

# Allgemeine Botanische Zeitschrift

für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben

von **A. Kneucker**, Werderplatz 48 in Karlsruhe.

Verlag von **J. J. Reiff** in Karlsruhe.

<b>N<sup>o</sup> 11.</b> <b>November</b>	— Erscheint am 15. jeden Monats. — Preis: vierteljährl. 1.50 Mk. bei freier Zusendung.	<b>1895.</b> <b>I. Jahrgang.</b>
---	---	-------------------------------------

## — Inhalt —

**Originalarbeiten:** O. Bückeler, Diagnosen neuer Cyperaceen. (Fortsetzung) — C. Warnstorf, Beiträge zur Kenntnis exotischer Sphagna. (Forts.) — Dr. J. Murr, Beiträge z. Kenntn. d. alpinen Archieracien Tirols. (Forts.) — L. A. W. Hasse, Schlüssel z. Einführung in das Studium der mitteleuropäischen Rosen. (Schluss) — H. Hofmann, Die Zwischenform v. *Asplenium viride* Huds. u. *A. adulterinum* Milde. — Dr. O. Zacharias, Ueber den Unterschied in den Aufgaben wandernder und stabiler Süßwasserstationen. (Schluss)

**Bot. Litteratur, Zeitschriften:** A. Kneucker, Dr. E. Huth, Flora von Frankfurt a.O. und Umgebung. Ref. — H. Trautschold, Jahresbericht der Kais. Moskauer Naturforschergesellschaft 1894/95. Ref. — H. Pöckerlein, Katalog d. Bibliothek d. kgl. bot. Gesellschaft zu Regensburg. Ref. — Inhaltsangabe verschied. bot. Zeitschriften etc.

**Bot. Anstalten, Vereine, Tauschvereine, Exsiccatenwerke, Reisen etc.:** Dr. P. Gräbner, Bot. Verein der Provinz Brandenburg. — Dr. Vollmann, Königliche botanische Gesellschaft zu Regensburg. — H. Pöckerlein, Kgl. bot. Gesellschaft zu Regensburg. — Zapfen von *Pinus Pallasiana* Lam. — *Plantae criticae Saxoniae*. — Stockholms Botaniska Byfes-Förenings „Floras Vänner“.

**Personalnachrichten.** — Zur Nachricht. (Auf d. Umschlag)

## Diagnosen neuer Cyperaceen.

Von O. Bückeler.

(Fortsetzung)

### 7. *C. pseudosurinamensis* Böckel.

Laete viridis; caespitosus; radices fibrillis numerosis validulis; culmo singulo abbreviato pertenui 9—10 poll. alto triangulo, basi incrassata multifoliato; foliis confertis rigidulo-herbaceis patentibus culmo longioribus planis longe angustato-acuminatis, marginibus spinuloso-scabris sesquilineam latis; capitulo hemisphaerico e simplicibus tribus subrotundis composito, 10 lin. diam., foliis 5 elongatis involu-crato; spiculis minutis confertis orbiculato-ovatis obtusis compressis 14—10 floris sesquilineam latis; squamis albidis laxe dispositis patentibus leviter incurvis oblongis obtusis muticis, nervo unico carinali; caryopsi squama parum brevior lineari-oblonga utrinque attenuata, subtilissime punctata fusca opaca. — Ex. affinit. *C. surinamensis*.

In insula Martinica leg. Hahn.

**Eucyperus.****8. *C. celluloso-reticulatus* Böckel.**

Viridis; culmo alto ac valido duro acutangulo laevi, lateribus duobus excavatis striatisve; foliis basilaribus . . . ; involucri foliis 8—6 patentibus coriaceo-rigidis carinato-planis nervosis, in superficie subtiliter celluloso-reticulatis, marginibus aculeolatis, inferioribus subsesquipedem longis 7—5 lin. latis; umbella composita explanata multi (12—8) radiata; radiis validis patentibus valde inaequalibus, 4—1 poll. long., leviter compressis, apice corymboso-ramosis; spiculis pluribus in apice ramorum confertis longis linearibus obtusis compressis multi — (30—50) floris 7—5 lin. longis; squamis distincte biserialibus, fructiferis patulis, late ovatis convexis, superne leviter angustatis acutiusculis, perspicue celluloso-reticulatis, stramineo-viridulis; car. squama  $\frac{1}{3}$  brevior anguste ovali, superne parum attenuata obtusa, obtuse triangulari subtiliss. celluloso-punctata flavo-albida.

Species peculiaris e sectione Bracteatorum. — E. Ule Fl. brasiliens. N. 1332.

In paludosis prope Tubarao prov. S. Catharina.

**9. *C. varius* Böckel.**

Culmo gracili stricte erecto 2 ped. et supra alto, inferne lineam diametro, triangulo leviter compresso laevi basin versus paucifoliato; foliis rigidulis sublaevibus inter nervos granulato-septatis, pedem circ. longis, complicatis, sursum longe angustatis, inferne  $1\frac{1}{2}$ —2 lin. latis; umbella 7 radiata simplici; radiis patentibus valde inaequalibus  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  poll. longis, intermedio sessili; capitulis variegatis glomerato-compositis orbiculato-triangularibus 7—6 lin. diam.; foliis involucri 3 patentibus  $5\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  poll. long. apicem versus margine denticulatis; spicularum fasciculis bractea brevi membranacea breviter cuspidata munitis; spiculis confertissimis orbiculato-ovatis obtusis 14—10 floris; squamis chartaceis dense imbricatis apice patulis, navicularibus oblongis e carina lata flavovirente breviter acutatis, lateribus purpurascens; car. ovali utrinque attenuata triangula subtiliss. granulata sordide straminea.

*C. consanguineo* Kauth et *C. Widgrenii* Böckel. proxime affinis.

Argentina. — G. Niederlein invenit.

**10. *C. longicaulis* Böckel.**

Intense viridis; culmo elongato tripedali et supra acute, triquetra parte superiore compresso, vix semilineam lato, laevi; foliis involucri (basilar. haud exstant) 5—3 valde inaequalibus acuminatis, longioribus 7—6 poll. long. ad 3 lin. latis multinervatis, superne pl. m. scabris, nervo carinali anguste alato; umbella simplici 7—5 radiata; radiis compresso-trigonis 2— $1\frac{1}{2}$  poll. long., v. omnibus monocephalis v. inferioribus (2) tricepalis; capitulis variegatis glomeratim compositis orbiculato-triangularibus 5—4 lin. diam.; spiculis confertissimis suborbiculatis obtusis 10—12—8 floris; squamis chartaceis tandem patentibus, navicularibus, oblongis leviter incurvis, carina flavo-virentibus, ad latera sanguineis, ex more ciliolatis; car. minuta squamae dimidium subaequante oblonga basi attenuata, obtusa triangulari valide mucronata, subtiliss. punctata fusciscenti-lutea. — Ex. affin. *C. varii*, *C. Widgrenii*.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [1\\_1895](#)

Autor(en)/Author(s): Böckeler Otto [Johann]

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Cyperaceen. 201-202](#)