

Schlüssel zur Einführung in das Studium der mitteleuropäischen Rosen.

(160 Arten, Abarten und Bastardformen.)

Von L. Aug. W. Hasse in Witten.

(Schluss)

- 2. Endblech, mit abgerundetem o. verschmälertem Grunde, vk.-eirundl. o. vk.eirundl.-oval, bis 21 : 35 mm, obers. fast kahl; Blütenst. weniger lang (bis 18 mm); Wulst fast kegelförmig; Grk. zottig; (*R. canina* v. *hispida* Tausch)

R. Tauschiana H. Braun.

- 2. Blech. nur unters. auf den Nerv. beh., br.-ov., zieml. gr.; Kz. zurückg. o. absteht.; Grk. woll.; Fr. eirund:

R. Lloydii Déséglise.

- 2) Frst. sehr kurz, nebst d. Rücken d. Kz. dr.; Fr. kugl.; Kz. spät abfall.; Grk. woll.; Kr. schönrosa; Blst. flaumig; Blech. eif.-ell., zugesp., nur unten auf den Nerven beh.; Zahnung bisweilen etw. gedopp.:

R. Zoisaeanu Oborny.

- *2. Gr. zieml. so l. w. d. Staubf., die innern zus.geklebt (aber nicht verwachsen wie bei *R. repens*), in der Regel ganz kahl; Wulst sehr hoch kugelig; Blütenst. sehr lang (bis 2 1/2 cm), reichl. mit kurzen, ungleichen Drüsenborsten besetzt; Blst. obers. zieml. dicht, unters. dünner flaumig; Blech. l.-ell., zugesp., am Gr. meist spitzwinklig, ganz einf.-ges., obers. sehr glänzend u. haarlos, unt. auf dem Rückgr. lockerh., auf den Rippen zerstreuth. (Westfalen b. Witten u. Hagen, Baden am Rhein b. Burkheim, Müllheim u. Istein, Vogesen, Schweiz a. d. nordwestl. Grenze):

R. stylosa Desroux.

§3. Blech. obers. dicht kurz, unt. dicht zottig, fast filzig;

‡1. Blütenst. m. o. w. lang, meist viel länger als die Fr.;

†1. Stacheln gleichartig, schwach gebogen bis zieml. grade; Zweige meist 3- u. mehrblütig: *R. tomentosa* Smith.

*1. Frucht ohne deutl. Hals;

×1. Kz. zurückg. o. ausgebr., früh abfallend, reichlich fiederlapp.; Gr. mäss. beh. bis kahl; Kr. blassrosa;

1) Endblech. breit, herzf., eif. o. oval;

1] die obere Endblech. der Blütenzw. vollst. o. vorherrschend einfach kerbzählig (gedoppelte Zahnung besonders an den untern Zweigblech.):

v. simplicidentata Hasse.

2] Endblech. vorherrschend doppelt gesägt; Subfoliadrüsen fehlend o. spärlich:

v. latifolia Hasse.

2) Endblech. lang-oval o. lang-ell.; Subfoliadrüsen häufiger, manchmal zahlreich:

v. longifolia Hasse.

- ×2. Kz. aufrecht o. ausgebreitet, lange bleibend, meist nur mit 1 o. 2 Fiederläppchen: Zahnung der Blch. reichl. drüsig; Subfoliadrüsen zahlreich; Kr. frischrosa bis purpurn;
- 1) Gr. mässig beh. bis kahl; Subfoliadr. dichtstehend; Zw. meist mehrblütig (vorzugsweise im östl. Teil des Gebiets): *r. umbelliflora* (Swartz).
 - 2) Grk. dichthaarig bis wollig; Zw. meist 1blütig; Subfoliadr. zerstreut o. dicht stehend (Mittel-Dtschl.): *r. venusta* (Scheutz).
- *2. Frucht in einen deutlichen Hals verschmälert; Kz. meist reichl. fiederlappig;
- ×1. Blch. unters. m. o. w. drüsig;
- 1) Gr. schwach beh. bis fast kahl; Kz. früh abfall.:
 - 1] Behaarung mässig: *r. lageniformis* Hasse.
 - 2] Blch. unters. (für tomentosa) auffall. schwach beh., aber von Drüsen rauh; Blüten zu 3—8, selten einzeln; Stacheln abw. gebog. o. gekrümmt: *r. scabriuscula* (Smith).
 - 2) Grk. dichth. bis wollig; Kz. aufrecht, scheinbar bleibend; Subfoliadr. meist fehlend; St. grade; *r. cristata* Christ.
- ×2. Blch. unters. drüsenlos; Kz. aufrecht o. ausgebr., bleibend;
- 1) Zahnung durchw. dopp. u. mehrf. (Schw., selt.): [*R. alpina* × *tomentosa*] *R. vestita* Godet.
 - 2) Zahnung der Endblch. vollst. o. teilw. einfach: [*R. alpina* × *tomentosa*] *R. Havnana* Kmet.
- ‡2. Stacheln mit Nadeln u. Borsten gemengt: Strauch nur $\frac{1}{2}$ —1 m h., mit rechtwinkl. absteh. Aesten; Blch. sehr br. eif. bis rundl., unters. mit im Filze versteckten, sehr zerstreuten kl. Drüsen, vorherrsch. einf. ges.; Frst. nebst der rundl.-ov. Fr. drüsenborstig; Kz. aufr., bleibend; Grk. wollig (Solothurn, Jura): *R. involuta* Smith.
- ‡2. Blütenst. kurz, die meisten noch nicht 1 cm l.; Kz. aufr., oft fortwachsend, bis zur Fruchtreife bleibend; Grk. wollig o. dichthaarig; Kr. frischrosa, fast purp.;
- ‡1. Zahnung vollst. drüsig dopp. u. mehrf.; St. immer ganz grade;
- *1. Wulstmündung wie gewöhnlich: von den Griffelenden überragt: *R. villosa* Linné.
- ×1. Frst. mit feinen Drüsenborsten; Endblch. breit-oval; Seitenblch. meist gedrängt, etwas aufeinandergeschoben;
- 1] Subfoliadrüsen sehr deutl., dicht; Endblch. spitz-oval (zerstr. in den Alp, sonst selten): *r. omissa* (Déséglise).
 - 2] Subfoliadr. versteckt, spärlich; Endblch. mit stumpfer Spitze; Fr. meist zieml. kl., etw. drüsenborstig o. glatt (sehr zerstr., oft mit voriger verwechselt): *r. mollis* (Smith).

×2. Frst. u. Fr. dicht mit drüsen-spitzigen Nadeln besetzt; Endbleh. längl., kurz zugespitzt, am Grunde schwach herzf. ausgerandet; Seitenbleh. entfernt, unters. reichl. mit kl., versteckten Dr. bes., oft auch obers. etwas drüsig (in den Alp. häufiger, sonst s. zerstr., häuf. kult.): *v. pomifera* (Herrmann).

*2. Wulstmündung ausserordentlich gross, die langhaarigen Griffel nicht eng von der Mündung umschloss. und nicht über dieselbe hinausragend; Kz. kurz: Bleh. spitz-oval, unters. rauhhaarig-dichtzottig (nicht filzig); Fr. glatt, kuglig: *R. Mauternensis* Keller.

†2. Zahnung teilweise einfach, wenig drüsig;

*1. St. sehr zahlr., fast grade; Bleh. kl., ov. u. ziemlich scharf zugesp.: Fr. gr., ov., in einen Hals auslaufend, die mittelständige keulig; Kz. sehr l., aufr., bleibend: *[R. coriif. × tomentosa?]* *R. colliraga* Cottet.

*2. St. spärlich, krumm; Bleh. sehr gr.: Kz. aufr., scheinbar bleibend: *R. Borernierana* Crépin.

4b. die mittleren Blätter normaler Blütenzw. mit 7 o. 9 Bleh.; Blüten meist einzeln, frischrosa; Blütenst. meist mit zerstreuten Drüsenborsten, oft auch glatt; Laub haarlos; St. grade o. wenig gekr.:

§1. St. gleichartig; Fr. birnf., l.-ov. o. ellipsoidisch; Grk. dichtwollig; Kz. aufr. o. ausgebr., bleibend (in der westl. Schweiz):

[R. alpina × glauca] *R. Salaerensis* Rapin.

§2. St. mit Borsten vermengt; Fr. eif., l.-ov. o. birnf.; Grk. kurzhaarig; Kz. lange bleibend: *R. Waitziana* Trattinnick.

3b. Kz. in der Regel ganz ohne Fiedern, nur ausnahmsw. mit 1 o. 2 Fiederchen, mit auffallend langer Spitze, meist aufr. u. bleibend;

a. Bleh. zu 5 o. 7; Grk. wollig:

§1. Bleh. vollst. o. vorherrsch. einf.-ges.;

S1. Blst. n. Bleh. ganz haarlos:

≠1. Stämme u. Aeste mit sehr zerstr. graden o. kaum gebog. St.; Bleh. ganz einf.-ges.; Blütenst. glatt o. drüsenborstig; Kr. frischrosa (Alpen, Schwarzw., Vogesen):

R. ferruginea Villars.

≠2. Stämme u. Aeste mit zahlr., dünnen, graden St. u. Borsten; Bleh. fast ganz einf.-ges.; Blütenst. glatt; Kr. blassrosa o. weiss (kultiv.): *v. blanda* (Aiton).

S2. Blst. schwach beh. bis filzig;

≠1. Bestachelung doppelt; Bleh. zu 5 o. 7., obers. kahl o. schwach flaumig, unt. dichtfl., Blütenst. glatt:

†1. Bleh. lang-ell., mit etwas keiligem Grunde (Alp.):

R. cinnamomea Linné.

†2. Bleh. eif. o. ov., spitz o. stumpf; Frst. u. Fr. meist drüsenborstig, selten glatt (gezogen in Gärten u. als Heckenpflanze, oft verwildert):

R. turbinata Aiton.

≠2. Bestachelung einfach; St. zerstreut, derb, schwach gekrümmt bis priemenf., mit schmal-ell. Grunde; Blst. flaumig-filz.: Bleh. zieml. gr., eif. bis eif.-ell., sp., obers. fein flaumh., unt. weich graufilzig; Blütenst. glatt: (Var. v. *R. coriifolia?*)

R. incana Kitaibel.

- ‡3. Bestachelung fast ganz fehlend, nur selt. unt. am Stamm mit einzelnen, fast graden St. mit verbreitert. Grunde; Blch. ober. kahl, unt. auf d. Nerven o. auf der ganz. Fläche beh.;
 †1. Blütenst. zerstr. drüsenb.: [*R. alpina* × *coriifolia*]
R. stenosepala Christ.
 †2. Blütenst. glatt; Blch. zu 7: *R. subinermis* Besser.
- §2. Blch. dopp.-ges., zu 5 o. 7 (selten zu 9), oval, ober. kahl, unt. meist etwas flaumig u. wenigst. die untern Zweigblch. drüsig; Blst. beh. u. drüsig; Blütenst. sehr drüsenborst.; Kz. kürzer als die Krbl., auf dem Rücken drüs., aufr., bleibend; Grk. wollig; St. ungleich, grade, pfrieml. u. borstl.; Str. meist kl.;
- S1. nur die untern Zweigblättchen mit Subfoliadr.; Blch. klein; die Endblch. normaler Blütenzw. 15—20 mm l.; Blst. stachel.; Frst. einzeln, herabgebogen; Fr. eif. u. oben verdünnt (aber nicht halsartig eingeschnürt) o. ellipsoidisch; Blütenzw. stachelig; Kr. dunkel- o. hellrosa (Engadin, Tirol, Steierm., Krain, Ungarn):
 [*R. pimpin.* × *alpina*?] *R. reversa* Kitaibel.
- S2. alle Blch. unters. mit zahlreichen Drüsen; die Endblch. normaler Blütenzw. bis 25 mm l.; Blst. wehrlos; Frst. einzeln u. zu 2, grade; Fr. kugl.; Blütenzw. oft wehrl.; Kr. purpurfarb. (Neuchâtel):
 [*R. omissa* × *pimpin.?*] *R. dichroa* Lerch.
- b. die mittleren Bl. der Blütenzw. mit 7—11 Blättchen; diese in der Regel kahl u. glatt, seltener unters. spärll. beh. o. drüs.; Blst. meist ohne Haare u. Drüsen, häufig m. o. w. drüsig u. oft auch etwas behaart;
- S1. Blch. sehr kl. o. kl., die grössten Endblch. normaler Blütenzweige höchstens 18 mm l., rundl. o. br.-oval, ohne Spitze, aber am Stielchen meist etwas eckig;
- ‡1. Fr. meist kugelig u. ohne Hals, selten birnförm. u. dann oft kurz-halsig, in der Regel an gradem (nicht herabgebogenem) Stiel; Blch. meist sehr kl.; Endblch. 10—17 mm l., vk.-eirund o. rundl.-ov., am Ende abgerundet, aber am Stielchen etw. eckig (auf kalkigem Boden nicht selten, auch häufig in Gärten gezogen):
R. pimpinellifolia Linné.
- *1. Blütenst. glatt; Griffelbündel wenigstens unten herum wollig o. dichthaarig; Kr. weiss; Blch. einf.-ges.:
v. scotica Miller.
- *2. Blütenst. stieldr.;
- ×1. Griffelbündel wenigst. unten herum wollig o. dichth.;
 1] Blch. einf.-ges.; Kr. gewöhnlich weiss, selten blass-rosa:
v. spinosissima (Linné).
 2] Blch. dopp.-ges. u. unters. drüsig; Kr. weiss:
v. myriacantha (De Candolle).
- ×2. Gr. verlängert, ein lockeres Büschel bildend, oben kahl, unt. schwach beh.; Blst. u. Rückgr. der Blch. flaumig:
v. Besseri (Trattinnick).
- ‡2. Fr. längl.-ellipsoidisch; Frst. grade, stieldr.; Blst. kahl u. glatt o. stieldr.; Blch. kl., eirund o. rundl.-ov., kahl u. glatt, dopp.-ges.; Grk. gr., dichtwollig (Krain, Istrien, Kroatien, Bosnien):
 [*R. alpina* × *pimpinellif.?*] *R. gentilis* Sternberg.
- §2. Blch. grösser (d. h. die Endblch. kaum unter 18 mm l.);
 ‡1. Blütenzw. meist stachelig; Blst. fast ohne Haare u. Drüsen; Endblch. (18—27 mm l.) längl., oval, ell.-längl. o. ell., meist

stumpf, vorherrsch. einfach ges.; Kr. trübrosa, aussen weisslich; Grk. oben fast kahl, unt. woll.; Fr. rundl.-eif. o. birnf., oft kurz-halsig; Frst. glatt o. stieldr., herabgebogen (westl. Schweiz):

[*R. alpina* × *pimpin.*?] *R. rubella* Smith.

- ♯2. Blütenzw. meist wehrlos; Blst. haarlos o. beh., m. o. w. drüs.; Endblech. (30—54 mm l.) ell. u. am Ende stumpf o. ell.-oval u. spitz, seltener länglich eif.-ell., dopp.-ges., meist kahl; Kr. frisch purpurn; Gr. wollig; Fr. lang-eif. o. birnf. u. m. o. w. halsig, bisweilen flaschenf., selten kugl.; Frst. gewöhnl. stieldr., herabgebogen (Alpen, Jura, Vogesen, Schwarzw., Sudeten):

R. alpina Linné.

2b. Griffel zu einer dünnen Säule verwachsen, so l. wie die Staubf. o. länger;

§1. Blech. eif. bis rundl.; Oehrchen der Nbl. eif., zugesp., grade; Gr. kahl (im mittleren u. südlichen Teil des Gebiets, mehr als andere Arten sich in Wäldern haltend):

R. repens Scopoli 1760.

§1. alle Stämme u. Aeste hingestreckt u. oft wurzelnd; Blütenzw. aufrecht u. sehr lang; Kr. weiss:

v. decumbens Hasse.

§2. Stämme stärker, steif aufr., bis 1 1/2 m h.; Aeste u. Zweige kürz., abstehend; Kr. schwach rosa: (*R. silvestris* ß *stricta* Spenner.)

v. stricta Sp.

§2. Blech. rundl.-ell., mit angebogenen Zähnen; Oehrchen der Nbl. lanz., abwärts gebogen; Gr. zottig o. kahl (kultiviert, in Istrien wild):

R. sempervirens Linné.

1b. Blech. derb, fast lederähnlich, an den Blütenzw. meist über 2 cm breit; Blütenst. 2—5 cm lang, fein drüsenborstig; Kr. 5 1/2 bis 7 1/2 cm breit, dunkelrot; Stämme nur 1/3—1 m hoch (im mittl. u. südl. Teil des Gebiets):

R. Gallica Linné.

a. Blech. rundl. o. br.-ov. u. spitz;

α) Grk. stark beh. bis wollig;

1] Blech. einf.-ges., aber die Zähne reichdrüs. gewimp.:

v. austriaca (Cronz).

2] Blech. dopp.-ges., das Endblech. rundl.-herzf.:

v. cordifolia (Host).

β) Gr. fast kahl:

v. laevis (L.)

b. Blech. lang-ov.:

v. genuina.

Inhaltsangabe, alphabetisch geordnet.

	Seite		Seite
<i>abietina</i> Grenier	154	<i>affinis</i> Rau	148
<i>v. Addensis</i> Cornáz	149	<i>v. abscondita</i> (Chr.)	149
<i>v. Brueggeri</i> Godet	154	<i>v. Addensis</i> Cornáz	149
<i>v. capnoides</i> (A. Kern.)	154	<i>v. Borreri</i> (Woods)	151
<i>v. confusa</i> Puget	155	<i>v. densiflora</i> Sér.	149
<i>v. eglanulosa</i> Chr.	148	<i>v. Guentheri</i> Wiesb	149
<i>v. Gisleri</i> (Puget)	155	<i>v. Obornyana</i> Chr.	154
<i>v. Glaronensis</i> Chr.	148	<i>v. pubescens</i> Hasse	148
<i>v. Guentheri</i> Wiesb.	149	<i>v. scabrata</i> (Crép.)	148
<i>v. Heerü</i> Chr.	156	<i>v. sclerophylla</i> Chr.	
<i>v. orophila</i> Gren.	156	= <i>R. pseudopsis</i> Grmbl.	148
<i>v. Thomasü</i> (Pug.)	156	<i>v. subglabra</i> Hasse	148
<i>v. Thomasü</i> (Lagg.)	154	<i>v. Tirolensis</i> (A. Kern.)	154
<i>abscondita</i> Chr.	149	<i>agrestis</i> Savi	149
<i>aciphylla</i> Rau	146	<i>v. caryophyllacea</i> (Bess.)	150

	Seite		Seite
<i>r. elliptica</i> (Tausch)	150	<i>r. Hausmanni</i> (H. Brn.)	148
<i>r. eriostyla</i> Hasse	149	<i>r. incana</i> (Kit.)	147 211
<i>r. Friesiana</i> Chr.	152	<i>r. intermedia</i> (Kit.)	147
<i>r. Killiasi</i> God.	152	<i>r. pseudopsis</i> (Grenli)	148
<i>r. Kluckii</i> (Bess.)	150	<i>r. pseudo-venosa</i> (H. Brn.)	147
<i>r. laeristyla</i> Hasse	149	<i>r. pycnanantha</i> (Borb.)	147
<i>alba</i> L.	156	<i>r. subbiserrata</i> Borb.	148
<i>albida</i> Kmet	148	<i>r. vera</i> .	147
<i>alpestris</i> Rapin	151	<i>corymbifera</i> Borbk.	156
<i>alpina</i> L.	213	<i>Cotteti</i> Lagg.	151
<i>andegarensis</i> Bast.	146	<i>Damascena r. densiflora</i> Sér.	149
<i>anisopoda</i> Chr.	153	<i>decora</i> A. Kern.	147 149
<i>r. Lernitzensis</i> Kell.	153	<i>dichroa</i> Lerch.	212
<i>arvensis</i> Hudson = <i>repens</i> Scop.	213	<i>drosophora</i> H. Brn.	152
<i>Austriaca</i> Crantz	213	<i>dumalis</i> Bechst.	146
<i>bellerallis</i> Pug.	156	<i>dumetorum</i> Thuill.	147
<i>Besseri</i> Trattinnick	212	<i>r. pilosa</i> (Opitz)	147
<i>biserrata</i> Mérat	146	<i>r. pubescens</i> Hasse	147
<i>blanda</i> Aiton	211	<i>r. subglabra</i> Hasse	147
<i>Blondeana</i> Rip.	154	<i>r. Woloszczakii</i> (Kell.)	147
<i>Bohemica</i> H. Brn.	149	<i>elliptica</i> Tausch.	150
<i>Boreykiana</i> Bess.	156	<i>eriostyla</i> Rip.	146
<i>Borreri</i> Woods	151	<i>Erlbergensis</i> H. Brn.	149
<i>Borneriana</i> Crép.	211	<i>ferruginea</i> Vill.	211
<i>Braunii</i> Keller	155	<i>r. blanda</i> (Aiton)	211
<i>canina</i> L.	146	<i>flagellaris</i> Chr. et Grml.	151 153
<i>r. aciphylla</i> (Rau)	146	<i>flexuosa</i> Rau	155
<i>r. andegarensis</i> (Bast.)	146	<i>fraginifolia</i> Borbk. = <i>blanda</i> Aiton	211
<i>r. biserrata</i> (Mérat)	146	<i>frutetorum</i> Bess.	148
<i>r. Chaberti</i> (Déségl.)	146	<i>Gallica</i> L.	213
<i>r. dumalis</i> (Bechst.)	146	<i>r. Austriaca</i> (Crantz)	213
<i>r. eriostyla</i> (Rip.)	146	<i>r. cordifolia</i> (Host)	213
<i>r. globosa</i> (Desc.)	146	<i>r. genuina</i>	213
<i>r. hispidula</i> Tausch.	146	<i>r. laeristyla</i>	213
= <i>R. Tauschiana</i> H. Brn.	209	<i>gentilis</i> Sterub.	212
<i>r. luteiana</i> (Leman)	146	<i>Gisleri</i> Pug.	155
<i>r. macrocarpa</i> (Mérat)	146	<i>glabrata</i> Vest	151
<i>r. mucronulata</i> (Déségl.)	146	<i>glauca</i> Vill.	146
<i>r. oblonga</i> (Déségl.)	146	<i>r. complicata</i> (Gr.)	147
<i>r. Pouzini</i> (Fratt.)	146	<i>r. fugax</i> (Gr.)	147
<i>r. Schattiana</i> Seringe	146	<i>r. Mageri</i> (H. Brn.)	147
<i>r. squarrosa</i> (Rau)	146	<i>r. montiraya</i> (Déségl.)	147
<i>r. syntrichostyla</i> (Rip.)	146	<i>r. pinnatifida</i> Sér.	147
<i>capnoides</i> A. Kern.	154	<i>globosa</i> Desc.	146
<i>caryophyllacea</i> Besser apud Christ	150	<i>globularis</i> Franch.	148
<i>r. Friesiana</i> Chr.	152	<i>Granensis</i> Kmet.	149
<i>r. Killiasi</i> God.	152	<i>graccolens</i> Gr. = <i>elliptica</i> Tausch.	150
<i>Chaberti</i> Déségl.	146	<i>Hampeana</i> Griseb.	150
<i>cinerea</i> Rap.	148	<i>Havranca</i> Kmet.	210
<i>cinnamomea</i> L.	211	<i>incana</i> Kit.	147 211
<i>collina</i> Jacq.	156	<i>intermedia</i> Kit.	147
<i>colliraga</i> Cott.	211	<i>incoluta</i> Sm.	210
<i>confusa</i> Pug.	155	<i>Jundzilliana</i> Bess.	155
<i>complicata</i> Gren.	147	<i>Kernerii</i> H. Brn.	156
<i>cordifolia</i> Host.	213	<i>Killiasi</i> God.	152
<i>coriifolia</i> Fries	147	<i>Kluckii</i> Bess.	150
<i>r. albida</i> (Kmet)	148	<i>livescens</i> Bess.	150
<i>r. cinerea</i> (Rap)	148	<i>r. Aliothii</i> Chr.	150
<i>r. glandulosa</i> Chr.	148	<i>r. alpestris</i> (Rap.)	151
<i>r. Erlbergensis</i> (H. Brn.)	149	<i>r. aspreticola</i> (Grml.)	155
<i>r. frutetorum</i> (Bess.)	148	<i>r. Blondeana</i> (Rip.)	154
<i>r. Glaronensis</i> Chr.	148	<i>r. Borreri</i> (Woods)	151
<i>r. globularis</i> (Franch.)	148	<i>r. capnoides</i> (A. Kern.)	154

	Seite		Seite
<i>r. Cotteti</i> (Lagg)	151	<i>r. glabriuscula</i> Pirm.	152
<i>r. flexuosa</i> (Rau)	155	<i>r. heteracantha</i> Hasse	152
<i>r. glaberrima</i> Hasse	150	<i>r. laeris</i> G. Meyer	152
<i>r. glabrata</i> (Vest)	151	<i>r. leiostyla</i> Chr.	153
<i>r. Hampeana</i> (Gris.)	150	<i>r. LERNITZENSIS</i> Kell.	153
<i>r. heteracantha</i> Chr.	152	<i>r. macrantha</i> Neilr.	153
<i>r. Jundzilliana</i> (Bess.)	155	<i>r. micrantha</i> (Sm.)	153
<i>r. marginata</i> (Wallr.)	152	<i>r. micranthoides</i> (Kell.)	153
<i>r. nitidula</i> (Bess.)	151	<i>r. nemorosa</i> (Lib.)	153
<i>r. pseudo-alpestris</i> Hasse	151	<i>r. nuliuscula</i> Pirm.	152
<i>r. reticulata</i> (A. Kern.)	154	<i>r. permixta</i> (Déségl.)	153
<i>r. Schmidtii</i> (H. Brn.)	150	<i>r. pubescens</i> Pirm.	152
<i>r. Tolosana</i> (Timb.)	155	<i>r. Sagorskii</i> Chr.	153
<i>r. trachyphylla</i> (Rau)	151	<i>rubrifolia</i> Vill. = <i>ferruginea</i> Vill.	211
<i>Lloydi</i> Déségl.	209	<i>sabini</i> Woods = <i>involuta</i> Sm.	210
<i>lutea</i> Daléch.	150	<i>Salaerensis</i> Rapaia	211
<i>lutetiana</i> Leman	146	<i>Salsanensis de la Soie</i>	155
<i>macrocarpa</i> Mérot	146	<i>scabrata</i> Crép.	148
<i>marginata</i> Wallr.	152	<i>scabriuscula</i> Sm.	210
<i>Mauternensis</i> Kell.	152	<i>Schmidtii</i> H. Brn.	150
<i>Mayeri</i> H. Brn.	147	<i>Schottiana</i> Sér.	146
<i>micrantha</i> Sm.	153	<i>sempervirens</i> L.	213
<i>r. nemorosa</i> (Lib.)	153	<i>sepium</i> Th = <i>agrestis</i> Suri	149
<i>r. permixta</i> (Déségl.)	153	<i>similata</i> Pug.	155
<i>r. Sagorskii</i> Chr.	153	<i>sphaerica</i> Gren.	146
<i>micranthoides</i> Kell.	153	<i>spinosissima</i> L. = <i>pimpinellifolia</i>	212
<i>mollis</i> Sm.	210	<i>squarrosa</i> Rau	146
<i>montana</i> = <i>glabrata</i>	151	<i>stenosepala</i> Chr.	212
<i>montivaga</i> Déségl.	147	<i>stylosa</i> Désr.	209
<i>myriacantha</i> De Candolle	212	<i>subinermis</i> Bess.	212
<i>macronulata</i> Déségl.	146	<i>superba</i> A. Kern.	155
<i>nemorosa</i> Lib.	153	<i>syntrichostyla</i> Rip.	146
<i>nitidula</i> Bess.	151	<i>Tauschiana</i> H. Brn.	209
<i>oblonga</i> Déségl.	146	<i>Tirolensis</i> A. Kern.	154
<i>Obornyana</i> Chr.	154	<i>Thomasii</i> Pug.	156
<i>oncissa</i> Déségl.	210	<i>Tolosana</i> Timb.	155
<i>permixta</i> Déségl.	153	<i>tomentella</i> Leman 1818	
<i>pilosa</i> Opitz	147	= <i>affinis</i> Rau 1816:	148
<i>pimpinellifolia</i> L.	212	<i>tomentosa</i> Sm.	209
<i>r. Besseri</i> (Tratt.)	212	<i>r. cristata</i> Chr.	210
<i>r. myriacantha</i> (DC.)	212	<i>r. lageniformis</i> Hasse	210
<i>r. scotica</i> Miller	212	<i>r. latifolia</i> Hasse	209
<i>r. spinosissima</i> (L.)	212	<i>r. longifolia</i> Hasse	209
<i>pomifera</i> Hrrm.	211	<i>r. scabriuscula</i> (Sm.)	210
<i>Pouzian</i> Tratt.	146	<i>r. simplicidentata</i> Hasse	209
<i>r. subintrans</i> Gren.	154	<i>r. umbelliflora</i> (Sw.)	210
<i>pseudopsis</i> Grml.	148	<i>r. renusta</i> (Scheutz)	210
<i>pycnacantha</i> Borb.	147	<i>trachyphylla</i> Rau = <i>livescens</i> Bess.	151
<i>repens</i> Scopoli	213	<i>turbinata</i> Aiton	211
<i>r. decumbens</i> Hasse	213	<i>umbelliflora</i> Sw.	210
<i>r. stricta</i> Sp.	213	<i>Uriensis</i> Lagg.	154
<i>reticulata</i> A. Kern.	154	<i>Valesiaca</i> Lagg.	154
<i>Reuteri</i> = <i>glauca</i>	146	<i>renusta</i> Scheutz	210
<i>reversa</i> Kt.	212	<i>restita</i> God	210
<i>rubella</i> Sm.	213	<i>rillosa</i> L.	210
<i>rubiginosa</i> L.	152	<i>r. onissa</i> (Déségl.)	210
<i>r. aculeata</i> Hasse	153	<i>r. mollis</i> (Sm.)	210
<i>r. anisopoda</i> (Chr.)	153	<i>r. pomifera</i> (Herrm.)	211
<i>r. denudata</i> Gr.	153	<i>Waltziana</i> Tratt	211
<i>r. drosophora</i> (H. Brn.)	152	<i>Woloszczakii</i> Kell.	147
<i>r. flagellaris</i> Chr.	151	<i>Zoisacana</i> Oborny	209

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [1_1895](#)

Autor(en)/Author(s): Ha Hasse L.Aug.W.

Artikel/Article: [Schlüssel zur Einführung in das Studium der mitteleuropäischen Rosen. 209-215](#)