

Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc.

Referierendes Organ

des bot. Vereins der Provinz Brandenburg, der kgl. bot. Gesellschaft zu Regensburg,
und Organ des Berliner und schlesischen bot. Tauschvereins.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben

von **A. Kneucker**, Werderplatz 48 in Karlsruhe.

Verlag von **J. J. Reiss** in Karlsruhe.

Nº 6.	— Erscheint am 15. jeden Monats. —	1896.
J u n i	Preis: vierteljährl. 1.50 Mk. bei freier Zusendung.	II. Jahrgang.

Inhalt

Originalarbeiten: O. Böckeler, Diagnosen neuer Cyperaceen (Fortsetzung). — Lujo Adamovic, Neue Beiträge zur Flora von Serbien. (Forts.) — Br. Blocki, Aufklärung über einige galizische Euphrasien. — H. Rottenbach, Die Verbreitung der Potentilla thuringiaca Bernh. (Schluss). — C. A. Knabe, Pflanzenphysiognomische Skizzen aus dem südwestlichen Finnland (Forts. statt Schluss!). — O. Kuntze, Die Wiener Nomenklatur-Vorschläge. — A. Kneucker, Bemerk. zu den „Carices exsicc.“ (Schluss)

Bot. Litteratur, Zeitschriften etc.: A. Kneucker, Höck, Dr., Laubwaldflora Norddeutschlands. Ref. — Derselbe, Dörfler, J., Botaniker-Adressbuch, Ref. — H. Trautschold, Fadjäev, A. F., Honigtragende Pflanzen des Urals. Ref. — Inhaltsangabe verschiedener bot. Zeitschriften.

Bot. Anstalten, Vereine, Tauschvereine, Exsiccatenwerke, Reisen etc.: Dr. P. Graebner, Bot. Verein d. Prov. Brandenburg. — F. Petzi, Kgl. bot. Gesellschaft zu Regensburg. — Huter, Rupert, Katalog verkäuflicher Pflanzen.

Personalnachrichten. — Zur Nachricht (auf d. Umschl.).

Diagnosen neuer Cyperaceen.

Von O. Böckeler.

(Fortsetzung)

52. *R. perrigida* Böckel.

Glaucomvirens; in omnibus partibus rigida; culmo gracili elongato, 2—1 pedali semilineam diametro, supra basin bulboso incrassatam duram vaginis brunneis obtectam paucifoliato; foliis confertis tenacibus planis breviter angustato-acuminatis laevibus pedem circ. longis semilineam latis; capitulo nudo globoso ferruginescenti-albido e spicularum fasciculis composito 5—6 lin. diametro, basi squamis majusculis coriaceo-perrigidis convexis mucronatis munito; spiculis teretiusculis oblongis albidis 3 lin. circ. longis monocarpis; squamis (6) confertis perrigidis carinato-naviculatis albis v. ferruginescentibus lanceolato-ovatis, interioribus decrescentibus; caryopsi (non perfecte matura) grandiuscula flava obovata obtusa tumido-biconvexa seriatim subtilissime applanato-granulata; rostro longo e basi lata compressa rugosa angustato; perigonii setis 4 validis hispidulis ferrugineis caryopsin rostratam subaequantibus. — Species peculiaris ex habitu *R. flavidae* modice similis. — H. Pittier et H. Durand Pl. costaric. no. 6549.

Buenos Aires.

53. *R. tenerrima* Böckel. var. *flexuosa* ejd.

Culmis foliisque flexuosis; squamis muticis; car. late obovata turgidula; perigonii setis tabescentibus. — Ule Herb. Brasil. no. 1935.
Brasilia.

54. *R. heterolepis* Böckel.

Glaucovirens; in omnibus partib. rigida; culmo tenui duro c. infloresc. 13—8 poll. alto triangulari basin versus plurifoliato; foliis erectis culmum subaequantibus angustis canaliculatis acute carinatis, parte longa superiore triquetris, ad angulos denticulatis; corymbis 3 remotis pluriramosis densis: terminali composito quam bractea sua parum breviore pollicem alto, lateralibus simplicibus longe bracteatis semipollicem altis ac latis; ramis patentibus brevibus; spiculis binatis sessilibus oblongo-lanceolatis 4 lin. circ. long. subquadrifloris, floribus inferioribus binis fertilibus; squamis difformibus: exterioribus 4 rigidis late ovatis obtusis mucronatis convexis ferrugineo-stramineis nitidis, interioribus longioribus membranaceis cuspidatis ferrugineis; car. parva squamae dimidium vix aequante turgide biconvexa depresso-obovata vertice truncata, breviss. stipitata, longitudinaliter rugoso et poroso-granulata, ferrugineo-lutea; rostro brevi pyramidali obtuso reguloso pallido. Ex affin. *R. nardifoliae*. — Coll. A. Glaciou no. 17870.

Brasilia.

55. *R. Durandiana* Böckel.

Caespitosa; rhizone parum elongato pauciramoso brunneo, fibrillis radicalibus validulis; culmis e foliorum fasciculis singulis erectis tenuibus firmis 9—6 poll. altis teretibus striolatis; foliis numerosis confertis rigidis angustis obtusiusculis carinato-planis lineam latis, apice ad margines denticulatis; fasciculis corymbosis 5—6 parvis (3 lin. diam.): terminalibus 2 oppositis sessilibus breviter bracteatis, lateralibus valde remotis pedunculatis bracteis longis munitis; spiculis dense confertis oblongis brunneis acutiusculis $1\frac{1}{2}$ lin. long. monocarpis; squamis membranaceis ovato-lanceolatis acutis; car. parvula squamae dimidium aequante obovata obtusa, basi attenuata, lenticulari-biconvexa, obsolete marginata, transversim undulato-rugulosa flava; rostro illam aequante pallide viridi e basi latiuscula soluta conico-attenuato; perigonii setis (4) subtilibus concoloribus caryopsin rostratam aequantibus. — Species insignis, *R. fuscae* modice similis.

In Costarica coll. H. Pittier.

56. *R. maculata* Maury. Contrib. p. 146.

Viridis; caespitosa; rhizom. brevissimo, fibrillis radicalibus validis vaginisque brunneis; culmis pluribus gracilibus strictis rigidis 18—15 poll. altis obtusangulis foliosis; foliis rigidulis angustis, vix lineam latis, carinato-planis breviter acuminatis, margine vix denticulatis, superioribus culmum subaequantibus; paniculis 1—3: terminali contracta spiciformi perdensa ovata 1 poll. alta, bracteis interpositis foliaceis elongatis, sequentibus remotis pedunculatis diminutis; spiculis fasciculatis parvis oblongis obtusis paucifloris $1\frac{1}{2}$ lin. long. fasciculisque sessilibus; squamis perdense dispositis membranaceis ferrugineo-fuscis oblongo-ovalibus muticis, margine angusto hyalino-pallidis; car. perminuta squamae partem quartam subaequante orbi-

culari v. obovata, biconvexa transversim rugulosa ferruginea; rostro trianguli acuto lacunuloso luteolo. — *R. spicata* Böckel, in litt. — Species peculiaris et insignis ex habitu *R. cephaloti* aliquantum similis. — E. Ule Pl. brasil. no. 1611.

Prov. S. Catharina: Serra do Oratorio.

(Fortsetzung folgt)

Neue Beiträge zur Flora von Serbien.

Von Lujo Adamovic, Gymnasiallehrer zu Vranja.

(Fortsetzung)

Alyssum minutum Schl. An Weideplätzen und auf sonnigen Hügeln um Vranja. ca. 600—900 m. Sand und Schiefer. April, Mai. Von *A. campestre* L. und *A. calycinum* L. durch kahle Schötchen zu unterscheiden. Von *A. minimum* W. durch zweierlei Bekleidung (sternhaarige und zugleich auch abstehende langhaarige), gedrungene Inflorescenz, dauernden Kelch etc. verschieden.

Thlaspi Kovacsii Henuff. Auf Alpenmatten des Midzor, Kopren, Tri Cuje, Vrazija Glava, Tupanac und Streser. Um Vlasina und auf der Motina. 1200—2100 m. Mai, Juni. Mit banater Exemplaren vom klass. Standorte vollkommen übereinstimmend.

Polygala bosniaca Murrb. (*P. serbica* Adam. ined.!) In lichten Wäldern des Vujan bei Gornji Milanovac. Kalkboden. Gehört in die Verwandtschaft der *P. supina* Schr., scheint aber doch eine gute, selbständige Art zu sein.

Moenchia graeca B. H. var. *serbica* Adam. Exsicc. 1895 (Dr. Baenitz Herb. europ.). ⊙ Omnibus partibus minor, gracilior, caule saepe unifloro, foliis tenuioribus, floribus minoribus bracteis sepalisque magis lanceolatis, hisce sub fructu in pedicellum valde incrassatum sensim abeuntibus, a typo recedit. Sonnige Abhänge der Pljackavica und trockene Weideplätze um Vranja. ca. 600—900 m. April blühend.

Spergula pentandra L. Auf Hügeln um Preobrazenje, Coska, Balinovac und Sobina nächst Vranja. Immer in Gesellschaft von *Alsine riscosa* Schreb., *Psilurus nardooides* Trin. und *Arenaria serpyllifolia* L.

Viscaria atropurpurea Grsb. Auf steinigen Hügeln um Vranja, an Abdachungen der Pljackavica. 600—900 m. Mai.

Linum angustifolium Huds. Auf sonnigen Hügeln und trockenen Weideplätzen am Fusse der Pljackavica und Krstilovica bei Vranja, ca. 700 m.

Cytisus rectipilosus Adam. „Nastavnik“ IV p. 8, Belgr. 1893. (Synon. *Cytisus ambiguus* Adam. Oest. bot. Z. 1892 Nr. 12 non Schuhrt!) In der höheren Bergregion der Bassara bei Pirot. Loc. class. Kalkboden. ca. 1300 m. Juni. Statura (tota planta vix 20 cm alta) indumento longo patule piloso, pilis rectis, foliis majoribus ab affini *C. procumbenti* W. K. dignoscitur. A *C. agnipro* Vel. pilis rectis non crispis, foliis majoribus, turionum acutatis, fasciculorum oblongo-linearibus obtusis vel mucronulatis diversus.

Cytisus Petroviciei nova, spec. ♂ Fruticulosus; ramis elongatis gracilibus tenuibus; foliis utrinque albo-sericeis, in ramulis hornotinis alternis solitariis subpedunculatis oblongis, floriferis fasciculatis

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [2_1896](#)

Autor(en)/Author(s): Böckeler Otto [Johann]

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Cyperaceen. 93-95](#)