

Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae“

von A. Kneucker.

III. u. IV. Lieferung 1901.

(Schluss.)

- Nr. 89. *Crypsis aculeata* Ait. Hort. Kew. ed. I, p. 48 (1789) = *Schoenus aculeatus* L. Spec. pl. ed. I, p. 42 (1753) = *Heleochoa diandra* Host Fl. Austr. I, p. 77 (1827).

Auf Salzwiesen bei Soroksár im Komitat Pest in Ungarn. Begleitpflanzen: *Atropis limosa* Schur, *Agrostis alba* L., *Chlorocyperus Pannonicus* (Jacq.) Rikli, *Scirpus maritimus* L., *Plantago maritima* L., *Achillea crustata* (Rochel), *Aster tripolium* L.

110 m ü. d. M.; 31. Aug. 1900.

leg. C. v. Flatt.

- Nr. 90. *Heleochoa schoenoides* Host Gram. Aust. I, p. 23 (1801) = *Phleum schoenoides* L. Spec. pl. ed. I, p. 60 (1753) = *Crypsis schoenoides* Lam. Illustr. I, p. 166 t. 42 fig. 1 (1791).

Auf alluvialem Sandboden am Ufer des Dniepr bei Kiew in Süd-russland. Begleitpflanzen: *Eragrostis pilosa* P. B., *Heleochoa alopecuroides* Boiss., *Eucyperus fuscus* (L.) Rikli, *Rumex Ucrainicus* Fisch., *Limosella aquatica* L., *Dichostylis Micheliana* Nees.

88 m ü. d. M.; 14. Sept. 1900.

leg. N. Zinger.

- Nr. 91. *Phleum pratense* L. Spec. pl. ed. I, p. 59 (1753), *v. nodosa* (L.) Syst. ed. 10, p. 871 (1759), *f. laxiuscula* Aschs. & Gräbn. Syn. II, p. 143 (1899).

An trockenen Stellen bei Wettelroda unweit Sangerhausen in Thüringen; Buntsandstein. Begleitpflanzen: *Dactylis glomerata* L., *Poa annua* L., *Bromus mollis* L., *Festuca ovina* L., *Lolium perenne* L., *Lotus corniculatus* L., *Achillea millefolium* L., *Trifolium repens* L., *Cerastium arvense* L., *triviale* Lk., *Hypericum perforatum* L. etc.

Ca. 250 m ü. d. M.; 25. Juni 1900.

leg. W. Becker.

- Nr. 92. *Phleum Boehmeri* Wibel *f. infecta*.

Auf trockenen Stellen unter lichtem Gebüsch, an Waldrändern etc. hauptsächlich am Rheingrafenstein bei Münster am Stein nahe bei Kreuznach; Porphy. Begleitpflanzen: *Melica nutans* L., *ciliata* L. α . *Linnaei* Hack., *M. Transsilvanica* Schur, *Potentilla cinerea* Chaix, *argentea* L. *f. tomentosa* Döll, *Alyssum montanum* L., *Geranium rotundifolium* L., *lucidum* L., *Acer Monspessulanum* L.

Ca. 240 m ü. d. M.; 9. u. 13. Juni 1900.

leg. L. Geisenheyner.

Die hier ausgegebene Missbildung ist im ganzen Gebiet von Münster a. St., hauptsächlich aber am Rheingrafenstein und Rothenfels bei weitem häufiger als die normale Pflanze. Nach Hackels Mitteilung ist die Pflanze durch die von *Tylenchus phalaridis* verursachte Galle verändert. [Siehe Aschs. & Gräbn. Syn. II, p. 148 (1899)].

A. K.

- Nr. 93. *Alopecurus utriculatus* Pers. Syn. I, p. 80 (1805).

Auf feuchten Wiesen bei Rieding unweit Saarburg in Lothringen. Kalk. Begleitpflanzen: *Ranunculus acer* L., *Trifolium pratense* L., *Carum carvi* L., *Silaus pratensis* Bess., *Senecio aquaticus* Huds., *Crepis biennis* L., *Poa trivialis* L., *Bromus racemosus* Huds.

Ca. 252 m ü. d. M.; 3. Juni 1900.

leg. Herm. Petry.

- Nr. 94. *Sporolobus arenarius Dural-Joure* Bull. S. B. Fr. XVI, p. 294 (1869) = *Agrostis arenaria Gouan* Illust. p. 3 (1773) = *Sporolobus pungens Kunth* Rev. Gram. I, p. 68 (1829). Enum. I, p. 210 (1833) = *Agrostis pungens Schreb.* Besch. Gräs. II, p. 46 (1779).

Auf Sand am Meeresstrand bei Bordighera in Ligurien (Italien). Begleitpflanzen: *Euphorbia peplus* L., *paralias* L., *Pancratium maritimum* L., *Salsola kali* L., *Echinophora spinosa* L.

Meeresstrand; 22 Sept. 1900.

leg. Clarence Bicknell u. Luigi Pollini.

- Nr. 95. *Agrostis alba* L. Sp. pl. ed. I, p. 63 (1753).

Um Karlsruhe in Baden auf Rasenboden nahe dem Durlacher Wald; sandiges Alluvium. Begleitpflanzen: *Apera spica venti* P. B., *Phalaris Canariensis* L., *Hordeum murinum* L., *Deschampsia caespitosa* P. B., *Bromus arvensis* L., *Potentilla supina* L., *Agrostis vulgaris* With.

Ca. 118 m ü. d. M.; 12. Juli 1900.

leg. A. Kneucker.

- Nr. 96. *Agrostis vulgaris* With. Arrang. p. 132 (1776)

Um Karlsruhe in Baden auf Rasenboden nahe dem Durlacher Wald; sandiges Alluvium. Begleitpflanzen: *Agrostis alba* L., *Apera spica venti* P. B., *Phalaris Canariensis* L., *Hordeum murinum* L., *Deschampsia caespitosa* P. B., *Bromus arvensis* L., *Potentilla supina* L.

Ca. 118 m ü. d. M.; 12. Juli 1900.

leg. A. Kneucker.

- Nr. 97. *Agrostis Castellana Boiss. et R.* Diagn. pl. hisp. p. 26 (1842), *ssp. Byzantina Hackel nov. nom.* = *A. Byzantina Boiss.* Diagn. pl. or. I, Ser. 13, p. 46 (1853) = *A. olivetorum Gren. & Godr.* Fl. de Fr. III, p. 483 (1855—56) = *A. Castellana v. mutica Hack.* Cat. rais. Gram. Port. p. 14 (1880) = *A. Castellana subv. heterophylla Hack.* Cat. rais. Gram. Port., p. 14 (1880).

An grasigen Orten in der Sierra del Pinar bei Puebla de Don Fadrique in Spanien; sand- und kalkhaltiges Terrain. Begleitpflanzen: *Festuca rubra* L., *Cistus ladanum*, *Carduus Granatensis*, *Hieracium Castellanum*.

Ca. 1700—1800 m ü. d. M.; Juni 1900.

leg. Elisee Reverchon.

Durch Vergleich des Original Exemplars von *Agrostis Byzantina* Boiss. (1853) habe ich festgestellt, dass diese Art vollkommen identisch ist mit *Agr. olivetorum* Gr. & Godr., welcher Name 3 Jahre später (1856) gegeben wurde. Da *A. olivetorum* nur eine unbegrannte Rasse der *A. Castellana* Boiss. & Reut. (1842) ist, so muss nunmehr die vorliegende Pflanze den Namen *A. Castellana* subsp. *Byzantina* Hack. führen; Synonyme sind ausser *A. olivetorum* noch *A. Castellana v. mutica* Hack. Cat. rais. Gram. Port., p. 14 (1880) und *A. vulgaris* §. *olivetorum* Posp. Fl. Oest. Küst. I, p. 68 (1897). Die Vereinigung der *A. Castellana* mit *alba*, wie sie Aschers. & Gräbn. Syn. durchgeführt haben, wobei jedoch *A. Byzantina* 13 Seiten später als eigene Art aufgeführt wird, halte ich nicht für gerechtfertigt. Die Verbreitung der *A. Castellana* genuina scheint sich auf Spanien und Portugal zu beschränken; hingegen ist die Rasse *Byzantina* von Portugal durch die ganze Mediterranregion Europas bis Konstantinopel verbreitet. E. Hackel.

- Nr. 98. *Agrostis Juressi Ik.* in Schrad. journ. IV, p. 312 (1799).

Feuchtes und sandiges Alluvium am Flussufer bei Fôja unweit Montemor Volho westlich von Coimbra in Portugal. Begleitpflanzen: *Festuca ampla* Hackel.

Ca. 15 m ü. d. M.; Juni 1900.

leg. M. Ferreira.

- Nr. 99. *Agrostis alpina* Scop. Fl. Carn. I, p. 60 (1772), *ssp. Schleicheri* Aschs. & Gräb. Syn. II, p. 187 (1899) = *A. Schleicheri* Jord. & Perlot. in Schultz Arch. Fl. Fr. et All., p. 346 (1855).

In den Spalten schwer zugänglicher Kalkfelsen oberhalb des „Pont de Nant“ in den Alpen von Bex im Kanton Waadt (Schweiz) bis zum Fusse des „Glacier des Martinets“ emporsteigend. Begleitpflanzen: *Carex brachystachys* Schrk., *ferruginea* Scop., *Asplenium viride* Huds., *Salix reticulata* L., *serpyllifolia* Scop., *Erigeron glaberrimus* Hoppe, *Hieracium pseudocerinthe* Gaud., *Arabis pumila* Jacq., *brassiciformis* Wlfr. etc.

1500—2000 m ü. d. M.; 2. Aug. 1900.

leg. Prof. F. O. Wolf.

- Nr. 100. *Agrostis rupestris* All. Fl. Pedem. II, p. 237 (1785).

1. Unterhalb des Gotthardpasses gegen Norden im Kanton Tessin (Schweiz) am Strassenrande. Begleitpflanzen: *Poa laxa* Haenke, *alpina* L., *supina* Schrad., *Achillea moschata* Wulf., *Cerastium strictum* Haenke.

Ca. 1900 m ü. d. M.; 1. Aug. 1899.

2. Auf dem sogenannten „Manniboden“ zwischen Bimenthal und Geispfadpass im Kanton Wallis (Schweiz); Gneis. Begleitpflanzen: *Carex lagopina* Whlbg., *nigra* All., *Persoonii* O. F. Lang., *foetida* Vill., *microstyla* Gay etc. 2090 m ü. d. M.; 14. Aug. 1899.

Der betr. Standort, von dem jeweils die ausgegebenen Pflanzen stammen, ist unterstrichen. leg. A. Kneucker.

- Nr. 101. *Calamagrostis villosa* Mutel Fl. France IV, p. 41 (1837) = *Calamagrostis Halleriana* P. B. Agrost. p. 15 (1812). = *Agrostis villosa* Chaix in Vill. Hist. pl. Dauph. I, p. 378 (1786).

An sandig-lehmigen Wegrändern in Hochwäldungen der „Morgenröthe“ im Vogtlande (Sachsen). Begleitpflanzen: *Deschampsia flexuosa* Trin., *Polypodium juniperinum* Hedw. etc.

450 m ü. d. M.; 23. Juli 1900.

leg. P. Seurich.

- Nr. 102. *Calamagrostis tenella* Lk. Hort. Berol. I, p. 103 (1837) non Host.

Weitfeld in Schwarzenbach unweit Luttach in Tirol auf geröllreichem und schotterigem Boden. Begleitpflanzen: *Festuca ovina* L., *rubra* L., *Poa alpina* L. etc.

Ca. 2000—2200 m ü. d. M.; 8. Aug. 1900.

leg. G. Treffer.

- Nr. 103. *Calamagrostis arundinacea* Roth. Tent. Fl. Germ. II 1, p. 89 (1789) = *Agrostis arundinacea* L. Spec. pl. ed. I, p. 61 (1753) = *Calamagrostis sileatica* DC. Fl. Fr. V, p. 253 (1815).

Laubwald des Ettersberges in Thüringen; thoniger Kalkboden. Begleitpflanzen: *Poa nemoralis* L., *Festuca heterophylla* Hnke., *Bromus asper* Murr., *serotinus* Beneken etc.

Ca. 400 m ü. d. M.; 15—22. Juli 1900

leg. Dr. E. Torges.

- Nr. 104. *Airopsis globosa* Desc. in Journ. d. bot. I, p. 200 (1808) = *Aera globosa* Thore Journ. d. bot. I, p. 197 (1808).

Auf Sandboden zw. S. Paulo und Eiras bei Coimbra in Portugal. Begleitpflanzen: *Aera caryophyllea* L. et *capillaris* Host.

70—130 m ü. d. M.; Mai 1900.

leg. M. Ferreira.

- Nr. 105. *Aera Cupaniana* Guss. Syn. Fl. Sic. I, p. 145 (1842).

Auf Sandboden bei Bordighera in Ligurien (Italien). Begleitpflanzen: *Fumaria capreolata* L., *officinalis* L., *Linaria simplex* DC., *Arabis Thaliana* L., *Cerastium glomeratum* Thuill.

Ca. 50 m ü. d. M.; 5. Mai 1900.

leg. Luigi Pollini.

- Nr. 106. *Deschampsia flexuosa* Trin. Bull. Ac. St. Pet. I, p. 66 (1836) = *Ara flexuosa* L. Sp. pl. ed. I, p. 65 (1753).

In Kiefern- und Laubmischbeständen des sogenannten Bienwaldes zwischen Wörth und Langenkandel in der bayr. Rheinpfalz; Diluvialsand. Begleitpflanzen: *Festuca silvatica* Vill., *Carex silvatica* Huds. etc.

Ca. 115 m ü. d. M.; 17. Juni 1900.

leg. A. Kneucker.

- Nr. 30 a I.*) *Ventenata dubia* E. Schultz.

In einer meist ausgetrockneten Wasserrinne am östl. Rande des Heineckeröder Berges bei Wettelroda unweit Sangerhausen in Thüringen; unteres Rotliegendes. Begleitpflanzen: *Trisetum flavescens* P. B., *Apera spica venti* P. B., *Poa compressa* L., *Agrostis vulgaris* With., *Festuca elatior* L., *Trifolium arvense* L., *hybridum* L. etc.

Ca. 275 m ü. d. M.; Mitte Juli 1900.

leg. W. Becker.

- Nr. 107. *Avena filifolia* Lagasca El. gen. et sp. nov. p. 4 (1816),
f. glabra Boiss. Voyage Esp. II, p. 655 (1845).

Auf Kalkfelsen in Fichtenwäldern in der Sierra de la Sagra bei der Stadt Puebla de Don Fadrique in Spanien. Begleitpflanzen: *Alyssum spinosum* L., *Festuca rubra* L., *scoparia* Kern., *Sarothamnus scoparius* Wimm.

Ca. 1800 m ü. d. M.; Juni 1900.

leg. Élisée Reverchon.

- Nr. 108. *Avena sulcata* Gay in Del. fl. d. Vienne, p. 477 (1842).

Auf Sandboden bei Coimbra in Portugal unter Oelbäumen. Begleitpflanzen: *Briza maxima* L. etc.

30—130 m ü. d. M.; Mai 1900.

leg. M. Ferreira.

- (Nr. 31 a II.***) *Avena versicolor* Vill.

Auf der Staffelfalpe am Fusse des Matterhorns über Zermatt im Wallis (Schweiz); Glanz- und Glimmerschiefer. Begleitpflanzen: *Pinus cembra* L., *Rhododendron ferrugineum* L., *Azalea procumbens* L., *Crepis jubata* Koch, *Anemone vernalis* L., *Oxytropis campestris* DC., *cyanea* M. Bieb., *Phaca australis* L., *Luzula spicata* DC., *Salix glauca* L., *Helvetica* Vill., *Carex frigida* All.

2200 m ü. d. M.; Aug. 1900.

leg. Prof. F. O. Wolf.

- Nr. 109. *Arena bromoides* L. Sp. pl. ed. II, p. 1666 (1763).

Auf Hügeln über Bordighera in Ligurien (Italien); Conglomerat (Pliocän). Begleitpflanzen: *Coris Monspeiensis* L., *Andropogon hirtus* L., *Juniperus oxycedrus* L., *Fumana laevipes* Spach, *thymifolia* L.

Ca. 50 m ü. d. M.; 10. Juni 1900.

leg. Clarence Bicknell.

- Nr. 110. *Dactyloctenium Aegyptium* K. Richter Pl. Europ. I, p. 68 (1890) = *Cynosurus Aegyptius* L. Sp. pl. ed. I, p. 72 (1753) = *Dactyloctenium Aegyptiacum* Willd. II, p. 1029 (1809).

Auf einem mit Maulbeerbäumen bepflanzten Felde unweit der alten Brücke am Ausflusse des Nahr el Kello (Hundsfluss), nordwärts Beirut in Syrien; Alluvium (kalkige und sandige Sedimente der Kreideperiode). Begleitpflanzen: *Phaseolus nanus* L. (kultiviert), *Mentha silvestris* L., *Erigeron Canadensis* L., *Inula viscosa* L., *Cynodon dactylon* L., *Panicum sanguinale* L. subv. *Aegyptiacum* Hackel, *P. colonum* L., *Leersia hexandra* Scop., *Eragrostis minor* Host var. *poaeoides* Baumg. u. a.

Wenige m ü. d. M.; 20. Aug. 1900.

leg. Ernst Hartmann.

*) Die Pflanze wurde schon in Lief. I unter Nr. 30 ausgegeben.

**) Die Pflanze wurde schon in Lief. II unter Nr. 31 ausgegeben.

- Nr. 111. *Sesleria Budensis* Aschs. u. Gräbn. Syn. II, p. 320 (1900) = *S. coerulea* var. *Budensis* Borb. in Oesterr. bot. Z. XXXIII, p. 30 (1883) = *S. Heuffleriana* Janka Oesterr. bot. Z. VIII, p. 113 (1863) non Schur.

An steinigem und felsigen Ablängen des „Sashegy“ bei Ofen im Komitat Pest in Ungarn; Kalk. Begleitpflanzen: *Draba aizoon* Whlbg., *Arabis petrogena* Kern., *Hutchinsia petraea* R. Br., *Biscutella didyma* L., *Paronychia cephalotes* (M. Bieb.), *Seseli leucospermum* W. K., *Podanthum canescens* W. K.

Ca. 150 m ü. d. M.; 16. April 1900. leg. Dr. A. von Degen.

Diese bisher nur in Mittellungarn und besonders auf den Kalkbergen bei Ofen (Buda) beobachtete Pflanze ist nach Aschs. u. Gräbn. Syn. II, p. 320 wohl die schönste der *Sesleria*-Arten. A. K.

- Nr. 112. *Sesleria rigida* Heuffel in Rechb. Fl. Germ. exc., p. 140 (1830) = *S. Heuffleriana* Bielz Landk. VIII, p. 84 (1857).

Auf steinigem Abhängen des Prolázthales bei Herkulesbad im Banat (locus classicus); Kalk. Begleitpflanzen: *Poa firmula* Gaud., *Festuca rupicola* Heuff., *xanthina* R. S., *Erysimum comatum* Panc., *Cerastium Banaticum* Roch., *Moehringia pendula* (W. K.), *Silene petraea* (W. K.), *Dianthus petraeus* W. K., *Campanula divergens* W., *Edraianthus Kitaibelii* A. DC., *Arabis procurrens* W. K., *Draba aizoon* Whlbg., *Alyssum edentulum* W. K.

Ca. 500 m ü. d. M.; 27. Juni 1900. leg. Dr. A. v. Degen.

- Nr. 113. *Sesleria ovata* Kern. Sched. Fl. Austr. Hung. exs. I, p. 109 (1882) = *Cynosurus ovatus* Hoppe in Sturm. Deutsch. Fl. H. VI, (1799) = *Sesleria microcephala* Lam. u. DC. Fl. Fr. III, p. 76 (1805).

Auf dem nördl. Kamm des Monte Sobretta und an einzelnen Punkten seiner beiden Abhänge bei Bormio in Oberitalien; ausschliesslich auf Kalk. Begleitpflanzen: *Salix herbacea* L., *Saxifraga adscendens* L., *androsacea* L., *Dianthus glacialis* Haenke, *Lychnis alpina* L. etc.

Ca. 2500 m ü. d. M.; 12. Aug. 1897.

leg. M. Longa; com. Dr. Ed. Cornaz.

- Nr. 114. *Sesleria disticha* Pers. Syn. I, p. 72 (1805) = *Poa disticha* Wulf. in Jacq. Collect. II, p. 74 (1781) = *Oreochloa disticha* Lk. Hort. Ber. I, p. 44 (1827).

Am Fusse des Piz Umbrail im Bezirk Bormio in Oberitalien (Lombardei); kieselhaltiger Boden. Begleitpflanzen: *Carex curvula* All., *rupestris* All., *Koeleria hirsuta* Gaud., *Luzula spicata* DC., *Arabis alpina* L., *Oxytropis Halleri* Bunge etc.

2750 m ü. d. M.; 13. Aug. 1894. leg. M. Longa; com. Dr. Ed. Cornaz.

- Nr. 115. *Eragrostis pilosa* P. B. Agrost. p. 162 (1812) var. *condensata* Hackel nov. var.

Auf Gartenland im Grossherzoglichen Hofgarten in Karlsruhe, seit langen Jahren äusserst lästiges und schwer zu beseitigendes Unkraut; sandiger Humus. Begleitpflanzen: *Euphorbia polygonifolia* Jacq., ein in bot. Gärten hier und da ebenfalls sehr lästiges, eingeschlepptes Gartenunkraut. [Siehe „Allg. bot. Z.“ p. 11 u. 234 (1895)].

Ca. 117 m ü. d. M.; 17. Juli 1900.

leg. A. Kneucker.

Vorliegende Pflanze ist von der typischen Form verschieden durch: einzelnstehende Rispenäste ohne Haare im Winkel derselben (die wohl auch beim Typus mitunter fehlen), die Rispenäste sind schon vom Grunde an mit Aehrchen besetzt, daher die Rispe viel dichter erscheint. Die Aehrchen sitzen auf kurzen Stielen (das vorletzte eines jeden Zweiges hat nur einen etwa 1 mm langen Stiel). Beim Typus sind die Rispenäste zu 2–4, erst vom Drittel oder

der Hälfte an geteilt und locker mit Aehren besetzt, deren Stiele mindestens 2 mm lang sind. Die Pflanze nähert sich der *E. Purshii* (Caroliniana), hat aber zum Unterschiede von dieser keine vorspringenden Seitennerven auf der Deckspelze. Ed. Hackel.

Nr. 116. *Eragrostis Purshii* Schrad. in Linn. XII, p. 451 (1838) =
E. Caroliniana Scribner Bull. Torr. Bot. Cl. V, p. 49 (1894).

Unbenützte Plätze am Nordostufer des Eriekanals auf sandigem Humus (dem Lehm und Kalk aufgelagert ist), innerhalb der Stadtgrenzen bei St. Marys in Ohio (U. S. A.), woselbst die Pflanzen einen vollständigen Teppich bilden, der nur hie und da von folgenden Begleitpflanzen unterbrochen ist: *Malva rotundifolia* L., *Datura tatula* L., *Plantago major* L., *Lepidium Virginicum* L., *Euphorbia nutans* Lag., *Amarantus retroflexus* L., *Chenopodium album* L., *Urticum* L., *Atriplex hastatum* L., *Panicum crus galli* L., *Syntherisma sanguinalis* Nash. u. *Eleusine Indica* Gaertn. (Der Standort liegt am Anfang der grossen centralen Prairie, der sog. „Lakeplain“.)

200—250 m ü. d. M.; 2. Sept. 1900.

leg. Prof. A. Wetzstein.

Nr. 117. *Eragrostis minor* Host Gram. Austr. IV, p. 15 (1809) =
E. poaeoides P. B. Agrost. p. 172 (1812).

Auf trockenen, sandigen und kiesigen Stellen des rechten und linken Rheinufers bei Maxau und Maximiliansau in Menge. Begleitpflanzen: *Panicum lineare* Krock., *sanguinale* L., *viride* L., *Polygonum aviculare* L.

Ca. 107 m ü. d. M.; 5. Sept. 1900.

leg. A. Kneucker.

Nr. 118. *Eragrostis hypnoides* B. S. P. Prelim. Catal. N. York p. 69 (1888). = *E. reptans* Nees Agrost. Bras. p. 514 (1829) = *Poa reptans* H. B. K. = *P. hypnoides* Lam. Illust. gen. I, p. 185. (1791).

Auf dem sandigen, im Frühling und bei Hochwasser überschwemmten Ufer der Nordostseite des St. Marys Reservoir in Ohio (U. S. A.) stellenweise den Boden dicht überwuchernd. Begleitpflanzen: *Bidens cernua* L. (in Menge), *Hysanthes gratioloides* Benth. (einzeln), *Polygonum Pennsylvanicum* L. (stellenweise in Menge), *Alisma plantago-aquatica* L. (einzeln), *Sagittaria arifolia* Nutt. (einzeln), *Lophocarpus calycinus* J. G. Smith (einzeln, doch reichlich), *Schoenoplectus lacustris* Palla (stellenweise in dichten Massen), *Cyperus erythrorrhizos* Muhl. (in grosser Menge), *Panicum crus galli* L. (einzeln, doch reichlich).

Ca. 240—270 m ü. d. M.; 20. Okt. 1900.

leg. Prof. A. Wetzstein.

Nr. 119. *Eragrostis megastachya* Lk. Hort. Berol. I, p. 187 (1827) =
Poa megastachya Koeler Descr. Gram. p. 181 (1802) = *Eragrostis major* Host Gram. Austr. IV, p. 14 t. 24 (1809).

Zwischen Ragusa im südlichen Dalmatien und dem Kloster S. Giacomo im Strassengraben am Rande des Weges auf Kalk. Begleitpflanzen: *Panicum viride* L., *Lagurus ovatus* L., *Tragus racemosus* Desf. etc.

Ca. 40—60 m ü. d. M.; 6. Aug. 1900. leg. L. Gross u. A. Kneucker.

Nr. 120. *Eragrostis suaveolens* Becker in Beitr. z. Kenntn. d. r. R. VIII var. *Borysthenica* Schmalh. in Mém. Soc. Natural. Kiew. XI, p. 69.

Auf aufgeschwemmtem Sandboden am Ufer des Dniepr bei Kiew (Süd-Russland). Begleitpflanzen: *Eragrostis pilosa* P. B., *Heleochoa alopecuroides* Boiss., *Heleochoa schoenoides* Host, *Polygonum lapathifolium* L., *Gratiola officinalis* L., *Pulicaria vulgaris* Gaertn., *Ptar mica cartilaginea* Led.

88 m ü. d. M.; 17. Sept. 1900.

leg. N. Zinger.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [7_1901](#)

Autor(en)/Author(s): Kneucker Andreas

Artikel/Article: [Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae" 9-14](#)