

Bemerkungen zu den „*Carices exsiccatae*“*)

von A. K n e u c k e r.

IX. Lieferung 1901.

(Schluss.)

- Nr. 267. *Carex rigida* Good. in Trans. Linn. soc. II, p. 193 (1794) = *C. saxatilis* Whlbg. Act. holm. p. 140 (1803) = *C. compacta* Hoppe in Caric. p. 37 (1826) = *Vignea saxatilis* Rehb. Fl. exc. p. 66 (1830) = *Vigmantha rigida* Schur in En. p. 705 (1866).

An trockenen, torfigen und kiesigen Stellen der weissen Wiese im Riesengebirge in Schlesien; Granit. Begleitpflanzen: *Molinia coerulea* L., *Nardus stricta* L., *Hieracium alpinum* L., *nigrescens* Willd. etc.

1430 m ü. d. M.; Juli u. Aug. 1896.

leg. E. Fieck †.

- Nr. 268. *Carex rigida* Good. var. *infern alpina* Laest. \times *salina* Whlbg. ssp. *cuspidata* Whlbg. var. *borealis* Almq. (Almq.) in Bot. Not. p. 128 (1891) = *C. rigida* Good. f. *longipes* Laest. in herb.

Auf Storstennes bei Tromsö im nördl. Norwegen. Auf mit Heidekraut bewachsenem Heideboden; Alluvium. Begleitpflanzen: Die Eltern, *Empetrum nigrum* L., *Rubus chamaemorus* L., *Salix glauca* L. etc.

Ca. 20 m ü. d. M.; 11. Juli 1898.

leg. Andr. Notó.

Die vorliegende Form des Bastardes ist wohl gewiss *C. rigida* v. *infern alpina* \times *salina* ssp. *cuspidata*, da *C. rigida* v. *infern alpina* viel mehr in der Nähe wächst als die entferntere *C. rigida* v. *typica*. Ehe dieser Bastard im Herbst welk wird, erreicht er eine Höhe bis zu 40 cm und die Blätter werden bis 6 mm breit. Die bis meterlangen Ausläufer breiten sich nach allen Seiten aus. *C. salina* ssp. *cuspidata* v. *borealis* wächst 50 m von dem Standort entfernt am Meeresstrande.

A. Notó.

- Nr. 269. *Carex alpina* Sw. var. *holostoma* (Drej.) in Rev. crit. car. bor. p. 29 (1841) als Art.

An feuchten Stellen auf dem Gebirge Stääro (Slivarre) in Kvönangen im Amte Tromsö im nördl. Norwegen; Glimmerschiefer. Begleitpflanzen: *Carex rigida* Good., *vaginata* Tsch., *Betula nana* L. etc.

Ca. 800—900 m ü. d. M.; 27. Juli u. 2. Aug. 1900.

leg. A. Notó.

- Nr. 270. *Carex Buxbaumii* Whlbg. var. *alpicola* Anders. in Cyp. Scand. p. 39 (1849).

Auf grasigen Stellen bei Sandnes auf der Insel Tromsö in Norwegen; Glimmerschiefer. Begleitpflanzen: *Carex atrata* L., *flava* L., *alpina* Sw., *Deschampsia caespitosa* P. B., *Juncus alpinus* Vill., *Calamagrostis phragmitoides* Hartm., *Tofieldia borealis* Whlbg. etc.

5—20 m ü. d. M.; 18. Juli u. 20. Aug. 1899.

leg. A. Notó.

Notiz.

Bei genauer Revision des unter der Bezeichnung *Carex silvatica* L. f. *latifolia* Kneucker (VIII. Lief. Nr. 219) vorliegenden Materials hat sich nachträglich ergeben, dass die meisten Individuen der typischen *C. silvatica* sehr nahe stehen; nur vereinzelte Individuen gehören zu der breitblättrigen Form, deren Laubwerk eine Breite bis zu 1 cm erreicht. Herr Marcowicz wird wohl die Freundlichkeit haben, die echte, breitblättrige Form s. Zt. nachzuliefern. Einstweilen soll aber das vorhandene Material aus dem Kankasus unter Nr. 219 ausgegeben werden.

A. K.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [7_1901](#)

Autor(en)/Author(s): Kneucker Andreas

Artikel/Article: [Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae" 70](#)