© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae"*)

von A. Kneucker.

V. u. VI. Lieferung 1901.

Nr. 121. ***Sesleria coerulea Ard. ssp. varia (Wettst.)*** in Verh. d. zool.-bot. Ges. XXXVIII, p. 557 (1888) = *Aira varia Jacq.* Stirp. p. 15 (1762) ob = *Sesleria coerulea var. calcarea (Opiz)* in Ber. d. ök. fl. v. Boehm. p. 492 (1836)?

An sonnigen, grasigen Abhängen und in lichten Föhrenwäldern bei Kaltenleutgeben in Niederösterreich; Kalk. Begleitpflanzen: Carex montana L., Halleriana Asso, Pulsatilla grandis Wender., Thlaspi montanum L., Chamaebuxus alpestris Spach., Primula acaulis L., Pannonica Kern.

Ca. 350 m ü. d. M.; 29. April 1900. leg. Dr. Aug. v. Hayek.

Da in einem Briefe vom 14. Sept. 1900 Herr Dr. von Hayek mitteilt, Herr Prof. Dr. R. v. Wettstein halte diese vorliegende Pflanze des Wiener Beckens für verschieden von Sesleria coerulea var. calcarea (Opiz), so sei dieselbe an dieser Stelle unter dem Wettstein'schen Namen ausgegeben. Unter Nr. 35 in Lief. II wurde Sesl. coer. Ard. v. calcarea (Opiz) publiziert. A. K.

Nr. 122. ***Arundo donax L.*** Sp. pl. ed. 1, p. 81 (1753) = *Donax donax Aschers. u. Gräbn.* Fl. d. nordostd. Flachl. p. 101 (1898).

Am Ufer des Flusses Sarca in Südtirol unweit des Gardasees; Kalk.

Ca. 100—200 m ü. d. M.; Oktober 1900. leg. Pietro Porta.

Nr. 123. ***Molinia coerulea Moench*** Meth. p. 183 (1794) ***var. robusta (Prahl)*** Krit. Fl. Schl.-Holst. II, p. 257 (1890) = *Aira coerulea L.* Spec. pl. ed. 1, p. 63 (1753).

Am Rande eines etwas feuchten Kiefernwaldes am Rigaischen Meerbusen (Russland); alter Dünensand. Begleitpflanzen: Vaccinium myrtillus L., uliginosum L., Calluna vulgaris Salisb., Empetrum nigrum L., Melampyrum pratense L., Potentilla silvestris Neck.

3—5 m ü. d. M.; 19. Aug. 1900. leg. G. Westberg.

Da nach Hackels Mitteilung Linne von seiner Aira coerulea in Sp. pl. sagt, „panicula coarctata" und in Fl. Lapp. „panicula contracta", so wäre die vorliegende Varietät mit dem Ausdruck „genuina" passender bezeichnet als mit „robusta" (Prahl). Siehe Aschs. u. Gräbn. Syn. II, p. 337 (1900). Die Linné'sche Pflanze deckt sich somit mit der von Prahl aufgestellten robusta. A. K.

Nr. 123 a. ***Molinia coerulea Moench var. robusta (Prahl).***

Feuchter Diluvialsand auf mooriger Unterlage im Sebalder Reichswalde nordöstlich vom Spitalhof bei Nürnberg in Bayern. Begleitpflanzen: Calluna vulgaris Salisb., Sarothamnus vulgaris Wimm., Deschampsia flexuosa Gris.

Ca. 330 m ü. d. M.; 5. Sept. 1900. leg. L. Gross.

---

*) Die Revision, bezw. Bestimmung des ausgegebenen Materials und teilweise auch die Zusammenstellung der Litteraturnachweise wurde von Herrn Prof. Ed. Hackel in St. Pölten gütigst übernommen. Ausserdem wirkten noch Herr Schriftsteller W. Lackowitz in Berlin und L. Gross in Nürnberg bei Durchsicht der Korrekturabzüge freundlichst mit. Die Schedae sind von dem unterzeichneten Herausgeber selbst zusammengestellt. Da die Aufzählung aller bekannten Synonyme jeder Art zu weit führen würde, hat sich der Herausgeber erlaubt, nur die wichtigsten Synonyme aufzunehmen. In der Anordnung der Genera wurden die „Genera Siphonogamarum ad systema Englerianum conscripta" von Dr. v. Dalla Torre und Dr. Harms, wovon erst Fascikel I u. II erschienen sind, zugrunde gelegt. Da der unterzeichnete Herausgeber die Druckkosten der Bemerkungen zum grossen Teil trägt, kommt die durch die letzteren verursachte Erweiterung des Umfangs der Zeitschrift den Abonnenten gratis zu gut. A. Kneucker.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nr. 124. ***Molinia coerulea Mnch. var. genuina Aschs. u. Gräb.*** Syn. II, p. 337 (1900). (Siehe Bemerkung zu Nr. 123.)

Feuchter Diluvialsand auf mooriger Unterlage im Sebalder Reichswald nordöstl. vom Spitalhof bei Nürnberg in Bayern. Begleitpflanzen: Sarothamnus vulgaris Wimm., Calluna vulgaris Salisb., Deschampsia flexuosa Gris.
Ca. 330 m ü. d. M.; 3. Sept. 1900. leg. L. Gross.

Nr. 125. ***Koeleria glauca DC.*** Hort. Monsp. p. 116 (1813) = *Poa glauca Schkuhr* Cat. hort. Wittenbg. p. 49 (1799).

Auf dem Diluvialsand der Ingelheimer Heide in Rheinhessen unter Kiefern. Begleitpflanzen: Poa Badensis Hnke., Alyssum montanum L. var. arenaria Gmel., Silene conica L., Salsola kali L., Oenothera biennis L., Arenaria serpyllifolia L., Euphorbia Gerardiana Jacq. etc.
Ca. 100 m ü. d. M.; 6. Juni 1900.
leg. Freiherr v. Spiessen und A. Kneucker.

Nr. 126. ***Koeleria Vallesiana Aschs. u. Gräbn.*** Syn. II, p. 354 (1900) = *Aira Vallesiana All.* Auct. p. 40 (1789) = *Koeleria Valesiaca Gaud.* Agrost. Helv. I, p. 149 (1811).

Sonnverbrannte Hügel im mittleren Wallis (Schweiz) am Mont d'Orge; Urkalk. Begleitpflanzen: Stupa pennata L. ssp. Gallica Celak., capillata L., Festuca Valesiaca Schl., Poa concinna Gaud., Carex nitida Host, Iris lutescens Lam., Hyssopus officinalis L., Galium rigidum Vill., Trigonella Monspeliaca L., Medicago minima Bartl., Astragalus onobrychis L., Euphorbia Gerardiana Jacq., Anemone montana Hoppe etc.
Ca. 500—800 m ü. d. M.; Mai 1900. leg. Prof. F. O. Wolf.

Nr. 127. ***Melica ciliata L. ssp. Transsilvanica Hackel*** in Halácsy u. Braun Nachtr. z. Fl. v. Niederösterr., p. 19 (1882) = *M. Transsilvanica Schur* Enum. Transs. p. 764 (1866).

In den Steinbrüchen bei Flörsheim in der Nähe von Hochheim a. M.; Tertiärkalk. Begleitpflanzen: Linum tenuifolium L., Veronica spicata L., Peucedanum oreoselinum Mnch., Anthemis tinctoria L., Onobrychis sativa Lam., Coronilla varia L., Avena pratensis L., Carex humilis Leyss. etc.
Ca. 94 m ü. d. M.; 29. Juni 1900. leg. M. Dürer.

Nr. 128. ***Melica ciliata L. ssp. Transsilvanica Hackel f. inaequalis Hackel nov. f.***

Auf Schotterbänken an der Donau im Wiener Prater; Alluvium. Begleitpflanzen: Agropyron repens (L.) P. B., glaucum R. Sch., Bromus tectorum L., sterilis L., Oenothera biennis L., Solanum dulcamara L., Verbascum phlomoides L., Epilobium angustifolium L. etc.
Ca. 170 m ü. d. M.; 17. Juni 1900.
leg. Dr. F. A. Tscherning: com. Dr. A. von Hayek.

Vorliegende Pflanze ist nach Hackel eine der M. lobata Schur nahestehende, bezw. zur var. Holubyana Aschs. u. Gräb. Syn. II, p. 345 (1900) hinneigende, aber nicht genau mit letzterer übereinstimmende Form. A. K.

Nr. 129. ***Melica minuta L. ssp. latifolia Coss.*** Not. pl. crit. p. 12 (1848) = *M. major Parl.* Fl. Ital. p. 305 (1848) *non Sibth. u. Sm.* Prodr. Fl. Graec. I, p. 51 (1806).

In trockenen Olivengärten bei Bordighera in Ligurien (Italien); Begleitpflanzen: Ranunculus bulbosus L., Hyoseris radiata L., Carex glauca Murr., Allium Neapolitanum Cyr.
Ca. 150 m ü. d. M.; 8. Mai 1900.
leg. Clarence Bicknell und Luigi Pollini.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nr. 130. ***Melica picta K. Koch*** in Linnaea XXI f. 1848, p. 395 (1850) ***f. rubriflora v. Seemen*** in Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenbg. XXIV, p. 21 (1887).

In einem lichten Laubwalde über Tonndorf bei Weimar in Thüringen; Kalk. Begleitpflanzen: Lonicera xylosteum L., Viburnum lantana L., Pleurospermum Austriacum Hoffm., Orchis mascula L., Cephalanthera rubra Rich., Ophrys muscifera Huds., Carex digitata L., Melica nutans L.

Ca. 375 m ü. d. M.: 10. u. 17. Juni 1900. leg. Dr. E. Torges.

Nr. 131. ***Briza minor L.*** Spec. pl. ed. 1, p. 70 (1753).

An sandigen Stellen am Meere bei der Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera in Ligurien (Italien). Begleitpflanzen: Arundo donax L., Doryenium rectum DC., Chlora perfoliata L., Linum angustifolium Huds.

Ca. 2—3 m ü. d. M.: 9. Juni 1900. leg. Clarence Bicknell.

Nr. 41 a II.*) ***Briza maxima L.***

Auf thonigem Boden in Olivengärten bei Bordighera in Ligurien (Italien). Begleitpflanzen: Bellis perennis L., Ranunculus bulbosus L., Lithospermum purpureo-coeruleum L., Hyoseris radiata L.

Ca. 10 m ü. d. M.: 8. Mai 1900. leg. Clarence Bicknell.

Nr. 132. ***Dactylis glomerata L. var. abbreviata Drejer*** Fl. Hafniensis excurs. p. 44 (1838) = *D. abbreviata Bernh.* in Link Hort. Berol. I, p. 153 (1827).

Auf Glimmerschiefer am nördl. Fusse des Simplon bei „Schallberg“ oberhalb Brig im Wallis (Schweiz) an trockenen Halden. Begleitpflanzen: Koeleria Vallesiana Aschs u. Gräbn., Bromus squarrosus L., Erysimum canescens Roth., Astragalus onobrychis L., exscapus L., Oxytropis pilosa DC., Halleri Bunge, Onobrychis arenaria DC., Hieracium tardans Naeg., Peleterianum Mer., lanatum Vill., pictum Schleich., lanatellum Arv.-Touv. etc.

1200—1300 m ü. d. M.: 5. Juli 1900. leg. Prof. F. O. Wolf.

Blüht 4—6 Wochen später als D. glomerata L. auf den dortigen und noch höher gelegenen Wiesen. F. O. Wolf.

Nr. 133. ***Dactylis glomerata L. ssp. Hispanica Koch*** Syn. ed. I, p. 808 (1837) ad ***genuinam transiens Hackel.***

In der Umgegend von Coïmbra in Portugal. Begleitpflanzen: Bodenunterlage etc. waren leider nicht angegeben.

30—130 m ü. d. M.; Mai 1900. leg. M. Ferreira.

Hackel schrieb unterm 26. Nov. 1900, dass die vorliegende Pflanze eine deutliche Mittelform zw. ssp. Hispanica und der typischen D. glomerata darstelle. Hiedurch sei bewiesen, dass D. Hispanica nicht als Art aufrecht erhalten werden könne. Dactylis Hispanica ist von Roth in Catalect. bot. I, p. 8 (1797) als Art aufgeführt. A. K.

Nr. 134. ***Cynosurus elegans Desf.*** Fl. atl. I, p. 82 (1798).

Auf Kalkfelsen in Fichtenwäldern an besonders schattigen Stellen bei der kleinen Stadt Puebla de Don Fadrique in der Provinz Granada in Spanien in der Sierra de la Sagra. Begleitpflanzen: Daphne laureola L., Arum Italicum Mill., Sarothamnus vulgaris Wimm. etc.

1700—1800 m ü. d. M.; Juni 1900. leg. E. Reverchon.

Nr. 135. ***Poa concinna Gaud.*** Agrost. Helv. I, p. 196 (1811).

Sonnverbrannte Hügel im mittleren Wallis (Schweiz) am Mont d'Orge; Urkalk. Begleitpflanzen: Stupa pennata L. ssp. Gallica Celak., capillata L., Koeleria Vallesiana Aschs. u. Gräbn., Carex nitida Host, Iris lutescens Lam.,

*) Die Pflanze wurde schon in Lief. II unter Nr. 41 ausgegeben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hyssopus officinalis L., Galium rigidum Vill., Trigonella Monspeliaca L., Medicago minima Bartl., Astragalus onobrychis L., Euphorbia Gerardiana Jacq., Anemone montana Hoppe etc.

Ca. 500—800 m ü. d. M.; Mai 1900. leg. Prof. F. O. Wolf.

Die Poa concinna Gaud. ist wohl nur eine Varietät der P. bulbosa L.! Hackel.

Nr. 136. ***Poa nemoralis L.*** Spec. pl. ed. I, p. 69 (1753) ***f. fallax A. v. Hayek*** in Verh. d. zool.-bot. Ges. L. p. 149 (1900).

In dem Eichenwäldchen am Laaer Berg bei Wien: Tegel. Begleitpflanzen: Agropyron pseudocaninum Schur, Dactylis glomerata L., Poa nemoralis L. f. typica, Saxifraga granulata L., Hesperis tristis L., Viola Austriaca Kern.,

Ca. 220 m ü. d. M.; 18. Juni 1900. leg. Dr. A. von Hayek.

Nr. 137. ***Poa sterilis M. B.*** Fl. Taur.-Cauc. I, p. 62 (1809) ***ssp. eusterilis Aschs. u. Gräbn.*** Syn. II, p. 414 (1900) ***var. scabra Aschs. u. Gräbn.*** Syn. II, p. 414 (1900) = *Poa scabra Kit.* in Linnaea XXXII, p. 311 (1863) = *Poa sterilis Kerner* in Oesterr. bot. Z. XIV, p. 85 (1864).

An trockenen Stellen des „Sárhegy" oberhalb Gyöngyös im Komitat Herves in Ungarn auf Trachyt-Boden. Begleitpflanzen: Festuca pratensis Huds., Potentilla meridionalis Siegtr., patula W. K., Cytisus procumbens (W. K.), Achillea crithmifolia W. K., Neilreichii Kern., Carduus collinus W. K., Lactuca perennis L., Centaurea axillaris Willd., Dorycnium diffusum Ika, Asperula glauca (L.), Adonis vernalis L.

200 m ü. d. M.; 18. Juni 1899. leg. Dr. A. v. Degen.

Nr. 138. ***Poa bulbosa L. var. vivipara L. f. laxiuscula.***

Schattige Wegränder bei Hagenau i. E. auf Sand. Begleitpflanzen: Poa pratensis L., nemoralis L., Ajuga reptans L., Aegopodium podagraria L. etc.

Ca. 140—150 m ü. d. M.; 4. Juni 1900. leg. A. Kneucker.

Eine etwas schlaffe Form der Poa bulbosa L. var. vivipara. A. K.

Nr. 139. ***Glyceria arundinacea Kunth*** Enum. I, p. 367 (1833) = *Gl. aquatica Whlbg. ssp. arundinacea Aschs. u. Gräb.* Syn. II, p. 452 (1900) = *Poa arundinacea M. Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. I, p. 60 (1808) non Lk.

In einem ausgetrockneten Bächlein zwischen Wiesen in der Nähe des Dorfes Alagir in der Landschaft Ossetien im Kaukasus, Gouvern. Terek. Begleitpflanzen: Carex stricta Good., leporina L., vesicaria L., Juncus effusus L., Agrostis vulgaris With., Poa pratensis L., Ranunculus repens L., Rumex crispus L., Filipendula ulmaria Maxim. etc.

Ca. 650 m ü. d. M.; Anf. Juli 1900. leg. B. Marcowicz.

Die Pflanze war als Gl. remota Fr. eingesandt worden, was leicht erklärlich ist, da nach Velenovský Fl. Bulg. (Siehe Aschs. u. Gräbn. Syn. II, p. 452) die in Ledeb. Fl. Ross. u. Boiss. Fl. Or. vom Kaukasus angegebene Gl. remota unsere Gl. arundinacea Kunth ist. A. K.

Nr. 140. ***Atropis distans Gris.*** in Ledeb. Fl. Ross. IV, p. 388 (1853) = *Poa distans L.* Mant I, p. 32 (1767) = *Glyceria distans Whlbg.* Fl. Ups. p. 36 (1820).

In der Nähe eines Tümpels auf mit Bauschutt vermengtem Diluvialsand nächst Marienberg bei Nürnberg in Bayern. Begleitpflanzen fehlen; in der Nähe wachsen aber: Bromus mollis L. u. Apera spica venti (L.) P. B.

320 m ü. d. M.; 24. Juni 1900. leg. L. Gross.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nr. 141. ***Atropis distans Gris. f. litoralis Hackel nov. f.***
Auf feuchtem Dünensande am Strande des Rigaischen Meerbusens in Russland, beim Aa-Durchbruch. Begleitpflanzen: Juncus Balticus Willd., bufonius L., Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla, Phragmites communis Trin., Aster tripolium L., Elymus arenarius L., Ammophila Baltica Lk. etc.
Meeresnähe: 29. Juli 1900. leg. G. Westberg.
Mit grösseren Aehrchen. Hackel.

Nr. 142. ***Atropis distans Gris. var. limosa Schur.*** Enum. p. 779 (1866) = *Glyceria festucaeformis Schur.* Verh. S. I, p. 185 (1850).
Auf sumpfigen Stellen des Natron auswitternden Lehmbodens zw. Tápió-Györgye und Ujszasz im Komitat Pest in Ungarn. Begleitpflanzen: Glyceria fluitans R. Br., Festuca rutila (Hackel), Lepidium ruderale L., crassifolium W. K., Camphorosma ovata W. K., Hordeum Gussoneanum Parl., Agrostis alba L., Poa palustris Roth, Heleocharis palustris R. Br., Nasturtium palustre DC., Kochia arenaria Rth., Melilotus procumbens Bess., Valerianella Morisonii DC., Podospermum Jacquinianum Koch, Cerastium anomalum W. K., Statice Gmelini Willd.
49 m ü. d. M.; 4. Juni 1899. leg. Dr. A. von Degen.

Nr. 143. ***Festuca ovina L.*** Spec. pl. ed. I, p. 73 (1753) ***var. vulgaris Koch*** Syn. ed. 1, p. 812 (1837); Hackel Monogr. Fest. p. 86 (1882) ***subvar. laevifolia Hackel*** Mon. Fest. p. 87 (1882).
Auf altem Dünensand einer dürren, mit Calluna vulgaris bewachsenen Heide kleine Bestände bildend; Assern am Rigaischen Meeresstrand (Russland).
Ca. 3—5 m ü. d. M.; 27. Juni 1900. leg. G. Westberg.

Nr. 144. ***Festuca ovina L. var. glauca Hackel*** Monogr. Fest. p. 83, 94 (1882); ***subvar. genuina Hackel*** Monogr. Fest. p. 94 (1882) = *F. glauca Lam.* Enc. II, p. 459 (1789).
An Porphyrfelsen des Donnersberges in der bayr. Pfalz. Begleitpflanzen: Asplenum septentrionale Hoffm., Hieracium Peleterianum Mer., Schmidtii Tsch., Aronia rotundifolia Pers.
Ca. 500 m ü. d. M.; 5. Juni 1900. leg. A. Kneucker.

Nr. 145. ***Festuca ovina L. var. vaginata Hackel*** Monogr. Fest. p. 97 (1882) = *F. vaginata Waldst. u. Kit.* in Willd. Enum. hort. Berol. p. 116 (1809).
Auf Sandhügeln (Flugsand) der Donauinsel Csepel im Komitat Pest in Ungarn. Begleitpflanzen: Alyssum tortuosum W. K., erigens F. J., Gypsophila paniculata L., arenaria W. K., Secale campestre Schult., Carex conglobata Kit., Alsine setacea (Thuill.), Linum Pannonicum Kern., Kocleria glauca DC., Stipa pennata L. ssp. Joanis Celak., capillata L.
100 m ü. d. M.; 17. Juni 1899. leg. Dr. A. v. Degen.

Nr. 146. ***Festuca ovina L. ssp. pinifolia Hack.*** in Boiss. Fl. Or. V, p. 617 (1884).
Auf steinigem, felsigem Boden der Gipfel des Dschebel Sannin im Libanon: Kreidekalk. Begleitpflanzen: Bromus variegatus M. B., Lloydia rubroviridis Boiss. et Ky., Lamium nivale Boiss. et Heldr., Astragalus cruentiflorus Boiss., A. nummularius DC., Acantholimon Libanoticum Boiss., Crepis robertioides Boiss., Bunium Pestalozzae Boiss., Johrenia aurea Boiss. et Bl., Alyssum condensatum Boiss. et Haussk., Podanthum virgatum Labill., Campanula Libanotica Boiss. etc.
Ca. 2600 m ü. d. M.; 26. Juli 1900. leg. Ernst Hartmann.

Nr. 147. ***Festusa ovina var. Valesiaca Koch*** Syn. ed. 1, p. 812 (1837) = *F. Valesiaca Schleich.* ap. Gaud. Agrost. Helv. I, p. 242 (1811).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Auf dem sonnverbrannten Hügel von Schloss Tourbillon bei Sion im Wallis (Schweiz); Urkalk. Begleitpflanzen: Stupa pennata ssp. Gallica Celak., capillata L., Koeleria Vallesiana Aschs. u. Gräbn., Poa concinna Gaud., Carex nitida Host, Iris lutescens Lam., Hyssopus officinalis L., Galium rigidum Vill., Trigonella Monspeliaca L., Medicago minima Bartl., Astragalus onobrychis L., Euphorbia Gerardiana Jacq., Anemone montana Hoppe etc.

Ca. 500—600 m ü. d. M.; Mai 1900. leg. Prof. F. O. Wolf.

Nr. 148. ***Festuca ovina L. var. pseudovina Hackel*** Monogr. Fest. p. 102 (1882) [Fest. sulcata Nyman Consp p. 828 (1882) Suppl. 339 als Art] ***subvar. rutila Hackel*** in litt. 1900.

Auf Natron auswitterndem Lehmboden zw. Szolnok und Tápió-Györgye im Komitat Fász-Nagykim-Szolnok. Begleitpflanzen: Poa bulbosa L. var. vivipara L., Cerastium anomalum W. K., Plantago tenuiflora W. K., Trifolium angulatum W. K., parviflorum Ehrh., striatum L., Artemisia monogyna W. K., Matricaria chamomilla L., Statice Gmelini Willd., Lepidium ruderale L.

91 m ü. d. M.; 8. Juni 1900. leg. Dr. A. v. Degen.

(Fortsetzung folgt.)

Botanische Litteratur, Zeitschriften etc.

Missbach, E. Rob. u. Krause, Ernst H. L., Die Cyperaceae in J. Sturms Flora von Deutschland. 2. Aufl. 2. Band., Verl. v. K. G. Lutz in Stuttgart 1900. 160 Seiten und 64 kolor. Tafeln.

Vor kurzem erhielt ich das Cyperaceen-Bändchen der im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift angekündigten Sturm'schen Flora von Deutschland. Leider sind in diesem Bändchen die Autornamen, welche im 3. Bändchen stehen, weggelassen. Nur bei manchen Synonymen, die sich aber nur bei einem Teil der Arten befinden, sind Autornamen beigefügt. Die Weglassung der Autornamen ist grundsätzlich geschehen, wie in „Aus der Heimat", Nr. 1, Febr. 1901, S. 18 mitgeteilt wird. Ich bin der Ueberzeugung, dass die Weglassung der Autornamen nicht als praktisch angesehen werden kann, solange nicht alle bedeutenden Botaniker sich auf einen Namen geeinigt haben. Besonders nötig scheint mir gerade dann die Nachstellung des Autornamens beim Hauptnamen (viel wichtiger als bei den Synonymen), wenn die Synonyme möglichst eingeschränkt werden sollen. Wie ist es möglich, bes. für den auf floristischem Gebiete nur gelegentlich Belehrung Suchenden (welchem ja die Sturm'sche Flora hauptsächlich dienen soll) festzustellen, ob z. B. die *Carex caespitosa*, deren Namen er irgendwo ohne Beifügung des Autors findet, identisch ist mit der in Sturm's Flora als *C. caespitosa* bezeichneten Pflanze und den Synonymen *C. pacifica, C. Drejeri,* oder ob er es mit der *C. caespitosa* der älteren Autoren zu thun hat, welche Bezeichnung als Synonym von *C. Goodenoughii* betrachtet wird. Aehnliche Beispiele lassen sich noch manche anführen; ich erinnere nur noch an *C. distans Lightf. = binervis Sm.* und an die in Sturm's Flora angeführte Linné'sche *C. distans*. Auch bedaure ich, dass die Namen der Schädlinge nicht wie im Gräser-Bändchen unter jeder Art, sondern nur kurz zu Anfang der ganzen Familie genannt sind, da es in der Gegenwart, wo so viele neue Schädlinge unserer Kulturpflanzen entdeckt werden, gewiss für manche von Interesse ist, zu sehen, welche derselben auf wilden Pflanzen schon vorkamen. Hoffentlich werden wenigstens in den späteren Bändchen die Autornamen zur Erleichterung des Auffindens angegeben. Endlich begreife ich nicht, warum die Verfasser einige *Carices,* die vollständig aufgeklärt sind, mit dem Zusatz „dubia" bezeichnen. Das Format ist sehr praktisch, daher kann das Bändchen auf Spaziergängen leicht in der Tasche mitgenommen werden. Die recht guten, kolorierten Bilder fast aller deutschen Arten erleichtern selbstverständlich dem Anfänger das Auffinden des zugehörigen Namens sehr. Der Preis ist für Mitglieder des „Deutschen Lehrervereins für Naturkunde", welchem

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 7_1901

Autor(en)/Author(s): Kneucker Andreas

Artikel/Article: Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae" 71-76