

*Carex remota L.* Im Teufelsgrund. — *C. digitata L.* Auf der Hüneburg. — *C. leporina L.* Im Teufelsgrund, im Walde zwischen Sittichenbach und Rothen-schirmbach, neben dem Pfarrholze bei Wolferode. — *C. scutellata Schreb.* Im Seebecken miweit der Pumpstation. [Als der salzige See noch bestand, war die Pflanze im Sealluvium allgemein verbreitet, doch standen die einzelnen Individuen meist mehrere hundert Meter von einander entfernt. Nachdem der See abgelassen und das Sealluvium beackert worden ist, ist die Pflanze spärlicher geworden, hat sich aber mehrfach auf dem trockenen Seegrunde angesiedelt. In jüngster Zeit ist sie u. a. noch an folgenden Punkten im Gebiete des salzigen Sees gefunden worden: am Mittelkanal, in der Nähe der Teufelsbrücke, am Teiche an der Kärrnerbrücke, sowie an dem Tümpel westlich davon, am Teiche bei Rolldorf z. B. am Bade. Ansserdem wächst die Art an verschiedenen Stellen am süßen See]. — *C. rostrata Wth.* Auf Wiesen am Sülzer Bach. — *C. vesicaria L.* An der Erdsenke auf dem Friedrichsberg, am Teiche hinter dem Katharinenholze. — *C. riparia Curt.* Am Fischteiche in Rothenschirmbach, am Erdeborner Stollengraben, am Braudteiche neben dem früheren Bade in Ober-Röblingen, am süßen See neben dem Schlosse in Seeburg. — *C. hirta L. var. hirtaeformis Pers.* Am Annateiche in Helbra.

*Phleum Boehmeri Wib.* Am Waldesrande bei Sittichenbach. — *Calamagrostis silvatica DC.* An einem Hohlwege am dem Friedrichsberg. — *C. epigeios Roth.* An der hallischen Chaussee vor der Bruchmühle, im Pfarrholze bei Wolferode. — *Stipa capillata L.* Au Bergen bei Wormsleben. — *St. pennata L.* [Weinberge über Rollsdorf]. — *Corynephorus canescens P. B.* Häufig in der oberen Glunne u. s. w. — *Melica Nebradiensis Parl.* In den Hohnstädter Weinbergen oberhalb des Rösenthales. — *Sclerochloa dura P. B.* An trockenen Stellen der Vogelwiese, an der Landwehr, an der Galgenschlucht neben der Parkstrasse, an Wegen nach der Zellermühle, in der Aue neben den hohen Pappeln, auf dem Wege unterhalb der Unter-Rissdorfer Weinberge, an der Dorfstrasse in Wormsleben. — *Poa serotina Ehrh.* Im Walde bei Holzzelle. — *P. bulbosa L.* Am Wege neben dem Windberg unweit Hornburg, am Berge oberhalb Wormsleben. — *Glyceria spectabilis M. u. K.* Im Graben von Rollsdorf nach der Kärrner Brücke. — *Festuca gigantea Vilm.* Im Walde bei Holzzelle. — *Bromus arvensis L.* An der Blankenheimer Chanssee oberhalb Wimmelburg, an einem Wege auf dem Hütberg. — *B. asper Murr.* Am Kesselholze, im Buschholz neben der Buschmühle im Fressbachthale, im oberen Kriebichthale. — *B. commutatus Schr.* Auf Feldern am Kärrner See. — *Triticum glaucum Desf.* [In der Umgebung der Mansfelder Seen]. — *T. repens L. v. caesia Presl.* Häufig in den Weinbergen. — *Hordeum secalinum Schreb.* Auf Wiesen bei Wormsleben, auf Wiesen zwischen Aseleben und Seeburg.

*Equisetum silraticum L.* Im oberen Kriebichthale.

*Cystopteris fragilis Bernh.* An Felsabhängen im Walde unterhalb Holzzelle. — *Asplenium trichomanes L.* An Felsabhängen im Neckendorfer Grunde. — *A. ruta muraria L.* In einem ausgemauerten Graben neben dem Seminar.

## Zusammenstellung von Zoocecidiens.

Aus dem Kreise Grünberg i. Schles.

Von Th. Hellwig.

(Fortsetzung aus Nr. 10, p. 161, 1901.)

*Polygala vulgaris.*

*Phytoptoecidium.* Nr. 167. Neu f. Schl.

*Phytoptoecidium.* Vergl. Nr. 167.

Rohrb.

Wirtspfl. neu.

*Dianthus arenarius.* S.W.-Grenze.

Barnd'sche M., Holzmann's Zieg.

Trieb spitzen - Knospe, verkrümmte

Blasige Knötchen am St. grunde. Neu.

Kelche. Neu.

Bothe's Seechen.

Pirnig.

*P. amara* 3. *Austriaca.*

*Saponaria officinalis.*

Gedunsene Blüten, verkrümme Blätter. Nen.

Pulverhans, Naumburg a. B.

*Silene nutans.*

Blattgalle.

Schlossberg.

*S. chlorantha.* S. W.-Gr.

An St. Neu.

Weite Mühle.

*S. inflata.*

*Aphis Cucubali* Pass. Nr. 356.

Lawaldauer Chaussee.

*S. otites.*

Blattrollung. Neu.

Siberien.

*Melandryum album.*

*Cecidom. Lychnidis* Heyd. Nr. 466.

Steinbach's Vorw., Aumühlberg.

Bothe's Seechen, Maugscht, Herren-

Mühle bei Heinerdorf (Br. Schroed.).

Dammerau, Kontopp.

*Agrostemma Githago.*

An St. u. Kapsel.

Louisenthal.

*Alsine viscosa.* W.-Pfl.

St.-drehnung u.-verdickung; gedunsene Kapsel.

Lindebusch, Weite M., Fliess.

*Arenaria serpyllifolia.*

Büschelestauchung, verkrümme Kapsel.  
Fliess.

*Stellaria media.*

Blattrandrollung. Nährpfl. neu.

Erste Walke.

*S. Holostea.*

Triebspitzen, Knitterung.

Rohrbusch.

*S. palustris (glaea).*

*Phytoptocecidium.* Nr. 247. Neu f. Schl.  
Steinbach's Vorw., Nitritz, Kon-  
topp, Aufzug, Carolath.

*S. graminea.*

*Phytoptocecid.*? Nährpfl. neu f. Schl.  
Rohrbusch.

*S. nigrinosa.*

*Phytoptocecid.* Nährpfl. neu f. Schl.  
Holzmann's Zieg., Zahmer See.

*Cerastium triviale.*

*Trioza Cerastii* (H. Löw.) F. Löw.  
Nr. 291.

Kontopp, Dickstrauch.

*C. arvense.*

*Aphis Cerastii* Kalt. Nr. 311.  
Seinberg, Marschfeld, Promenade.

*Linum perenne.*

Stengelgalle. Neu.

Sorauer Chaussee.

*Malva alcea.*

Blattrollung.

Prautzke.

*M. neglecta.*

*Aphis articaria* Kalt. Nr. 330.

Pitnig, Hohenborau, Kr. Freyst.

*Tilia platyphyllea.* S.-Pfl.

*Erineum.* Nr. 259. Neu f. Schl.

Schlossberg.

*E. bifrons* Lepell. Nr. 260. (*Phytoptus tiliæ Nalepa*)

Seiffersholz.

*Ceratoneon extensum* Bremi. Nr. 261.

Grünberg.

*Cecid. tiliæ volvens* Rübs. Nr. 573.

2. Standort.

Carolath, Schlawa.

*T. ulmifolia (parrifolia).*

*Erineum* oder *Phyllerium tiliaceum* Pers. Nr. 263.

Weisser Berg, Költschbusch bei Carolath, Naumburg a. B.

*E. nervale* Kunze (*Phytoptus tiliæ leiosoma* Nal.). Nr. 265.

Weisser Berg, Seiffersholz.

Knotige Randrollung. Nr. 266.

Rohrbusch.

*Legnon crispum* Bremi. Nr. 267.

Weisser Berg, Grünwald (in Aus-  
stülpungen der Blattfläche).

*Ceratoneon extensum* Bremi (*Phytop-  
tus tiliæ Nal.*). Nr. 268.

Carolath.

*Cecid. Thomasiana* Kieff. Vgl. Nr. 572.

Nährpfl. neu.

*C. tiliæ volvens* Rübs. Nr. 576.

Carolath.

*Hormomyia Reamuriana* Fr. Löw.  
Nr. 575.

Weisser Bg., Dammerau, Carolath.

*Hypericum perforatum.*

*Cecid. Hyperici* Br. Nr. 454.

Pfeifferberg, Sauermann's Mühle.

*H. tetrapetrum.*

*Cecid. Hyperici* Br. Vgl. Nr. 454.  
Nährpfl. neu.

Grünberg.

*H. quadrangularum.*

*Cecid. Hyperici* Br. Vergl. Nr. 454.  
Nährpfl. neu.

Schlossberg.

*Acer Pseudoplatanus.*

*Cephalaneon solitarium* Bremi. Vgl.  
Nr. 16. Nährpfl. neu.

Nensalz a. O.

*Erineum acerinum* Pers. (= *E. platanoides* Fr.). Nr. 21.

Sauermann's Mühle.

- A. platanoides.*  
*Erineum acerinum* Pers. Nr. 19.  
 Augustberg.
- A. campestre.* S.-Pfl.  
*Erineum purpurascens* Gärtn. Nr. 14.  
 2. Standort.  
 Cucave, Nensalz a. O.
- Cephaloneon myrialeum* Bremi, Nr. 15.  
 Dammerau, Neusalz, Költschbusch  
 bei Carolath.
- Erph. solitarium* Bremi, Nr. 16, Nährpfl.  
 neu für Schl.  
 Dammerau, Költschbusch b. Carolath.
- Vitis vinifera.* Südl. Kaukasus.  
*Phytoptus Vitis Landois.* Mr. 286.  
 $(\text{Phyllerium f Erineum} / \text{Vitis Fr.})$ .  
 Grünberg, (Lansitz: Auch auf der  
 Oberseite).
- Ampelopsis quinquefolia.* N. Amerika.  
 Neu. Lebtenz, Ochelhermsdorf.
- Geranium palustre.*  
*Frineum* (= *Phyllerium Geranii*  
*Rabenh.*) Nr. 124. 2. Standort.  
 Grünwald.
- G. sanguineum.*  
*Phytoptus Geranii Canestrini* (*Ph.*  
*dolichosoma Can.*), Nr. 126. Neu  
 für Schlesien.  
 Schlossberg.
- G. pusillum.*  
 Blattgalle: Blatt krausblasig, Blst.-  
 Knoten. Neu.  
 Tschieherzig, Prov. Brandenburg.
- Oxalis stricta.* W.-Pfl.  
 Bl. galle: Faltung u. Drehung. Vgl.  
 Nr. 155. Neu f. Schl. Nährpfl. neu.  
 Bergwerk, Schlossberg.
- Eryngium Europaea.*  
*Legnon?* Nr. 93.  
 Carolath.
- Aphis Eryngii* Eb. Neu.  
 Rauherei, Steinbach's Vorwerk,  
 Boyadel.
- Rhamnus cathartica.*  
*Trioza Walkeri* (Frsh.) F. Löw. Nr. 300.  
 Barnd'sche M., Weite M., Pirmig.
- Genista tinctoria.* S.-Pfl.  
*Cecid. genisticola* F. Löw. Nr. 439.  
 Wittgenauer Berge, Weisser Berg.
- Cecid. Schlechtend.* Nr. 440.  
 Wittgenauer Berge, Glogeiche.
- Lupinus luteus.* S.-Pfl.  
 Bl.galle: Faltung, Rollung.  
 Bobernick.
- Medicago sativa.*  
 Bl-faltung. Vgl. Nr. 146. Nährpfl. neu.  
 Marschfeld.
- M. folcata.*  
 Faltung u. s. w. Nr. 146. Neu f. Schl.  
 Alte Maugscht.
- Cecid. ignorata* Wachtl. Nr. 463.  
 2. Standort.  
 Poln. Nettkow.
- M. lupulina.*  
*Cecid. Vieja Kieff.* Vergl. Nr. 595  
 Nährpfl. neu.  
 Holzmann's Zieg.
- Trifolium pratense.*  
*Cecid. Trifolii F. Löw.* Nr. 580. 2. St.  
 Halbmil-M., Wittgenau.
- T. arrense.*  
 Vergrünung u. s. w. (*Phyptoocecid.*)  
 Nr. 269. 2. Standort.  
 Klopseh's Zieg., Lawaldauer Ch.
- Tychius polyneatus* Germ. Nr. 802. Neu.  
 Siberien (zwisch. *Calluna*). Weite  
 Mühle, Weisser Berg, Kontopp.
- T. repens.*  
*Cecid. Trifolii F. Löw.* Nr. 581. 2. St.  
 Schwent-See, Carolath.
- T. aureum.*  
*Tychius polyneatus* Germ. Vgl. Nr. 802.  
 Nährpfl. neu.  
 Aufzug.
- T. agrarium.*  
*Tychius polyneatus* Germ. Vgl. Nr. 802.  
 Nährpfl. neu.  
 Weite Mühle.
- T. minus (filiforme).*  
 Vergrünung u. s. w. Vergl. Nr. 269.  
 Nährpfl. neu.  
 Schwenten.
- Lotus corniculatus.*  
 Blrandrollung. Nr. 142.  
 Steinbach's Vorw., Carolath.
- Diplosis Loti* (Deg.) H. Löw. Nr. 461.  
 Bei Beuchelt's Fabrik, Carolath.
- L. uliginosus.*  
*Diplosis Loti* (Deg.) H. Löw. Nr. 461.  
 Nährpfl. neu.  
 Halbmil-Mühle.
- Cecid. toticola* Rübs. Nr. 462.  
 Holzmann's Zieg., Barnd'sche M.
- Astragalus glycyphylloides.*  
 St.galle. Neu.  
 Haide-Mühle.
- A. arenarius.* S. O.-Gr.  
*Cecid.* Nr. 383. Neu f. Schl. Herbar.  
*cecidiol.* Nr. 56.  
 Ochelhermsdorf (Schr.), Halbmil-  
 Mühle (Hellw.).
- Cecid.* (Larven). Nr. 384.  
 Ochelhermsdorf b. Grünbg. (Schröd.)

- Coronilla varia.*  
Bl.galle: Verkrümmung u. Rollung.  
Rohrbusch.
- Vicia tetrasperma.*  
*Cecid.* *Viciae Kieff.* Nr. 601.  
Lindebusch, Seiffersholtz, Sauer-  
mann's Mühle, Carolath.
- V. Cracca.*  
*Phytophitis.* Vgl. Nr. 283. Nährpfl. neu.  
Fliesse.
- Cecid.* *Viciae Kieff.* Nr. 597.  
Promenade, Barnd'sche M., Carolath.
- Diplosis Loti Deg.* Nr. 588. 2. St.  
d. Nährpfl.  
Carolath.
- V. tenuifolia.*  
*Cecid.* *Viciae Kieff.* Vergl. Nr. 595.  
Nährpfl. neu.  
Klopsch's Zieg., Oderwald.
- V. dumetorum.*  
*Cecid.* *Viciae Kieff.* Vergl. Nr. 595.  
Nährpfl. neu.  
Läsgen.
- V. sepium.*  
*Cecid.* *Viciae Kieff.* Nr. 600. Nährpfl.  
nen f. Schl.  
Cucave.
- V. sativa.* S.-Pfl.  
*Cecid.* *Viciae Kieff.* Vergl. Nr. 595.
- Nährpfl. neu.  
Droschkau.
- V. angustifolia.*  
*Cecid.* *Viciae Kieff.* Nr. 595. 2. St.  
Sorauer Ch., Holzmann's Zieg.,  
Kontopp.
- V. segetalis.*  
*Diplosis Loti Deg.* Vergl. Nr. 596.  
Nährpfl. neu.  
Holzmann's Zieg.
- Cecid.* *Viciae Kieff.* Nr. 599. 2. St.  
Hinter dem Pulverhause.
- Lathyrus pratensis.*  
*Cecid.* *Lathyri Frauenf.* Nr. 459.  
Barnd'sche M., Rohrb., Maugscht-  
thal, Wittgenan, Carolath.
- Cecid.* Nr. 460. 2. St.  
Walter's Berg.
- Prunus spinosa.*  
*Cratoneuron attenuatum Bremi.* (*Phytop-*  
*tus Padi Nalepa*). Vergl. Nr. 185.  
Nährpfl. neu.  
Läsgen.
- Cephalonem molle Bremi.* Nr. 187.  
Rohrb., Pirnig.
- C. hypocrateiforme (confluens) Bremi*  
(*Phytopodus similis Nalepa*) Nr. 188.  
Rohrb., Ranherei, Läsgen.  
(Fortsetzung folgt.)

## Beitrag zur Flora von Böhmen.

Von J. Rohlena, Prag.

*Potamogeton densus L.* In den kleinen Teichen ober dem Oel-  
berger Bräuhaus bei Braunauf. In anderen Teichen in der Umgebung von  
Braunauf habe ich vergebens nach demselben geforscht. Im Jahre 1895 fand ich  
ihn noch häufig; voriges Jahr schon seltener, und in schwachen Exemplaren,  
weil diese Teiche jetzt von *Elolea canadensis* angefüllt werden, welche früher  
dort fehlte.

*P. compressus L.* In der Umgebung von Braunauf in den erwähnten  
Teichen; in beiden Teichen bei Ruppersdorf, im grossen bei Oelberg und in den  
beiden kleinen ober dem Oelberger Bräuhaus.

*P. rufescens Schrad.* In der Umgebung von Braunauf, in den Teichen  
bei Neusorge und Weckelsdorf, sehr häufig.

*Carex hirta L. v. hirtaeformis Pers.* Auf nassem Boden beim  
Bahnhofe in Halbstadt.

*Eriophorum polystachyrum L.* Auf einer nassen Wiese in der  
Nähe von Halbstadt.

*Scirpus Tabernaemontani Gmel.* In einem Sumpfe bei Libice  
unter dem Voškovrech.

*Anthoxanthum odoratum L. var. verticillata v. n.* Rispe  
lang (über 1½ dm), unterbrochen, die Zweige kurz, so dass die Aehrchen  
anscheinend in, von einander entfernten Wirbeln stehen. — In der Kral. Obora  
bei Prag.

— *var. pubiculmis v. n.* Nicht nur die Scheiden, sondern auch der  
Halm ist von nach abwärts gerichteten Härchen ranh. — Auf einem Holzschlag  
bei Přelouč.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [8\\_1902](#)

Autor(en)/Author(s): Hellwig Frank H.

Artikel/Article: [Zusammenstellung von Zoocecidiens. Aus dem Kreise Grünberg\\* i. Schles. 81-84](#)