

Carex remota L. Im Teufelsgrund. — *C. digitata* L. Auf der Hüneburg. — *C. leporina* L. Im Teufelsgrund, im Walde zwischen Sittichenbach und Rothenschirmbach, neben dem Pfarrholze bei Wolferode. — *C. scabina* Schreb. Im Seebecken unweit der Pumpstation. [Als der salzige See noch bestand, war die Pflanze im Secalluvium allgemein verbreitet, doch standen die einzelnen Individuen meist mehrere hundert Meter von einander entfernt. Nachdem der See abgelassen und das Secalluvium beackert worden ist, ist die Pflanze spärlicher geworden, hat sich aber mehrfach auf dem trockenen Seegrunde angesiedelt. In jüngster Zeit ist sie u. a. noch an folgenden Punkten im Gebiete des salzigen Sees gefunden worden: am Mittelkanal, in der Nähe der Teufelsbrücke, am Teiche an der Kärnerbrücke, sowie an dem Tümpel westlich davon, am Teiche bei Rolldorf z. B. am Bade. Ausserdem wächst die Art an verschiedenen Stellen am süßen See]. — *C. rostrata* With. Auf Wiesen am Sülzer Bach. — *C. vesicaria* L. An der Erdsenke auf dem Friedrichsberg, am Teiche hinter dem Katharinenholze, — *C. riparia* Curt. Am Fischteiche in Rothenschirmbach, am Erdeborner Stollengraben, am Brandteiche neben dem früheren Bade in Ober-Röblingen, am süßen See neben dem Schlosse in Seeburg. — *C. hirta* L. var. *hirtiformis* Pers. Am Annateiche in Helbra.

Phleum Boehmeri Wib. Am Walde rinde bei Sittichenbach. — *Calamagrostis silvatica* DC. An einem Hohlwege an dem Friedrichsberg. — *C. epigeios* Roth. An der hallischen Chaussee vor der Bruchmühle, im Pfarrholze bei Wolferode. — *Stipa capillata* L. An Bergen bei Wormsleben. — *St. pennata* L. [Weinberge über Rolldorf]. — *Corynephorus canescens* P. B. Häufig in der oberen Glume u. s. w. — *Melica Nebrodensis* Parl. In den Höhnstedter Weinbergen oberhalb des Röserthales. — *Sclerochloa dura* P. B. An trockenen Stellen der Vogelwiese, an der Landwehr, an der Galgenschlucht neben der Parkstrasse, an Wegen nach der Zellermühle, in der Aue neben den hohen Pappeln, auf dem Wege unterhalb der Unter-Rissdorfer Weinberge, an der Dorfstrasse in Wormsleben. — *Poa serotina* Ehrh. Im Walde bei Holzzelle. — *P. bulbosa* L. Am Wege neben dem Windberg unweit Hornburg, am Berge oberhalb Wormsleben. — *Glyceria spectabilis* M. u. K. Im Graben von Rolldorf nach der Kärner Brücke. — *Festuca gigantea* Vill. Im Walde bei Holzzelle. — *Bromus arvensis* L. An der Blankenheimer Chaussee oberhalb Wimmelburg, an einem Wege auf dem Hutberg. — *B. asper* Murr. Am Kesselholze, im Buschholz neben der Buschmühle im Fressbachthale, im oberen Kliebichthale. — *B. commutatus* Schr. Auf Feldern am Kärner See. — *Triticum glaucum* Desf. [In der Umgebung der Mansfelder Seen]. — *T. repens* L. v. *caesia* Presl. Häufig in den Weinbergen. — *Hordeum scaberrimum* Schreb. — Auf Wiesen bei Wormsleben, auf Wiesen zwischen Aseleben und Seeburg.

Equisetum silvaticum L. Im oberen Kliebichthale.

Cystopteris fragilis Bernh. An Felsabhängen im Walde unterhalb Holzzelle. — *Asplenium trichomanes* L. An Felsabhängen im Neckendorfer Grunde. — *A. ruta muraria* L. In einem ausgemauertem Graben neben dem Seminar.

Zusammenstellung von Zoocecidien.

Aus dem Kreise Grünberg i. Schles.

Von Th. Hellwig.

(Fortsetzung aus Nr. 10, p. 161. 1901.)

Polygala vulgaris,

Phytoptocidium, Vergl. Nr. 167.

Wirtspfl. neu.

Barnd'sche M., Holzmann's Zieg.

Blasige Knötchen am St. grunde. Neu.

Bothe's Seechen.

P. amara f. *Austriaca*,

Phytoptocidium, Nr. 167. Neu f. Schl.

Rohrb.

Dianthus arvensis, S.W.-Grenze,

Triebspitzen-Knospe, verkrümmte Kelche. Neu.

Pirnig.

- Saponaria officinalis*.
Gedunsene Blüten, verkrümmte Blätter. Neu.
Pulverhaus, Naumburg a. B.
- Silene nutans*.
Blattgalle.
Schlossberg.
- S. chlorantha*. S. W.-Gr.
An St. Neu.
Weite Mühle.
- S. inflata*.
Aphis Cucubali Pass. Nr. 356.
Lawaldauer Chaussee.
- S. otites*.
Blattrollung. Neu.
Siberien.
- Melandryum album*.
Cecidom. Lychnidis Heyd. Nr. 466.
Steinbach's Vorw., Aumühlberg.
Bothe's Seechen, Mangsch. Herren-
Mühle bei Heinerdorf (Br. Schroed.),
Dammerau. Kontopp.
- Agrostemma Githago*.
An St. n. Kapsel.
Louisenthal.
- Alsine viscosa*. W.-Pfl.
St.-drehung n. verdickung; gedunsene
Kapsel.
Lindebusch. Weite M., Fließ.
- Arenaria serpyllifolia*.
Büschelstauhung, verkrümmte Kapsel.
Fließ.
- Stellaria media*.
Blattrandrollung. Nährpfl. neu.
Erste Walke.
- S. Holostea*.
Triebspitzen, Knitterung.
Rohrbusch.
- S. palustris (glauca)*.
Phytoptococcidium. Nr. 247. Neu f. Schl.
Steinbach's Vorw., Nitritz, Kontopp,
Aufzug, Carolath.
- S. graminea*.
Phytoptococcid.? Nährpfl. neu f. Schl.
Rohrbusch.
- S. uliginosa*.
Phytoptococcid. Nährpfl. neu f. Schl.
Holzmann's Zieg., Zalmers See.
- Cerastium triviale*.
Trioxa Cerastii (H. Löw.) F. Löw.
Nr. 291.
Kontopp, Dickstranch.
- C. arvense*.
Aphis Cerastii Kalt. Nr. 311.
Seinberg, Marschfeld, Promenade.
- Limon perenne*.
Stengelgalle. Neu.
Sorauer Chaussee.
- Malva alcea*.
Blattröllung.
Praulzke.
- M. neglecta*.
Aphis urticae Kalt. Nr. 330.
Pirrig, Hohenborau, Kr. Freyst.
- Tilia platyphyllo*. S.-Pfl.
Erineum. Nr. 259. Neu f. Schl.
Schlossberg.
- E. bifrons* Lepell. Nr. 260. (*Phytoptus*
tiliae Nalepa.)
Seiffersholz.
- Ceratoneon extensum* Bremi. Nr. 261.
Grünberg.
- Cecid. tiliae colceus* Rübs. Nr. 573.
2. Standort.
Carolath, Schlawa.
- T. ulmifolia (parvifolia)*.
Erineum oder *Phyllerium tiliaceum*
Pers. Nr. 263.
Weisser Berg. Költschbusch bei
Carolath, Naumburg a. B.
- E. nervale* Kautz (*Phytoptus tiliae*
leiosoma Nal.). Nr. 265.
Weisser Berg. Seiffersholz.
- Knötige Randrollung. Nr. 266.
Rohrbusch.
- Legnon crispum* Bremi. Nr. 267.
Weisser Berg. Grünwald (in Aus-
stülpungen der Blattfläche).
- Ceratoneon extensum* Bremi (*Phytoptus*
tiliae Nal.). Nr. 268.
Carolath.
- Cecid. Thomasiana* Kieff. Vgl. Nr. 572.
Nährpfl. neu.
- C. tiliae colceus* Rübs. Nr. 576.
Carolath.
- Hormomyia Reaumuriana* Fr. Löw.
Nr. 575.
Weisser Bg., Dammerau, Carolath.
- Hypericum perforatum*.
Cecid. Hyperici Br. Nr. 454.
Pfeifferberg, Sauermann's Mühle.
- H. tetrapterum*.
Cecid. Hyperici Br. Vgl. Nr. 454.
Nährpfl. neu.
Grünberg.
- H. quadrangulum*.
Cecid. Hyperici Br. Vergl. Nr. 454.
Nährpfl. neu.
Schlossberg.
- Acer Pseudoplatanus*.
Cephaloneon solitarium Bremi. Vgl.
Nr. 16. Nährpfl. neu.
Neusalz a. O.
- Erineum acrinum* Pers. (= *E. platanoides*
Fr.). Nr. 21.
Sauermann's Mühle.

- A. platanoides.*
Erineum acerinum Pers. Nr. 19.
 Augustberg.
- A. campestre.* S.-Pfl.
Erineum purpurascens Gärtn. Nr. 14.
 2. Standort.
 Cucave, Neusalz a. O.
Cephaloneon myrialeum Bremi. Nr. 15.
 Dammerau, Neusalz, Költchbusch
 bei Carolath.
Ceph. solitarium Bremi. Nr. 16. Nährpfl.
 neu für Schl.
 Dammerau, Költchbusch b. Carolath.
- Vitis cinifera.* Südl. Kaukasus.
Phytoptus Vitis Landois. Nr. 286.
 (*Phyllerium [Erineum] Vitis Fr.*).
 Grünberg. (Lansitz: Auch auf der
 Oberseite).
- Ampelopsis quinquefolia.* N. Amerika.
 Neu. Lebtenz, Ochelhermsdorf.
- Geranium palustre.*
Erineum (= Phyllerium Geranii
Rabenh.). Nr. 124. 2. Standort.
 Grünwald.
- G. sanguineum.*
Phytoptus Geranii Canestrini (Ph.
dolichosoma Cant.). Nr. 126. Neu
 für Schlesien.
 Schlossberg.
- G. pusillum.*
 Blattgalle: Blatt krausblasig, Blst.-
 Knoten. Neu.
 Tschicherzig, Prov. Brandenburg.
- Oxalis stricta.* W.-Pfl.
 Bl. galle: Faltung u. Drehung Vgl.
 Nr. 155. Neu f. Schl. Nährpfl. neu.
 Bergwerk, Schlossberg.
- Eronymus Europa.*
Leguon? Nr. 93.
 Carolath.
Aphis Eronymi Eb. Neu.
 Rauherei, Steinbach's Vorwerk,
 Boyadel.
- Rhamnus cathartica.*
Trioxa Walkeri (Frsh.) F. Löw. Nr. 300.
 Barnd'sche M., Weite M., Pirmig.
- Genista tinctoria.* S.-Pfl.
Cecid. genisticola F. Löw. Nr. 439.
 Wittgenauer Berge, Weisser Berg.
Cecid. Schlechtend. Nr. 440.
 Wittgenauer Berge, Glogeiche.
- Lupinus luteus.* S.-Pfl.
 Bl. galle: Faltung, Rollung.
 Bobernig.
- Medicago sativa.*
 Bl-faltung. Vgl. Nr. 146. Nährpfl. neu.
 Marschfeld.
- M. fulcata.*
 Faltung u. s. w. Nr. 146. Neu f. Schl.
 Alte Maugscht.
Cecid. ignorata Wachtl. Nr. 463.
 2. Standort.
 Poln. Nettkow.
- M. lupulina.*
Cecid. Vicia Kieff. Vergl. Nr. 595
 Nährpfl. neu.
 Holzmann's Zieg.
- Trifolium pratense.*
Cecid. Trifolii F. Löw. Nr. 580. 2. St.
 Halbmeil-M., Wittgenau.
- T. arvense.*
 Vergrünung u. s. w. (*Phytoptocoid.*)
 Nr. 269. 2. Standort.
 Klopsch's Zieg., Lawaldauer Ch.
Tychius polyneatus Germ. Nr. 802. Neu.
 Sibirien (zwischen *Calluna*). Weite
 Mühle, Weisser Berg, Kontopp.
- T. repens.*
Cecid. Trifolii F. Löw. Nr. 581. 2. St.
 Schwent-See, Carolath.
- T. aurum.*
Tychius polyneatus Germ. Vgl. Nr. 802.
 Nährpfl. neu.
 Aufzug.
- T. agrarium.*
Tychius polyneatus Germ. Vgl. Nr. 802.
 Nährpfl. neu.
 Weite Mühle.
- T. minus (filiforme).*
 Vergrünung u. s. w. Vergl. Nr. 269.
 Nährpfl. neu.
 Schwenten.
- Lotus corniculatus.*
 Bl. randrollung. Nr. 142.
 Steinbach's Vorw., Carolath.
Diplosis Loti (Dy.) H. Löw. Nr. 461.
 Bei Beuchelt's Fabrik, Carolath.
- L. uliginosus.*
Diplosis Loti (Dy.) H. Löw. Nr. 461.
 Nährpfl. neu.
 Halbmeil-Mühle.
Cecid. loticola Rüb. Nr. 462.
 Holzmann's Zieg., Barnd'sche M.
- Astragalus glycyphyllos.*
 St. galle. Neu.
 Haide-Mühle.
- A. arenarius.* S. O.-Gr.
Cecid. Nr. 383. Neu f. Schl. Herbar.
 cecidiol. Nr. 56.
 Ochelhermsdorf (Schr.), Halbmeil-
 Mühle (Hellw.).
Cecid. (Larven). Nr. 384.
 Ochelhermsdorf b. Grünbg. (Schröd.)

- Conomilla varia*.
Bl.galle: Verkrümmung u. Rollung.
Rohrbusch.
- Vicia tetrasperma*.
Cecid. Viciae Kieff. Nr. 601.
Lindebusch, Seiffersholz, Sauer-
mann's Mühle, Carolath.
- V. Cracca*.
Phytoptus. Vgl. Nr. 283. Nährpfl. neu.
Flieess.
Cecid. Viciae Kieff. Nr. 597.
Promenade, Barnd'sche M., Carolath.
Diplosis Loti Deg. Nr. 588. 2. St.
d. Nährpfl.
Carolath.
- V. tenuifolia*.
Cecid. Viciae Kieff. Vergl. Nr. 595.
Nährpfl. neu.
Klopsch's Zieg., Oderwald.
- V. dumetorum*.
Cecid. Viciae Kieff. Vergl. Nr. 595.
Nährpfl. neu.
Läsgen.
- V. sepium*.
Cecid. Viciae Kieff. Nr. 600. Nährpfl.
neu f. Schl.
Cucave.
- V. sativa*. S.-Pfl.
Cecid. Viciae Kieff. Vergl. Nr. 595.
- Nährpfl. neu.
Droschkau.
- V. angustifolia*.
Cecid. Viciae Kieff. Nr. 595. 2. St.
Sorauer Ch., Holzmann's Zieg.,
Kontopp.
- V. segetalis*.
Diplosis Loti Deg. Vergl. Nr. 596.
Nährpfl. neu.
Holzmann's Zieg.
Cecid. Viciae Kieff. Nr. 599. 2. St.
Hinter dem Pulverhause.
- Lathyrus pratensis*.
Cecid. Lathyri Fraunf. Nr. 459.
Barnd'sche M., Rohrb., Maugscht-
thal, Wittgenau, Carolath.
Cecid. Nr. 460. 2. St.
Walter's Berg.
- Prunus spinosa*.
*Ceratodon attenuatum Bremi. (Phytop-
tus Padi Nalepa)*. Vergl. Nr. 185.
Nährpfl. neu.
Läsgen.
- Cephalomon molle Bremi.* Nr. 187.
Rohrb., Pirnig.
- C. hypocrateriforme (confluens) Bremi*
(*Phytoptus similis Nalepa*) Nr. 188.
Rohrb., Rauherei, Läsgen.
(Fortsetzung folgt.)

Beitrag zur Flora von Böhmen.

Von J. Rohlena, Prag.

Potamogeton densus L. In den kleinen Teichen ober dem Oel-
berger Bräuhaus bei Braunau. In anderen Teichen in der Umgebung von
Braunau habe ich vergebens nach demselben geforscht. Im Jahre 1895 fand ich
ihn noch häufig; voriges Jahr schon seltener, und in schwachen Exemplaren,
weil diese Teiche jetzt von *Elodea canadensis* angefüllt werden, welche früher
dort fehlte.

P. compressus L. In der Umgebung von Braunau in den erwähnten
Teichen; in beiden Teichen bei Ruppertsdorf, im grossen bei Oelberg und in den
beiden kleinen ober dem Oelberger Bräuhaus.

P. rufescens Schrad. In der Umgebung von Braunau, in den Teichen
bei Neusorge und Weckelsdorf, sehr häufig.

Carex hirta L. v. *hirtaeformis* Pers. Auf nassem Boden beim
Bahnhofs in Halbstadt.

Eriophorum polystachyum L. Auf einer nassen Wiese in der
Nähe von Halbstadt.

Scirpus Tabernaemontani Gmel. In einem Sumpfe bei Libice
unter dem Voškovreh.

Anthoxanthum odoratum L. var. *verticillata* v. n. Rispe
lang (über 1½ dm), unterbrochen, die Zweige kurz, so dass die Aehren
anscheinend in, von einander entfernten Wirbeln stehen. — In der Kral. Obora
bei Prag.

— var. *pubiculmis* v. n. Nicht nur die Scheiden, sondern auch der
Halm ist von nach abwärts gerichteten Härchen rauh. — Auf einem Holzschlag
bei Prolouč.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [8_1902](#)

Autor(en)/Author(s): Hellwig Frank H.

Artikel/Article: [Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg* i. Schles. 81-84](#)