© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Geographische Verbreitung der Campanula Zoysii Wulf.

Von Leo Derganc (Wien).

Campanula Zoysii[1]) *Wulfen* i. Jacquin Collect. II. (1788) p. 122. — Derganc, L., i. Actis Horti Jurjevensis. Tom. II. (1901) p. 25. — Paulin, A., i. Schedis ad Fl. exsicc. Carniol. I. (1901) p. 94.

Syn: *Campanula petraea Bracht:* i. schedis ao. 1842, non L. — *Saxia Zoysii Freyer!* i. sched. ao. 1845. — Costa, Reiseerinnerungen aus Krain (1848) p. 265. — *Saxia Zoysii var. pubescens Freyer!* i. sched. ao. 1845. — *Fauratia Zoysii Feer*[2]) i. Engler's Botan. Jahrb. XII. Bd. (1890) p. 610.

Exsicc.: Zechenter! i. Rchb. Fl. Germ. exsicc. Nr. 1172. — Derganc Leodegar et Paulin ap. Kerner, A., Fl. exs. A.-Hung. Nr. 2999 (1899)! — Derganc, Leo, IV. Delect. plant. exsicc. Jurjevens. (1901) p. 20 et V. Delect. 1902) p. 26. — Paulin Fl exsicc. Carniol. Nr. 191.

Icon.: Wulfen i. Jacquin Icon. rar. II. tab. 334. — Feer l. c. Taf. VI.

Diese Felsspalten bewohnende, von Juli bis August blühende Glockenblume ist von der Krummholz- bis in die Alpenregion der meisten Alpen des Sannthaler- oder Steineralpen- und des Karawankenzuges, des Zuges der Julischen, sowie der angrenzenden Alpen in Oberkrain, Südsteiermark, Südkärnten und dem Nordküstenlande sehr verbreitet. Speziell ist sie bisher von folgenden Standorten bekannt:

Steiner- oder Sannthaler-Alpenzug: Grintavec (Freyer, Kocbek); Skuta (Kocbek); Kanker Kočna (Freyer! 1845. VII. fl.); Rinka: im trockenen Sannbette unterhalb des Rinkafalles (Weiss. E.! 1858. VII. 17 fl.): Brana (ipse! 1892. VII. 27. 28. fl., 1893. VIII. 11.—13. fl., 1901. VIII. fl., Kocbek); Kamniško sedlo oder Steiner Sattel (Rastern! 1862. VII fl., ipse! 1892. VII. 27. fl., 1893. VIII. 11. fl., 1901. VIII. fl., Paulin! Fl. exs. Carniol. Nr. 191. II. et Fl. exs. A.-H. Nr. 2999. I.); Velika planjava (ipse! 1893. VIII. fl., 1901. VIII. fl., Kocbek); Kriška planina (Robič); Ojstrica (Zechenter! i. Rchb. Fl. Germ. exs. Nr. 1172, Unger, Weiss, E. 1831, Krašan, Kocbek, Molisch); Okrešelj (Kocbek); Logarthal (Kocbek); Raduha (Kocbek); Igla oder Nadel im Sulzbacherthale (Gebhard).

Karawankenzug: Storžič, 1700—1800 m (Zois! i. Hb. Wulfen, Krašan); Košuta (J. Durchner); Kotla (Graf); Rechberg (nach W. D. Koch); Obir, 6800' (Jabornegg! 1859); Ursulaberg (Jabornegg); Kočna (Jabornegg); Vellacher Kočna (Josch): Vellacher-Alpe (Krenberger): Loibl (Janša! Hb R., Schiff!); Loiblthal: an Felsen des rechten Bachufers zwischen dem Quecksilberbergwerke und St. Anna (Val. Plemel); Begunskiplatz unterm Loibl (Janša! 1853. VII. 25. fl. Hb. R.); Sattel des Medvedji dol oder Bärenthales ob Jauerburg (Voss, Krašan): Jauerburger Gereuth

---

[1]) Benannt nach Carl Freiherrn von Zois

[2]) Feer trennt diese *Campanula* besonders wegen der eigentümlichen Beschaffenheit der mit Klappen sich schliessenden Corolle als eigene Gattung *Fauratia Feer* von der Gattung *Campanula L.* ab; die von ihm angegebenen Merkmale sind jedoch nicht so schwerwiegend, dass dieselben eine neue Gattung, vielmehr nur eine eigene *Campanula*-Sektion *Fauratia (Feer) m.* begründen würden Uebrigens haben schon vor Feer alle Botaniker, welche unsere *Campanula* im blühenden Zustande lebend sahen, Bedenken gehabt, dieselbe ohne weiteres mit den anderen Glockenblumen mit offener Corolle zusammenzuwerfen; Freyer z. B. benannte sie zur Erinnerung an den Besuch ihres Standortes auf der Crna prst durch den Sachsenkönig Friedrich August II. *Saxia Zoysii* und verteilte sie im Jahre 1845 unter diesem Namen, ohne sie irgendwo zu beschreiben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

[Travniki, Polje pod Javornikom] (Valentin Plemel); im Gerölle des Savebettes bei Jauerburg mit *Primula Wulfeniana Schott* bei 550 m (Val. Plemel, Deschmann, Paulin); Südseite des Stol ob Žirovnica und auf der Belšica (C. Deschmann. Leodegar Derganc!); Begunjščica (Janša! Hb. R.); Zelenica (Janša! 1853. VIII. 16. fl., Wuzella! Josch); Korošica (Paulin); Ortača (Hohenwart S u. Reiner); Mittagskogl (Fr. Ressmann! 1880, Rotky); Harlouz (R. Graf!); Kreuzeralpe bei Neumarktl, 4600' (Janša! 1853. VIII. 23 fl.); Mittagskuppe, 5000' (Janša! 1850. VIII. 22. fl.).

Zug der Julischen Alpen: Kot bei Lengenfeld (Janša! 1850. VIII. 18. fl. Hb. R.); Peklo ober dem Kotthale (Paulin); auf Felsen am Wege von Belopolje unterm Triglav nach Trenta (Leodegar Derganc!); Tičerca-Thörl pri jezerih (Stur, Rechinger); Opočnica ober den Savicaseen (Val. Plemel); unterm Triglav (Deschmann! Hb. R.); Abanca-Thörl bei Konjšica-planina in der Triglaver Umgebung (Stur); Feistritz-Ursprung (Breindl! 1862. VIII. fl.); Lipanca (Val. Plemel); Škrbina (Kugy); Woheiner-Alpen (G. L. Mayr!); Črna prst, 1800 m (Freyer! König Friedrich August II. 1841. VII., Deschmann! Hb. R., Poech! 1842. VIII. fl., Graf, Rulitz!, Leodegar Derganc! Fl. exs. A.-H. Nr. 2999. II., Armič! Fl. exs. Carniol. Nr. 191. I.); Mangart (Solla); Rote Wand am Mangart, 6000' (R. Mirich! (Hb. R.); Krn (Deschmann! 1854 Hb. R.); Felsen des Poljethales unterm Krn (Tommasini); Fličer-Gebirge: Vratni vrh, Črnala Rombon (Stur); Kanin (Ball nach Nyman).

Raiblsee im Raiblerthal, 3400' (A. Breindl!, Reyer, J.! 1874. VII. fl., Jabornegg! 1875. VII. fl., Peter!); Raibler-Gebirge (Jabornegg); Wischberg bei Raiblsee, 5000—7000' (Huter! 1875. VII. 31. fl.); Gamswurzgraben hinter Raiblsee (Krenberger, J A.! 1868., Reyer! 1874. VII. fl., Zwanziger); Alpen zwischen Wolfsbach und Raibl (Marchesetti); Kastreinwand am Wischberg (Schunk); Seekopf (Josch); Zweispitz bei Malborghett (Ressmann! 1880); Kalkschutt der Seisera-Alm im Kanalthale (Jabornegg); Kanalthal (Ressmann!).

Im hiesigen k. k. botan. Hofmuseum liegt auch ein Exemplar der *C. Zoysii* aus Italien „e rupibus vallis Pantenae, prov. Veron. leg. Bracht 1842. VII. fl.", die der Sammler als *C. petraea* bestimmt hat. Es ist möglich, dass durch Versehen Bracht's oder der mit dem Aufkleben von Herbarpflanzen betrauten Organe eine Etiketten- und Pflanzenverwechslung stattgefunden hat.

In den Steineralpen trifft man in Gesellschaft unserer Glockenblume die ebenfalls Felsritzen bewohnenden *Potentilla Clusiana, Bupleurum petraeum, Saxifraga incrustata, S. squarrosa,* bisweilen auch *Gentiana acaulis* und *Leontopodium alpinum.*

Rubus villicaulis var. validus mh.

Von E. Holzfuss, Stettin.

Rubus villicaulis scheint in dem nördlichen Teil des Kreises Schlawe, dem Rügenwalder Amte, ganz zu fehlen, wenigstens ist es mir noch nicht gelungen, die Art in ihrer typischen Gestalt aufzufinden. Sie scheint aber vertreten zu sein durch eine recht stattliche Form, die ich als Varietät *validus* zu *villicaulis* stellte.

Herr Dr. W. O. Focke, dem ich für seine liebenswürdigen Mitteilungen auch an dieser Stelle herzlich danke, hielt diese Pflanze zuerst — infolge mangelhaften Materials — als zu *R. hypomalacus F.* gehörig. Nach Zusendung reichlich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 9_1903

Autor(en)/Author(s): Derganc Leodegar

Artikel/Article: Geographische Verbreitung der Campanula Zoysii Wulf. 26-27