

Geographische Verbreitung der *Gentiana Froelichii* Jan.

Von Leo Derganc (Wien).

Gentiana Froelichii ist im Gebiete der Samthaler- oder Steiner-Alpen der Karawanken ihrer Vorberge in Nord-Krain und der angrenzenden Gebirge des südlichsten Unter-Steiermark, sowie in Süd-Kärnten einheimisch und strahlt bis nach N.-O.-Venezien (Alpe Valmenon) aus. Sie bevorzugt kurzhegraste trockene Abhänge der Kalkalpen und tritt in einer Höhe von 900 bis über 2000 m ü. M. auf. Ihre Nomenklatur und die mir bekannten Standorte erhellen aus der nachfolgenden Aufzählung.

Gentiana Froelichii Jan. i. Rehb. Fl. Germ. excurs. Add. p. 865 (1832). —

Syn.: *G. alpina* Rehb. Fl. Germ. excurs. p. 427 (1831) non Vill. — *G. Carnica Welwitsch* ined. sec. Rehb. Fl. Germ. excurs. Add. p. 865 (1832). — *G. Hladnikiana Host* ined. sec. Koch Synops. Fl. Germ. et Helv. Ed. I. (1837) p. 488. — *G. angustifolia Sturm* Deutschl. Fl. t. 54 non Villars.

Cf. Kuznecow i. Act. Hort. Petrop. Tom. XV. fasc. 2. p. 289 (1898).

Exsicc.: Deschmann! ap. A. Kerner, Fl. exs. A.-Hung. No. 651 (1882). — Dörfler I! Herb. Norm. No. 3718. — Leo Derganc! V. Delect. pl. exsicc. Jurjev. (1902) p. 55.

Geographische Verbreitung: Italien (N.-O.-Venezien): Alpe Valmenon zwischen Val Zellina und Val Farno a. d. Grenze von Kärnten, 5000—7000' (Huter!); Friaul (Venzo).

Oesterreich: Karawanken: Korošica nächst Loibl (Janša! 1853. IX. 1. fl. Hb. R.); Baba (Jabornegg); Košuta (Durchner! 1847. VIII. 23. fl. Hb. R.); Košuta bei Neumarkt! (Janša! 1853. VIII. 25. fl. Hb. R.); Obir, 1920 m (Welwitsch, Josch, Jabornegg); Sedlo nächst Storžec, hfg. (Janša! 1853. VIII. 19. fl. Hb. R.); Storžec, 1800—2000 m (Freyer! Hb. R. Krašau!, Statzer!).

Srednji vrh bei Höflein, 1800 m (Deschmann! Hb. R. u. Fl. exs. A.-H. No. 651!); zwischen Zaplata und Dolga njiva ob Höflein, hfg. (Janša! H. R.).

Vellacher Alpen (Jabornegg): Goli vrh bei Vellacher Kočna (Graf).

Obere Seeländer Kočna i. d. Krummholzregion (Krašau! 1900).

Steiner Alpen: Na Podeh ober dem Kankerthale, hfg. (Potočnik! 1901 sec. Leo Derganc); Skuta (Kocbek); Brana, i. Gerölle des südseitigen Grabens, ca. 1400 m, selt. (ipse! 1893. VIII. 13. fl.); Kamniško sedlo, Gipfel u. Nordseite, 1860—1879 m (Deschmann! 1849. IX. fl. Hb. R., ipse 1893! 1901! VIII. 21. fl., Leodegar Derganc, 1894!, 1896!); Velika planjava, 1900—2200 m (Hladnik sec. Koch: ipse 1893!, 1901! VIII. 20. fl., Leodegar Derganc 1894!, 1896! Kocbek); Ojstrica, hfg. (Kocbek); Mokrica (Janša! Hb. R.); Okrešelj über der Okrešelj-hütte, 1450—1500 m (Krašau! 1894, Kocbek); Raduha ober dem Samthal, 2000—2065 m, selt. (Krašau! 1894. VIII. 9. fl., Kocbek!).

In den Steiner Alpen und auf der Alpe Valmenon in Venezien ist *Primula Wulfeniana Schott* eine beständige Begleiterin der *Gentiana Froelichii*.

Blütezeit: Mitte August bis September vereinzelt auch schon Ende Juli.

Volkname im Kankerthale: Cjan.

Schliesslich erfülle ich eine angenehme Pflicht, wenn ich Herrn Prof. A. Müller, Kustos des Krainer Landesmuseums Rudolphinum für die frdl. Ueberlassung des Landesherbarmaterials (Hb. R.), sowie den Herren Prof. Fr. Krašau u. Oberlehrer Kocbek für jenes ihrer Privatherbare verbindlich danke.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [9_1903](#)

Autor(en)/Author(s): Derganc Leodegar

Artikel/Article: [Geographische Verbreitung der Gentiana Froelichii Jan. 67](#)