

Birkhuhn: In der Wolkersdorfer Niederung traf ich 7 Hähne und 8 Hennen, ferner einen Hahn bei Patting am Seeufer. Ferner sah ich folgende Arten: Rabenkrähen, Stare, Grünlinge, Stieglitz, Buchfinken, Haus- und Feldspatzen, Goldammern, Feldlerchen, Bachstelzen, Kohl-, Blau-, Tannen- und Sumpfmeyen, Wintergoldhähnchen, Weiden- und Fitislaubvögel, Mistel- und Singdrosseln, Amsel, Hausrötel, Rotkehlchen, Rauchschwalbe, Grünspecht, Turmfalken, Mäusebussard, Ringel- und Hohltauben, Rebhühner und Fasane.

Grosse Rohrdommel am Maisinger See brütend.

Von **A. Kl. Müller**, München.

In der Lachmöwenkolonie des Maisinger Sees wurde am 12. Mai 1938 von Max und Rupert Wachter, Maising, ein Nest der Gr. R. mit 6 Eiern entdeckt und der brütende Vogel öfters auf dem Nest gesehen. Ende Mai wurde das Nest verlassen, weil es nach Aufhören der langen Trockenperiode unter Wasser geriet. R. Wachter entnahm etwa eine Woche später dem Nest zwei Eier, die sich als hochbebrütet erwiesen und sich jetzt in der Zoologischen Staatssammlung zu München befinden.

Materialien aus Oberbayern.

Von **G. Diesselhorst**, München.

1. **Ortolan.** Ein durchziehendes Exemplar am 7. V. 1938 an der Amper bei Emmering.

2. **Heidelerche.** Am Nordrand des Weidfilzes, dicht bei Seehaupt am Starnberger See hörte ich am 16. V. 1938 morgens eine Heidelerche singen. Im Frühjahr 1937 hatte ich in diesem Gelände mehrfach Heidelerchen gehört, leider ohne genauere Aufzeichnungen darüber zu machen. 1938 konnte ich die Art trotz mehrfachen Besuches der Gegend nur an dem einen Tage hören.

3. **Sommergoldhähnchen.** Am 30. V. 1937 fand ich ein Nest mit sieben Eiern nur mannhoch am Rande einer Fichtenschonung zwischen Pöcking und Maisinger See.

4. **Rotkopfwürger.** Mitte Mai 1935 ein Männchen in den Obstbäumen bei Postschwaige im Erdinger Moos, welches später dort nicht mehr gesehen wurde. Am 29. IV. 1938 ein Paar im Randgelände der Isarauen bei Hallbergmoos. Auch dieses Paar wurde später nicht mehr angetroffen. Da die Würger normalerweise einzeln ziehen, und das ♂ einige Tage vor dem ♀ am Brutplatz erscheint, dürfte dieses Paar zum mindesten nicht allzu weit vom Brutplatz entfernt gewesen sein.

5. **Wiedehopf.** Seehaupt. 15. IV. 1938 ein Durchzügler am nördlichen Weidfilzrand. Am 31. VIII. hielt sich ein durchziehender Wiedehopf in dem kleinen Grasgarten des Münchner zoologischen Instituts auf. Bei längerem Regen setzte er sich auf ein Sims unter dem Dach

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [3_3](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Adolf Klaus

Artikel/Article: [Grosse Rohrdommel am Maisinger See brütend 97](#)