Register

Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern und Ornithologischer Anzeiger (1919 bis 2000)

Vorbemerkung

Zügig nach dem kompletten Inhaltsverzeichnis der "Orn. Verhandlungen" (s. Beilage Bd. 25, 1998) erscheint das Autorenregister des "Anzeigers" zum Abschluss des vorigen Jahrhunderts. Über die Einführung dieser unserer bleibenden Zeitschrift vgl. R. PFEIFER (1997): C. E. Hellmayr (1878-1944) – der Begründer des "Anzeigers" (Orn. Anz. **36**: 203-206), über die Geschichte mit Faksimile-Abdruck der 1. Seite vom 25. Februar 1919 vgl. E. FRANCK (1987): Die Schriften der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. (eine Übersicht). (Anz. Orn. Ges. Bayern **26**: 150-155). Von 1942-1950 erschienen kriegsbedingt keine Hefte.

Zur Benutzung: Das Inhaltsverzeichnis ist nach Autoren sortiert. Aufgeführt werden nur Originalarbeiten, jedoch nicht Entgegnungen oder Nachrufe. Koautoren werden mit Jahreszahl zum Erstautor verwiesen. Der Index der wissenschaftlichen Vogelnamen wird hier nicht aufgeführt, da meist am Ende eines Bandes komplettiert. Ältere Hefte können von der Bibliothek der Zoologischen Staatssammlung München verbilligt bezogen werden. Dieses Register schließt mit Heft 2/3, 2000.

- Abs, M. s. Galhoff, H. (1984)
- Albert, P. (1977): Schlangenadler *Circaetus gallicus* zur Brutzeit im Murnauer Moos in Bayern. **16**: 90
- Alkemeier, F. & Burger, H. (1987): Eine Gebäudebrut beim Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*. **26**: 265
- Alkemeier, F., Reiner, K., Stäbler, K. & H. (1987): Zwei Triele in Mittelfranken. **26**: 137
- Alkemeier, F. & Sombrutzki, A. (1988): Zwergschnäpper *Ficedula parva* im Altmühltal. **27**: 130-131
- Alkemeier, F. s. Dornberger, W. (1986)
- Alkemeier, F. s. Franz, D. (1987)
- Alkemeier, F. s. Ranftl, H. (1988)
- Altner, H. & Reger, K. (1959): Ornithologische Frühjahrsbeobachtungen auf Kreta. **5**: 224-234
- Altrichter, K. (1974): Invasion des Birkenzeisigs *Carduelis flammea* 1972/73 in Südbayern. **13**: 231-239
- Ammermann, D. (1975): Beginn und Ende der Tagesaktivität von Zaunkönigen, *Troglodytes troglodytes*, beobachtet an einem Gemeinschaftsschlafplatz. **14**: 296-299
- Anderle, G. & Anderle, L. (1994): Kein Bruterfolg der Lachmöwe *Larus ridibundus* im Jahr 1993 an der Neuen-Ammer-Mündung. **33**: 75-76
- Andrä, E. (1999): Mischgesang eines Buchfinken *Fringilla coelebs* in Bad Aibling, Oberbayern. **38**: 199-201
- Andris, K. (1974): Mittelmeersteinschmätzer *Oenanthe hispanica* bei Freiburg. **13**: 95
- Anka, K. & Hölzinger, J. (1965): Durchzug und erfolgreiche Brut des Rotfußfalken (*Falco vespertinus* L.) 1964 im Ulmer Raum. **7**: 325-332
- Anthes, N. (1999): Schlafplatzbesetzung der Rabenkrähe *Corvus corone corone* im Landkreis Ludwigsburg. **38**: 31-140
- Auber, L. (1934): Der Rassenkreis *Chalcopsittacus duivenbodei* Dubois. **2**: 313-315
- Bacmeister, W. (1928): Einiges über den Austernfischer. **1**: 147-150
- Bährmann, U. (1960): Wie verhalten sich die mitteldeutschen Krähenmischlinge in der Größe zu ihren Ausgangsrassen, den Raben- und Nebelkrähen? **5**: 510-513

- Bährmann, U. (1960): Untersuchungen über das Körpergewicht von einer Anzahl Saatkrähen aus einer mitteldeutschen Winterpopulation. **5**: 573-577
- Baier, E. (1979): Zum Ankoten von Greifvögeln durch Wacholderdrosseln. **18**: 81
- Bairlein, F. (1975): Bemerkenswerte Beobachtungen zur Ernährung von Graureiher *Ardea cinerea*, Bläßhuhn *Fulica atra* und Haussperling *Passer domesticus*. **14**: 209-210
- Bairlein, F. (1975): Zu: Kohl- und Blaumeise *Parus major* und *P. caeruleus* fressen milchreife Maiskörner. **14**: 209
- Bandorf, H. (1960): Das Vorkommen der See- und Lappentaucher in Unterfranken. **5**: 557-572
- Bandorf, H. s. Ranftl, H. (1976)
- Banse, G. (1978): Vergleichende Vogelbestandsaufnahme im "Torfeinfang" bei München. **17**: 239-246
- Bär, U. & Jochums, F. (1993): Brutbestand und Bruterfolg der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für die Jahre 1988-1992. **32**: 45-58
- Bär, U. & Jochums, F. (1993): Erfolgreiche Brut der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* 1992 am Starnberger See. **32**: 75-76
- Bär, U. & Jochums, F. (1994): Übersommern eines Ohrentauchers *Podiceps auritus* 1993 am Starnberger See. **33**: 75
- Bär, U. & Jochums, F. (1995): Ethologische Beobachtungen an Flußseeschwalben *Sterna hirundo* in der Bucht von St. Heinrich/Starnberger See. **34**: 168-171
- Bär, U. & Jochums, F. (1995): Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* füttert fremde Brut. **34**: 69-70
- Bär, U. & Jochums, F. (1995): Übersommernde, mausernde Eiderenten *Somateria mollissima* in Bayern mit Anmerkungen zur Dreikantmuschel *Dreissena polymorpha*. **34**: 159-162
- Bär, U. & Jochums, F. (1997): Zur Situation der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* in Bayern 1992 bis 1996. **36**: 177-184
- Bär, U. & Jochums, F. (1998): Weitere Brutzeitbeobachtungen an Flußseeschwalben *Sterna hirundo* in der Bucht von St. Heinrich/Starnberger See. **37**: 55-60
- Bär, U., Müller, A. & F. Jochums (1993): Weitere Nachweise des Eistauchers *Gavia immer* vom Starnberger See. **32**: 162-163
- Bär, U. s. Jochums, F. (1993a,b)
- Bär, U. s. Jochums, F. (1996)
- Barnickel, W. & Trommer, G. (1984): Erste nachgewiesene Gebäudebrut des Uhus *Bubo bubo* in Bayern. **23**: 243-245
- Bastian, H.-V. (1993): Die Brutvogelfauna einer Feuchtwiese im Haidenaabtal (Oberpfalz): Bedeutung, Gefährdungen, Schutzforderungen. **32**: 23-36
- Bauer, H.-G. & Ranftl, H. (1996): Die Nutzung "überwinternder" Stoppelbrachen durch Vögel. **35**: 127-144
- Bauer, U. (1986): Brutnachweis des Birkenzeisigs *Acanthis flammea* in Augsburg. **25**: 96-97
- Bauer, U. (1989): Brutvorkommen des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* am mittleren Lech zwischen Augsburg und Landsberg. **28**: 15-24
- Bauer, U. (1991): Langjährige Bestandserfassung des Zwergtauchers *Tachybaptus ruficollis* im Landkreis Augsburg. **30**: 27-32
- Bauer, U. (1991): Brutvorkommen der Hohltaupe *Columba oenas* im Raum Augsburg. **30**: 33-40
- Bauer, U. (1991): Brut des Steinkauzes *Athene noctua* im Landkreis Augsburg. **30**: 87-88
- Bauer, U. (1993): Erstansiedlung der Schellente *Bucephala clangula* am Lech. **32**: 65-67
- Bauer, U. (1996): Brutvorkommen und Habitansprüche des Zwergtauchers *Tachybaptus ruficollis* im Landkreis Augsburg. **35**: 113-126
- Bauer, U. & Zintl, H. (1974): Brutvorkommen und Brutbiologie des Gänsejägers *Mergus merganser* in Bayern. **13**: 71-86
- Bauer, U. & Zintl, H. (1995): Brutbiologie und Entwicklung der Brutpopulation des Gänsejägers *Mergus merganser* in Bayern seit 1970. **34**: 1-38
- Beck, P. (1978): Ein weiteres Vorkommen der Zippammer *Emberiza cia* in Unterfranken. **17**: 185-186
- Becker, P. (1975): Frühbeobachtung von Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus* am Bodensee. **14**: 92
- Becker, P. (1977): Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus* überwintert bei Radolfzell am Bodensee. **16**: 200
- Behmann, H. (1964): Ornithologische Beobachtungen aus dem südlichen Allgäu. **7**: 153-173
- Beier, J. (1968): Lachmöwenverluste 1967 im fränkischen Weihergebiet. **8**: 402
- Beierkuhnlein, C. s. Heßberg, A. von (2000)

- Beigel, H. s. Klein, H. (1991)
- Beissmann, W. (1984): Durchzug und Überwinterung des Zwergtauchers *Tachybaptus ruficollis* im Brenztal 1978/79. **23**: 57-64
- Bell, K. P. (1958): Rothalsgänse (*Branta ruficollis* Pallas) in Franken. **5**: 35-36
- Bell, K. P. (1963): Beobachtung eines Tafel- × Moorentenbastardes (*Aythya ferina* × *nyroca*) bei Bamberg. **6**: 565
- Bell, K. P. (1980): Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* erstmals Brutvogel in Bayern. **19**: 179-181
- Bell, K. P. (1984): Erneuter Brutversuch der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* in Franken. **23**: 234-235
- Bell, K. P. (1989): Erfolgreiche Zweitbrut beim Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*. **28**: 69-70
- Belting, H. s. Helbig, A. (1986)
- Berck, K.-H. & Berck, U. (1976): Brutvorkommen der Zippammer *Emberiza cia* in Unterfranken. **15**: 95-96
- Berg-Schlosser, G. (1966): Das Birkhuhn *Lyrurus tetrix* L. in der Rhön. **7**: 671-674
- Berg-Schlosser, G. (1975): Ökologie und Siedlungsdichte der Brutvögel des Schwarzen Moores in der Rhön (Brutperiode 1971-1973). **14**: 273-295
- Berg-Schlosser, G. (1979): Beobachtungen zur Rastplatzökologie und Rastplatzverhalten westpaläarktischer Drosseln zu beiden Zugzeiten. **18**: 23-35
- Berg-Schlosser, G. (1981): Die Brutvögel der südlichen Reschenregion, Südtirol, Italien. **20**: 45-63
- Berg-Schlosser, G. (1983): Flugkarussell als kollektives und aggressives Abwehrverhalten von Lachmöwen *Larus ridibundus* gegenüber Großfalken. **22**: 113-115
- Berndt, R. (1958): Die Weidenmeise (*Parus atricapillus*) als Brutvogel in trockenster Kiefernheide. **5**: 108-113
- Bernecker, A. (1969): Beobachtungen von albinotischen Individuen der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) und des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*). **8**: 510
- Bernecker, A. (1969): Verhalten junggefütternder Mauersegler (*Apus apus*) gegenüber Störungen. **8**: 510-511
- Bernecker, A. (1976): Ein albinotischer Zwergtaucher *Podiceps ruficollis* am Ammersee. **15**: 225-226
- Bernecker, A. (1983): Beobachtung einer ad. Schwalbenmöwe *Larus sabini* auf dem Herbstzug in Oberbayern. **22**: 116-118
- Bernecker, A., Hörl, H. & H. Schmidt (1979): Teilalbinotische Rohrammer *Emberiza schoeniclus* am Ammersee. **18**: 198
- Berthold, P., Ertel, R., Hölzinger, J., Kalchreuter, H. & K. Ruge (1974): Die in Baden-Württemberg gefährdeten Vogelarten – "Rote Liste" (Stand 31.12.1973). **13**: 87-94
- Besserer, L. von (1936): Gelegenheitsbeobachtungen aus dem Gebiet der Osterseen. **2**: 377-380
- Besserer, L. von (1937): Beobachtungen aus dem Osterseegebiet im Sommer 1936. **2**: 389-392
- Besserer, L. von (1940): Nimmt der Kolkkrabe in den bayerischen Bergen zu? **3**: 93-95
- Bethge, E. & Hayo, L. (1979): Untersuchungen an einer Population der Schleiereule *Tyto alba* in einem ländlichen Bezirk des westlichen Saarlands. **18**: 161-170
- Bezzel, E. (1954): Ornithologische Beobachtungen an den Baggerseen bei München-Feldmoching. **4**: 149-155
- Bezzel, E. (1955): Biologische Beobachtungen über die Tafelente (*Aythya ferina*) im Ismaninger Teichgebiet. **4**: 274-297
- Bezzel, E. (1956): Über den Vogelzug im Frühjahr auf Sardinien. **4**: 401-412
- Bezzel, E. (1957): Der Brachpieper, *Anthus c. campestris* L., in Oberbayern. **4**: 538-539
- Bezzel, E. (1957): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Sardinien. **4**: 589-707
- Bezzel, E. (1959): Beiträge zur Biologie der Geschlechter bei Entenvögeln. **5**: 269-355
- Bezzel, E. (1961): Gründel- und Tauchenten als Wintergäste in Südbayern. **6**: 21-41
- Bezzel, E. (1962): Beobachtungen über Legebeginn und Legezeit bei Entenpopulationen. **6**: 218-233
- Bezzel, E. (1962): Ornithologische Beobachtungen aus Griechenland. **6**: 273-279
- Bezzel, E. (1962): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern. **6**: 389-398
- Bezzel, E. (1962): Ein bemerkenswerter Nistplatz des Grünlings (*Chloris chloris*). **6**: 403
- Bezzel, E. (1963): Tafelente (*Aythya ferina*), Reiherente (*Aythya fuligula*) und Schnatterente (*Anas strepera*) als Brutvögel Südbayerns. **6**: 443-453

- Bezzel, E. (1963): Der Durchzug des Schilfrohrsängers (*Acrocephalus schoenobaenus*) bei München nach Fangergebnissen. **6**: 459-462
- Bezzel, E. (1963): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern - Nachträge und Berichtigungen. **6**: 551-556
- Bezzel, E. (1963): Bemerkungen zum Vorkommen wildlebender Tauchentenbastarde (*Aythya*). **6**: 566-567
- Bezzel, E. (1964): Zur Ökologie und Brutmauser bei Enten. **7**: 43-79
- Bezzel, E. (1964): Ornithologische Sommerbeobachtungen aus Kleinasien. **7**: 106-120
- Bezzel, E. (1964): Zum Frühjahrszug der Knäkente und Löffelente (*Anas querquedula* und *A. clypeata*) in Südbayern. **7**: 145-152
- Bezzel, E. (1965): Zum Brutbestand von Lappentauchern und Enten in Südbayern. **7**: 249-272
- Bezzel, E. (1965): Bemerkungen zum Zeitpunkt des Flügge werdens junger Tauchenten. **7**: 338-339
- Bezzel, E. (1965): Zum Brutvorkommen des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) im Bayerischen Wald und Böhmerwald. **7**: 344-346
- Bezzel, E. (1966): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 1965/66 in Bayern. **7**: 847-854
- Bezzel, E. (1967): Versuch einer Bestandsaufnahme und Darstellung der Arealveränderungen der Tafelente (*Aythya ferina*) in einigen Teilen Europas. **8**: 13-44
- Bezzel, E. (1967): Der Winterbestand an Wasservögeln in Bayern 1966/67. **8**: 129-133
- Bezzel, E. (1967): Einige Notizen über den Mauerläufer (*Tichodroma muraria*) in den Bayerischen Alpen. **8**: 172-174
- Bezzel, E. (1967): Über Gelegegröße und Legebeginn beim Bläßhuhn (*Fulica atra*) in Oberbayern. **8**: 183-185
- Bezzel, E. (1968): Neue Beobachtungen zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers in Südbayern. **8**: 365-368
- Bezzel, E. (1969): Die Bedeutung der Gewässer Bayerns als Durchzugs- und Rastbiotope für Schwimmvögel. **8**: 556-577
- Bezzel, E. (1970): Durchzug und Überwinterung des Bleißhuhns (*Fulica atra*) in Bayern. **9**: 202-207
- Bezzel, E. (1970): Sammelbericht zur Brutverbreitung einiger Vogelarten in Südbayern. **9**: 226-234
- Bezzel, E. (1971): Grobe Analyse der Verbreitung einiger Brutvögel in den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland. **10**: 7-37
- Bezzel, E. (1972): Einige Daten zur Ernährung oberbayerischer Waldohreulen (*Asio otus*). **11**: 181-184
- Bezzel, E. (1972): Frühbrut der Wasserramsel (*Cinclus cinclus*). **11**: 210
- Bezzel, E. (1972): Ergebnisse der Schwimmvogelzählungen in Bayern von 1966/67 bis 1971/72. **11**: 221-247
- Bezzel, E. (1974): Zur Verbreitung und Biotopwahl des Alpenbirkenzeisigs *Carduelis flammea cabaret* am deutschen Nordalpenrand. **13**: 157-170
- Bezzel, E. (1974): Untersuchungen zur Siedlungsdichte von Sommervögeln in Talböden der Bayerischen Alpen und Versuch ihrer Interpretation. **13**: 259-279
- Bezzel, E. (1980): Die Brutvögel Bayerns und ihre Biotope: Versuch der Bewertung ihrer Situation als Grundlage für Planungs- und Schutzmaßnahmen. **19**: 133-169
- Bezzel, E. (1987): Der Wegzug des Waldlaubsängers *Phylloscopus sibilatrix* in Südbayern. **26**: 133-135
- Bezzel, E. (1995): "Regelmäßige" und "unregelmäßige" Brutvögel: Zeitmuster in Brutvogelgesellschaften. **34**: 103-113
- Bezzel, E. (1998): Altitudinalgrenze des Höcker Schwans *Cygnus olor* und Gewässereutrophierung: Eine langfristige Fallstudie am Nordalpenrand. **37**: 149-156
- Bezzel, E. & Brandl, R. (1988): Der Zitronengirlitz *Serinus citrinella* im Werdenfeller Land, Oberbayern. **27**: 45-65
- Bezzel, E. & Engler, U. (1985): Rastbestände von Schwimmvögeln in Südbayern (Enten, Bläßhuhn). **24**: 39-58
- Bezzel, E. & Geiersberger, I. (1998): Wasservogeljagd am Staffelsee: Fallbeispiel für die Störwirkung verschiedener Jagdmethoden. **37**: 61-68
- Bezzel, E. & Hölzinger, J. (1969): Untersuchungen zur Nahrung des Rotfußfalcons (*Falco vespertinus*) bei Ulm. **8**: 446-451
- Bezzel, E., Koller, J. & Bucher, K. (1966): Kurze quantitative Beiträge zur Avifauna der Stadt München. **7**: 605-609

- Bezzel, E., Krauß, W. & Vidal, A. (1970): Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) als Brutvogel in Bayern. **9**: 27-46
- Bezzel, E. & Krosigk, E. von (1966): Versuch einer quantitativen Erfassung des Winterbestandes einiger Wasservögel in Südbayern. **7**: 675-680
- Bezzel, E. & Löhr, H. (1972): Blauschwanz (*Tarsiger cyanurus*) in Bayern gefangen. **11**: 282-287
- Bezzel, E. & Müller, G. (1964): Einige Notizen zum Herbstzug in Nordgriechenland. **7**: 190-196
- Bezzel, E. & Ranftl, H. (1996): Abhängigkeit der Artenvielfalt von Land- und Forstwirtschaft: eine Statusübersicht am Beispiel der Vögel Bayerns. **35**: 49-74
- Bezzel, E., Rust, R. & Kechele, W. (1997): Nahrungswahl südbayerischer Habichte *Accipiter gentilis* während der Brutzeit. **36**: 19-30
- Bezzel, E. & Schwarzenbach, F. (1968): Zur Variation der Eidimensionen bei Enten und ihrer biometrischen Auswertung. **8**: 235-254
- Bezzel, E. & Stiel, K. (1977): Zur Biologie des Braunkehlchens *Saxicola rubetra* in den Bayerischen Alpen. **16**: 1-9
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1963): Die zweite Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. **6**: 513-524
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1964): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (1). **7**: 124-131
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1964): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (2). **7**: 205-213
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1965): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (3). **7**: 347-355
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1965): Vergleichende Planbeobachtungen zum Durchzug der Watvögel (Limicolae) im Ismaninger Teichgebiet bei München. **7**: 429-474
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1965): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (4). **7**: 495-506
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1966): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (5). **7**: 616-632
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1966): Vergleichende Planbeobachtungen zum Durchzug der Watvögel (Limicolae) im Ismaninger Teichgebiet bei München. II. Teil. **7**: 771-822
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1966): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (6). **7**: 872-879
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1967): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (7). **8**: 73-85
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1967): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (8). **8**: 186-200
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1968): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (9). **8**: 299-307
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1968): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (10). **8**: 405-417
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1969): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (11). **8**: 518-530
- Bezzel, E. & Wüst, W. (1969): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (12). **8**: 634-637
- Bezzel, E. s. Hölzinger, J. (1966)
- Bibra, F. von (1941): Der Hausstorch in Franken. **3**: 141-145
- Biebach, H. (1966): Frühe Brut des Waldkauzes (*Strix aluco*) in München. **7**: 610
- Biebach, H. & Lohmann, M. (1965): Chiemseebericht für die Jahre 1961-1964. **7**: 314-324
- Bindl, W., Faas, M. & C. Schulze (1990): Weiterer Nachweis der Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla* für Bayern. **29**: 63-81
- Blaszyk, P. (1965): Birkenzeisig (*Carduelis flammula*) Brutvogel im Bayerischen Wald. **7**: 343-344
- Blessing, J. s. Randler, C. (1999)
- Blum, V. s. Schuster, S. (1972)
- Bodenstein, G. (1965): Die dritte Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. **7**: 299-306
- Bodenstein, G. & Kroymann, B. (1967): Die Ergebnisse der Mazedonien-Exkursion der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern im Mai/Juni 1966. **8**: 134-157
- Boetticher, H. von (1926): Gedanken über Formenkreise, ihren Umfang und ihre Begrenzung. **1**: 93-94
- Boetticher, H. von (1926): Zwei seltene Irrgäste im Coburger Land [Hakengimpel, Zitronenzeisig]. **1**: 96-97
- Boetticher, H. von (1926): Eine eigenartige Ruhestellung einer Nebelkrähe in der Voliere. **1**: 97-98
- Boetticher, H. von (1927): Bulgarische Repphühner. **1**: 105-106
- Boetticher, H. von (1927): Über die Notwendigkeit der Beibehaltung des Untergattungs-Begriffes. **1**: 106-108
- Boetticher, H. von (1927): Der Star von Sophia. **1**: 108-110
- Boetticher, H. von (1927): Neuer Name für die Gattung: Wanderfalke. **1**: 111-112

- Boetticher, H. von (1927): Fringilliden-Leben auf dem Coburger Glockenberg. 1: 122-123
- Boetticher, H. von (1927): Frühzeitiges Eintreffen der Bergfinken (*Fringilla montifringilla* L.). 1: 123
- Boetticher, H. von (1928): Zur Synonymik der Balkanlachtaube (*Streptopelia d. decaocto* (Friv.)). 1: 132-134
- Boetticher, H. von (1929): Artenkreise und Untergattungen. 2: 6-7
- Boetticher, H. von (1929): Bemerkungen über die Gattungen der Albatrosse. 2: 8-10
- Boetticher, H. von (1929): Kritische Betrachtungen über Anatiden. 2: 10-15
- Boetticher, H. von (1929): Zur Systematik der Kakadus. 2: 15-16
- Boetticher, H. von (1929): Ornithobiologische Beobachtungen in Coburg (Bayern). 2: 36-44
- Boetticher, H. von (1930): Bemerkungen über die Abgrenzung der Rassenkreise. 2: 50-55
- Boetticher, H. von (1930): Über die Hornstifchen an den Zehen des Auer- und Birkhuhnes. 2: 83-87
- Boetticher, H. von (1930): Versuch einer natürlichen Klassifikation der Entenvögel. 2: 94-100
- Boetticher, H. von (1930): Interessante Schwalbennester. 2: 117-118
- Boetticher, H. von (1931): Ist *Heteropsar acuticaudus* (Boc.) eine Rasse von *Lamprocolius chloropterus* (Swains.)? 2: 138-140
- Boetticher, H. von (1932): Kleinschmidt's Formenkreisbegriff und der Begriff von Rasse, Art und Gattung im modernen System. 2: 158-162
- Boetticher, H. von (1935): Gedanken über zwei Eulen-"Mohren" im Coburger naturwissenschaftlichen Museum. 2: 356-360
- Boetticher, H. von (1937): Die systematische Stellung einiger Entenformen. 2: 406-408
- Boetticher, H. von (1938): Wieder ein Polarseetaucher in Coburg. 3: 29
- Boetticher, H. von (1940): Die Glanzstare Afrikas. 3: 86-91
- Boetticher, H. von (1941): Bemerkungen zur Gattungs-Systematik der Weber (Fam.: Passeridae; Subfam.: Ploceinae). 3: 126-130
- Boetticher, H. von (1941): Das Kichern (Lachen) der Balkanlachtaube (Tempel- oder Türkentaube) *Streptopelia d. decaocto* Friv.). 3: 130
- Boetticher, H. von (1941): Nomenklatorische Berichtigungen. 3: 157
- Boetticher, H. von (1951): Zur Klassifikation der Stahl- oder Atlasvögel, *Hypochaera*, BP. 4: 16-22
- Boetticher, H. von (1953): Die Inselenten. 4: 62-64
- Boetticher, H. von (1953): Die Türken- oder Tempeltaube, *Streptopelia d. decaocto* Friv. nunmehr auch in Coburg. 4: 78
- Boetticher, H. von (1953): Neuere Literatur über die Vogelwelt des Balkans. 4: 78-80
- Boetticher, H. von (1954): Zur Familiensystematik der Singvögel (Oscines). 4: 138-143
- Boetticher, H. von (1954): Der gelbschnäbelige Eis-Seetaucher. Nomenklatur und Systematik. 4: 170-171
- Boetticher, H. von (1955): Der Blaufuß-Töpel "Camany", *Sula nebouxii* Milne-Edwards. 4: 375
- Boetticher, H. von (1957): Die Waldfrankoline Afrikas. 4: 570-572
- Boetticher, H. von (1957): Zur Frage der Herkunft von *Xiphocolaptes fortis* Heine. 4: 711-712
- Boetticher, H. von (1958): Der Name der nordrussischen Sturmmöwe. 5: 31-32
- Bogdanowicz, H. (1940): Ein Osterbesuch am Tachinger und Waginger See. 3: 95-97
- Bokranz, W. (1999): Jagdstrategien und Beutespektrum des Kormorans *Phalacrocorax carbo* am Unteren Niederrhein. 38: 131-147
- Bönisch, R. (1992): Teilübersommerung eines Singschwans *Cygnus cygnus* in der nördlichen Oberpfalz. 31: 72-73
- Bönisch, R., Leibl, F. & E. Möhrlein (1991): Der Waldwasserläufer *Tringa ochropus* als Brutvogel in der Oberpfalz. 30: 11-20
- Bönisch, R. & Möhrlein, E. (1993): Späte Brut des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* in der nördlichen Oberpfalz. 32: 74
- Bosch, J. (1984): Bestandsaufnahme einer Population des Neuntöters *Lanius collurio* in Unterfranken. 23: 215-224
- Bosch, J. & Laubender, H. (1978): Vorkommen des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* in Unterfranken. 17: 63-77
- Bosch, S. (1995): Brutergebnisse beim Buntspecht (*Dendrocopos major*) während und nach einer Gradation des Schwammspinners (*Lymantria dispar*) am Heuchelberg. 34: 151-154
- Brandl, R. & Schmidtke, K. (1979): Über die Beziehung zwischen Lachmöwe *Larus ridibundus* und Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* im Rußweihergebiet. 18: 185-187

- Brandl, R. & Schmidtke, K. (1980): Struktur der Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei Eschenbach/ Opf. **19**: 47-56
- Brandl, R. & Walberer, E. (1982): Zur ornithologischen Bedeutung von Brachflächen. **21**: 21-41
- Brandl, R. s. Bezzel, E. (1988)
- Brandl, R. s. Mann, W. (1987)
- Brandl, R. s. Mann, W. (1987)
- Brandl, R. s. Pfeifer, R. (1990)
- Brandl, R. s. Pfeifer, R. (1991)
- Brandl, R. s. Pfeifer, R. (1997)
- Brandl, R. s. Stickroth, H. (1991)
- Brandt, H. (1960): Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.), in Garmisch-Partenkirchen. **5**: 514
- Brandt, H. (1960): Beobachtungen bei der Beringung von Zitronenzeisigen (*Carduelis citrinella* Pall.). **5**: 597-598
- Brandt, H. (1962): Nestverlegung durch Stieglitz und Gelbspötter. **6**: 401-402
- Brandt, H. (1963): Felsenschwalben (*Ptyonoprogne rupestris*) brüten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. **6**: 546-550
- Brandt, H. (1963): Seetaucher als Wintergäste in Garmisch-Partenkirchen und im Alpenvorland. **6**: 573
- Brandt, H. (1964): Kurzzeihenlerche, *Calandrella brachydactyla* (Leisler), bei Garmisch-Partenkirchen. **7**: 203-204
- Brandt, H. & Koenig, C. (1961): Die Vogelwelt einer oberbayerischen, landwirtschaftlich genutzten Gemarkung. **6**: 162-165
- Brandt, H. & Lechner, F. (1963): Durchzug seltener Ammern in Garmisch-Partenkirchen. **6**: 474-475
- Brandt, H. & Lechner, F. (1963): Bemerkenswerte Kolkrabenansammlungen. **6**: 475-476
- Braun, J. (1922): Weidenmeisen (*Parus atric. salicarius* Brehm) im nördlichen Schwaben. **1**: 57
- Braun, K. (1986): Beutelmeisen *Remiz pendulinus* auf dem Durchzug in Stuttgart. **25**: 105
- Braun, K. (1986): Winterbeobachtungen eines Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros*. **25**: 105
- Breuer, R. (1959): Beobachtungen während des Herbstzuges auf Langeoog. **5**: 219-223
- Brummer, C., Grossmann, T. & Trellinger, K. (2000): Überwinterung eines Rotschenkels *Tringa totanus* am Echinger Stausee. **39**: 238-239
- Brünner, K. & Reger, P. (1976): Brutbiologie und Bestandsentwicklung des Sperbers *Accipiter nisus* in Franken. **15**: 48-64
- Brünner, K. (1973): Bestandsschwankungen des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*) bei Biotopveränderungen. **12**: 141-142
- Brünner, K. (1978): Zweijährige Untersuchungen an einer Population des Ziegenmelkers *Caprimulgus europaeus* in Mittelfranken. **17**: 281-291
- Bruns, H. (1959): Beiträge zur Avifauna Unterfrankens. **5**: 181-196
- Bub, H. (1965): Zur Berghänfling-Forschung in Mitteleuropa: Erste Ringfunde auch in Bayern. **7**: 489-491
- Bub, H. (1970): Zum Gefieder einer einjährigen Lachmöwe (*Larus ridibundus*). **9**: 76-78
- Bub, H. (1970): Über mißgebildete Läufe und Füße bei frischgeschlüpften Kiebitzen (*Vanelus vanellus*). **9**: 78-80
- Bub, H. (1980): Beeren des Seidelbast *Daphne spec.* als Vogelnahrung. **19**: 118
- Bucher, K. (1971): Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Oberbayern 1968-1970. **10**: 97-99
- Bucher, K. s. Bezzel, E. (1966)
- Buck, K. & Schilhansl, K. (1977): Ein ungewöhnlicher Brutplatz der Knäkente *Anas querquedula* im Ulmer Raum. **16**: 205
- Budde, C. (1992): Bruterfolg und Jungenverluste der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* auf einem Nistfloß. **31**: 151-157
- Burger, H. s. Alkemeier, F. (1987)
- Clemens, T. (1978): Der Verlauf eines Nacht- und Beginn des Tagzuges auf Helgoland nach Radar-, optischer und akustischer Beobachtung. **17**: 267-279
- Comtesse, H. & Pflüger, H.-J. (1976): Ungewöhnliches Futtersuchverhalten bei Kohlmeisen *Parus major*. **15**: 223-224
- Conrads, K. (1988): Dialektartige Besonderheiten im Gesang des Rotkehlchens *Erithacus rubecula* im Bayerischen Wald. **27**: 67-75
- Conradty, P. & Hohlt, G. (1967): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands II. **8**: 45-51
- Conradty, P. (1979): Ein weiterer Brutnachweis des Häherkuckucks *Clamator glandarius* in Griechenland. **18**: 192

- Conradty, P. s. Kraus, M. (1965)
- Corti, U. (1954): Notizen zur Biotopologie und Systematik der Vögel. **4**: 183-188
- Corti, U. (1957): Zum Vorkommen von "Alpenvögeln" im schweizerischen Mittelland und Jura. **4**: 521-528
- Corti, U. (1958): Zum Vorkommen des Bartgeiers, *Gypaetus barbatus aureus* (Hablizl) in den französischen und italienischen Alpen. **5**: 27-30
- Corti, U. (1966): Über Tagesaktivität und Jahresrhythmus im Leben der Kohlmeise, *Parus major* L. **7**: 681-686
- Curio, E. (2000): Tier-Pflanze-Beziehungen: Frugivorie philippinischer Vögel. **39**: 81-85
- d'Oleire-Oltmanns, W. (1987): Prachtttaucher *Gavia arctica* verunglückt im Nationalpark Berchtesgaden aufgefunden. **26**: 275-276
- Dallmann, M. (1977): Alter und Ortstreue beim Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*. **16**: 202-203
- Dallmann, M. (1977): Beobachtungen zur Brutbiologie des Zaunkönigs *Troglodytes troglodytes*. **16**: 153-170
- Dathe, H. (1937): Ornithologische Notizen vom Bodensee und Allgäu. **2**: 435-445
- Dathe, H. (1966): Der Sanderling, *Calidris alba* (Pall.), in Sachsen. **7**: 687-696
- Deutsch, M. (1985): Maskenstelze *Motacilla flava feldegg* am Chiemsee. **24**: 186
- Deutsch, M. (1989): Beobachtung eines Schmutzgeiers *Neophron percnopterus* im Raum Tittmoning. **28**: 145
- Deutsch, M. (1989): Schwarzstirnwürger *Lanius minor* bei Pietling/Tittmoning. **28**: 145
- Deutsch-Reitinger, M. (1992): Rötelschwalbe *Hirundo daurica rufula* an der Salzach. **31**: 178
- Diemer, R. (1984): Bisher nördlichster Nachweis vom Nisten der Beutelmeise *Remiz pendulinus* in Bayern. **23**: 105-106
- Diemer, R. (1985): Rauhfußkauz *Aegolius funereus* von Kleiber *Sitta europaea* in Bruthöhle eingemauert. **24**: 81
- Diemer, R. (1985): Verunglückter junger Schwarzstorch *Ciconia nigra* im nördlichsten Unterfranken. **24**: 81-82
- Diesener, R. (1984): Zilpzalp *Phylloscopus collybita* im Januar in München. **23**: 106
- Diesselhorst, G. & Laubmann, A. (1940): "Das Ampermoos und seine Vogelwelt" Erster Nachtrag für die Jahre 1938 und 1939. **3**: 78-86
- Diesselhorst, G. (1940): Materialien aus den bayrischen Alpen. **3**: 75-78
- Diesselhorst, G. (1940): Das Ampermoos und seine Vogelwelt. **3**: 78-86
- Diesselhorst, G. (1940): Materialien aus Oberbayern. **3**: 97-98
- Diesselhorst, G. (1953): Verlust von Singvogelbruten durch Schnecken. **4**: 72-73
- Diesselhorst, G. (1971): Zur Deutung ungewöhnlicher Beobachtungen: Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) im Juli bei Fürstenfeldbruck. **10**: 38-42
- Diesselhorst, G. (1971): Die Westfunde des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*) im Herbst. **10**: 92-96
- Dietrich, C. (1999): Weißwangengänse *Branta leucopsis* als Brutvögel im Nymphenburger Park. **38**: 196-199
- Dietz, J. (1953): Brutablauf der Störche Oberfrankens 1952. **4**: 54-56
- Dietz, J. (1955): Ruderente (*Oxyura leucocephala* [Scop.]) überwintert auf dem Main bei Bamberg. **4**: 368-371
- Dietz, J. (1958): Schneefink und Mauerläufer im Kantabrischen Gebirge. **5**: 33-34
- Dietz, J. (1959): Storchensus für Oberfranken 1958. **5**: 208-211
- Dietz, J. (1968): Bestandsaufnahmen am Weißstorch in Bayern. **8**: 396-399
- Dietzen, W. (1978): Der Brutbiotop des Habichts *Accipiter gentilis* in drei Gebieten Bayerns. **17**: 141-159
- Dietzen, W. (1996): Haselhenne *Bonasia bonasa* am Ortsrand von Breitbrunn am Chiemsee. **35**: 98
- Dittrich, W. (1980): Zur Dominanz- und Phälogiestructur der Greifvögel in Nordost-Bayern. **19**: 171-177
- Dittrich, W. (1990): Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* und Teichhuhn *Gallinula chloropus* auf der Oberpfälzer Vils. **29**: 23-27
- Dorka, V. (1973): Das Verhaltensmerkmal Wassertransport in der Diskussion um die Verwandtschaftsbeziehungen von Tauben *Columbae*, Flughühnern *Pterocles* und Limicolen *Laro-Limicolae*. **12**: 1-9

- Dorka, V. (1973): Ankunft, Wegzug und Orts-treue des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in einem brutgebietfernen Überwinterungsgebiet. **12**: 95-99
- Dorka, V. (1973): Zur Funktion der Nacktgesichtigkeit bei der Saatkrähe *Corvus frugilegus frugilegus*. **12**: 114-121
- Dorka, V. (1975): Zum "Faust"-Gebrauch beim Raubwürger *Lanius excubitor* (Laniinae) und Weißsichelwürger *Eurocephalus anguitimens* (Prionopinae). **14**: 314-319
- Dorka, V. (1976): Beobachtungsnotizen zum Nestbau- und Lautverhalten eines Pyrenäen-Mauerläufers. **15**: 202-215
- Dorka, V. (1977): Beobachtungsnotizen zur Nahrungssuche und zum Gesangsverhalten von Mönchsmeisen *Parus montanus* in slowenisch-kroatischen Gebirgen. **16**: 133-140
- Dorka, V. & Hölzinger, J. (1974): Zum Brutvorkommen der Bartmeise *Panurus biarmicus* am Federsee mit Bemerkungen zum Auftreten der Art in Baden-Württemberg. **13**: 293-299
- Dorka, V. & Ullrich, B. (1975): Haben die Rassen des Raubwürgers *Lanius e. excubitor* und *L. e. meridionalis* unterschiedliche Paarbindungsmodi? – mit einer Diskussion möglicher etho-ökologischer Verknüpfungen. **14**: 115-140
- Dornberger, W. (1978): Bemerkungen zur Biometrie der Goldammer *Emberiza citrinella* im Winterhalbjahr. **17**: 335-337
- Dornberger, W. (1980): Vorkommen des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* im unteren Altmühltal. **19**: 117
- Dornberger, W. (1983): Winterbeobachtungen an Rebhühnern *Perdix perdix* in Mittelfranken. **22**: 169-175
- Dornberger, W. (1985): Ansiedlung eines Großen Brachvogels *Numenius arquata* aus dem Donaumoos im Altmühltal. **24**: 181-182
- Dornberger, W., Alkemeier, F., D. Franz & H. Ranftl (1986): Die Vogelwelt des Ausgleichsbeckens Altmühltal. 2. Ergänzungsbericht. **25**: 19-28
- Dornberger, W. & Ranftl, H. (1985): Die Vogelwelt des Ausgleichbeckens Altmühltal. 1. Ergänzungsbericht. **24**: 59-66
- Dornberger, W. & Ranftl, H. (1986): Brutbestand des Großen Brachvogels *Numenius arquata*, des Rotschenkels *Tringa totanus* und der Uferschnepfe *Limosa limosa* in Nordbayern 1977-1986. **25**: 189-194
- Dornberger, W. s. Ranftl, H. (1984)
- Dornberger, W. s. Ranftl, H. (1988)
- Dornberger, W. s. Ranftl, H. (1990)
- Dreyer, H. (1959): Zwergohreule (*Otus scops*) ruft bei Volkach im Maintal. **5**: 378
- Drost, R. (1935): Zum Zugweg des norwegischen Rotsternblaukehlchens (*Luscinia svecica gaetkei* [Kleinschmidt]). **2**: 353-354
- Eber, G. (1967): Wasservogelbeobachtungen im März 1967 aus Nordgriechenland und Südjugoslawien. **8**: 158-165
- Eck, S. s. Martens, J. (2000)
- Eichler, W. (1934): Kolkraben (*Corvus c. corax*) bei Garmisch. **2**: 322-323
- Eichler, W. (1936): Fernfunde in Bayern beringter Singdrosseln. **2**: 365-366
- Einstein, J. (1977): Über das Überbauen von Nestern von Haubentauchern und Mitausbrüten deren Eier durch Lachmöwen am Federsee. **16**: 91-92
- Einstein, J. (1990): Beobachtung eines zu Fuß jagenden Habichts *Accipiter gentilis*. **29**: 71
- Eisner, J. s. Schratler, D. (1986)
- Elßmann, H. (1990): Vorkommen und Verschwinden des Ziegenmelkers *Caprimulgus europaeus* im Veldensteiner Forst. **29**: 160-163
- Engelhardt, W. (1985): Mornellregenpfeifer *Eudromias morinellus* im Karwendel. **24**: 89-90
- Engler, U. s. Bezzel, E. (1985)
- Erdogan, A. s. Turan, L. (1998)
- Erhard, H. (1924): Der Ruf der Alpendohle (*Pyrhacorax graculus* L.). **1**: 67-68
- Erhardt, A. (1930): Beitrag zur Formenkreisnomenklatur. **2**: 55-60
- Erlemann, P. (1987): Zum Vorkommen des Sing-schwans *Cygnus cygnus* in Nordwestbayern. **26**: 261-263
- Erlinger, G. (1972): Eine Bodenbrut der Waldohreule (*Asio otus*) am Unteren Inn. **11**: 318-319
- Erlinger, G. (1974): Die Bestandsentwicklung von Rabenkrähe *Corvus corone* und Elster *Pica pica* nach Einstellung der Jagd im NSG "Hagenauer Bucht" am unteren Inn. **13**: 245-247
- Erlinger, G. & Reichholz, J. (1969): Neue Beobachtungen zum Vorkommen der Wasservögel an den Stauseen des Unteren Inn. **8**: 604-609
- Ertel, R. s. Berthold, P. (1974)

- Faas, M. s. Bindl, W. (1990)
- Fabian, K. (1994): Zum Rufverhalten der Wachtel *Coturnix coturnix* während der Rast. **33**: 37-41
- Farkaschovsky, H. (1977): Ein Schwarm von Hänflingen *Carduelis cannabina* veranlaßt einen Merlin *Falco columbarius* zu einem längeren Aufenthalt. **16**: 204-205
- Farkaschovsky, H. (1980): Zur Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Pestizidbelastung des Sperbers *Accipiter nisus* in Oberbayern. **19**: 1-11
- Farkaschovsky, H. (1988): Ein hochgelegener Brutplatz des Braunkehlchens *Saxicola rubetra* in den Allgäuer Alpen. **27**: 145
- Farkaschovsky, H. (1988): Ein Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus* im Oberallgäu. **27**: 146
- Farkaschovsky, H. (1990): Eine erfolgreiche Gebäudebrut des Kleibers *Sitta europaea*. **29**: 81
- Farkaschovsky, H. & Feurer, A. (1979): Ein großer Kranichtrupp *Grus grus* im Oberallgäu. **18**: 196
- Farkaschovsky, H. & Pudimat, K. (1984): Ein weiterer Brutnachweis der Rotdrossel *Turdus iliacus* in Bayern. **23**: 235-236
- Farkaschovsky, H. & Stadelmann, H. (1988): Erfolgreiche Gittermastbrut eines Kolkrahen *Corvus corax* bei Sulzberg (Lkr. Oberallgäu). **27**: 294-295
- Feulner, J. (1990): Zum Bestand des Braunkehlchens *Saxicola rubetra* in der "Bad Stebener Rodungsinsel" 1989. **29**: 29-36
- Feulner, J. (1991): Der Kolkrahe *Corvus corax* brütet im Frankenwald. **30**: 86-87
- Feulner, J. & Förster, D. (1995): Siedlungsdichte, Habitatwahl und Schutz des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) in der Teuschnitzaue, Frankenwald. **34**: 125-138
- Feurer, A. s. Farkaschovsky, H. (1979)
- Fiala, V. (1974): Populationsdynamik und Brutbiologie der Lappentaucher Podicipedidae im Teichgebiet von Námest' n. Osl./ CSSR. **13**: 198-218
- Fiedler, G. (1971): Weißstorch-Fernfunde in Bayern 1971. **10**: 188
- Finkenstein, H. von (1937): Die Artbestimmung der häufigsten deutschen Fringillidae nach dem Schädel skelett. **2**: 393-403
- Firsching, U. s. Köhler, U. (1997)
- Firsching, U. s. Köhler, U. (2000)
- Fischer, A. (1930): *Cursorius cursor* (Lath.) in Bayern erlegt. **2**: 117
- Fischer, A. (1932): Zugvögel und Irrgäste aus der Augsburger Umgebung. **2**: 163-165
- Fischer, A. (1933): Kolkrahen (*Corvus c. corax* L.) bei Garmisch. **2**: 276
- Fischer, W. (1959): Seevogelbeobachtungen während einer Schiffsreise vom Indischen Ozean bis zur Ostsee. **5**: 36-362
- Förstel, A. (1977): Der Uhu *Bubo bubo* im Frankenwald und im Bayerischen Vogtland. **16**: 115-131
- Förstel, A. (1982): Bemerkenswerter Fernfund eines im Frankenjura eingesetzten Uhus *Bubo bubo*. **21**: 180
- Förstel, A. (1983): Baßstöpel *Sula bassana* nahe Forchheim in Oberfranken. **22**: 115-116
- Förstel, A. (1983): Bestandsaufstockung des Uhus *Bubo bubo* in Bayern. **22**: 145-167
- Förstel, A. (1984): Baum- und Gebäudebruten beim Uhu *Bubo bubo*. **23**: 242
- Förstel, A. (1985): Außergewöhnlicher Fernfund eines oberfränkischen Uhus *Bubo bubo*. **24**: 182-183
- Förstel, A. (1986): Schwarzstörche *Ciconia nigra* im nördlichen Bayern. **25**: 240-241
- Förstel, A. (1987): Finnische Sperber *Accipiter nisus* in Bayern. **26**: 132-133
- Förstel, A. (1987): Reiher-Abschüsse geahndet. **26**: 140
- Förstel, A. (1987): Zum Bestand des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* im Regierungsbezirk Oberfranken. **26**: 272-273
- Förstel, A. (1989): Ringelgänse *Branta bernicla* nahe Forchheim in Oberfranken. **28**: 72
- Förstel, A. (1989): Kanadagans *Branta canadensis* aus Finnland in Niederbayern. **28**: 142
- Förstel, A. (1990): Beobachtungen am Uhu *Bubo bubo* L. im Gehege, Zucht und Auswilderung in Nordbayern. **29**: 1-22
- Förstel, A. (1991): Schwanzmißbildung bei einem Grünspecht *Picus viridis*. **30**: 92
- Förstel, A. (1993): Rabenkrähe *Corvus corone* öffnet Walnuß *Juglans regia* durch Fallenlassen. **32**: 165
- Förstel, A. (1993): Zur Ernährung des Ziegenmelkers *Caprimulgus europaeus*. **32**: 169
- Förstel, A. (1995): Der Uhu *Bubo bubo* L. in Nordbayern. **34**: 77-95

- Förstel, A. (1999): Neue Beobachtungen und Brutnachweise des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* im nördlichen Frankenjura. **38**: 192-196
- Förster, D. s. Feulner, J. (1995)
- Franck, E. (1981): Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* und Buntspecht *Dendrocopos major* im selben Brutbaum. **20**: 86-87
- Franck, E. (1987): Die Schriften der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. (eine Übersicht). **26**: 141-162
- Franz, D. (1981): Ergebnisse einer Populationsuntersuchung am Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*. **20**: 105-126
- Franz, D. (1981): Brutnachweis des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberen Maintal. **20**: 176
- Franz, D. (1988): Starke Bestandszunahme des Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneacula* nach dem Jahrhunderthochwasser 1988 in Nordbayern. **27**: 285-286
- Franz, D. (1988): Sperber *Accipiter nisus* schlägt junge Wanderfalken *Falco peregrinus* im Horst. **27**: 287-289
- Franz, D., Alkemeier, F., Sombrutzki, A. & Remm, W. (1987): Neues bayerisches Maximum des Sichlers *Plegadis falcinellus*. **26**: 271-272
- Franz, D., Hand, R. & Kamrad-Schmidt, M. (1987): Brut- und Winterbestand der Saatkrähe *Corvus frugilegus* 1986 in Bayern. **26**: 237-250
- Franz, D., Kortner, W. & Theiß, N. (1979): Invasionsartiges Auftreten der Beutelmeise *Remiz pendulinus* im oberen Maintal 1978 und ihre Brutbiologie. **18**: 1-21
- Franz, D. & Sombrutzki, A. (1991): Zur Bestandssituation des Kormorans *Phalacrocorax carbo* in Bayern in den Wintern 1988/89 und 1989/90. **30**: 1-10
- Franz, D. & Theiß, N. (1979): Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* im Oberen Maintal. **18**: 195
- Franz, D. & Theiß, N. (1983): Neuansiedlung des Graureihers *Ardea cinerea* in Oberfranken. **22**: 222-223
- Franz, D. & Theiß, N. (1985): Herkunft und Verbleib der nordbayerischen Beutelmeisen *Remiz pendulinus*. **24**: 67-74
- Franz, D. & Theiß, N. (1986): Untersuchungen zur Rückkehrquote einer farbberingten Population des Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneacula*. **25**: 11-17
- Franz, D. & Theiß, N. (1987): Herkunft und Verbleib der nordbayerischen Beutelmeisen *Remiz pendulinus* - Ergänzungsbericht. **26**: 115-128
- Franz, D. & Theiß, N. (1987): Lebensraumanalyse und Bestandsentwicklung des weißster-nigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneacula* im Oberen Maintal von 1971 bis 1986. **26**: 181-197
- Franz, D. & Theiß, N. (1991): Neue Ringfunde bayerischer Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneacula*. **30**: 79-80
- Franz, D. s. Dornberger, W. (1986)
- Franz, D. s. Ranftl, H. (1988)
- Franz, D. s. Ranftl, H. (1989)
- Franz, D. s. Theiss, N. (1983)
- Franz, D. s. Theiss, N. (1992)
- Frey, H. (1928): Beobachtungsnotizen. **1**: 153-156
- Frey, H. (1933): Beobachtungen aus dem oberen Aischgrund. **2**: 277-278
- Friedrich, H. (1961): Die Moorente (*Aythya nyroca* G.üldenst.) Brutvogel in Unterfranken. **6**: 67-72
- Friedrich, H. (1964): Ein Beitrag zum Vorkommen der Sumpfhühner der Gattung *Porzana* in Nordbayern. **7**: 100-105
- Friedrich, H. (1964): Zwei balzfreudige Tafelerpel (*Aythya ferina*). **7**: 122
- Friedrich, W. (1977): Gelbbräuenlaubsänger *Phylloscopus inornatus* überwinterte am Bodensee. **16**: 68-71
- Frisch, O. von (1957): Beobachtungen an einer blinden Schleiereule (*Strix flammea* [sic! = *Tyto alba*]). **4**: 572-574
- Frisch, O. von (1960): Gefangenschaftsbeobachtungen am Kampfläufer (*Philomachus pugnax*). **5**: 507-509
- Fröbel, F. (1981): Mariskensänger *Acrocephalus melanopogon* übersommern am Ammersee. **20**: 169-170
- Fröbel, F. (1982): Seidensänger *Cettia cetti* am Ammersee - Erstnachweis für Bayern. **21**: 101-102
- Fröbel, F. (1982): Spitzschwanzstrandläufer *Calidris acuminata* am Ammersee beobachtet. **21**: 182-183
- Fünfstück, H.-J. (1996): Bayerische Avifaunistische Kommission (BAK). **35**: 93-98

- Gajek, H. s. Heiser, F. (1999)
- Galhoff, H., Sell, M. & Abs, M. (1984): Aktivitätsrhythmus, Verteilungsmuster und Ausweichflüge von Tafelenten *Aythya ferina* L. in einem nordwestdeutschen Überwinterungsquartier (Ruhrstausee Kemnade). **23**: 133-147
- Gaschott, O. (1924): Materialien aus Oberbayern. **1**: 64
- Gaschott, O. (1926): Ornithologische Beobachtungen aus der Pfalz. **1**: 101-102
- Gatter, W. (1969): Ein Brutversuch der Blauracke (*Coracias garrulus*) in Baden-Württemberg. **8**: 631
- Gatter, W. (1970): Der Merlin (*Falco columbarius*) in Baden-Württemberg. **9**: 52-56
- Gatter, W. (1971): Aufenthalt und räumliche Bewegungen einer Flußregenpfeifer-Population (*Charadrius dubius*). **10**: 100-106
- Gatter, W. (1972): Herbstliche Zugplanbeobachtungen an Greifvögeln (Falconiformes) am Randecker Maar, Schwäbische Alb. **11**: 194-209
- Gatter, W. (1973): Zugplanbeobachtungen an Spechten der Gattung *Dendrocopos* am Randecker Maar, Schwäbische Alb. **12**: 122-129
- Gatter, W. (1977): Zug und Jahresperiodik nord- und mitteleuropäischer Schwarzspechte *Dryocopus martius*. **16**: 141-152
- Gatter, W. (1996): Das Abflämmverbot als Rückgangsursache von Singvögeln? **35**: 163-171
- Gatter, W. & Mattes, H. (1973): Der Wegzug der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*) am Randecker Maar, Schwäbische Alb. **12**: 256-262
- Gatter, W. & Müller, W. (1977): Winterbestandszählungen an Gebirgsstelzen *Motacilla cinerea*. **16**: 58-67
- Gatter, W. & Schütt, R. (1999): Langzeitentwicklung der Höhlenkonkurrenz zwischen Vögeln (Aves) und Säugetieren (Bilche Gliridae, Mäuse Muridae) in den Wäldern Baden-Württembergs. **38**: 107-130
- Gauckler, A. & Kraus, M. (1965): Die große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) als Brutvogel und Durchzügler in Nordbayern. **7**: 273-282
- Gauckler, A. & Kraus, M. (1962): Braune Sichler (*Plegadis falcinellus* L.) in Franken. **6**: 385-388
- Gauckler, A. & Kraus, M. (1963): Die Brutplätze des Brachvogels (*Numenius arquata*), Rotschenkels (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern. **6**: 427-442
- Gauckler, A. & Kraus, M. (1963): Die Sumpfhühner der Gattung *Porzana* als Brutvögel Nordbayerns. **6**: 525-540
- Gauckler, A. & Kraus, M. (1968): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Schwarzhals- tauchers (*Podiceps nigricollis*) in Nordbayern. **8**: 349-364
- Gauckler, A., Kraus, M. & W. Krauß (1970): Verbreitung und Brutbestände von Brachvogel (*Numenius arquata*), Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern im Jahre 1969. **9**: 13-26
- Gauckler, A., Kraus, M. & W. Krauß (1972): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) in Nordbayern. **11**: 115
- Gauckler, A., Kraus, M. & W. Krauß (1978): Die Schellente *Bucephala clangula* Brutvogel in Bayern. **17**: 161-175
- Gauckler, A. s. Kraus, M. (1969)
- Gebhardt, E. (1956): Der Alpenbirkenzeisig im Böhmerwald. **4**: 463
- Gebhardt, E. (1958): Die Turteltaube, wahrscheinlicher Brutvogel in Nürnberg. **5**: 49
- Gebhardt, E. (1958): Stelzenläufer bei Emskirchen (Mittelfranken). **5**: 49-50
- Gebhardt, L. (1958): Winterbeobachtungen in Mittenwald. **5**: 153-154
- Geh, G. (1964): Junge Rotmilane (*Milvus milvus*) fangen Insekten. **7**: 121-122
- Geh, G. (1964): Bachstelzen (*Motacilla alba*) schlafen im Dickicht. **7**: 201-202
- Geh, G. (1964): Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) nehmen Schneebad. **7**: 202-203
- Geh, G. (1965): Bienenfresser (*Merops apiaster*) am unteren Lech. **7**: 341-343
- Geh, G. (1967): Späte und frühe Haubentaucherbrut (*Podiceps cristatus*). **8**: 182
- Geh, G. (1987): Schein-Kopula bei Weibchen der Stockente *Anas platyrhynchos*. **26**: 131-1342
- Geiersberger, I. s. Bezzel, E. (1998)
- Gengler, J. (1925): Ein Schelladler in Franken. **1**: 80
- Gengler, J. (1928): Ein kleiner Beitrag zur Vogelwelt Tirols. **1**: 140-141
- Gengler, J. & Stresemann, E. (1919): Eine neue Form des Großen Buntspechtes von der Balkanhalbinsel. **1**: 2
- Gengler, J. s. Stresemann, E. (1919)
- Gerber, R. (1930): Sommerbeobachtungen bei Oberstdorf im Allgäu. **2**: 112-117

- Gerber, R. (1941): Die kleine Raubmöwe, *Stercorarius longicaudus* Vieillot, in Oberfranken. **3**: 161-162
- Gerber, R. (1953): Sommerbeobachtungen im Frankenjura. **4**: 64-67
- Gerber, R. (1954): Zum Thema: "Verluste von Singvogelbruten durch Schnecken" **4**: 173
- Gerum, M. (1989): Zweimalige Überwinterung eines Zwergschwans *Cygnus bewickii* am Starnberger See. **28**: 146-147
- Glätzer, G. & Theiß, N. (1986): Die Rohrdommel *Botaurus stellaris* brütet 1986 erstmals am Großen Nassanger Weiher / Trieb. **25**: 238-239
- Glätzer, G. s. Theiss, N. (1983)
- Glätzer, G. s. Theiss, N. (1987)
- Glätzer, G. s. Theiss, N. (1992)
- Gleixner, K. H., Meyer, H. & D. Singer (1992): Bruten des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* in den Nadelwäldern um München. **31**: 74-76
- Gleixner, K. H. & Singer, D. (1990): Vorkommen des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* in den Forsten um München. **29**: 68-70
- Gleixner, K.-H. s. Meyer, H. (1998)
- Glück, E. (1978): Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* mit überdimensionalem Kotballen. **17**: 337-338
- Glück, E. (1981): Beleuchtungsstärke der Neststandorte bei einigen Finken (Fringillidae) und beim Grauschnäpper *Muscicapa striata*. **20**: 35-44
- Goller, F. s. Landmann, A. (1983)
- Goßler, R. (1987): Zwergschnäpper *Ficedula parva* im südlichen Frankenwald. **26**: 273-274
- Greiner, H., Partsch, H. & W. Wüst (1976): Blauracken *Coracias garrulus* im Ries. **15**: 98
- Gröbbels, F. (1936): Über Farbvarietäten und Farbabweichungen der Vögel und ihre Vererbungsweise. **2**: 368-373
- Gröbbels, F. (1938): Über die Beziehungen der Merkmale des Eies in sich und zum Vogelkörper. **3**: 7-9
- Gröbbels, F. (1957): Schlag und Regenruf des Buchfinken in Beziehung zu Jahreszeit und Wetter. **4**: 567-570
- Gross, A. (2000): Die Entwicklung der Brutpopulation von *Mergus merganser* in Südbayern und Österreich im Hinblick auf die Sichttiefe repräsentativer Flüsse im Brutareal. **39**: 97-118
- Grossmann, T. s. Brummer, C. (2000)
- Grote, H. (1922): Eine neue mittelafrikanische Fliegenschnäpperform. **1**: 58-59
- Grote, H. (1928): Notizen über einige ostafrikanische Vögel. **1**: 134-136
- Grote, H. (1930): Die Formenkreise der Vasapageien (*Coracopsis*). **2**: 47-48
- Grote, H. (1931): Die Gliederung des Formenkreises *Treron australis* (L.). **2**: 140-141
- Grote, H. (1933): *Halcyon chloris laubmanniana* nom. nov. **2**: 266
- Grote, H. (1934): Über einige *Cossypha*-Arten. **2**: 310-312
- Grote, H. (1935): Die Gliederung des Formenkreises *Arizelocichla tephrolaema*. **2**: 355-356
- Grote, H. (1936): Nomenklatorische Bemerkungen über einige afrikanische Vögel. **2**: 373-375
- Gruber, A. (1928): Zur Vogelwelt der Umgebung von Speyer a. Rhein. **1**: 157
- Gubitz, C. (1977): Ein außergewöhnlicher Schlafplatz der Lachmöwe *Larus ridibundus* bei Bayreuth. **16**: 92-94
- Gubitz, C. (1982): Zur Verbreitung, Bestandsgröße und Ökologie der Haubenlerche *Galerida cristata* im östlichen Oberfranken. **21**: 87-95
- Gubitz, C. (1983): Beobachtungen zur Biologie der Haubenlerche *Galerida cristata*. **22**: 177-196
- Gubitz, C. (1987): Brutnachweis der Beutelmeise *Remiz pendulinus* nun auch im Rotmaingebiet. **26**: 263-264
- Gubitz, C. (1993): Wiesenpieper *Anthus pratensis* auf Waldschadensfläche im Fichtelgebirge. **32**: 73-74
- Gwinner, E. (1964): Ein Kolkrabenhorst bei Andechs/Obb. **7**: 200-201
- Haas, G. (1961): Federsee-Jahresbericht 1960. **6**: 157-161
- Haaß, C. (1982): Abhängigkeit des Vorkommens der Wasserralle *Rallus aquaticus* vom Wasserstand. **21**: 129-136
- Hachenberg, A. & Reiner, K. (1993): Tagfliegen der Uhu *Bubo bubo* im mittleren Neckartal. **32**: 77-78
- Haffer, J. (2000): Kontaktzonen bei Vögeln der Tropen und ihre biogeographische Bedeutung. **39**: 43-62
- Hagemann, P. s. Leibl, F. (1997)
- Hagen, W. (1932): Früher Kiebitzzug im Ostseegebiet. **2**: 156-158

- Hagen, W. (1935): Die Eismöwe (*Larus glaucus* Br.) in Schleswig-Holstein. 2: 360-362
- Hand, R. s. Franz, D. (1987)
- Handke, K. & Handke, U. (1982): Die Avizöno-se einer oberrheinischen Agrarlandschaft. 21: 137-151
- Harth, J. s. Ranftl, H. (1976)
- Harz, K. (1988): Eigentümliches Verhalten des Mauerseglers *Apus apus*. 27: 289
- Hausmann, S. (1982): Hohltauben *Columba oenas* brüten nach mehrjährigem Anlauf in Nistkästen. 21: 102-104
- Hausmann, S. (1982): Brutvogel-Bestandsaufnahme im Bergwald Oberschleißheim. 21: 153-163
- Hausmann, S. (1984): Brutvogel-Bestandsaufnahme im östlichen Dachauer Moos nördlich von München. 23: 65-87
- Hausmann, S. (1987): Brutvogel-Bestandsaufnahme in zwei naturnahen Waldstücken nördlich von München. 26: 209-220
- Hausmann, S. (1990): Erneute Beobachtungen des Seidensängers *Cettia cetti* in Oberbayern. 29: 163-164
- Hayo, L. s. Bethge, E. (1979)
- Heck, L. (1969): Brut des Eisvogels (*Alcedo atthis*) im Münchener Tierpark Hellabrunn. 8: 632
- Heckenroth, H. (1970): Der Greifvogelbestand des Bodanrücks (Bodensee) 1968 und 1969. 9: 47-51
- Heer, E. (1956): Von der Verbreitung der Türkentaube im Ries und seiner Umgebung bis 1955. 4: 447-453
- Heer, E. (1958): Stand der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) 1956 und 1957 in Württemberg und im Raume Nördlingen (Schwaben). 5: 94-108
- Heer, E. (1961): Weitere Ergebnisse an Türkentauben im Raum Nördlingen-Aalen 1958-1960. 6: 138-149
- Heer, E. (1966): Die Verbreitung der Dohle im Ries und seiner Umgebung. 7: 697-701
- Heer, E. (1967): Ein Brutnachweis der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Bopfingen am Nordostrand der Schwäbischen Alb. 8: 69-71
- Heer, E. (1967): Brüten der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) 1966 auf der Ostalb. 8: 71-72
- Heer, E. (1973): Zur Nistweise des Haussperlings (*Passer domesticus*). 12: 47-51
- Heer, E. (1975): Zur Brutablösung bei der Türkentaube *Streptopelia decaocto*. 14: 174-180
- Heidemann, J. (1936): Wiederfunde in Bayern beringter Turmfalken. 2: 366-367
- Heinle, R. (1988): Weißbartgrasmücke *Sylvia cantillans* im Oberallgäu. 27: 290-291
- Heinle, R. (1988): Wahrscheinliche Brut des Blaukehlchens *Cyanosylvia svecica cyaneacula* 1988 im Oberallgäu. 27: 302
- Heinle, R. (1989): Habicht *Accipiter gentilis* schwimmt mit Beute. 28: 68-69
- Heinle, R. (1989): Erfolgreiche Brut von Baumfalken *Falco subbuteo* in knapp 900 m Höhe im Oberallgäu. 28: 143
- Heinle, R. (1997): Häherkuckuck *Clamator glandarius* im Oberallgäu. 36: 58
- Heiser, F. (1967): Eine Kolkkrabenbrut (*Corvus corax*) bei Irsee (Landkreis Kaufbeuren). 8: 72
- Heiser, F. (1968): Neue Brutnachweise von Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) und Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Bayern. 8: 290-291
- Heiser, F. (1972): Erster Brutnachweis des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) in Bayern und sein Vorkommen in Schwaben. 11: 269-274
- Heiser, F. (1974): Zur Siedlungsdichte der Brutvögel in einem Flachmoor bei Donauwörth. 13: 219-230
- Heiser, F. (1983): Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* im Lech-Donau-Winkel. 22: 113
- Heiser, F. (1992): Die Kolbenente *Netta rufina* als Brutvogel im Regierungsbezirk Schwaben. 31: 159-161
- Heiser, F. (1992): Erfolgreiche Brut des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* im Lech-Donau-Winkel. 31: 172-173
- Heiser, F., Gajek, H. & Schubert, R. (1999): Die Rüppellseeschwalbe *Sterna bengalensis*, eine neue Art für Deutschland. 38: 189-192
- Heiser, F., Reichhof, J., M. Siering & J. Willy (1972): Neuer Nachweis des Terekwasserläufers (*Tringa terek*) in Bayern. 11: 320-321
- Heiser, F., Schmid, L. & M. Siering (1982): Neue Nachweise des Gelbschnabeistauchers *Gavia adamsii* in Bayern. 21: 175-177
- Helbig, A. (1981): Das Vorkommen der Eiderente *Somateria mollissima* in Westfalen in den Jahren 1971 bis 1977. 20: 139-153
- Helbig, A., Belting, H. & J. Ludwig. (1986): Vorkommen und Durchzug spärlich oder selten auftretender Laro-Limicolen am Dümmer,

- NW-Deutschland, von 1956-1985. **25**: 29-56
- Heller, I. s. Heller, M. (1979)
- Heller, I. s. Heller, M. (1988)
- Heller, M. & Heller, I. (1979): Eine Zwergohreule *Otus scops* in Nordwürttemberg. **18**: 193-195
- Heller, M. & Heller, I. (1988): Bemerkenswerte Geier- und Falkenbeobachtungen im Alpenpark Berchtesgaden. **27**: 299-301
- Heller, M. (1980): Ein Uhu *Bubo bubo* im Württemberger Unterland. **19**: 119-120
- Heller, M. (1981): Durchzug und Verhalten des Rotfußfalke *Falco vespertinus* in Nordwürttemberg. **20**: 65-72
- Heller, M. (1981): Beobachtungen an einem Fischadler *Pandion haliaetus* auf dem Herbstzug am Aalkistensee, Württemberg. **20**: 155-167
- Heller, M. (1981): Beobachtung eines Gerfalke *Falco rusticolus* in Nord-Württemberg. **20**: 181-182
- Heller, M. (1982): Häherkuckuck *Clamator glandarius* in Nordwürttemberg. **21**: 177-179
- Heller, M. (1983): Habichtsadler *Hieraetus fasciatus* in Nordwürttemberg. **22**: 122-125
- Heller, M. (1983): Beobachtung eines gemeinsam ziehenden Großverbandes verschiedener Greifvogelarten. **22**: 126-127
- Heller, M. (1983): Rötelfalke *Falco naumanni* in Nordwürttemberg. **22**: 224-226
- Heller, M. (1984): Nachweis einer flavistisch/rufinistischen Rabenkrähe *Corvus c. corone*. **23**: 102-103
- Heller, M. (1984): Mehrjähriges Auftreten desselben Fischadlers *Pandion haliaetus* mit Paarbildung und Ansiedlungsversuchen am NSG Aalkistensee/ Württemberg. **23**: 225-231
- Heller, M. (1985): Verhaltensbeobachtungen beim Nachweis eines juvenilen Wanderfalkepaars *Falco p. peregrinus* – ein Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie des Wanderfalke. **24**: 151-159
- Heller, M. (1986): Winterflüchtende Großtrappen *Otis tarda* in Nordwürttemberg im Kalte Winter 1984/85. **25**: 77-80
- Heller, M. (1988): Schell- und Schreiadler (*Aquila clanga* und *Aquila pomarina*) im nordwürttembergischen Stromberggebiet. **27**: 141-144
- Heller, M. (1990): Erfolgreiche Herbstbrut (?) beim Mäusebussard *Buteo buteo*. **29**: 80
- Heller, M. (1991): Wanderfalke *Falco peregrinus* attackiert an seinem Horstplatz einen überwinternden Mauerläufer *Tichodroma muraria*. **30**: 89
- Heller, M. (1992): Die Entstehung einer Population des Wanderfalke *Falco p. peregrinus* an Bauwerken im Württemberger Unterland. **31**: 51-55
- Heller, M. (1992): Fischender Wanderfalke *Falco p. peregrinus* im NSG Aalkistensee in Nordwürttemberg. **31**: 173-174
- Heller, M. (1995): Ein Brutvorkommen des Uhu *Bubo bubo* im Württemberger Unterland. **34**: 97-101
- Heller, M. (1996): Fischadler *Pandion haliaetus* als Stromschlagopfer an den Maulbronner Seen in Nordwürttemberg. **35**: 187-189
- Heller, M. (1997): Wanderfalkeweibchen *Falco p. peregrinus* des Pionierpaares der württembergischen Flachlandpopulation nach 10-jähriger Dauerehe als Stromschlagopfer tot gefunden. **36**: 58-59
- Heller, M. (1998): Bestandsaufnahme der Dohle im Nordwesten von Stuttgart. **37**: 230
- Hellmannsberger, J., Reichholf, J. & K. Schaack (1979): Gelbfüßige Silbermöwen am unteren Inn. **18**: 180-182
- Hellmayr, C. (1919): Zwei neue neotropische Vogelformen. **1**: 2
- Hellmayr, C. (1920): Neue neotropische Formen und Gattungen. **1**: 15-21
- Hellmayr, C. (1921): Zwölf neue Formen aus dem neotropischen Gebiet. **1**: 25-32
- Hellmayr, C. (1921): Zwei neue neotropische Vogelformen. **1**: 41-42
- Hellmayr, C. (1922): Vier neue Formen aus der südamerikanischen Avifauna. **1**: 44-48
- Hellmayr, C. (1925): Über einen neuen Tyranniden aus Venezuela. **1**: 73-74
- Hemprich, M. & Resch, J. (1978): Große Schlafplatzansammlung der Rohrweihe *Circus aeruginosus* am Bodensee. **17**: 179
- Henß, E. & Querner, U. (1981): Erstnachweis des Sprossers *Luscinia luscinia* am Bodensee. **20**: 83-85
- Herfurth, D. (1966): Merkwürdiges Verhalten von Grünlingen (*Chloris chloris*) beim Nestbau. **7**: 867-868
- Hermann, H. (1953): Beutelmeisen in den Ameraunen. **4**: 56-60

- Hermann, H. (1953): Abnormales Brüten eines Amselweibchens. 4: 74
- Heßberg, A. von & Beierkuhnlein, C. (2000): Vegetationsstrukturen in den Habitaten des Auerhuhns *Tetrao urogallus* im Fichtelgebirge. 39: 159-174
- Hesse, E. (1929): Ornithologische Bemerkungen II. (1. Zum Vorkommen von *Erythrosterina (Muscicapa) parva* (Bechst.) bei Garmisch-Partenkirchen.) 2: 25-29
- Hesse, E. (1930): Ornithologische Bemerkungen III. 2: 69-83
- Hesse, E. (1931): Ornithologische Bemerkungen IV. 2: 132-134
- Hettiger, M. (1938): Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea* [L.]) bei München. 3: 13-14
- Heyder, R. (1966): Zum Brutbiotop des Rauhfußkauzes, *Aegolius funereus*. 7: 865
- Heynen, I. s. Schuchmann, K.-L. (2000)
- Hiller, W. (1986): Schwimmvögel am Tegernsee. 25: 57-75
- Hiller, W. (1997): Entwicklung der Wasservogelbestände am Tegernsee von 1973-1997. 36: 143-158
- Hinkelmann, C. (2000): Tropenornithologie und deutschsprachiger Raum – alles andere als ein exotischer Beitrag. 39: 63-79
- Hirsch, B., Pointner K. & J. Reichholf (1973): Kaiseradler (*Aquila heliaca*) am Unteren Inn. 12: 270-271
- Hocheder, L. (1964): Der Weiße Storch in den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz 1959-1962. 7: 19-42
- Hocheder, L. (1970): Kurze Bestandsübersicht des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz 1963-1968. 9: 74-75
- Hofer, A. (1983): Brutbiologie und Strategien der Jungenaufzucht von Enten (Anatidae) im Ismaninger Teichgebiet. 22: 57-93
- Hoffmann, B. (1930): Noch einmal "Für ein einheitliches deutsches Namenverzeichnis unserer einheimischen Vogelwelt" 2: 48-50
- Hoffmann, B. (1931): Die deutschen Vogelnamen. 2: 124-127
- Hoffmann, B. (1934): Zur Frage der djordsui-Buchfinken. 2: 315-318
- Hoffmann, B. (1936): Neues von den djordsui-Buchfinken. 2: 375-376
- Hoffmann, B. (1939): Zur Deutung des Namens Radebrecher für den Rotrückigen Würger (*Lanius c. collurio* L.). 3: 51-52
- Hoh, E. s. Krüger, R. (1999)
- Hohlt, G. (1957): Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) am Inn bei Rott. 4: 576
- Hohlt, G. (1975): Erfolg einer künstlichen Brutinsel für Flußseeschwalben *Sterna hirundo* im Inn. 14: 311-313
- Hohlt, G. & Lohmann, M. (1987): Eismöwe *Larus hyperboreus* am Chiemsee. 26: 259-260
- Hohlt, G., Lohmann, M. & A. Suchantke (1960): Die Vögel des Schutzgebietes Achenmündung und des Chiemsees. 5: 452-505
- Hohlt, G. s. Conradt, P. (1967)
- Hohlt, G. s. Lohmann, M. (1989)
- Holynski, O. & Uhlich, D. (1978): Brutvorkommen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Unterfranken. 17: 338-339
- Holynski, O. s. Uhlich, D. (1992a,b)
- Holynski, O. s. Uhlich, D. (1994)
- Hölzinger, J. (1969): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (I). 8: 473-509
- Hölzinger, J. (1969): Fünfjährige Untersuchungen über den Brutbestand der Mehl- und Rauchschnalbe (*Delichon urbica* et *Hirundo rustica*) in der Umgebung von Ulm. 8: 610-624
- Hölzinger, J. (1970): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). 9: 57-73
- Hölzinger, J. (1970): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (3). 9: 155-169
- Hölzinger, J. (1970): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (4). 9: 208-225
- Hölzinger, J. (1971): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (5). 10: 43-53
- Hölzinger, J. (1971): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (6). 10: 174-182
- Hölzinger, J. (1972): Zug und Wintervorkommen von Wasserralle (*Rallus aquaticus*) und Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) in der Gegend von Ulm. 11: 49-53
- Hölzinger, J. (1972): Zur Verbreitung des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*) in Baden-Württemberg. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (8). 11: 111-114
- Hölzinger, J. (1972): *Leptomitus lacteus* als Nahrung des Bläßhuhns (*Fulica atra*) am Öpfinger Donaustausee. 11: 168-175

- Hölzinger, J. (1972): Das Alter europäischer Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius curonicus*) nach Beringungsunterlagen. **11**: 275-281
- Hölzinger, J. (1973): Brutverbreitung, Brut- und Sommerbestand des Höckerschwans (*Cygnus olor*) 1969 in Süddeutschland. **12**: 10-14
- Hölzinger, J. (1974): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (11). **13**: 240-244
- Hölzinger, J. (1975): Untersuchungen zum Verhalten des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* bei gestörtem und ungestörtem Brutablauf. **14**: 166-173
- Hölzinger, J. (1989): Die Schriften der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. - ein Nachtrag. **28**: 137-138
- Hölzinger, J. & Bezzel, E. (1966): Handzähluhren - praktische Hilfsmittel für Wasservogelzählungen. **7**: 613-615
- Hölzinger, J., Knötzsch, G., S. Schuster & K. Westermann (1972): Wetlands (Feuchtgebiete) in Baden-Württemberg mit internationaler und nationaler Bedeutung für Wasservögel. **11**: 70-110
- Hölzinger, J., Mickley, M. & K. Schilhansl (1970): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Ulmer Raum. **9**: 236-237
- Hölzinger, J., Mickley, M. & K. Schilhansl (1973): Beobachtungen an überwinternden Rotmilanen (*Milvus milvus*) im Donaumoos bei Ulm. **12**: 106-113
- Hölzinger, J., Mickley, M. & K. Schilhansl (1973): Untersuchungen zur Brut- und Ernährungsbiologie der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) in einem süddeutschen Brutgebiet mit Bemerkungen zum Auftreten der Art in Mitteleuropa. **12**: 176-197
- Hölzinger, J., Mickley, M. & K. Schilhansl (1973): Zur Überwinterung des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) im Donaubereich bei Ulm. **12**: 57-64
- Hölzinger, J. & Mickley, M. (1975): Zum Sozialverhalten der Grauwammer *Emberiza calandra* im Frühjahr. **14**: 90-91
- Hölzinger, J., Pflüger, J. & W. Schmidt (1973): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (9). **12**: 130-139
- Hölzinger, J., Rockenbauch, D. & K. Schilhansl (1968): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Süddeutschland. **8**: 383-392
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1966): Der Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*) wieder Brutvogel im Ulmer Raum. **7**: 612-613
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1966): Zum Brutbestand des Kiebitzes, *Vanellus vanellus* (L.), im Ulmer Raum. **7**: 702-708
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1967): Eine Dezember-Beobachtung des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) im Ulmer Raum. **8**: 68
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1967): Durchzug und Überwinterung der Lappentaucher (*Podicepsiformes*) im Ulmer Raum. **8**: 113-122
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1968): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) im Ulmer Raum. **8**: 277-285
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1968): Wintergewichte des Zwergtauchers. **8**: 297-298
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1971): Zur Gewichtsentwicklung junger Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*). **10**: 107-109
- Hölzinger, J. & Schilhansl, K. (1971): Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im Ulmer Raum. **10**: 170-173
- Hölzinger, J. & Weyhe, W. (1972): Elektrische Handzähluhren als Hilfsmittel für Wasservogelzählungen. **11**: 324-325
- Hölzinger, J. s. Anka, K. (1965)
- Hölzinger, J. s. Berthold, P. (1974)
- Hölzinger, J. s. Bezzel, E. (1969)
- Hölzinger, J. s. Dorka, V. (1974)
- Hölzinger, J. s. Prinzinger, R. (1971)
- Holzwarth, G. s. Prinzinger, R. (1971)
- Hörl, H. s. Bernecker, A. (1979)
- Hudec, K. (1966): Die Ringelgans (*Branta bernicla*) in der Tschechoslowakei. **7**: 709-713
- Hund, K. s. Prinzinger, R. (1975)
- Hundt, D. (1976): Kleine Rast- und Durchzugsbiotope für Wasservögel im Gebiet der oberen Amper. **15**: 185-201
- Isenmann, P. (1971): Ergänzungen und Bemerkungen zu den Westfunden des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*). **10**: 187-188
- Jacoby, H. & Leuzinger, H. (1972): Die Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*) als Nahrung der Wasservögel am Bodensee. **11**: 26-35
- Jacoby, H. & Schuster, S. (1972): Maße, Gewichte und Nahrung von im Dezember 1971 im

- Vorarlberger Rheindelta in Fischernetzen ertrunkenen Wasservögeln. **11:** 176-180
- Jacoby, H. & Schuster, S. (1976): Junge Rohrweihes *Circus aeruginosus* überwintert am Bodensee. **15:** 221
- Janner, S. & Zintl, H. (1982): Gänsesäger *Mergus merganser* – erster Brutnachweis jenseits der Ostgrenze des alpinen Brutgebietes. **21:** 107
- Jochums, F. (1991): Beobachtung eines zu Fuß jagenden Sperbers *Accipiter nisus*. **30:** 91-92
- Jochums, F. (1992): Zum Vorkommen des Karmingimpels *Carpodacus erythrinus* im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. **31:** 63-67
- Jochums, F. & Bär, U. (1993): Brut des Schneefinken *Montifringilla nivalis* im Karwendelgebirge. **32:** 167-168
- Jochums, F. & Bär, U. (1993): Frühe Balz des Zitronengirlitzes *Serinus citrinella* 1993 im Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen. **32:** 168-169
- Jochums, F. & Bär, U. (1996): Der Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* im Tölzer Land. **35:** 189-194
- Jochums, F. & Jochums, G. (1991): Der Bestand und die Nahrungsmenge des Gänsesägers *Mergus merganser* im Landkreis Bad Tölz/ Wolfratshausen für die Jahre 1988-1990. **30:** 105-114
- Jochums, F. & Jochums, G. (1993): Ungewöhnliche Jagdtechnik eines Sperbers *Accipiter nisus*. **32:** 76-77
- Jochums, F. s. Bär, U. (1993)
- Jochums, F. s. Bär, U. (1993a,b)
- Jochums, F. s. Bär, U. (1994)
- Jochums, F. s. Bär, U. (1995a,b,c)
- Jochums, F. s. Bär, U. (1997)
- Jochums, F. s. Bär, U. (1998)
- Jochums, G. s. Jochums, F. (1991)
- Jochums, G. s. Jochums, F. (1993)
- Jordans, A. von (1933): Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Vogelfauna der Balearen und Pithyusen. **2:** 223-250
- Jordans, A. von (1933): Über einige Vogelrassen der Nord-Pyrenäen und Nordost-Spaniens. **2:** 250-266
- Jordans, A. von (1937): *Emberiza leucocephala stachanowi*, Boett. subsp. n.? **2:** 404-405
- Jordans, A. von & Niethammer, G. (1957): Vögel auf Schiffen. **4:** 528-533
- Jud, E. & Kulzer, E. (1975): Ontogenese der Temperaturregulation beim Mäusebussard *Buteo b. buteo* (Linné, 1758). **14:** 261-272
- Jung, G. (1976): Eine Scheckente *Polysticta stelleri* am Chiemsee. **15:** 97
- Jung, G. (1990): Sprosser *Luscinia luscinia* am Chiemsee. **29:** 169-170
- Kalchreuter, H. (1969): Die Mauser der Rabenkrähe (*Corvus corone*). **8:** 578-592
- Kalchreuter, H. s. Berthold, P. (1974)
- Kämpfer-Lauenstein, A. (1997): Zum Vorkommen der Wachtel *Coturnix coturnix* im Bayerischen Wald. **36:** 54-57
- Kamrad-Schmidt, M. s. Franz, D. (1987)
- Kaniss, M. (1970): Beschreibung von Nestern des Zitronenzeisigs (*Serinus citrinella*). **9:** 173-174
- Kaniss, M. & Pfeifer, R. (1994): Notizen zur Brutbiologie des Zitronengirlitzes *Serinus citrinella*. **33:** 63-65
- Kasperek, M. (1974): Verstecken von Beute beim Turmfalke *Falco tinnunculus*. **13:** 248
- Kasperek, M. (1975): Zum Vorkommen des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* an der Westgrenze seines Brutareals. **14:** 141-165
- Kattinger, E. (1954): Bemerkungen über Vögel aus Franken in der Sammlung des Zoologischen Instituts der Universität Erlangen. **4:** 133-138
- Kattinger, E. (1978): Eine Waldammer *Emberiza rustica* in Nordbayern. **17:** 341
- Kaus, D. (1977): Zur Populationsdynamik, Ökologie und Brutbiologie der Schleiereule *Tyto alba* in Franken. **16:** 18-44
- Kaus, D., Link, H. & J. Werzinger (1971): Bemerkungen zum Bestand der Schleiereule (*Tyto alba*) in einigen Teilen Frankens. **10:** 69-82
- Kaus, D. & Veitengruber, A. (1978): Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* brütet weitab von Gewässern. **17:** 333-334
- Kayser, C. (1924): Über das Vorkommen von *Erismatura leucocephala* (Scop.). **1:** 66
- Kayser, C. (1924): Über den Gesang des Schwarzkopfes (*Sylvia a. atricapilla* (L.)). **1:** 67
- Kayser, C. (1926): Zur Ökologie des Sumpfrohrsängers, *Acrocephalus palustris* Bch. **1:** 92-93
- Kayser, C. (1928): Betrifft den Gesang des Schwarzplättchens, *Sylvia atricapilla*. **1:** 150
- Kechele, W. s. Bezzel, E. (1997)
- Kechele, W. s. Rust, R. (1996)

- Keicher, K. (1969): Beobachtungen an Schlafplätzen des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) auf der Schwäbischen Alb. **8**: 545-555
- Keller, T. (1996): Maßnahmen zur Abwehr von Kormoranen. **35**: 13-24
- Keller, T., Vordermeier, T., M.v. Lukowicz & M. Klein (1996): Der Einfluß des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* auf die Fischbestände ausgewählter bayerischer Gewässer unter besonderer Berücksichtigung fischökologischer und fischereiökonomischer Aspekte. **35**: 1-12
- Kellner, R. (1987): Erstnachweis der Zitronenstelze, *Motacilla citreola* Pallas, 1776, in Bayern. **26**: 173-180
- Keve, A. (1961): Die ornithogeographische Bedeutung der "Bernstein-Straße" **6**: 176-180
- Keve, A. (1961): Eine bescheidene Bemerkung zur geographischen Variation von *Mycerobas carnipes* (Hodgson). **6**: 181-182
- Keve, A. (1964): Über die taxonomische Stellung paläarktischer Teichhühner. **7**: 182-187
- Keve, A. (1978): Die Arealausbreitung der Maskenstelze *Motacilla (flava) feldegg*. **17**: 225-237
- Kiefer, M. (1925): Beobachtungen aus den Allgäuer Alpen. **1**: 81-83
- Kiefer, M. (1928): Herbstbeobachtungen aus dem bayerischen Allgäu. **1**: 156-57
- Kiefer, M. (1937): Beobachtungen im Jahre 1936 am Chiemsee bei Feldwies. **2**: 409-410
- Kinzelbach, R. (1966): Zur Kenntnis der Vögel von Elba. **7**: 858-860
- Kipp, F. (1928): Der asiatische Mauerläufer. **1**: 129-132
- Kipp, F. (1928): Zum Verlauf der Kleingefiedermauser bei den Passeres und Picidae. **1**: 139
- Kißling, D. (1998): Bemerkungen zum Flugverhalten von Kormoranen *Phalacrocorax carbo*. **37**: 158-159
- Kiziroglu, I. (1984): Untersuchungen über die Brutbiologie der höhlenbrütenden Vogelarten im Ebersberger Forst. **23**: 205-214
- Klein, H. & Beigel, H. (1991): Ornithologischer Jahresbericht 1990: Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim. **30**: 73-76
- Klein, H. s. Krüger, R. (1999)
- Klein, H. s. Ranftl, H. (1988)
- Klein, M. s. Keller, T. (1996)
- Klein, W. (1974): Zur Verbreitung der Wasseramsel *Cinclus cinclus* im Spessart. **13**: 35-46
- Kleiner, A. (1939): Ist *Motacilla flava lutea* Gm. eine Mutation? **3**: 3-5
- Klose, A. (1978): Habichtsadler *Hieraetus fasciatus* bei Regensburg. **17**: 177-178
- Klose, A. (1978): Universität Regensburg als Überwinterungsart von Hausrotschwänzchen *Phoenicurus ochruros*. **17**: 332-333
- Klose, A. (1978): Ein ungewöhnlicher Brutplatz der Lachmöwe *Larus ridibundus*. **17**: 333
- Klose, A. (1979): Rotschwanzwürger *Lanius collurio phoenicuroides* bei Regensburg. **18**: 197-198
- Klose, A. (1980): Beobachtung eines Kiefernkreuzschnabels *Loxia pytyopsittacus*. **19**: 192
- Klose, A. (1982): Eine Schwarzkehlrossel *Turdus ruficollis atrogularis* in Regensburg. **21**: 107-108
- Klose, A. (1983): Isabellwürger *Lanius isabellinus* an der Donau bei Pfatter/ Regensburg. **22**: 223
- Klose, A. (1985): Eigenartiges Verhalten eines Pirols *Oriolus oriolus*. **24**: 183-184
- Klose, A. (1985): Bastardierung beim Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*. **24**: 184
- Klose, A. (1986): Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* an der Donau bei Regensburg. **25**: 241
- Klose, A. (1988): Ein Blutspecht *Dendrocopos syriacus* im Rainer Wald, Landkreis Straubing. **27**: 303
- Klose, A. (1988): Ein Nordischer Laubsänger *Phylloscopus borealis* (?) in Regensburg. **27**: 303-304
- Knecht, S. (1938): Ein "Spion" zur Beobachtung von Tieren im Laboratorium und im Freien. **3**: 11-12
- Knecht, S. (1960): Ein Beitrag zur Erforschung der kanarischen Vogelwelt, insbesondere der Brutvögel, unter hauptsächlich Berücksichtigung der drei westlichen Inseln Teneriffa, Gomera und La Palma. **5**: 525-556
- Knecht, S. (1961): Ein Beitrag zur Kenntnis der azorischen Vogelwelt. **6**: 121-137
- Kniess, H. & Wegner, H. (1980): Die Vogelwelt forstlich rekultivierter Flächen im Oberpfälzer Braunkohlentagebau bei Schwandorf. **19**: 37-46
- Knötzsch, G. & Schuster, S. (1976): Erstbeobachtung des Cistensängers *Cisticola juncidis* in Baden-Württemberg. **15**: 101

- Knötzsch, G. s. Hölzinger, J. (1972)
- Knötzsch, G. s. Suchantke, A. (1963)
- Koenig, C. (1960): Zur Avifauna des Oberburger Raumes (Unterfranken). 5: 578-583
- Koenig, C. (1961): Beobachtungen an einer Brut des Wendehalses. 6: 81-83
- Koenig, C. (1961): Sperlingskauz – *Glaucidium passerinum* (L.) – bei Garmisch-Partenkirchen. 6: 93-94
- Koenig, C. (1961): Ornithologische Beobachtungen in Istrien und Dalmatien im Frühjahr 1956. 6: 166-175
- Koenig, C. (1961): Beobachtung einer Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris* Scop.) bei Garmisch-Partenkirchen. 6: 185
- Koenig, C. (1962): Sperber (*Accipiter nisus* L.) schlägt fliegende Fledermaus. 6: 402
- Koenig, C. (1963): Erlenzeisige (*Carduelis spinus*) fressen Weidenpollen. 6: 476
- Koenig, C. & Schwammerberger, K. (1963): Schwarzköpfige Schafstelze an den Kiesgruben bei Pleidelsheim, Kreis Ludwigsburg. 6: 570
- Koenig, C. & Wicht, U. von (1973): Eine erfolgreiche Brut des Bienenfressers (*Merops apiaster*) im Hegau. 12: 52-56
- Koenig, C. s. Brandt, H. (1961)
- Köhler, P. s. Köhler, U. (2000)
- Köhler, P. & Köhler, U. (1986): Durchzug von 11 Brandseeschwalben *Sterna sandvicensis* am Feringsee bei München. 25: 239-240
- Köhler, P. (1984): Weißkopfmöwe *Larus cachinans* am Ismaninger Speichersee. 23: 237-239
- Köhler, P. (1986): Die Entenfanganlage am Ismaninger Speichersee. 25: 1-10
- Köhler, P. (1986): Altersverhältnis, Mauser, Gewicht und Wiederfunde in Südbayern beringter Knäkenten *Anas querquedula*. 25: 163-173
- Köhler, P. (1991): Mauserzug, Schwingermauser, Paarbildung und Wegzug der Schnatterente *Anas strepera* im Ismaninger Teichgebiet 30: 115-150
- Köhler, P. s. Köhler, U. (1997)
- Köhler, P. s. Krosigk, E. von (2000)
- Köhler, U., Köhler, P., E. von Krosigk & U. Firsching (1997): Versuch mit karpfenfreien Teichen zur Verbesserung der Ernährungssituation für mausernde Wasservögel im Ismaninger Teichgebiet. 36: 83-92
- Köhler, U., Köhler, P.; Firsching, U. & E. von Krosigk (2000): Einfluß unterschiedlicher Besatzdichten von Karpfen *Cyprinus carpio* auf die Verteilung mausernder Wasservögel in den Fischteichen des Ismaninger Teichgebietes 1996-1999. 39: 119-134
- Köhler, U. s. Köhler, P. (1986)
- Koller, J. (1970): Quantitative Bestandsaufnahme der Brutvögel im Torfeinfang bei Dachau. 9: 150-154
- Koller, J. (1971): Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) nächtigen in warmer Asche. 10: 110
- Koller, J. (1971): Beobachtung eines Kuckucksweißchens (*Cuculus canorus*) bei der Eiablage. 10: 111
- Koller, J. (1976): Die Hohлтаube *Columba oenas* Brutvogel im Allacher Forst im Jahre 1976. 15: 224-225
- Koller, J. (1980): Nisthilfe für Wasseramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*. 19: 193-195
- Koller, J. s. Bezzel, E. (1966)
- Korn, W. (1983): Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* im Coburger Land. 22: 219-220
- Korn, W. (1984): Erneuter Nachweis des Prachtauchers *Gavia arctica* im Coburger Land. 23: 239-241
- Kornführer, H. (1971): Erste Brutnachweise der Reiherente (*Aythya fuligula*) in München. 10: 183-184
- Kortner, W. (1970): Beobachtungen am Brachvogel (*Numenius arquata*) der Altmühlwiesen. 9: 235-236
- Kortner, W. (1974): Erster erfolgreicher Brutnachweis des Brachvogels *Numenius arquata* in Bayern nördlich des Mains. 13: 97
- Kortner, W. (1979): Extrem späte Brut des Eisvogels *Alcedo atthis*. 18: 82
- Kortner, W. (1979): Ein Schmutzgeier *Neophron percnopterus* im Donaumoos. 18: 83
- Kortner, W. (1980): Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* auch 1979 wieder Brutvogel am Obermain. 19: 183-185
- Kortner, W. (1980): Blaukehlchen *Luscinia svecica* und Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* am Obermain 1979. 19: 188-189
- Kortner, W. (1981): Großes Brutvorkommen der Beutelmeise *Remiz pendulinus* im Mairdurchbruchstal zwischen Haßbergen und Steigerwald. 20: 73-81

- Kortner, W. (1981): Das Vorkommen der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Oberen Maintal. **20**: 177-180
- Kortner, W. (1982): Ergänzung zu den Brutvorkommen der Beutelmeise *Remiz pendulinus* im Maintal. **21**: 104-106
- Kortner, W. (1984): Der Brutbestand des Haubentauchers *Podiceps cristatus* im Oberen Maintal 1984. **23**: 245-245
- Kortner, W. (1984): Erste Gelegefunde des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberen Maintal. **23**: 246-247
- Kortner, W. (1987): Der Brutbestand der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, im Regnitzbecken im Jahre 1987. **26**: 265-267
- Kortner, W. s. Franz, D. (1979)
- Krafft, C. s. Schulze, C. (1984)
- Kraft, M. (1990): Bemerkenswertes Nahrungsdepot einer markierten Sumpfmeise *Parus palustris*. **29**: 170-171
- Krampitz, H. (1941): Beobachtungen an der Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*). **3**: 139-140
- Kraus, M. (1968): Beobachtungen an einer Zweitbrut des Bleßhuhnes. **8**: 393-395
- Kraus, M. (1998): Herbstnachweise der Amerikanischen Pfeifente *Anas americana* in Bayern. **37**: 227-229
- Kraus, M. & Conradt, P. (1965): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands. **7**: 475-485
- Kraus, M. & Gauckler, A. (1969): Zur Ausbreitung des Höckerschwanes (*Cygnus olor*) in Nordbayern. **8**: 452-462
- Kraus, M. & Krauß, W. (1967): Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in der Oberpfalz im Jahre 1967. **8**: 108-112
- Kraus, M. & Krauß, W. (1968): Die Brutplätze der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Nordbayern. **8**: 255-266
- Kraus, M. & Krauß, W. (1972): Zum Vorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Regnitzbecken mit Angaben zur Brutverbreitung in Nordbayern. **11**: 129-138
- Kraus, M. & Krauß, W. (1986): Zum Vorkommen der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, im Aischgrund und Regnitzbecken. **25**: 155-161
- Kraus, M. & Krauß, W. (1998): Auswertung der Ringfunde von in Nürnberg im Winterhalbjahr beringten Stockenten *Anas platyrhynchos*. **37**: 121-140
- Kraus, M. & Krauß, W. (1999): Die Schellente *Bucephala clangula* in der Oberpfalz: Bestandsentwicklung und Bemerkungen zur Brutbiologie. **38**: 149-160
- Kraus, M. & Krauß, W. (2000): Vorkommen und Brutbestand der Kolbenente *Netta rufina* im "Fränkischen Weihergebiet" und weitere neue Brutplätze in Nordbayern. **39**: 175-186
- Kraus, M., Krauß, W. & U. Mattern (1972): Zur Verbreitung der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) in Nordbayern. **11**: 263-268
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1962)
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1963a,b)
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1965)
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1968)
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1970)
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1972)
- Kraus, M. s. Gauckler, A. (1978)
- Kraus, M. s. Krauss, W. (1999)
- Kraus, M. s. Ranftl, H. (1989)
- Krauß, M. (1979): Zur Nahrungsökologie des Bläßhuhns *Fulica atra* auf den Berliner Havelseen und der Einfluß von Bläßhuhn und Bismartrate *Ondatra zibethicus* auf das Schilf *Phragmites communis*. **18**: 105-144
- Krauß, W. (1959): Wanderungen der bayerischen Lachmöwen (*Larus ridibundus* L.) **5**: 363-375
- Krauß, W. (1965): Beiträge zum Zugverhalten und Überwintern der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Bayern, speziell in München. **7**: 379-428
- Krauß, W. (1966): Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Franken im Jahre 1966. **7**: 763-770
- Krauß, W. (1967): Zum Brutvorkommen des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Franken. **8**: 105-107
- Krauß, W. (1972): Bericht über die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 1970/71 in Bayern. **11**: 54-57
- Krauß, W. (1988): Bemerkenswerte Ergänzung zum Ringfund einer Kohlmeise *Parus major*. **27**: 140-141
- Krauß, W. (1988): Erstnachweis des Orpheusspötters *Hippolais polyglotta* in Bayern. **27**: 297-298
- Krauß, W. (1999): Ergebnisse einer 10jährigen Bestandsaufnahme an einer Population des Gelbspötters *Hippolais icterina* im östlichen Nürnberger Pegnitzgrund. **38**: 169-176

- Krauß, W. & Kraus, M. (1999): Die Schellente *Bucephala clangula* im "Fränkischen Weihergebiet" zwischen Erlangen und Höchstädt/Aisch. **38**: 41-49
- Krauß, W. & Springer, H. (1962): Beiträge zur Vogelwelt des bayerischen Schwaben. **6**: 362-384
- Krauß, W. s. Bezzel, E. (1970)
- Krauß, W. s. Gauckler, A. (1970)
- Krauß, W. s. Gauckler, A. (1972)
- Krauß, W. s. Gauckler, A. (1978)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (1967)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (1968)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (1972)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (1986)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (1998)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (1999)
- Krauß, W. s. Kraus, M. (2000)
- Krieg, H. (1929): Alfred Edmund Brehm. **2**: 3-5
- Krösche, O. (1975): Zur Ökologie des Haussperlings *Passer domesticus*. **14**: 87-89
- Krosigk, E. von (1978): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **32**. Bericht 1974-1976. **17**: 37-62
- Krosigk, E. von (1980): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **33**. Bericht 1977-1979. **19**: 75-106
- Krosigk, E. von (1983): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **33**. Bericht 1977-1979. **22**: 1-36
- Krosigk, E. von (1985): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **35**. Bericht 1983-1984. **24**: 1-38
- Krosigk, E. von (1988): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **36**. Bericht 1985-1987. **27**: 173-225
- Krosigk, E. von (1991): Bestandszählungen an Schnatterenten *Anas strepera* im Ismaninger Teichgebiet **30**: 151-158
- Krosigk, E. von (1992): Das Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **37**. Bericht 1988-1991. **31**: 97-135
- Krosigk, E. von (1998): Das Europareservat Ismaninger Teichgebiet. **38**. Bericht: 1992-1993. **37**: 169-201
- Krosigk, E. von & Köhler, P. (2000): Langfristige Änderungen von Abundanz und räumlicher Verteilung mausernder Wasservogelarten nach Änderungen von Trophiestatus, Fischbesatz und Wasserstand im Ramsar-Gebiet Ismaninger Speichersee mit Fischteichen **39**: 135-158
- Krosigk, E. von s. Köhler, U. (2000)
- Krosigk, E. von s. Bezzel, E. (1966)
- Krosigk, E. von s. Köhler, U. (1997)
- Kroymann, B. & Mattes, H. (1972): Der Bestand von Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) und Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) auf der Hochfläche der Südwestalb. **11**: 64-69
- Kroymann, B. (1970): Der Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) in Baden-Württemberg. **9**: 120-133
- Kroymann, B. (1973): Beitrag zur Kenntnis der Brutverbreitung einiger Vogelarten im Bereich der Hochalb. – Mit Notizen zur Rufaktivität der Wachtel (*Coturnix coturnix*). **12**: 214-236
- Kroymann, B. (1975): Ein Brutvorkommen der Rohrammer *Emberiza schoeniclus* auf der Hochalb. **14**: 313-314
- Kroymann, B. s. Bodenstein, G. (1967)
- Krüger, R., Klein, H., Hoh, E. & Leuchs, O. (1999): Die Wiesenweihe *Circus pygargus* – Brutvogel der Mainfränkischen Platten. **38**: 1-10
- Kuhk, R. (1965): Skuas (*Stercorarius skua*) mit britischen Ringen 1963 und 1964 in Niederbayern, Österreich und Sachsen. **7**: 493
- Kuhk, R. (1966): Aus der Sinneswelt des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*). **7**: 714-716
- Kühlhorn, F. (1938): Über das Vorkommen der Weindrossel (*Turdus musicus* L.) in Bayern. **3**: 29
- Kühlhorn, F. (1941): Beobachtungen über den Schlafrhythmus der Amsel (*Turdus merula* L.). **3**: 153-155
- Kühlhorn, F. (1954): Ornithologische Studien aus Süd-Mattogrosso. **4**: 173-183
- Kuhn, J. (1994): Balzendes Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla* am Schmiechener See (Württemberg). **33**: 70-71
- Kulzer, E. s. Jud, E. (1975)
- Kumerloeve, H. & Lehmann, H. (1968): Zum Status des Würgfalken (*Falco cherrug* Gray, 1834) in Kleinasien. **8**: 286-289
- Kumerloeve, H. (1955): Sperlingsbekämpfung in Bayern zur Zeit Maximilian Josephs (18. Jh.). **4**: 371-373
- Kumerloeve, H. (1956): Zwei bemerkenswerte bayrische Beizjagdurkunden aus dem 16. Jahrhundert. **4**: 457-459

- Kumerloeve, H. (1956): Niederjagd und Vogelschutz in Bayern im 17./18. Jahrhundert. **4**: 459-462
- Kumerloeve, H. (1956): Lokale oder allgemeine Bestandssteigerung beim Augensteinigoldhähnchen im Frühjahr/Sommer 1955? **4**: 462
- Kumerloeve, H. (1957): Zur Verbreitungsgrenze des Gelbsteißbülbüls in Kleinasien. **4**: 574-576
- Kumerloeve, H. (1957): Brutvogelbeobachtungen bei Savastepe und Bergama (NW-Anatolien). **4**: 712-720
- Kumerloeve, H. (1958): Zur Verbreitung von *Streptopelia decaocto decaocto* (Friv.) in der Türkei. **5**: 17-26
- Kumerloeve, H. (1958): Vom Dornbuschspötter, *Hippolais languida* (Hemprich & Ehrenberg), im Hatay (türkisch-syrischer Grenzgebiet). **5**: 137-141
- Kumerloeve, H. (1963): Auffällige Rötelfalkenvergesellschaftung (*Falco naumanni*) und Bemerkungen zum Vorkommen des Rotfußfalken (*Falco vespertinus*) in der asiatischen Türkei. **6**: 463-465
- Kumerloeve, H. (1967): Zum Brutvorkommen der Samtente, *Melanitta fusca* (L.), im transkaukasisch-(armenisch)-nordostkleinasiatischen Hochland. **8**: 63-65
- Kumerloeve, H. (1983): Massendurchzug von Bergfinken *Fringilla montifringilla* am Ammersee Anfang Dezember 1982. **22**: 111-112
- Kurella, H. (1931): Zu B. Rensch's Buch: Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung. **2**: 135-138
- Kurth, D. (1970): Der Turmfalke (*Falco tinnunculus*) im Münchener Stadtgebiet. **9**: 2-12
- Kurz, H. s. Trawöger, E. (1986)
- Küsthardt, K. (1932): Kurze ornithologische Beobachtungen in Diezlings im Vorarlberg zwischen Lindau und Bregenz am Bodensee in der Zeit vom 15. Juli bis 8. August 1931. **2**: 166-167
- Lainer, H. s. Schmitt, M. (1961)
- Landgraf, G. & Landgraf, W. (1978): Neue Beobachtungen von Birkenzeisigen *Acanthis flammea* in Regensburg und im nördlichen Alpenvorland. **17**: 330-332
- Landgraf, G. & Landgraf, W. (1979): Nestfund des Birkenzeisigs *Acanthis flammea* in Regensburg. **18**: 191
- Landgraf, W. s. Landgraf, G. (1978)
- Landgraf, W. s. Landgraf, G. (1979)
- Landmann, A. (1978): Bemerkenswerter Totfund der Zwergohreule *Otus scops* in den Öztaler Alpen (Nordtirol). **17**: 180-181
- Landmann, A. (1979): Zur Überwinterung des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* in Nordtirol. **18**: 183-184
- Landmann, A. & Goller, F. (1983): Erster Nachweis der Eismöwe *Larus hyperboreus* in Nordtirol. **22**: 121-122
- Landmann, A. & Landmann, C. (1978): Zur Siedlungsbiologie der Rauchschnalbe *Hirundo rustica* und Mehlschnalbe *Delichon urbica* in der Unteren Schranne, Nordtirol. **17**: 247-265
- Landmann, C. s. Landmann, A. (1978)
- Lang, A., Müller, A., Lange, F. & Lange, A. (1999): Der Starnberger See als Rast- und Überwinterungsgewässer für die Kolbenente *Netta rufina* von 1966 bis 1998. **38**: 21-30
- Lang, M. (1972): Feststellung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im nördlichen Fichtelgebirge. **11**: 319-320
- Lange, A. s. Lang, A. (1999)
- Lange, A. s. Müller, A. (1989)
- Lange, A. s. Müller, A. (1990)
- Lange, A. s. Pilstl, F. (1989)
- Lange, F. s. Lang, A. (1999)
- Langer, W. (1988): Die Vögel des NSG Königsau. **27**: 265-273
- Langer, W. (1989): Schreiadler *Aquila pomarina* im Feilenmoos. **28**: 67-68
- Langer, W. (1992): Bienenfresser *Merops apiaster* bei Ingolstadt. **31**: 79
- Lankes, K. (1925): Die Weißwangengans (*Brantha leucopsis* (Bechst.)) in Schwaben. **1**: 85
- Lankes, K. (1926): Verspätete Brut? **1**: 100
- Lankes, K. (1927): Ornithologisches aus dem Bayerischen Walde (Niederbayern). – Nachtrag. **1**: 115-119
- Lankes, K. (1929): Ornithologisches aus Oberbayern. **2**: 31-33
- Lankes, K. (1929): Ornithologisches aus Oberbayern. [Drosselrohrsänger] **2**: 34
- Lankes, K. (1930): Ornithologisches aus dem Bayerischen Walde (Niederbayern). **2**: 110-112
- Lankes, K. (1932): Ornithologisches aus Bulgarien. **2**: 151-152
- Laubender, H. s. Bosch, J. (1978)

- Laubmann, A. (1922): Beiträge zur Kenntnis der Mauser bei *Corvus f. frugilegus* L. 1: 55-56
- Laubmann, A. (1922): Der Gänsesäger (*Mergus m. merganser* L.) brütend im Allgäu. 1: 57
- Laubmann, A. (1922): Ein neuer Brutplatz des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus a. arundinaceus* (L.)) im bayerischen Allgäu. 1: 48
- Laubmann, A. (1922): Zwei neue Rassen aus dem Formenkreis *Chloroceryle americana*. 1: 50-54
- Laubmann, A. (1924): Die Tafelente (*Nyroca f. ferina* (L.)) brütend im Allgäu. 1: 65
- Laubmann, A. (1924): Zur Nomenklatur der Alcedinidae. 1: 68-69
- Laubmann, A. (1925): Über eine neue Rasse von *Alcedo semitorquata* Swains. 1: 74-75
- Laubmann, A. (1925): Die Tafelente (*Nyroca f. ferina* (L.)) als Brutvogel im Allgäu. 1: 83-84
- Laubmann, A. (1926): Über eine neue Rasse von *Alcedo* (*Ispidella*) *leucogaster*. 1: 89-91
- Laubmann, A. (1926): Bemerkungen über *Alcedo coerulescens* Vieill. 1: 94-96
- Laubmann, A. (1926): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung *Todirhamphus* Less. 1: 98-100
- Laubmann, A. (1926): Zum Brutvorkommen der Tafelente (*Nyroca f. ferina* (L.)) im Allgäu. 1: 100-101
- Laubmann, A. (1927): Nochmals das Brüten der Tafelente (*Nyroca f. ferina* (L.)). 1: 121
- Laubmann, A. (1928): Über eine neue Rasse von *Drepanorhynchus reichenowi* Fischer. 1: 127-128
- Laubmann, A. (1930): Zum Vorkommen der Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne r. rupestris* [Scop.]) in Bayern. 2: 87-90
- Laubmann, A. (1932): Ein Gryllsteist (*Uria g. grylle* (L.)) in Bayern erlegt. 2: 167
- Laubmann, A. (1932): Zur Kenntnis von *Pyrrhura borellii* Salvadori. 2: 212-219
- Laubmann, A. (1933): Über Eisvögel aus Paraguay. 2: 267-275
- Laubmann, A. (1933): Nachweise seltener Vogelarten für das Allgäu. 2: 280
- Laubmann, A. (1933): Basstölpel (*Sula bassana* (L.)) neu für Bayern. 2: 280
- Laubmann, A. (1933): Beiträge zur Avifauna Paraguays. 2: 287-302
- Laubmann, A. (1934): Dr. Ernst Hartert †. 2: 309-310
- Laubmann, A. (1937): Ein zweiter Nachweis von *Accipiter pectoralis* (Bonaparte) in Paraguay. 2: 405-406
- Laubmann, A. (1938): Vorkommen der Heidelerche (*Lullula a. arborea* [L.]) bei Bernried, Starnberger See. 3: 13-14
- Laubmann, A. (1938): Zweiter Brutnachweis für die Reiherente (*Nyroca fuligula* [L.]) in Bayern. 3: 27-28
- Laubmann, A. (1938): Eiderente (*Somateria m. mollissima* [L.]) in Bayern. 3: 29
- Laubmann, A. (1939): Der Adlerbussard (*Buteo r. rufinus* Cretzschmar) mit Sicherheit für Bayern belegt. 3: 42-44
- Laubmann, A. (1941): Alcedinidologica I. (Die Gattungen *Ramphalcyon* und *Ceryle*). 3: 109-126
- Laubmann, A. (1951): Über Saatkrähen-Kolonien im engeren Randgebiet von München. 4: 29-30
- Laubmann, A. (1954): Bemerkung zur Nomenklatur der Gattung *Serinus* Koch 1816. 4: 132
- Laubmann, A. (1957): Kraniche am Südrand von München. 4: 711
- Laubmann, A. s. Diesselhorst, G. (1940)
- Laussmann, H. (1992): Zum Wandel der Habitatwahl des Weißsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneacula* im Maintal. 31: 171-172
- Laussmann, H. (1996): Interspezifische Auseinandersetzungen zwischen Blässhuhn *Fulica atra* und Teichhuhn *Gallinula chloropus* mit tödlichem Ausgang. 35: 91-92
- Lechner, F. (1960): Die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) auch in Garmisch-Partenkirchen. 5: 602
- Lechner, F. (1967): Steinadler, *Aquila chrysaetos*, kröpft im Fluge. 8: 68-69
- Lechner, F. & Schöpf, H. (1967): Zur Ernährung eines Waldohreulenbrutpaares (*Asio otus*) im Murnauer Moos. 8: 182-183
- Lechner, F. s. Brandt, H. (1963)
- Lechner, F. s. Ranftl, H. (1974)
- Lehmann, E. von (1956): Ornithologisches aus dem Erzgebirge vor 300 Jahren. 4: 453-457
- Lehmann, H. s. Kumerloewe, H. (1968)
- Leibl, F. (1983): Schelladler *Aquila clanga* bei Straubing. 22: 227-228
- Leibl, F. (1986): Eine Skua *Stercorarius skua* nördlich von Straubing. 25: 103-104

- Leibl, F. (1986): Erneute Beobachtung von Polarbirkenzeisigen *Acanthis hornemanni* in Ostbayern. **25**: 228
- Leibl, F. (1987): Rote Liste bedrohter Brutvogelarten der Oberpfalz. **26**: 199-207
- Leibl, F. (1988): Ökologisch-faunistische Untersuchungen an Vögeln in Windwurfflächen im Nationalpark Bayerischer Wald. **27**: 227-264
- Leibl, F. (1989): Schwarzstorchverluste *Ciconia nigra* an Freileitungen. **28**: 72-73
- Leibl, F. (1993): Bestandsentwicklung und Verbreitung der Uferschnepfe *Limosa limosa* im ostbayerischen Donautal zwischen Pfatter und Straubing in den Jahren von 1972 bis 1991. **32**: 17-21
- Leibl, F. (1994): Auftreten und Verbreitung des Karmingimpels *Carpodacus erythrinus* in der Oberpfalz. **33**: 27-30
- Leibl, F. (1995): Zur Bedeutung des ostbayerischen Donautes als Rast- und Überwinterungsgebiet für die Schnatterente *Anas strepera*. **34**: 163-164
- Leibl, F. (1997): Bestandsentwicklung der Saatkrähe *Corvus frugilegus* im Stadtgebiet von Straubing in den Jahren 1977 bis 1996. **36**: 197-201
- Leibl, F. (1999): Bestandsentwicklung und Brutbiologie des Haubentauchers *Podiceps cristatus* in einem ostbayerischen Kiesabbaugebiet. **38**: 177-188
- Leibl, F. & Hagemann, P. (1997): Erfolgreiche Bruten von Seiden- (*Egretta garzetta*), Nacht- (*Nycticorax nycticorax*) und Purpurreiher (*Ardea purpurea*) im ostbayerischen Donautal. **36**: 45-49
- Leibl, F. & Melchior, F. (1985): Durchzug und Brutbestand der Saatkrähe *Corvus frugilegus* im Stadtgebiet von Straubing. **24**: 125-133
- Leibl, F. & Vidal, A. (1991): Zur Situation des Nachtreihers *Nycticorax nycticorax* im ostbayerischen Donautal zwischen Regensburg und Straubing. **30**: 21-26
- Leibl, F. & Wolf, T. (1993): Schelladler *Aquila clanga* in Nordostbayern. **32**: 161-162
- Leibl, F. s. Bönisch, R. (1991)
- Leibl, F. s. Vidal, A. (1992)
- Leisler, B. (1973): Erstnachweis des Mariskensängers (*Acrocephalus melanopogon*) am Bodensee. **12**: 81
- Leitenbacher, G. s. Robel, K. (1993)
- Lenz, T. (1992): Brutversuch der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* am Egglburger See bei Ebersberg. **31**: 69-70
- Lepel, J. (1931): Können Kohlmeise, Rotschwanz und Schwalbe unseren Bienen gefährlich werden? **2**: 128-130
- Leuchs, O. s. Krüger, R. (1999)
- Leuzinger, H. s. Jacoby, H. (1972)
- Lieder, K. (1992): Ein mögliches Brutvorkommen des Steinrötels *Monticola saxatilis* 1990 in Oberbayern. **31**: 179-180
- Lille, R. & Moritz, V. (1975): Das Brutvorkommen der Bartmeise, *Panurus biarmicus*, in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. **14**: 300-303
- Limbrunner, A. (1979): Erstnachweis der Fortpflanzung des Häherkuckucks *Clamator glandarius* in Griechenland. **18**: 84-85
- Link, H. (1969): Ungewöhnlich kurze Brutdauer beim Schwarzmilan (*Milvus migrans*). **8**: 633
- Link, H., Mattern, U. & J. Werzinger (1969): Erste Ergebnisse einer Bestandsaufnahme der beiden Milanarten (*Milvus milvus* und *M. migrans*) in Nordbayern. **8**: 625-629
- Link, H. s. Kaus, D. (1971)
- Lissak, F. & Lissak, W. (1985): Neuer Nachweis des Bienenfressers *Merops apiaster* in Oberschwaben. **24**: 180-181
- Lissak, W. (1986): Gemeinschaftlicher Beuteerwerb von Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilanen *M. migrans*. **25**: 222-224
- Lissak, W. s. Lissak, F. (1985)
- Lohmann, M. (1961): Chiemsee-Jahresbericht 1960. **6**: 150-153
- Lohmann, M. (1961): Eine Rohrschwirl-Ansiedlung in Oberbayern. **6**: 154-156
- Lohmann, M. (1962): Sozialverhalten und ökologische Ansprüche des Rotfußfalken, *Falco vespertinus* L., auf dem Zug. **6**: 269-272
- Lohmann, M. (1985): Brut des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* am Chiemsee. **24**: 185-186
- Lohmann, M. (1986): Weitere Bruten des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* in Südostbayern. **25**: 226
- Lohmann, M. (1986): Weitere Beobachtungen am Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* in Südostbayern. **25**: 227
- Lohmann, M. (1986): Rötelschwalbe *Hirundo daurica* am Chiemsee. **25**: 227-228

- Lohmann, M. (1988): Weißkopfmöwe *Larus calchinnans* brütete 1987 auch am Chiemsee. **27**: 296-297
- Lohmann, M. (1991): Ornithologischer Jahresbericht 1990: Chiemsee (Oberbayern). **30**: 65-71
- Lohmann, M. (1992): Zur Dokumentation und Meldung seltener Arten. **31**: 87-88
- Lohmann, M. (1992): Die Liste der Bayerischen Seltenheiten-Kommission. **31**: 88-89
- Lohmann, M. (1995): Sind Wasservögel am Schilfrückgang beteiligt? **34**: 145-150
- Lohmann, M. & Hohlt, G. (1989): Erste Brutnachweise für Gänsesäger *Mergus merganser* und Schellente *Bucephala clangula* am Chiemsee. **28**: 66-67
- Lohmann, M. s. Biebach, H. (1965)
- Lohmann, M. s. Hohlt, G. (1960)
- Lohmann, M. s. Hohlt, G. (1987)
- Löhrl, H. (1966): Einige Zahlen zur Brutbiologie des Kleibers (*Sitta europaea*). **7**: 717-722
- Löhrl, H. (1970): Der Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) beim Sammeln und Knacken von Nüßchen der Zirbelkiefer (*Pinus cembra*). **9**: 185-196
- Löhrl, H. (1971): Wie lange sind Totalalbinos lebensfähig? **10**: 1-6
- Löhrl, H. (1972): Zum Nahrungserwerb beim Buntspecht (*Dendrocopos major*). **11**: 248-253
- Löhrl, H. (1972): Zur Lage der Bruthöhlen beim Mittelspecht (*Dendrocopos medius*). **11**: 314
- Löhrl, H. s. Bezzel, E. (1972)
- Loy, H. s. Zahner, V. (2000)
- Luce, J. s. Trellinger, K. (1971)
- Lüdtke, A. (1966): Einige Beobachtungen zum Nahrungserwerb, Nestbau und Neststandort der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*). **7**: 855-857
- Ludwig, J. s. Helbig, A. (1986)
- Lukowicz, M. von s. Keller, T. (1996)
- Magerl, C. (1978): Erneut Schlangennadler *Circus gallicus* zur Brutzeit in Bayern. **17**: 178
- Magerl, C. (1981): Bestandsaufnahme und Untersuchungen zur Habitatstruktur des Großen Brachvogels *Numenius arquata* im nordöstlichen Erdinger Moos. **20**: 1-34
- Mahler, S. & Mahler, U. (1973): Verlegen des Geleges beim Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*). **12**: 80
- Mahler, U. s. Mahler, S. (1973)
- Mandheim, H. (1937): Fressen Haubentaucher Frösche? **2**: 446-448
- Mann, W. & Brandl, R. (1987): Der Wert von Zufallsbeobachtungen zur Abschätzung von Bestandstrends. **26**: 221-227
- Mann, W. s. Stickroth, H. (1991)
- Mann, W., Schmidtke, K. & R. Brandl (1987): Gibt es einen Bestandsrückgang beim Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*? **26**: 229-235
- Martens, J. (1963): Offenes Gelände als Brutbiotop von Mäusebussard (*Buteo buteo*) und Schwarzem Milan (*Milvus migrans*). **6**: 454-458
- Martens, J. & S. Eck (2000): Der *Seicercus burkii*-Komplex im Himalaya und China oder: Schätzen wir die Diversität der Singvögel falsch ein? **39**: 1-14
- Mattern, U. (1967): Ornithologische Herbstbeobachtungen auf Korfu. **8**: 166-171
- Mattern, U. (1969): Zu Brutvorkommen und Ökologie des Ortolans (*Emberiza hortulana*) in Bayern. **8**: 593-603
- Mattern, U. s. Kraus, M. (1972)
- Mattern, U. s. Link, H. (1969)
- Mattes, H. s. Kroymann, B. (1972)
- Mattes, H. s. Gatter, W. (1973)
- Mauersberger, G. (1993): Bartgeier *Gypaetus barbatus* 1798 bei Berchtesgaden. **32**: 166
- Mebs, T. (1953): Der Uhu (*Bubo b. bubo* L.) im Fränkischen Jura. **4**: 67-69
- Mebs, T. (1955): Zum Brutvorkommen des Wanderfalken (*Falco peregrinus germanicus* Erlang.) in Süddeutschland. **4**: 343-362
- Mebs, T. (1957): Der Uhu (*Bubo b. bubo* L.) in Bayern. **4**: 499-521
- Mebs, T. (1959): Der Weiße Storch (*Ciconia ciconia*) in Unterfranken. **5**: 203-205
- Mebs, T. (1959): Der Bestand des Weißen Storches in Mittelfranken im Jahre 1958. **5**: 206-208
- Mebs, T. (1960): Die Zwergohreule (*Otus scops*) als Brutvogel an der Halburg bei Volkach/Main. **5**: 584-590
- Mebs, T. (1969): Der Bestand des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Franken 1965-1967 im Vergleich mit den Ergebnissen früherer Zählungen. **8**: 463-472
- Mebs, T. (1972): Zur Biologie des Uhus (*Bubo bubo*) im nördlichen Frankenjura. **11**: 7-25

- Mebs, T. (1975): Zum Vorkommen des Mauerläufers *Tichodroma muraria* im nördlichen Frankenjura, speziell in der Fränkischen Schweiz. **14**: 304-307
- Melchior, F. s. Leibl, F. (1985)
- Merkel, H. (1973): Brutpflege bei der Amsel (*Turdus merula*) durch 2 Weibchen. **12**: 140
- Mey, E. (1997): Leben auf dem Riesensee adler *Haliaeetus pelagicus* zwei *Degeeriella*-Arten (Insecta, Phthiraptera, Ischnocera)? Mit Anmerkungen zur Biographie G.W. Stellers. **36**: 1-18
- Meyer, H. (1990): Harembildung beim Rauhfußkauz *Aegolius funereus*. **29**: 65-67
- Meyer, H. (1993): Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* nutzt für den Rauhfußkauz *Aegolius funereus* aufgehängte Nistkästen im Winter. **32**: 164-165
- Meyer, H. (1999): Ein neuer Verbreitungsschwerpunkt des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* auf der Münchner Schotterebene. **38**: 50-51
- Meyer, H. (1999): Bemerkenswerter Ringfund in einem Rauhfußkauz-Nistkasten. **38**: 52-53
- Meyer, H. s. Gleixner, K. H. (1992)
- Meyer, H., Gleixner, K.-H. & S. Rudroff (1998): Untersuchungen zu Populationsdynamik, Brutbiologie und Verhalten des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* bei Hof und München. **37**: 81-107
- Mickley, M. s. Hölzinger, J. (1970)
- Mickley, M. s. Hölzinger, J. (1973a,b,c)
- Mickley, M. s. Hölzinger, J. (1975)
- Mieslinger, N. (1988): Kraniche *Grus grus* überfliegen das Steinerne Meer im Königssee-Gebiet. **27**: 295-296
- Mieslinger, N. (1989): Kormorane *Phalacrocorax carbo* in der Röth im Nationalpark Berchtesgaden. **28**: 75-76
- Mieslinger, N. (1997): 50 Jahre Vogelbeobachtungen am Inn zwischen Wasserburg und Rosenheim. **36**: 159-176
- Model, N. & Otremba, W. (1985): Brutvorkommen der Zippammer *Emberiza cia* am Kallmuth bei Homburg am Main. **24**: 177-179
- Model, N. & Schmöller, K. (1997): Brutversuch der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* im Feilenmoos südöstlich von Ingolstadt. **36**: 206-208
- Möhrlein, E. s. Bönisch, R. (1991)
- Möhrlein, E. s. Bönisch, R. (1993)
- Mörrike, K. (1963): Beobachtungen am Ohridsee (Mazedonien). **6**: 466-467
- Moritz, V. s. Lille, R. (1975)
- Mühlhäußer, G. (1980): Beeren des Seidelbastes *Daphne mezereum* zur Jungenaufzucht beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. **19**: 190
- Müller, A. (1986): Zweiter Nachweis des Gelbschnabeistauchers *Gavia adamsii* für den Starnberger See. **25**: 228-230
- Müller, A. (1986): Verluste bei Rauchschnalben *Hirundo rustica* durch Vereisung der Schwanzspieße. **25**: 233-238
- Müller, A. (1989): Rothalstaucher *Podiceps grise-gena* ertrank in mindestens 35 Meter Tiefe im Starnberger See. **28**: 139-142
- Müller, A. s. Bär, U. (1993)
- Müller, A. s. Lang, A. (1999)
- Müller, A. s. Schütt, R. (1986)
- Müller, A., Lange, A. & F. Pilstl (1989): Der Starnberger See als Rast- und Überwinterungsgewässer für See- und Lappentaucher (Teil I). **28**: 85-115
- Müller, A., Lange, A. & F. Pilstl (1990): Der Starnberger See als Rast- und Überwinterungsgewässer für See- und Lappentaucher (Teil II). **29**: 97-138
- Müller, A. K. (1922): Materialien für Oberbayern. **1**: 56-57
- Müller, A. K. (1925): Beobachtungen am Herzogstand. **1**: 80
- Müller, A. K. (1927): Beobachtungen zwischen Kufstein und dem Scheffauer Kaiser. **1**: 110
- Müller, A. K. (1927): Beobachtungen im Zillertal. **1**: 110-111
- Müller, A. K. (1927): Ornithologisches aus der näheren und weiteren Umgebung Münchens. **1**: 112-114
- Müller, A. K. (1929): Einiges von der Alpenbraunelle (*Prunella c. collaris* (Scop.)). **2**: 24-25
- Müller, A. K. (1930): Beobachtungen in Tirol. **2**: 100-101
- Müller, A. K. (1930): Materialien aus Oberbayern. **2**: 107-108
- Müller, A. K. (1930): Auswirkungen des Winters 1929 im Bestande der Vogelwelt des Wendelsteingebirges. **2**: 109
- Müller, A. K. (1931): Vogelzug im Hochgebirge. **2**: 127-128
- Müller, A. K. (1932): Materialien aus Oberbayern. **2**: 162-163

- Müller, A. K. (1938): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 8. Bericht 1937. 3: 14-17
- Müller, A. K. (1938): VIII. Nachtrag zum Maisinger See. 3: 17-18
- Müller, A. K. (1938): Materialien aus Oberbayern. 3: 28
- Müller, A. K. (1939): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 9. Bericht 1938. 3: 46-51
- Müller, A. K. (1940): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 10. Bericht 1939. 3: 61-64
- Müller, A. K. (1940): Große Rohrdommel am Maisinger See brütend. 3: 97
- Müller, A. K. (1941): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 11. Bericht 1940. 3: 146-151
- Müller, A. K. (1941): IX. Nachtrag zum Maisinger See. 3: 151-153
- Müller, A. K. (1953): Melanismus beim Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.). 4: 75
- Müller, A. K. (1953): Stoßtauchende Raubseeschwalbe. 4: 75
- Müller, A. K. (1953): Die Rufe des Berghänflings *Carduelis flavirostris* (L.). 4: 76
- Müller, A. K. (1955): X. Nachtrag zum "Maisinger See" 4: 297-310
- Müller, A. K. (1959): Bastarde zwischen Halsband- und Trauerschnäpper (*Muscicapa albicollis* × *Muscicapa hypoleuca*). 5: 217-218
- Müller, A. K. (1960): Beobachtungen im Wendelsteingebiet. 5: 600
- Müller, A. K. (1960): Weißrückenspecht im Kaisertal. 5: 600
- Müller, A. K. (1960): Weißflügelseeschwalbe (*Hydrochelidon leucoptera*) auf dem Zuge. 5: 601
- Müller, A. K. (1962): Zur Biologie des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*). 6: 359-361
- Müller, A. K. (1963): Über den Gesang der Weidenmeise (*Parus montanus* Baldenstein). 6: 541-545
- Müller, A. K. (1965): Weitere Beiträge zur Biologie des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*). 7: 333-335
- Müller, A. K. (1966): Vogeldialekte im Kanton Wallis (Schweiz). 7: 723-725
- Müller, A. K. (1979): Zur Verbreitung einiger Brutvögel in der subalpinen und alpinen Stufe der Penninischen Alpen im Kanton Wallis. 18: 49-62
- Müller, F. (1985): Zur Quantifizierung des Gesangs der Wachtel *Coturnix coturnix*. 24: 79-80
- Müller, G. s. Bezzel, E. (1964)
- Müller, J. (1997): Der Durchzug des Fischadlers *Pandion haliaetus* am Altmühlsee in den Jahren 1993-1996. 36: 39-44
- Müller, K. s. Schuster, S. (1976)
- Müller, W. s. Gatter, W. (1977)
- Münch, H. (1979): Beobachtung von Hakengimpeln, *Pinicola enucleator* (L.) im Thüringerwald. 18: 63-65
- Murr, F. (1922): Felsenschwalben (*Ptyonoprogne r. rupestris* (Scop.)) im Naturschutzgebiet am Königssee. 1: 54
- Murr, F. (1929): Der Steinsperling (*Petronia petronia* subsp.) in den Berchtesgadener Alpen. 2: 29-31
- Murr, F. (1938): Zur Avifauna der bayerischen Alpen. Materialien aus den Jahren 1935-1937. 3: 18-24
- Murr, F. (1938): Neues vom Uhu (*Bubo b. bubo* [L.]) aus den bayerischen Alpen. 3: 24-27
- Murr, F. (1939): Wieder eine Rotdrossel, *Turdus m. musicus* L., am Jochberg. 3: 44
- Murr, F. (1939): Nimmt der Kolkrabe, *Corvus c. corax* L., in den bayerischen Alpen zu? 3: 44-46
- Murr, F. (1941): Heringsmöwe in Bayern beobachtet. 3: 158-159
- Murr, F. (1954): Ein weiteres deutsches Vorkommen der Felsenschwalbe *Riparia rupestris* Scopoli. 4: 143-146
- Murr, F. (1954): Überwinternde Hausrotschwänze, *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Gmelin) im Gebirge. 4: 171-172
- Murr, F. (1957): Zur Kulturfolge der Alpendohle, *Pyrrhocorax graculus* im Berchtesgadener Gebiet. 4: 536-538
- Murr, F. (1958): Rotfußfalken in Bad Reichenhall durchziehend. 5: 152-153
- Nachtigall, W. (1986): Taubenflug im Windkanal: Was kann man über Energetik, Wärmeabgabe und Wasserhaushalt beim Langstreckenflug lernen? 25: 137-153
- Naumann, O. (1932): Bemerkungen über neue und ungenügend bekannte Rassen paläarktischer Vögel. 2: 145-150

- Naumann, O. (1932): Zwei neue zentralafrikanische Astrilde. **2:** 153-155
- Naumann, O. (1934): Drei neue geographische Rassen aus dem paläarktischen Gebiet. **2:** 331-334
- Nebelsiek, U. (1962): Herbst- und Winterbeobachtungen 1961 aus dem südlichen Ammerseegebiet. **6:** 280-282
- Nebelsiek, U. (1963): Limikolenzug am Süden- de des Ammersees im Verlaufe eines Jahres (Juni 1962 – Juni 1963). **6:** 562-564
- Nebelsiek, U. (1966): Das Schicksal der Flußsee- schwalbe (*Sterna hirundo*) und der Lachsee- schwalbe (*Gelochelidon nilotica*) als Brutvögel Bayerns. **7:** 823-846
- Neub, M. (1973): Birkenzeisig-Invasion (*Carduelis flammea*) 1972/73 in Baden-Württemberg. **12:** 248-255
- Neunzig, R. (1927): Neue *Ploceus*-Rassen. **1:** 104-105
- Neunzig, R. (1928): Formenkreis *Passer luteus*. **1:** 137-139
- Niethammer, G. (1958): Das Schicksal des Schot- tischen Moorschneehuhnes auf dem Festland. **5:** 142-148
- Niethammer, G. (1966): Zur Vogelwelt Kretas nach Winterbeobachtungen. **7:** 726-731
- Niethammer, G. s. Jordans, A. von (1957)
- Nigmann, G. & Stickroth, H. (1994): Nachweis eines Karmingimpels *Carpodacus erythrinus* im Frankenwald. **33:** 73-74
- Nitsche, G. & Rudolph, B.-U. (1995): Habitat und Siedlungsdichte des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* in einem oberbayerischen Hoch- moorkomplex. **34:** 53-59
- Nitsche, G. (1964): Rabenkrähe (*Corvus corone*) trägt Beute mit den Füßen. **7:** 198-199
- Nitsche, G. (1965): Neuer Brutplatz des Rot- schenkels (*Tringa totanus*) in Südbayern. **7:** 492-493
- Nitsche, G. (1967): Große Raubmöwe (*Stercorarius skua*) am Chiemsee und ihr Vorkommen in Bayern. **8:** 66-67
- Nitsche, G. (1968): Die Vogelwelt des Eggstät- ter Seengebietes. **8:** 321-348
- Nitsche, G. (1978): Brutnachweis des Gänsesä- gers *Mergus merganser* an der oberen Wertach. **17:** 182
- Nitsche, G. (1979): Planbeobachtungen zur Frühjahrsrast des Rotkehlpiepers *Anthus cer- vinus* nördlich von München. **18:** 145-160
- Nitsche, G. (1986): Ein weiterer Brutplatz des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* im Alpen- vorland. **25:** 224-225
- Nitsche, G. (1992): Zur Situation der Flußsee- schwalbe *Sterna hirundo* in Bayern 1979-1991. **31:** 137-150
- Nitsche, G. (1993): Brutvorkommen der Hohl- taube *Columba oenas* in den Schlierseer Ber- gen (Bayerische Alpen). **32:** 129-139
- Nitsche, G. (1995): Ein Nachtrag zu: Brutvor- kommen der Hohлтаube *Columba oenas* in den Schlierseer Alpen (Bayerische Alpen). **34:** 70-71
- Nitsche, G. s. Scheuerlein, A. (1994)
- Noe, A. (1983): Birkenzeisige *Acanthis flammea* mit Jungen in München. **22:** 110-111
- Noe, A. & Noe, W. (1985): Möwenverluste bei extremer Winterkälte im Januar 1985 an der Isar in München. **24:** 88-89
- Noe, W. s. Noe, A. (1985)
- Nothdurft, W. (1972): Brut des Fichtenkreuz- schnabels (*Loxia curvirostra*) im südlichen Baden-Württemberg. **11:** 185-189
- Nothdurft, W. (1972): Brut des Zitronengirlit- zes (*Serinus citrinella*) in Oberschwaben. **11:** 315-316
- Nothdurft, W. (1974): Beitrag zum Vorkommen des Fichtenkreuzschnabels *Loxia curvirostra* in Oberschwaben von 1968 bis 1972. **13:** 47-55
- Nothdurft, W. (1976): Sommervorkommen schwarzgrauer Aaskrähen *Corvus corone* in Oberschwaben von 1968 bis 1971. **15:** 65-68
- Nothdurft, W. (1978): Ungewöhnliche Verhar- zungen bei einem Kleiber *Sitta europaea*. **17:** 183-185
- Oertel, E. (1932): Können Meisen den Bienen gefährlich werden? **2:** 153
- Oertel, E. (1934): Zur Arbeit von Hans Stadler "Über Vogelrufe" **2:** 322
- Onken, A. (1966): Zum Fischen und Schnee- baden von Rabenvögeln. **7:** 866-867
- Ortlieb, R. (1971): Stadtbrut des Kolkra- ben (*Corvus corax*) in Ravensburg. **10:** 186-187
- Otremba, W. s. Model, N. (1985)
- Ottenberger, K. (1983): Beobachtungen am Baumfalken *Falco subbuteo* in einem Brutrevier am Stadtrand von München. **22:** 197-210

- Ottenberger, K. (1995): Beobachtungen am Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*). **34**: 166-168
- Partsch, H. s. Greiner, H. (1976)
- Pechacek, P. (1994): Brutavifauna naturnaher Waldparzellen im Nationalpark Berchtesgaden. **33**: 1-9
- Pechacek, P. (1995): Verhalten des Dreizehenspechts *Picoides tridactylus* an der Bruthöhle in der Fütterungsphase der Nestlinge. **34**: 139-144
- Pelchen, H. (1998): Aus dem Verhalten verstädterter Kolbenenten *Netta rufina* am Kleinhesseloher See in München. **37**: 46-54
- Pfeifer, E. (1982): Rötelschwalben *Cecropis daurica* im Stadtgebiet von München. **21**: 179
- Pfeifer, R. (1988): Außergewöhnlich starke Heimzugsansammlung des Goldregenpfeifers *Pluvialis apricaria* bei Bayreuth. **27**: 291-292
- Pfeifer, R. (1989): Zu Nahrungssituation und Bruterfolg des Weißstorches *Ciconia ciconia* an zwei Brutplätzen im Rotmaingebiet. **28**: 117-130
- Pfeifer, R. (1993): Neuer Fund eines Schwarzschnabel-Sturmtauchers *Puffinus puffinus* in Bayern. **32**: 69-71
- Pfeifer, R. (1993): Kleinräumige Unterschiede im Durchzugmuster des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos*. **32**: 141-145
- Pfeifer, R. (1995): Mögliche Ursachen für das Verschwinden des Steinrötels *Monticola saxatilis* aus Mitteleuropa. **34**: 155-158
- Pfeifer, R. (1996): Fremdstoffkonglomerate im Muskelmagen als Todesursache bei nestjungen Weißstörchen *Ciconia ciconia*. **35**: 194-197
- Pfeifer, R. (1997): Der Schwarzstorch *Ciconia nigra* in Bayern – Ausbreitungsgeschichte, Verbreitung und aktueller Status. **36**: 93-104
- Pfeifer, R. (1997): Carl Eduard Hellmayr (1878-1944) – der Begründer des "Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern". **36**: 203-205
- Pfeifer, R. & Brandl, R. (1990): Ein Massenschlafplatz des Stars *Sturnus vulgaris* in Bayreuth. **29**: 155-160
- Pfeifer, R. & Brandl, R. (1991): Der Einfluß des Wiesenmahdtermins auf die Vogelwelt. **30**: 159-171
- Pfeifer, R., Stadler, J. & R. Brandl (1997): Areal-expansion der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Kann Bayern dauerhaft besiedelt werden? **36**: 31-38
- Pfeifer, R. & Thaler, E. (1992): Ein ungewöhnlicher Nachweis des Rotfußfalcken *Falco vesper-tinus* für Nordbayern. **31**: 76-78
- Pfeifer, R. s. Kaniss, M. (1994)
- Pfeifer, S. (1928): Zur Brutbiologie von *Passer montanus* L. **1**: 142-143
- Pfister, H. & Rennau, H. (1999): Das Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 39. Bericht: 1994-1997. **38**: 73-106
- Pflüger, H.-J. s. Comtesse, H. (1976)
- Pflüger, J. s. Hölzinger, J. (1973)
- Pietsch, W. (1963): Mehrmals kopfüber hängende Rabenkrähe (*Corvus corone*). **6**: 467-468
- Pietzsch, W. (1992): Winterbeobachtung einer Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*. **31**: 81-82
- Pilstl, F. & Lange, A. (1989): Zweiter Nachweis des Eistauchers *Gavia immer* für den Starnberger See. **28**: 139
- Pilstl, F. s. Müller, A. (1989)
- Pilstl, F. s. Müller, A. (1990)
- Pinn, G. (1967): Beobachtungen über den Bruterfolg des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) im Allgäu. **8**: 175-176
- Pinn, G. (1967): Die Nahrung und Jagd des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*). **8**: 59-62
- Poetschke, G. (1989): Übersommern eines Ohrentauchers *Podiceps auritus* am Maisinger See. **28**: 146
- Pointner K. s. Hirsch, B. (1973)
- Pollheimer, J. & Pollheimer, M. (1998): Prachttäucher *Gavia arctica* erbeutet an inneralpinem Rastplatz einen Grasfrosch *Rana temporaria*. **37**: 69-70
- Poltz, W. s. Sonnabend, H. (1978)
- Poost, W. & Scherzinger, W. (1985): Prachttäucher *Gavia arctica* im Bayerischen Wald. **24**: 184-185
- Prausnitz, H. (1934): Drüsenfunktion und Gesang? **2**: 334
- Prinzinger, R. (1972): Nektar als Nahrung der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*). **11**: 322
- Prinzinger, R. (1973): Kohl- und Blaumeise (*Parus major* und *P. caeruleus*) fressen milchreife Maiskörner. **12**: 144-145

- Prinzinger, R. (1974): Untersuchungen über das Verhalten des Schwarzhalstauchers *Podiceps n. nigricollis* Brehm (1831). **13**: 1-34
- Prinzinger, R. (1976): Temperatur- und Stoffwechselregulation der Dohle *Corvus monedula* L., Rabenkrähe *Corvus c. corone* L. und Elster *Pica pica* L.; Corvidae. **15**: 1-47
- Prinzinger, R., Hölzinger, J. & G. Holzwarth (1971): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (6). **10**: 174-182
- Prinzinger, R. & Hund, K. (1975): Untersuchungen über Körpertemperatur und Stoffwechsel beim Fichtenkreuzschnabel *Loxia c. curvirostra*. **14**: 70-78
- Pudimat, K. s. Farkaschovsky, H. (1984)
- Pudimat, K. s. Walter, D. (1999)
- Puell, R. (1993): Kopfüber schlafende Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*. **32**: 78-79
- Querner, U. s. Henß, E. (1981)
- Randler, C. (1994): Hybrideinfluß von Hausenten und Zuchtformen bei semidomestizierten Stockenten *Anas platyrhynchos* – eine Studie aus dem Großraum Stuttgart. **33**: 31-35
- Randler, C. (1996): Wegzug ausgewählter Invasionsvogelarten nach stichprobenartigen Planbeobachtungen 1974-1995 im mittleren Neckarraum/ Nord-Württemberg **35**: 145-162
- Randler, C. (1998): Dynamik der Kormoranbestände am Pleidelsheimer Baggersee. **37**: 203-212
- Randler, C. (1998): Ziehender Waldbaumläufer *Certhia familiaris* am Pleidelsheimer Baggersee. **37**: 157
- Randler, C. (2000): Verbreitung, Bestand und Siedlungsdichte des Mittelspechts *Dendrocopos medius* im Stromberg, Nordwürttemberg. **39**: 197-206
- Randler, C. & Blessing, J. (1999): Invasion des Kernbeißers *Coccothraustes coccothraustes* im Herbst 1998 am Lotterberg bei Stuttgart. **38**: 161-168
- Ranftl, H. (1977): Beitrag zur Avifauna des Ampermooses. **16**: 177-185
- Ranftl, H. (1983): Der Brutbestand des Großen Brachvogels *Numenius arquata*, der Uferschnepfe *Limosa limosa* und des Rotschenkel *Tringa totanus* 1982 in Nordbayern. **22**: 107-109
- Ranftl, H. (1983): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* in Nordbayern. **22**: 103-106
- Ranftl, H. (1992): Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Halbinsel im Kleinen Brombachsee", Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. **31**: 163-169
- Ranftl, H. s. Bauer, H.-G. (1996)
- Ranftl, H. s. Bezzel, E. (1996)
- Ranftl, H. s. Dornberger, W. (1985)
- Ranftl, H. s. Dornberger, W. (1986a,b)
- Ranftl, H., Alkemeier, F., W. Dornberger & D. Franz (1988): Die Vogelwelt des Ausgleichsbeckens Altmühltal. 3. Ergänzungsbericht 1986 und 1987. **27**: 99-114
- Ranftl, H., Bandorf, H. & J. Harth (1976): Der Graureiher *Ardea cinerea* in Bayern. **15**: 161-184
- Ranftl, H. & Dornberger, W. (1984): Die Vogelwelt des Ausgleichbeckens Altmühltal. **23**: 1-55
- Ranftl, H. & Dornberger, W. (1990): Brutbestand und Bruterfolg von Großem Brachvogel, Rotschenkel und Uferschnepfe in Nordbayern 1987-1989. **29**: 55-61
- Ranftl, H., Dornberger, W. & H. Klein (1988): Das Braunkehlchen *Saxicola rubetra* in der Region 8, Westmittelfranken, 1987. **27**: 131-134
- Ranftl, H., Franz, D. & M. Kraus (1989): Winterflucht norddischer Gänse nach Bayern 1986/87. **28**: 39-57
- Ranftl, H. & Lechner, F. (1974): Einige neuere Erfahrungen mit künstlichen Niststätten für Flußseeschwalben. **13**: 99-102
- Rathmayer, W. (1958): *Gavia immer adamsii* in Bayern. **5**: 43-44
- Rathmayer, W. (1958): Ornithologische Beobachtungen aus Griechenland. **5**: 37-42
- Reger, K. s. Altner, H. (1959)
- Reger, P. s. Brünner, K. (1976)
- Reichel, D. (1990): Liste bedrohter Brutvogelarten in Oberfranken. **29**: 37-47
- Reichel, D. (1990): Zum Vorkommen des Zwergtauchers *Tachybaptus ruficollis* in Oberfranken. **29**: 164-166
- Reichenberger, E. (1922): Eine neue *Siptornis* aus Ost-Brasilien. **1**: 43-44
- Reicherzer, S. (1985): Mornellregenpfeifer *Eudromias morinellus* und Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* im Ries. **24**: 78-79

- Reicherzer, S. (1985): Zum Durchzug des Goldregenpfeifers *Pluvialis apricaria* im Ries. **24**: 135-149
- Reicherzer, S. (1986): Schreiadler *Aquila pomarina* 1981 und 1982 im Ries. **25**: 101-102
- Reicherzer, S. (1986): Zum Durchzug des Regenbrachvogels *Numenius phaeopus* im Ries. **25**: 102-103
- Reicherzer, S. (1987): Überwinterungsplatz der Wasserralle *Rallus aquaticus* in geschlossener Ortschaft. **26**: 268-270
- Reicherzer, S. (1990): Ungewöhnliche Ansammlungen von Rotmilanen *Milvus milvus* im Ries. **29**: 77-80
- Reichholf, J. (1962): Außergewöhnlich lange Verweildauer eines Teichwasserläufers (*Tringa stagnatilis*) am Eggelfinger Innstausee. **6**: 283
- Reichholf, J. (1963): Seidenreiher (*Egretta garzetta*), Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) und Brauner Sichler (*Plegadis falcinellus*) am Eggelfinger Innstausee. **6**: 472-473
- Reichholf, J. (1963): Eistaucher (*Gavia immer*) am Eggelfinger Innstausee. **6**: 473
- Reichholf, J. (1963): Ein Tamariskensänger (*Lu-sciniola melanopogon*) am Inn. **6**: 571
- Reichholf, J. (1963): Heftiger Paarungskampf zweier Mauersegler (*Apus apus*). **6**: 567-568
- Reichholf, J. (1965): Ein Fall von Polygynie bei der Reiherente (*Aythya fuligula*). **7**: 339-340
- Reichholf, J. (1966): Untersuchungen zur Ökologie der Wasservögel der Stauseen am unteren Inn. **7**: 536-604
- Reichholf, J. (1968): Vier "Rassen" der Schafstelze (*Motacilla flava*) in einem Trupp am Eggelfinger Innstausee. **8**: 294-295
- Reichholf, J. (1968): Rekord-Frühjahrszug des Kampfjägers (*Philomachus pugnax*) am unteren Inn. **8**: 369-382
- Reichholf, J. (1971): Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) am unteren Inn. **10**: 162-169
- Reichholf, J. (1971): Erster Brutversuch des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) in Bayern. **10**: 184-186
- Reichholf, J. (1972): Der Durchzug der Bekassine (*Gallinago gallinago*) an den Stauseen am Unteren Inn – Versuch einer ökologischen Analyse. **11**: 139-163
- Reichholf, J. (1972): Brutversuch der Sturmmöwe (*Larus canus*) am Unteren Inn. **11**: 316-317
- Reichholf, J. (1973): Die Bestandsentwicklung des Höckerschwans (*Cygnus olor*) und seine Einordnung in das Ökosystem der Innstauseen. **12**: 15-46
- Reichholf, J. (1973): Fischende Waldohreulen (*Asio otus*). **12**: 81-82
- Reichholf, J. (1973): Der Einfluß der Flurbereinigung auf den Bestand an Rebhühnern (*Perdix perdix*). **12**: 100-105
- Reichholf, J. (1973): Die Bestandsentwicklung bei Drossel- (*Acrocephalus arundinaceus*) und Teichrohrsänger (*A. scirpaceus*) in einem Kontrollgebiet am Unteren Inn. **12**: 210-213
- Reichholf, J. (1973): Begründung einer ökologischen Strategie der Jagd auf Enten (Anatidae). **12**: 237-247
- Reichholf, J. (1973): Bestandszunahme beim Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) am Unteren Inn. **12**: 269-270
- Reichholf, J. (1974): Phänologie und Ökologie des Durchzuges der Zwergmöwe *Larus minutus* am Unteren Inn. **13**: 56-70
- Reichholf, J. (1975): Biogeographie und Ökologie der Wasservögel im subtropisch-tropischen Südamerika. **14**: 1-69
- Reichholf, J. (1975): Ein Steinadler *Aquila chrysaetos* bei München. **14**: 210-211
- Reichholf, J. (1975): Bemerkenswerte Überwinterungen 1974/75 am unteren Inn. **14**: 308-311
- Reichholf, J. (1976): Zur Dispersionsdynamik der Türkentaube *Streptopelia decaocto*. **15**: 69-77
- Reichholf, J. (1976): Daten zur Nahrungskonkurrenz zwischen Höckerschwanz *Cygnus olor* und Bläßhuhn *Fulica atra* außerhalb der Brutzeit. **15**: 93-94
- Reichholf, J. (1976): Ein Trauersteinschmätzer *Oenanthe leucura* in Bayern. **15**: 97
- Reichholf, J. (1977): Der Seeadler *Haliaeetus al-bicilla* als Wintergast in Bayern. **16**: 72-80
- Reichholf, J. (1977): Mehrjährige und jahreszeitliche Häufigkeitsschwankungen beim Turmfalke *Falco tinnunculus*. **16**: 191-196
- Reichholf, J. (1978): Ein Tundra-Wanderfalke *Falco peregrinus calidus* am unteren Inn. **17**: 179-180
- Reichholf, J. (1979): Die Schellente *Bucephala clangula* als Wintergast in Südbayern, speziell am unteren Inn. **18**: 37-48
- Reichholf, J. (1979): Der Eisvogel *Alcedo atthis* am unteren Inn. **18**: 171-176

- Reichholf, J. (1979): Rekordergebnis der Schwimmvogelzählung vom Januar 1979 auf der ostbayerischen Donau und Winterflucht der Wasservogel vom unteren Inn. **18**: 177-180
- Reichholf, J. (1980): Die Arten-Areal-Kurve bei Vögeln in Mitteleuropa. **19**: 13-26
- Reichholf, J. (1980): Zur Funktion der herbstlichen "Gruppenbalz" beim Rebhuhn *Perdix perdix*. **19**: 181-183
- Reichholf, J. (1981): Süddeutsche Rekordzahlen von Goldregenpfeifern *Pluvialis apricaria* am unteren Inn. **20**: 87-89
- Reichholf, J. (1981): Aberrante Lachmöwen *Larus ridibundus* als Quellen für Fehlbestimmungen von Dünnschnabelmöwen *Larus genei*. **20**: 89-90
- Reichholf, J. (1982): Verdrängte der Fasan *Phasianus colchicus* das Birkhuhn *Tetrao tetrix*? **21**: 3-19
- Reichholf, J. (1982): Erste Auswirkungen der neuen Schußzeit auf Graureiher *Ardea cinerea*. **21**: 97-100
- Reichholf, J. (1982): Der Niedergang der kleinen Rallen (*Rallus* und *Porzana*). **21**: 165-174
- Reichholf, J. (1983): Ausbrüche von Enten-Botulismus im Sommer 1982 in Bayern. **22**: 37-56
- Reichholf, J. (1983): Zusammensetzung und Dynamik der Enten-Brutbestände im Ismaninger Teichgebiet und an den Stauseen am unteren Inn. **22**: 95-102
- Reichholf, J. (1983): Bestandstendenzen bei der Lachmöwe *Larus ridibundus*. **22**: 211-217
- Reichholf, J. (1983): Schelladler *Aquila clanga* am unteren Inn. **22**: 226-227
- Reichholf, J. (1984): Kleinräumige Arealveränderungen bei der Heckenbraunelle *Prunella modularis*. **23**: 89-98
- Reichholf, J. (1985): Starker Bestandsrückgang des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* am unteren Inn. **24**: 82-83
- Reichholf, J. (1985): Vogelverluste durch Botulismus am Innstausee Eggfling-Obernberg im Sommer 1983. **24**: 85-88
- Reichholf, J. (1985): Das Ausmaß von Bestands-einbußen verschiedener Vogelarten als Folge der extremen Kälte im Januar/ Februar 1985: Befunde aus Südostbayern. **24**: 117-123
- Reichholf, J. (1986): Gewinne und Verluste: Ein halbes Jahrhundert Veränderung in der Avifauna eines Gebietes im nördlichen Voralpenraum. **25**: 81-92
- Reichholf, J. (1986): Der Wegzug des Mauerseglers *Apus apus* im Sommer 1985 und 1986: Beobachtungen aus München-Nymphenburg. **25**: 219-222
- Reichholf, J. (1987): Vorkommen der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* an den Stauseen am unteren Inn. **26**: 129-130
- Reichholf, J. (1987): Starker Rückgang der Winterbestände der Saatkrähe *Corvus frugilegus* und Dohle *Corvus monedula* im niederbayerischen Inntal. **26**: 251-257
- Reichholf, J. (1987): Erste Brut der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* in Bayern. **26**: 270
- Reichholf, J. (1987): Sprosser *Luscinia luscinia* in Niederbayern. **26**: 276
- Reichholf, J. (1988): Der Schlangennadler *Circus gallicus* in Bayern: Ein seltener aber regelmäßiger Durchzügler am Alpennordrand. **27**: 115-124
- Reichholf, J. (1988): Hat der Kormoran *Phalacrocorax carbo* an den Stauseen am unteren Inn die Kapazitätsgrenze seines Herbst- und Winterbestandes erreicht? **27**: 134-138
- Reichholf, J. (1988): Eine Massenansammlung von Saatgänsen *Anser fabalis* am unteren Inn Mitte März 1987. **27**: 138-139
- Reichholf, J. (1988): Neue Meldungen von Gerkfalken *Falco rusticolus* für Bayern. **27**: 146-147
- Reichholf, J. (1988): Gehört der Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* in die Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Bayerns? **27**: 275-284
- Reichholf, J. (1988): Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* auch am unteren Inn 1988. **27**: 298
- Reichholf, J. (1989): Warum verschwanden Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* und Triel *Burhinus oedicephalus* als Brutvögel aus Bayern? **28**: 1-14
- Reichholf, J. (1989): Der Bestand des Kormorans *Phalacrocorax carbo* am unteren Inn im Winterhalbjahr 1988/89. **28**: 131-136
- Reichholf, J. (1992): Turmfalke *Falco tinnunculus* versucht bei beutetragendem Wanderfalken *Falco peregrinus* zu schmarotzen. **31**: 178-179
- Reichholf, J. (1996): Bestandszusammenbruch des Kiebitzes *Vanellus vanellus* im niederbayerischen Inntal. **35**: 173-179

- Reichholf, J. & Schaack, K. (1986): Linientaxierungen von Sommervögeln im Auwald. **25**: 175-187
- Reichholf, J. & Utschick, H. (1972): Vorkommen und relative Häufigkeit der Spechte (Picidae) in den Auwäldern am Unteren Inn. **11**: 254-262
- Reichholf, J. & Windsperger, W. (1972): Erste Funde der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*) am Unteren Inn. **11**: 323
- Reichholf, J., Witt, K. & W. Wüst (1962): Brandseeschwalben (*Sterna sandvicensis*) in Bayern. **6**: 284-285
- Reichholf, J. s. Erlinger, G. (1969)
- Reichholf, J. s. Heiser, F. (1972)
- Reichholf, J. s. Hellmannsberger, J. (1979)
- Reichholf, J. s. Hirsch, B. (1973)
- Reichholf, J. s. Riehm, H. (1968)
- Reichholf-Riehm, H. (1972): Zur tageszeitlichen Verteilung der Nahrungssuche der Seidenschwänze (*Bombycilla garrulus*) während der Invasionen 1970/71 und 1971/72 in Südostbayern. **11**: 190-193
- Reichholf-Riehm, H. (1973): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (13). **12**: 263-268
- Reichholf-Riehm, H. (1974): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (14). **13**: 305-313
- Reichholf-Riehm, H. (1975): Kontaktschlafen bei der Beutelmeise *Remiz pendulinus*. **14**: 208-209
- Reichholf-Riehm, H. (1976): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (15). **15**: 85-92
- Reichholf-Riehm, H. (1977): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (16). **16**: 81-88
- Reichholf-Riehm, H. (1977): Über die Bedeutung der unterschiedlichen Färbung des Augenlidrandes bei adulten und juvenilen Schwanzmeisen *Aegithalos caudatus*. **16**: 197-198
- Reichholf-Riehm, H. (1979): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (17). **18**: 67-80
- Reichholf-Riehm, H. & Utschick, H. (1974): Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* am unteren Inn und ihr Vorkommen in Mitteleuropa. **13**: 280-292
- Reiner, K. s. Alkemeier, F. (1987)
- Reiner, K. s. Hachenberg, A. (1993)
- Reinsch, A. (1961): Ein gefährdeter Brutplatz des Wiedehopfs (*Upupa epops*). **6**: 95-96
- Reinsch, A. (1961): Niedrigstehendes Nest der Wacholderdrossel. **6**: 95
- Reinsch, A. (1961): Vom Gesang des Gelbspöters (*Hippolais icterina*). **6**: 95
- Reinsch, A. (1961): Jungkuckuck (*Cuculus canorus*) in einer Betonröhre. **6**: 96
- Reinsch, A. (1963): Albino im Rauchschnäbelnest (*Hirundo rustica*). **6**: 567
- Reinsch, A. (1964): Rauchschnäbel (*Hirundo rustica*) als Außenwandbrüterin. **7**: 197
- Reinsch, A. (1964): Über einige quantitative Auswirkungen des Eiswinters 1962/63 auf die Vogelwelt um Hilpoltstein/Mfr.. **7**: 197-198
- Reinsch, A. (1966): Das Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) als Höhlenbrüter. **7**: 611
- Reinsch, A. (1966): Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) verfüttert Regenwürmer. **7**: 611
- Reinsch, A. (1966): Niedrig stehendes Nest der Ringeltaube (*Columba palumbus*). **7**: 611
- Reinsch, A. (1968): Grauschnäpperweibchen (*Muscicapa striata*) bringt allein eine Brut zum Ausfliegen. **8**: 296
- Reinsch, A. (1968): Jungkuckuck (*Cuculus canorus*) in einem Blumenkasten. **8**: 297
- Reinsch, A. (1968): Späte Brut eines Zilpzals (*Phylloscopus collybita*). **8**: 297
- Reinsch, A. (1971): Sandbadender Baumfalk (*Falco subbuteo*). **10**: 110
- Reinsch, A. (1974): Skua *Stercorarius skua* von den Shetland-Inseln in Mittelfranken. **13**: 247
- Reinsch, A. (1975): Der Wiedehopf *Upupa epops* wieder Brutvogel im Hilpoltsteiner Gebiet. **14**: 206
- Reinsch, A. (1975): Der Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* ist Brutvogel am Kauferlacher Weiher. **14**: 207
- Reinsch, A. (1975): Maskenstelze *Motacilla flava feldegg* bei Pleinfeld/Mfr. **14**: 211
- Reinsch, A. (1979): Wiedehopf *Upupa epops* brütet in einem Nistkasten. **18**: 189-190
- Reinsch, A. (1979): Bienen und Hornissen als Nistplatzkonkurrenten der Hohltaube *Columba oenas*. **18**: 190
- Reinsch, A. (1979): Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* brütet erfolgreich in einem Generator. **18**: 191
- Reinsch, A. (1981): Ein Fünfergelege des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius*. **20**: 85
- Reinsch, A. (1981): Gehäuftes Brutvorkommen des Baumfalken *Falco subbuteo* im Jahre 1980. **20**: 86

- Reinsch, A. (1985): Bemerkenswerte Durchzügler am Kauerlacher Weiher / Mittelfranken. **24**: 75
- Reinsch, A. (1985): Alpenbraunelle *Prunella collaris* als Durchzüglerin bei Hilpoltstein, Mittelfranken. **24**: 76
- Reinsch, A. (1985): Gehäuftes Brutvorkommen des Baumfalcken *Falco subbuteo* im Jahre 1984 im Bereich des Kauerlacher Weihers / Mittelfranken. **24**: 76
- Reinsch, A. (1988): Der Wiedehopf *Upupa epops* wieder Brutvogel bei Hilpoltstein. **27**: 128-130
- Reinsch, A. & Warncke, K. (1968): Zweitbruten bei der Waldohreule (*Asio otus*). **8**: 400-401
- Reiser, O. (1925): Vogeleiarausbeute auf den Lechinseln bei Augsburg und in Schwaben in längst entschwundenen Zeiten. **1**: 76-80
- Remm, W. s. Franz, D. (1987)
- Remmert, H. (1978): Forschungsziel und Forschungsmethodik. **17**: 1-7
- Remold, H. (1958): Ein Beitrag zur Verbreitung des Zitronenzeisigs (*Carduelis c. citrinella* Pall.) in den Bayerischen Alpen. **5**: 45-48
- Remold, H. (1958): Die Gattung *Calidris* in Südbayern. **5**: 113-126
- Rennau, H. s. Pfister, H. (1999)
- Repa, P. (1994): Zusammensetzung winterlicher Vogelbestände in den Feldern und Wiesen der Senke von Tachov. **33**: 11-18
- Resch, J. s. Hemprich, M. (1978)
- Riedinger, H. J. (1974): Beobachtungen zur Brutbiologie und zum Verhalten des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* auf der Schwäbischen Alb. **13**: 171-197
- Riehm, H. & Reichholz, J. (1968): Erstnachweis des Grünen Laubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) für Bayern. **8**: 296
- Robel, D. (2000): Zur Ausbreitung der Türken-taube *Streptopelia decaocto* in Nordwest-Afrika. **39**: 236-237
- Robel, K. (1973): Wie kommt die Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) durch den Wasservorhang an einem Wehrüberlauf? **12**: 145-146
- Robel, K. (1980): Doppelnester bei Wasseramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*. **19**: 113-115
- Robel, K. (1997): Bemerkenswertes zur Brutbiologie des Mauerseglers *Apus apus*. **36**: 51-53
- Robel, K. & Leitenbacher, G. (1993): Der Einfluß des Siebenschläfers *Glis glis* auf die Höhlenbrüterpopulation in künstlichen Nisthöhlen am Surspeicher. **32**: 59-63
- Rockenbauch, D. (1968): Zur Brutbiologie des Turmfalcken (*Falco tinnunculus* L.). **8**: 267-276
- Rockenbauch, D. (1976): Ergänzungen zur Nahrungsbiologie einiger Eulenarten. **15**: 78-84
- Rockenbauch, D. (1978): Untergang und Wiederkehr des Uhus *Bubo bubo* in Baden-Württemberg **17**: 293-328
- Rockenbauch, D. s. Hölzinger, J. (1968)
- Rödl, T. (1994): Schwarzkehlchen *Saxicola torquata* frißt Skorpion. **33**: 72
- Rokitansky, G. (1965): Mit den Beinen fischende Aaskrähen (*Corvus corone*). **7**: 488
- Rokitansky, G. (1965): Zu: "Saatkrähen nehmen ein Schneebad" **7**: 488-489
- Rokitansky, G. (1966): Einige bemerkenswerte Beobachtungen zum Verhalten des Haushuhnes. **7**: 733-735
- Rosenberger, W. (1954): Die Würzburger Saatkrähen. **4**: 188-189
- Rosenberger, W. (1957): Winterbeobachtungen von Zugvogelarten in Unterfranken. **4**: 558-567
- Rosenberger, W. (1959): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen aus Würzburg. **5**: 197-203
- Rosenberger, W. (1965): Fitis/ Zilpzalp- Mischsänger im Steigerwald. **7**: 491
- Roth, F. (1960): Neues Vorkommen der Graummer (*Emberiza calandra*) in Südbayern. **5**: 514
- Rudolph, B.-U. (1993): Zum Vorkommen von Wasservögeln, insbesondere von Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*, Teichhuhn *Gallinula chloropus* und Bleßhuhn *Fulica atra* im Landkreis Forchheim. **32**: 147-158
- Rudolph, B.-U. (2000): Baumbrütende Dohlen (*Corvus monedula*, L. 1758) im Inn-Chiemsee - Hügelland (Südbayern). **39**: 207-216
- Rudolph, B.-U. (2000): Überwinterung der Pfeifente *Anas penelope* bei Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim. **39**: 217-222
- Rudolph, B.-U. s. Nitsche, G. (1995)
- Rudroff, S. s. Meyer, H. (1998)
- Ruge, K. & Weber, W. (1974): Brutgebiet des Dreizehenspechts *Picoides tridactylus* im Eisenerzer Raum, Steiermark. **13**: 300-304
- Ruge, K. s. Berthold, P. (1974)

- Rust, R. (1971): Populationsdynamische Untersuchungen am Habichtsbestand (*Accipiter gentilis*) eines oberbayerischen und schwäbischen Gebietes. **10**: 83-91
- Rust, R. & Kechele, W. (1996): Altersbestimmung von Habichten *Accipiter gentilis*: Langfristige Vergleiche gemauerter Handschwingen. **35**: 75-83
- Rust, R. s. Bezzel, E. (1997)
- Sachs, F. (1941): Starker Zuzug seltener Wintergäste im Oberrheingraben. War der Krieg mit die Ursache? **3**: 130-139
- Sachteleben, J. (1993): Jagdstrategie und Habitatnutzung bei Mäusebussard *Buteo buteo* und Turmfalke *Falco tinnunculus* – Konkurrenzvermeidung zweier Greifvogelarten. **32**: 37-43
- Sachtleben, H. (1919): Eine neue Stieglitzform von der Balkanhalbinsel. **1**: 3-4
- Sachtleben, H. (1919): *Sitta europaea cisalpina* subsp. nov. **1**: 7-8
- Sachtleben, H. (1920): Ein neuer Specht aus Litauen. **1**: 20-21
- Salomonsen, F. (1935): Zur Dialektbildung bei der Goldammer (*Emberiza citrinella* L.). **2**: 346-351
- Sassi, M. (1937): Über *Muscicapa striata sarudnyi* Snigirewski. **2**: 449
- Sassi, M. (1938): Bemerkung zu *Phasianus colchicus europaeus* Hachisuka. **3**: 6-7
- Schaack, K. s. Hellmannsberger, J. (1979)
- Schaack, K. s. Reichholf, J. (1986)
- Schacht, W. (1979): Welche Fliegen dienen den Mauerseglern *Apus apus* in den Kammlagen des Bayerischen Waldes als Nahrung? **18**: 82
- Schaefer, E. (1972): Beobachtungen einer Fichtenammer (*Emberiza leucocephalos*) bei Altann, Kreis Ravensburg. **11**: 321
- Schäfer, J. (1978): Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* im Raum Neu-Ulm. **17**: 339-340
- Schäffer, N. (1989): Schwarzstirnwürger *Lanius minor* im Isarmündungsgebiet. **28**: 65-66
- Schäffer, N. (1990): Beobachtungen an ausgewilderten Habichtskäuzen *Strix uralensis*. **29**: 139-154
- Scharbert, O. (1979): Nachweis einer Drittblut beim Haubentaucher *Podiceps cristatus*. **18**: 187-188
- Scharbert, O. (1981): Mast-Bruten von Schwarzmilan *Milvus migrans* und Rabenkrähe *Corvus c. corone*. **20**: 174-175
- Scheer, G. (1953): Beobachtungen am Karmingimpel. **4**: 70-72
- Schenk, N. (1990): Schwimmender Habicht *Accipiter gentilis* im Großen Rötelsee. **29**: 76
- Scherl, L. (1956): Ergebnisse einer Storch-Bestandszählung 1952-1955 in Niederbayern und der Oberpfalz. **4**: 434-446
- Scherl, L. (1959): Bestandszählung des Weißen Storchs (*Ciconia ciconia*) 1958 in der Oberpfalz und in Niederbayern. **5**: 211-216
- Scherzinger, W. (1974): Mauersegler *Apus apus* als Waldbewohner im Nationalpark Bayerischer Wald. **13**: 97-98
- Scherzinger, W. (1974): Zur Ökologie des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* im Nationalpark Bayerischer Wald. **13**: 121-156
- Scherzinger, W. (1979): Thermospeicherung beim Rauhfußkauz *Aegolius f. funereus*. **18**: 184-185
- Scherzinger, W. (1980): Grüner Laubsänger *Phylloscopus trochiloides* im Bayerischen Wald. **19**: 190-191
- Scherzinger, W. (1987): Der Uhu *Bubo bubo* L. im Inneren Bayerischen Wald. **26**: 1-51
- Scherzinger, W. s. Poost, W. (1985)
- Scheuerlein, A. & Nitsche, G. (1994): Brutbestand und Verbreitung des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* im bayerischen Alpenvorland. **33**: 19-26
- Scheufele, U. & Ullrich, B. (1973): Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*) entstacheln Hymenopteren. **12**: 142-144
- Schilhansl, K. (1976): Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* brütet wieder im Ulmer Raum. **15**: 219-220
- Schilhansl, K. (1977): Ein ungewöhnlicher Brutplatz der Uferschwalbe *Riparia riparia* im Ulmer Raum. **16**: 198-199
- Schilhansl, K. s. Buck, K. (1977)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1966a,b)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1967a,b)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1968)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1968a,b)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1970)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1971a,b)
- Schilhansl, K. s. Hölzinger, J. (1973a,b,c)

- Schlenker, R. (1986): Neue Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*-Ringfunde aus Afrika. **25**: 217-219
- Schlögel, J. (1991): Eine Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola* im Unterallgäu. **30**: 90
- Schlögel, J. (1991): Silberreiher *Casmerodius albus* im Unterallgäu. **30**: 90
- Schlögel, J. (1991): Rothalstaucher *Podiceps griseogen* – Einflug 1988 im Unterallgäu. **30**: 90-91
- Schlögel, J. (1991): Ein Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* im Unterallgäu. **30**: 91
- Schlögel, J. s. Weiss, I. (1993)
- Schmager, P. (1986): Die Vögel des Donaumooses. **25**: 207-216
- Schmid, L. (1990): Ungewöhnliche Zahlen von Eisenten *Clangula hyemalis* im Donauwörther Raum. **29**: 77
- Schmid, L. s. Heiser, F. (1982)
- Schmidt, E. (1967): Die Ruderente (*Oxyura leucocephala*) im Karpatenbecken. **8**: 123-128
- Schmidt, H. s. Bernecker, A. (1979)
- Schmidt, J. (1998): Kormoranabwehr durch weitmaschige Überspannung von Karpfenwinterungsteichen in der Oberpfalz. **37**: 1-18
- Schmidt, O. (1987): Silberreiher *Casmerodius albus* in Oberfranken. **26**: 263
- Schmidt, O. (1989): Gleichzeitige Bruten vom Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* und Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* am selben Gebäude. **28**: 65
- Schmidt, O. (1990): Beobachtungen zum Auftreten des Pirols *Oriolus oriolus* im Frankенwald und Fichtelgebirge in den letzten Jahren. **29**: 72-74
- Schmidt, O. (1990): Brut der Wasseramsel *Cinclus cinclus* mitten in München. **29**: 74-76
- Schmidt, W. s. Hölzinger, J. (1973)
- Schmidtke, K. (1966): Brutplätze von Kiebitz und Brachvogel im mittleren Rottal. **7**: 870-871
- Schmidtke, K. (1975): Die Brutkolonien der Lachmöwe *Larus ridibundus* im Rußweihergebiet bei Eschenbach/Oberpfalz. **14**: 237-260
- Schmidtke, K. (1989): Zum Brutbestand von Kiebitz *Vanellus vanellus* und Brachvogel *Numenius arquata* im niederbayerischen Rottal. **28**: 25-38
- Schmidtke, K. (1994): Der Raubwürger *Lanius excubitor* als Brutvogel im Rußweihergebiet bei Eschenbach. **33**: 72-73
- Schmidtke, K. & Utschick, H. (1980): Ornithologische Ergebnisse einer Türkei-fahrt. **19**: 57-74
- Schmidtke, K. s. Brandl, R. (1979)
- Schmidtke, K. s. Brandl, R. (1980)
- Schmidtke, K. s. Mann, W. (1987)
- Schmitt, M. & Lainer, H. (1961): Schlangena-dler (*Circaetus gallicus*) am Ammersee. **6**: 94
- Schmitz, K. (1994): Herbstaufenthalt eines Sakerfalken *Falco cherrug* im Bereich des Ismaninger Teichgebietes. **33**: 67-70
- Schmöller, K. s. Model, N. (1997)
- Schnabel, E. (1955): Beringungs-Ergebnisse an fränkischen Vögeln. **4**: 310-343
- Schnabel, E. (1957): Ein Beitrag zum Brutvorkommen des Schwarzstirnwürgers – *Lanius minor* Gmelin – in Unterfranken. **4**: 548-556
- Schnabel, E. (1957): Zum Vorkommen des Flußregenpfeifers – *Charadrius dubius curonicus* Gmelin – in Unterfranken. **4**: 707-710
- Schneid, T. (1933): Der Nachtreiher (*Nycticorax n. nycticorax* (L.)) als Brutvogel bei Bamberg. **2**: 279-280
- Schneider, H. & Schneider, P. (1966): Erster Brutnachweis für die Spießente (*Anas acuta*) in Nordbayern. **7**: 868-869
- Schneider, H. & Schneider, P. (1970): Bestandsaufnahme des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Nordbayern. **9**: 105-119
- Schneider, H. s. Schneider, P. (1969)
- Schneider, M. (1959): Beobachtung der Zippammer (*Emberiza cia*) in Gunzenhausen, Mittelfranken. **5**: 377
- Schneider, M. (1961): Charakteristische Brutvögel der Altmühlwiesen im Landkreis Gunzenhausen – Mittelfranken. **6**: 73-80
- Schneider, P. & Schneider, H. (1969): Erste Bestandsaufnahmen an der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Bayern. **8**: 511-515
- Schneider, P. s. Schneider, H. (1966)
- Schneider, P. s. Schneider, H. (1970)
- Schöll, R. W. (1960): Über das Sperlingsvorkommen am Brennerpaß (Tirol). **5**: 506
- Schöll, R. W. (1960): Die Sperlingsbesiedelung des Pustertales/Südtirol und seiner nördlichen Seitentäler. **5**: 591-596
- Schön, M. (1976): Nestaufgabe bei Wacholderdrosseln *Turdus pilaris* nach Verschwinden eines schon nistenden Raubwürgerpaares *Lanius excubitor*. **15**: 100-101

- Schonhardt, H. (1972): Der Purpurreiher (*Ardea purpurea*) Brutvogel bei Karlsruhe. **11**: 58-63
- Schöpf, H. s. Lechner, F. (1967)
- Schratter, D. & Eisner, J. (1986): Nachweise der Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybrida* in Oberösterreich. **25**: 241-242
- Schreiner, H. & Vidal, A. (1972): Neuer Nachweis der Schwarzkehlhrossel (*Turdus ruficollis atrogularis*) in Bayern. **11**: 115-116
- Schröder, W. (1938): Über die Deutung des Namens "Radebrecher" für den Großen Raubwürger (*Lanius e. excubitor* L.) und den Rotrückwürger (*Lanius c. collurio* L.). **3**: 5-6
- Schröder, W. (1940): Kolkraben am Kreuzeck. **3**: 92-93
- Schröder, W. (1941): Ein Albino der Rauchschnalbe. **3**: 140
- Schubert, R. s. Heiser, F. (1999)
- Schubert, W. (1969): Neue Beobachtungen zum Vorkommen des Weißrückenspechtes (*Dendrocopos leucotos*) in den bayerischen Alpen. **8**: 515-517
- Schubert, W. (1970): Zur Brutvogelwelt der unteren Isar. **9**: 134-149
- Schubert, W. (1972): Der Bergglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) als Brutvogel in den voralpinen Hochmooren des bayerischen Allgäus. **11**: 43-48
- Schubert, W. (1974): Aschköpfige Schafstelze *Motacilla flava cinereocapilla* brütet im bayerischen Allgäu. **13**: 96
- Schubert, W. (1974): Eine Kurzzehenlerche *Callandrella brachydactyla* bei München. **13**: 96-97
- Schubert, W. (1977): Zum Brutvorkommen und zur Brutbiologie des Fichtenkreuzschnabels *Loxia curvirostra* im Kreis Böblingen (Baden-Württemberg). **16**: 45-57
- Schubert, W. (1977): Brutauffälle beim Wespenbussard *Pernis apivorus* in Baden-Württemberg. **16**: 171-175
- Schubert, W. (1978): Verbreitung, Bestandsgröße und Daten zur Brutbiologie des Mittelspechtes *Dendrocopos medius* im Raum zwischen Stuttgart, Schönbuch und Schwarzwald. **17**: 125-131
- Schubert, W. (1982): Nestfund der Rotdrossel *Turdus iliacus* im bayerischen Allgäu. **21**: 181-182
- Schuchmann, K.-L., Weller, A.-A. & I. Heynen (2000): Biogeography and taxonomy of the Andean hummingbird genus *Haplophaedia* Simon (Aves: Trochilidae), with the description of a new subspecies from southern Ecuador. **39**: 17-42
- Schuhmacher, E. (1931): Ornithologische Beobachtungen aus den Alpen (Wetterstein- und Miemingergebirge). **2**: 141-142
- Schuhmacher, E. (1933): Mitteilungen über die Brutvögel auf den Lechkiesbänken in den Jahren 1930-1932. **2**: 275-276
- Schuhmacher, E. (1937): Beobachtungen am Chiemsee bei Feldwies und an der Achenmündung am 13.9.1936. **2**: 409
- Schuhmacher, E. (1941): Kannibalismus am Bussardhorst? **3**: 157-158
- Schultze-Westrum, T. (1961): Beobachtungen an Eleonorenfalken. **6**: 84-86
- Schulze, A. (1984): Die Avifauna der Klärschlamm-Deponie bei München. **23**: 149-182
- Schulze, A. (1989): Eine Zweitbrut (?) beim Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*. **28**: 70-72
- Schulze, A. (1992): Ein weiterer Nachweis der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Bayern. **31**: 174-175
- Schulze, C. (1993): Neuer Nachweis eines Zwergadlers *Hieraetus pennatus* in Bayern. **32**: 159
- Schulze, C. & Krafft, C. (1984): Neuer Nachweis der Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis* für Bayern. **23**: 236-237
- Schulze, C. s. Bindl, W. (1990)
- Schuster, S. (1968): Mäusern die bayerischen Gänsesäger (*Mergus merganser*) am Bodensee ihr Kleingefieder? **8**: 291-292
- Schuster, S. (1971): Der Bestand des Waldkauzes (*Strix aluco*) auf dem Bodanrück/Bodensee. **10**: 156-161
- Schuster, S. (1975): Fehlerquellen bei Wasservogelzählungen am Beispiel baden-württembergischer Gewässer. **14**: 79-86
- Schuster, S. & Blum, V. (1972): Der Bodensee als Mäuserstation auf dem Frühjahrszug des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*)? **11**: 36-42
- Schuster, S. & Müller, K. (1976): Gelbschnäbliger Eistaucher *Gavia adamsii* am Bodensee. **15**: 220-221
- Schuster, S. & Werner, H. (1977): Der Greifvogelbestand des Bodanrücks (Bodensee) 1974 und 1975. **16**: 10-17
- Schuster, S. s. Hölzinger, J. (1972)

- Schuster, S. s. Jacoby, H. (1972)
- Schuster, S. s. Jacoby, H. (1976)
- Schuster, S. s. Knötzsch, G. (1976)
- Schütt, R. & Müller, A. (1986): Dünnschnabelmöwen *Larus genei* am Neusiedler See (Österreich). **25:** 230-233
- Schütt, R. s. Gatter, W. (1999)
- Schüz, E. (1934): Über die Ausbreitungs-Geschwindigkeit ausfliegender Jungreiher. **2:** 312-313
- Schüz, E. (1966): Berichte über Geier als Aasfresser in Abessinien aus dem 18. und 19. Jahrhundert. **7:** 736-738
- Schwammberger, K. (1974): Grünspecht *Picus viridis* plündert Wespennest. **13:** 247
- Schwammberger, K. s. Koenig, C. (1963)
- Schwarzenbach, F. s. Bezzel, E. (1968)
- Seilkopf, H. (1965): Wodurch geriet die 1964 bei Penig in Sachsen gefundene Skua (*Stercorarius skua*) ins Binnenland? **7:** 494
- Seitz, B. s. Seitz, E. (1983)
- Seitz, E. (1988): Ein Tordalk *Alca torda* bei Lindau/Bodensee. **27:** 127-128
- Seitz, E. (1988): Winterquartier- und Sitzplatztreue bei Kormoranen *Phalacrocorax carbo* am Bodensee. **27:** 125-127
- Seitz, E. & Seitz, B. (1983): Erfolgreiche Brut des Weißrückenspechts *Picoides leucotos* im Westallgäu. **22:** 228
- Sell, M. s. Galhoff, H. (1984)
- Sellmayr, Dr. (1938): Zum Vorkommen der Alpenkrähe (*Pyrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus* [Viell.]) in Bayern. **3:** 12
- Siegner, J. (1984): Zug, Alter und Todesursachen der im Ismaninger Teichgebiet beringten Reiherenten *Aythya fuligula*. **23:** 99-101
- Siegner, J. (1985): Winterbeobachtungen eines Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros*. **24:** 76-77
- Siegner, J. (1985): Zum Höchstalter freilebender Reiherenten *Aythya fuligula*. **24:** 77
- Siegner, J. (1985): Zum Zug in Süddeutschland beringter Krickenten *Anas crecca*. **24:** 161-175
- Siegner, J. (1986): Kirchturm-Brut des Gänsesägers *Mergus merganser*. **25:** 98-101
- Siegner, J. (1986): Brut des Kolkkraben *Corvus corax* bei München. **25:** 104-105
- Siegner, J. (1987): Winterquartier-Treue eines Zwergsägers *Mergus albellus*. **26:** 130-131
- Siegner, J. (1988): Ergebnisse der Reiherenten (*Aythya fuligula*)-Beringung im Ismaninger Teichgebiet. **27:** 77-98
- Siegner, J. (1989): Gewichte, neue Wiederfunde und Mauerplatz-Aspekte von Krickenten *Anas crecca* des Ismaninger Teichgebietes. **28:** 59-64
- Siegner, J. (1990): Beobachtungen an einer Mauersegler (*Apus apus*)-Kolonie im Süden Münchens. **29:** 49-54
- Siegner, J. (1991): Weitere Wiederfunde von im Ismaninger Teichgebiet beringten Reiherenten *Aythya fuligula*. **30:** 77-78
- Siegner, J. (1993): Weiteres zu Bruten des Kolkkraben *Corvus corax* bei München. **32:** 159-160
- Siegner, J. (1994): Brutbiologie und Dismigration oberbayerischer Schleiereulen *Tyto alba*. **33:** 55-62
- Siegner, J. (1998): Brutbiologie und Ringfunde oberbayerischer Turmfalken *Falco tinnunculus*. **37:** 213-220
- Siegner, J. (2000): Bruterfolg und Ringfunde einer Nistkasten-Population oberbayerischer Hohltauben *Columba oenas*. **39:** 223-226
- Siering, M. (1988): Beutelmeise *Remiz pendulinus* verwendet Raupengespinnste zum Nestbau. **27:** 290
- Siering, M. (1990): Nimmt die Mandarinente *Aix galericulata* als Brutvogel am Stadtrand Münchens zu? **29:** 166-169
- Siering, M. s. Heiser, F. (1972)
- Siering, M. s. Heiser, F. (1982)
- Singer, D. s. Gleixner, K.H. (1990)
- Singer, D. s. Gleixner, K.H. (1992)
- Sombrutzki, A. s. Alkemeier, F. (1988)
- Sombrutzki, A. s. Franz, D. (1987)
- Sombrutzki, A. s. Franz, D. (1991)
- Sommerfeld, E. (1930): Gefiederstudien an Drosseln. **2:** 60-69
- Sommerfeld, E. (1934): Einige Blaukehlchen-Daten und Berichtigung. **2:** 319-320
- Sommerfeld, E. (1935): 2 albinotische Junge von *Muscicapa s. striata* (Pall.) in einer Brut. **2:** 352-353
- Sommerfeld, E. (1953): Brutplatz des Kolkkraben (*Corvus c. corax* L.) im Isartal. **4:** 77
- Sommerfeld, E. s. Wüst, W. (1967)
- Sonnabend, H. & Poltz, W. (1978): 30jährige Bestandsaufnahme von Raubwürger *Lanius*

- excubitor* und Rotkopfwürger *Lanius senator* am nordwestlichen Bodensee. 17: 133-139
- Sonnenschein, E. (1992): Beobachtung einer Kappenammer *Emberiza melanocephala* in Oberbayern. 31: 175
- Sperber, G. (1970): Der Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*) nun auch im Spessart. 9: 170-172
- Spitznagel, A. (1978): Zur Brutbiologie einer süddeutschen Population der Dorngrasmücke *Sylvia communis*. 17: 99-123
- Springer, H. (1960): Studien an Rohrsängern. 5: 389-433
- Springer, H. (1966): Wintervogel in Zentral-Alaska. 7: 739-753
- Springer, H. s. Krauß, W. (1962)
- Stäbler, H. s. Alkemeier, F. (1987)
- Stachanow, W. (1929): *Emberiza fucata laubmanni* subsp. nov. 2: 6
- Stachanow, W. (1929): Einige Bemerkungen zur Systematik der Ostpaläarktischen *Riparia riparia* Linné 1758. 2: 21-24
- Stadelmann, H. s. Farkaschovsky, H. (1988)
- Stadler, H. (1932): Über Vogelrufe. 2: 169-212
- Stadler, H. (1951): Die Stimmen einiger Ammern. 4: 12-16
- Stadler, H. (1953): Die Vögel der Kalkheiden und Felsabstürze von Gambach bis Würzburg. 4: 56-60
- Stadler, H. (1953): Das Lied des Mittelspechts. 4: 61-62
- Stadler, H. (1954): Die Stimmen der Blaumeise (*Parus c. coeruleus*). 4: 155-170
- Stadler, H. (1955): Verzeichnis meiner Veröffentlichungen über Vogelstimmen. 4: 362-367
- Stadler, H. (1956): Die Stimmen der europäischen Grasmücken. 4: 413-433
- Stadler, H. (1957): Der Gesang eines grauen Fliegenschnäppers (*Muscicapa ficedula*). 4: 533-537
- Stadler, H. (1958): Das Lied des Tamariskensängers (*Luscinola m. melanopogon* Temm.). 5: 126-137
- Stadler, J. s. Pfeifer, R. (1997)
- Stark, W. (1937): Faunistische Notizen über einige Weiher und Weihergebiete aus der Oberpfalz. 2: 417-424
- Stark, W. (1941): Avifaunistische Daten aus der Oberpfalz. 3: 159-161
- Stein, H. (1984): Zu einigen biometrischen Maßen adulter Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (Bechst.). 23: 183-204
- Steinbacher, G. (1964): 10 Jahre Storchenzählung im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. 7: 174-181
- Steinbacher, G. (1964): Zum Brutvorkommen der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. 7: 80-89
- Steinbacher, G. (1964): Zur Verbreitung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben (ein Nachtrag). 7: 188-189
- Steinbacher, G. (1968): Irrgäste im südbayerischen Raum. 8: 293-294
- Sterbetz, I. (1967): Zur Ernährungsökologie der in der ungarischen Tiefebene durchziehenden Kampfläufer (*Philomachus pugnax*). 8: 52-58
- Stick, R. (1977): Zum Insektenfangverhalten des Mäusebussards *Buteo buteo*. 16: 201-202
- Stickroth, H. (1996): Zur Rassenzugehörigkeit der Heringsmöwe *Larus fuscus* in Bayern. 35: 181-186
- Stickroth, H. (1998): Winterbeobachtungen der Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* in Augsburg und Mitteleuropa. 37: 71-73
- Stickroth, H., Mann, W. & R. Brandl (1991): Avifaunistische Dokumentation zweier Talandschaften: Rasterkartierung von Sulztal und Ottmaringer Tal (Südliche Frankenalb). 30: 41-64
- Stickroth, H. s. Nigmann, G. (1994)
- Stiel, K. s. Bezzel, E. (1977)
- Straubinger, J. (1960): Zum Vorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Bayern. 5: 599
- Straubinger, J. (1962): Weiteres Brutvorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) im südlichen Alpenvorland. 6: 283
- Straubinger, J. (1964): Haubenmeisen (*Parus cristatus*) als Stiefeltern nestjünger Tannenmeisen (*Parus ater*). 7: 199
- Straubinger, J. (1965): Erfahrungen bei der Ansiedlung des Waldkauzes (*Strix aluco*) in Nistkästen. 7: 307-313
- Straubinger, J. (1966): Bienenfresser (*Merops apiaster*) brütet bei Augsburg. 7: 861-863
- Strehlow, J. (1967): Gerfalke, *Falco rusticolus*, bei München. 8: 176-178

- Strehlow, J. (1968): Aschköpfige Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla*) brütet in Bayern. **8:** 402-404
- Strehlow, J. (1981): Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* brütet am Ammersee – zweiter Brutnachweis für Bayern. **20:** 170-173
- Strehlow, J. (1982): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. 2. Ergänzungsbericht 1976-1980. **21:** 43-86
- Strehlow, J. (1984): "Fußtrillern" beim Feldschwirl *Locustella naevia*. **23:** 104
- Strehlow, J. (1985): 1984 dreimal Eistaucher *Gavia immer* am Ammersee. **24:** 90-91
- Strehlow, J. (1985): Erste erfolgreiche Brut der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* in Bayern 1982 am Ammersee. **24:** 91-92
- Strehlow, J. (1987): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. 3. Ergänzungsbericht 1981-1985. **26:** 53-113
- Strehlow, J. (1992): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. 4. Ergänzungsbericht 1986-1990. **31:** 1-41
- Strehlow, J. (1992): Sperber *Accipiter nisus* verfolgt Haussperling *Passer domesticus* zu Fuß. **31:** 72
- Strehlow, J. (1997): Ammerseegebiet 1966-1996. Teil I: Trendsausgewählter Brutvogelarten. **36:** 125-142
- Strehlow, J. (1998): Ammerseegebiet 1966-1996. Teil II: Trends bei Durchzüglern und Wintergästen. **37:** 19-45
- Stresemann, E. (1919): Neue und interessante Ergebnisse aus Mazedonien. **1:** 4-6
- Stresemann, E. (1919): Notwendige Namenänderungen. **1:** 8
- Stresemann, E. (1919): *Dryobates major italiae* subsp. nov. **1:** 9
- Stresemann, E. (1919): *Emberiza schoeniclus volgae* subsp. nov. **1:** 9
- Stresemann, E. (1919): *Dryobates major candidus* subsp. nov. **1:** 10
- Stresemann, E. (1919): Vorläufiges über das geographische Variieren der Körpergröße beim Gimpel. **1:** 11
- Stresemann, E. (1919): Nachtrag zur Terminologie der Gefiederwandlungen. **1:** 12
- Stresemann, E. (1921): Zur Nomenklatur einiger Vögel der orientalischen Region. **1:** 23-25
- Stresemann, E. (1921): 11 neue Formen aus dem Stromgebiet des Sepik (nördl. Neuguinea). **1:** 33-41
- Stresemann, E. (1922): Erscheinungsdaten von Temminck und Laugiers "Planches Coloriées" **1:** 54
- Stresemann, E. & Gengler, J. (1919): Eine neue Form des Großen Buntspechtes von der Balkanhalbinsel. **1:** 2
- Stresemann, E. s. Gengler, J. (1919)
- Strobel, G. & Ziegler, W. (1987): Eismöwe *Larus hyperboreus* am Kochelsee. **26:** 260
- Sturm, K. & Zintl, H. (1977): Singende Schlagchwirle *Locustella fluviatilis* an der Isar in Alpenrandnähe. **16:** 90-91
- Stürzer, S. (1998): Bestandsentwicklung und Nahrungsökologie von Habichtskauz *Strix uralensis* und Waldkauz *S. aluco* im Nationalpark Bayerischer Wald. **37:** 109-119
- Stürzer, S. (1998): Habitatwahl des Habichtskauzes *Strix uralensis* im Nationalpark Bayerischer Wald. **37:** 193-202
- Stürzer, S. (1999): Bedeutung der Zufütterung für die Wiederansiedelung von Habichtskäuzen *Strix uralensis*. **38:** 11-20
- Suchantke, A. s. Hohlt, G. (1960)
- Suchantke, A., Willi, P. & G. Knötzsch (1963): Über das Vorkommen von *Motacilla flava cinereocapilla* Savi am Alpennordrand im Frühjahr 1963. **6:** 568-570
- Sumper, M. (1964): Der Durchzug des Tüpfelsumpfhuhns (*Porzana porzana*) im Ismaninger Teichgebiet bei München. **7:** 90-99
- Sumper, M. (1964): Zweitbruten bei der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). **7:** 121
- Sunkel, W. (1924): Bluthänfling mit Schwanzmißbildung. **1:** 69
- Sunkel, W. (1929): Vogelbeobachtungen in der Rhön. **2:** 19-21
- Sunkel, W. (1965): Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*) in der Rhön. **7:** 486-487
- Sunkel, W. (1966): Ortswechsel junger Wasseramseln *Cinclus c. aquaticus* Bechst. **7:** 754-756
- Tannert, H. (1961): Doppelgelege beim Gartenrotschwanz. **6:** 88
- Taurikov, A. (1962): Fütterung eines Waldkauzes (*Strix aluco*) am Fensterfutterplatz. **6:** 399-401
- Thaler, E. s. Pfeifer, R. (1992)

- Thannert, H. (1965): Beringte Graugänse am Kleinhesseloher See in München. 7: 340-341
- Theiss, N. (1989): Nachweis von Geburtsortstreue beim Weißsternigen Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneacula*. 28: 144
- Theiss, N. (1991): Weißsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneacula* brütet erstmals in einem Rapsfeld. 30: 80-82
- Theiss, N. (1991): Graureiherbrutbestand *Ardea cinerea* in Oberfranken von 1980 bis 1990. 30: 83-85
- Theiss, N. (1993): Lebensraum Grenzstreifen. Hohe Siedlungsdichte von Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneacula*, Braunkehlchen *Saxicola rubetra* und Schwarzkehlchen *Saxicola torquata* in gleicher Biotopstruktur. 32: 1-9
- Theiss, N. (1993): Hoher Brutbestand des weißsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneacula* im Landkreis Coburg 1992 durch Besiedlung von Grabensystemen in intensiv genutzten Grünlandbereichen. 32: 11-16
- Theiss, N. (1993): Über Zug, Ausbreitung und Überwinterung der Beutelmeise *Remiz pendulinus* anhand von Ringfunden am Obermain zwischen 1980 und 1992. 32: 89-116
- Theiss, N. (1993): Wiesenpieper *Anthus pratensis* brütet erstmals 1992 im Coburger Land. 32: 160
- Theiss, N. (1997): Bestandsentwicklung und Habitatwahl des Weißsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneacula* im Coburger Land von 1971 bis 1996. 36: 105-124
- Theiss, N. & Franz, D. (1983): Brutnachweise des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* 1982 im Oberen Maintal. 22: 221-222
- Theiss, N. & Glätzer, G. (1983): Erster gesicherter Nachweis einer Skua *Stercorarius skua* im Oberen Maintal. 22: 119-120
- Theiss, N. & Glätzer, G. (1987): Bestandsentwicklung des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* von 1981 bis 1986 im Oberen Maintal. 26: 137-139
- Theiß, N. s. Franz, D. (1979)
- Theiß, N. s. Franz, D. (1983)
- Theiß, N. s. Franz, D. (1985)
- Theiß, N. s. Franz, D. (1986)
- Theiß, N. s. Franz, D. (1987a,b)
- Theiß, N. s. Franz, D. (1991)
- Theiß, N. s. Glätzer, G. (1986)
- Theiss, N., Franz, D. & G. Glätzer (1992): Zur Bestandsentwicklung des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberen Maintal von 1981 bis 1991. 31: 43-49
- Thiede, W. (1989): Zum Regensburger Laubsänger. 28: 149
- Timmermann, G. (1958): Mallophagen und Vogelsystem. 5: 148-152
- Tittel, W. (1989): Kommentar zu: "Sperber *Accipiter nisus* schlägt junge Wanderfalken *Falco peregrinus* im Horst" 28: 147-148
- Tratz, E. P. (1963): Ergänzendes zum Vorkommen des europäischen Bartgeiers (*Gypaetus barbatus*). 6: 470-471
- Trauttmansdorff, J. (1986): Brutbiologie der Wasservogel am Stausee Staning, Österreich. 25: 195-206
- Trawöger, E. & Kurz, H. (1986): Grasläufer *Tryngites subruficollis* am Chiemsee. 25: 93-95
- Trellinger, K. & Luce, J. (1971): Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Moosburg und Landshut. 10: 123-155
- Trellinger, K. s. Brummer, C. (2000)
- Trettau, W. (1963): Trinkende Spechte. 6: 476
- Trommer, G. (1971): Hohe Pestizidrückstände in unerbrüteten Sperbereiern. 10: 189-190
- Trommer, G. (1984): Der Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* jetzt auch wieder im Coburger Land. 23: 101-102
- Trommer, G. s. Barnickel, W. (1984)
- Trummer, R. (1970): Erfolgreiche Dreierbrut des Wespenbussards (*Pernis apivorus*). 9: 75-76
- Tsurikov, A. (1958): Eine Beobachtung über die Ernährung eines jungen Grauschnäppers (*Muscicapa striata*). 5: 50-51
- Turan, L. & Erdogan, A. (1998): Avifauna Research of Antalya/Kursunlu Redpine Natural Forest. 37: 141-148
- Uhl, F. (1927): Zur Ornithologie von Kaufbeuren. 1: 120-121
- Uhl, F. (1928): Beitrag zur Vogelwelt Südbayerns. 1: 144-146
- Uhl, F. (1928): Zur Ornithologie von Burghausen a. See. 1: 151-153
- Uhl, F. (1929): Neuerliche Beobachtungen über die Felsenschwalbe am Falkenstein bei Pfronten. 2: 34-36

- Uhl, F. (1930): Über die Verbreitung des weißsternigen Blaukehlchens in Bayern rechts des Rheines. **2**: 91-94
- Uhl, F. (1932): Kurze Mitteilungen über das Blaukehlchen (*Cyanosylvia svecica cyanecula* (Wolf)). **2**: 162-163
- Uhl, F. (1937): Nachtrag zu den "Brutvögeln der Umgebung von Burghausen a.S." **2**: 410-417
- Uhlich, D. & Holynski, O. (1992): Erfolgreiche Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* im Landkreis Würzburg. **31**: 70-71
- Uhlich, D. & Holynski, O. (1992): Erneute Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* im Landkreis Würzburg. **31**: 179
- Uhlich, D. & Holynski, O. (1994): Brut Neuntöter *Lanius collurio* × Rotkopfwürger *Lanius senator* im Landkreis Würzburg. **33**: 76-77
- Uhlich, D. s. Holynski, O. (1978)
- Ullrich, B. (1965): Mäusebussard (*Buteo buteo*) brütet in freier Flur. **7**: 336-337
- Ullrich, B. (1973): Beobachtungen zur Biologie des Steinkauzes (*Athene noctua*). **12**: 163-175
- Ullrich, B. (1976): Rosenstar *Sturnus roseus* im mittleren Vorland der Schwäbischen Alb. **15**: 222
- Ullrich, B. s. Dorka, V. (1975)
- Ullrich, B. s. Scheufele, U. (1973)
- Utschick, H. (1974): Erste Brut des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* an den Innstauseen. **13**: 314-315
- Utschick, H. (1978): Zur ökologischen Einnischung von 4 Laubsängerarten (*Phylloscopos*) im Murnauer Moos, Oberbayern. **17**: 209-224
- Utschick, H. (1980): Die Schadwirkung des Graureihers *Ardea cinerea* in Salmonidenbächen in Abhängigkeit von Fischdichte und Bachqualität. **19**: 107-110
- Utschick, H. (1993): Größe, Verteilung und Zusammensetzung von Vogeltrupps in Auwäldern am Unteren Inn. **32**: 117-128
- Utschick, H. (1996): Dynamik von Wasservogelgemeinschaften nach Staustufenneubau (Innstau Perach, Südbayern). **35**: 25-48
- Utschick, H. (1998): Wasservogelgemeinschaften der Innstau Perach 20 Jahre nach Inbetriebnahme. **37**: 221-226
- Utschick, H. s. Reichholf, J. (1972)
- Utschick, H. s. Reichholf-Riehm, H. (1974)
- Utschick, H. s. Schmidtke, K. (1980)
- Utendörfer, O. (1934): Zur Nahrungsbiologie unserer Eulen. **2**: 318
- Veitengruber, A. (1980): Grauschnäpperpaar *Muscicapa striata* gibt eigene Brut auf, um Jungamseln *Turdus merula* zu füttern. **19**: 192-193
- Veitengruber, A. (1995): Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel im Stadtgebiet von Nürnberg. **34**: 39-51
- Veitengruber, A. s. Kaus, D. (1978)
- Venzlaff, F. (1978): Ein Doppelgelege beim Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*. **17**: 341
- Vidal, A. (1972): Ein neuer Brutplatz des Rot-schenkels (*Tringa totanus*) im bayerischen Donautal. **11**: 317
- Vidal, A. (1973): Die Vogelwelt des Oberpfälzer Donautales und ihre Bedrohung durch technische Projekte. **12**: 65-79
- Vidal, A. (1975): Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Vogelwelt einiger Waldflächen im Raum Regensburg. **14**: 181-195
- Vidal, A. (1977): Neuansiedlung des Halsbandschnäppers *Ficedula albicollis* in Ostbayern. **16**: 89
- Vidal, A. (1977): Braune Sichler *Plegadis falcinellus* an der ostbayerischen Donau. **16**: 203
- Vidal, A. (1977): Spornammer *Calcarius lapponicus* an der Donau bei Kiefenholz/Opf. **16**: 204
- Vidal, A. (1980): Die Vogelwelt von Steinbrüchen in der Region Regensburg. **19**: 27-35
- Vidal, A. (1981): Die Überwinterung der Lachmöwe *Larus ridibundus* im Stadtgebiet von Regensburg. **20**: 127-137
- Vidal, A. (1987): Rastplatz von Kormoranen *Phalacrocorax carbo* auf den Turmspitzen des Regensburger Doms. **26**: 136
- Vidal, A. (1988): Ein neuer Brutnachweis des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* im ostbayerischen Donautal. **27**: 286-287
- Vidal, A. (1991): Rückgang des Brutbestandes der Grauammer *Miliaria calandra* im ostbayerischen Donautal. **30**: 173-175
- Vidal, A. (1997): Bestandsentwicklung der Brutvögel in der Kulturlandschaft nördlich Regensburg. **36**: 185-196
- Vidal, A. & Leibl, F. (1992): Erfolgreiche Brut des Seidenreihers *Egretta garzetta* bei Regensburg. **31**: 175-177
- Vidal, A. s. Bezzel, E. (1970)

- Vidal, A. s. Leibl, F. (1991)
- Vidal, A. s. Schreiner, H. (1972)
- Vogrin, M. (2000): Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka* a breeding species of Macedonia (former Yugoslavia). **39**: 231-233
- Vogrin, M. & Vogrin, N. (2000): Mute Swan *Cygnus olor* in Slovenia. **39**: 227-230
- Voous, K. H. (1969): Gemischte Schafstelzenflüge. **8**: 630-631
- Vordermeier, T. s. Keller, T. (1996)
- Vowinkel, K. (1976): Flußregenpfeifer *Charadrius dubius* frißt den Inhalt zerstörter Eier. **15**: 222
- Wagner, H. (1987): Ausgefallenes Verhalten von Kormoranen *Phalacrocorax carbo*: Tübinger Hochhaus dient als Schlafplatz. **26**: 274-275
- Walberer, E. s. Brandl, R. (1982)
- Walter, D. (1979): Einwöchiger Aufenthalt einer Blauracke *Coracias garrulus* bei Kempten (Allgäu). **18**: 85
- Walter, D. (1980): Gänsesäger *Mergus merganser* – Bruterfolg im Oberallgäu. **19**: 111-112
- Walter, D. (1980): Hochgelegener Brutplatz einer Tannenmeise *Parus ater*. **19**: 112
- Walter, D. (1982): Felsenschwalben-Brut *Ptyonoprogne rupestris* im Oberallgäu. **21**: 180-181
- Walter, D. (1983): Felsenschwalben-Brut *Ptyonoprogne rupestris* im Oberallgäu. **22**: 110
- Walter, D. (1984): Ein Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* im Oberallgäu. **23**: 102
- Walter, D. (1987): Ein Brutversuch und eine erfolgreiche Brut des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* im Oberallgäu. **26**: 267-268
- Walter, D. (1988): Eine Falken-Raubmöwe *Stercorarius longicaudus* im Oberallgäu. **27**: 292-294
- Walter, D. (1990): Bachstelze *Motacilla alba* brütet in über 1800 m Höhe im Allgäu. **29**: 76-77
- Walter, D. (1991): Zur Verbreitung des Hänflings *Acanthis cannabina* im Oberallgäu. **30**: 85-86
- Walter, D. (1992): Achter-Gelege einer Klappergrasmücke *Sylvia curruca* bei 1740 m NN. **31**: 79-80
- Walter, D. (1992): Brutversuch des Bluthänflings *Acanthis cannabina* im Oberallgäu bei knapp 2000 m NN. **31**: 80-81
- Walter, D. (1992): Brutversuch der Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* auf einem Seilbahnmasten. **31**: 81
- Walter, D. (1993): Erfolgreiche Mastbrut der Alpendohle *Pyrrhocorax graculus*. **32**: 72
- Walter, D. (1993): Bachstelze *Motacilla alba* brütet bei 1925 m NN im Allgäu. **32**: 72-73
- Walter, D. (1994): Zur Verbreitung und Fortpflanzungsbiologie des Steinschmätzers *Oenanthe oenanthe* in den Allgäuer Alpen, Bayern. **33**: 43-53
- Walter, D. (1994): Ein Spornpieper *Anthus novaeseelandiae* im Oberallgäu. **33**: 74
- Walter, D. (1995): Zur Fortpflanzungsbiologie des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in den Allgäuer Alpen (Bayern). **34**: 61-67
- Walter, D. (1995): Zur Verbreitung und Fortpflanzungsbiologie der Alpen-Ringdrossel *Turdus torquatus alpestris* im Oberallgäu (Bayern). **34**: 115-123
- Walter, D. (1995): Feldlerche (*Alauda arvensis*) brütet im Allgäu bei 1100m NN. **34**: 164-166
- Walter, D. (1996): Zur Brutbiologie einer alpinen Population des Bluthänflings *Carduelis cannabina* im Allgäu/Bayern. **35**: 84-90
- Walter, D. (1996): Außergewöhnliche Neststandorte bei Sumpfrohrsängern *Acrocephalus palustris*. **35**: 197-198
- Walter, D. (1997): Rückläufige Wintermaxima des Bläßhuhns *Fulica atra* auf der Iller in Kempten. **36**: 209-211
- Walter, D. & Pudimat, K. (1999): Uferschwalben (*Riparia riparia*)-Kolonie im Allgäu bei 865 m NN. **38**: 53-55
- Warncke, K. (1961): Zum Verhalten des Steinwälzers in einem atypischen Brutgebiet. **6**: 89-90
- Warncke, K. (1962): Beitrag zur Avifauna der March- und unteren Donauauen. **6**: 234-268
- Warncke, K. (1968): Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) brütete in Mittelfranken. **8**: 401
- Warncke, K. & Wittenberg, J. (1961): Spätbrut der Felsenschwalbe. **6**: 94
- Warncke, K. s. Reinsch, A. (1968)
- Warncke, H. (1955): Kampf zwischen Lachmöwe und Wanderfalk. **4**: 373-374
- Weber, W. s. Ruge, K. (1974)
- Wegner, H. s. Kniess, H. (1980)
- Wegst, C. (2000): Massenzug des Trauerschnäppers *Ficedula hypoleuca* bei Karlsruhe. **39**: 233-235

- Weiss, I. & Schlögel, J. (1993): Erfolgreiche Gittermastbrut des Baumfalken *Falco subbuteo* bei Berkheim (Lkr. Biberach). **32**: 71-72
- Weissert, B. (1983): Fehlbestimmung von Dünnschnabelmöwen *Larus genei* auch in Österreich. **22**: 118-119
- Weller, A.-A. s. Schuchmann, K.-L. (2000)
- Wengersky, A. von (1983): Isabellwürger *Lanius isabellinus* im Attetal, Landkreis Ebersberg **22**: 224
- Werner, H. s. Schuster, S. (1977)
- Werzinger, J. (1965): Spätes Flüggewerden einer Tafelente (*Aythya ferina*). **7**: 337-338
- Werzinger, J. s. Kaus, D. (1971)
- Werzinger, J. s. Link, H. (1969)
- Westermann, K. (1961): Ornithologische Beobachtungen in Sardinien. **6**: 55-66
- Westermann, K. s. Hölzinger, J. (1972)
- Wettstein, O. (1929): Über *Parus atricapillus submontanus* Kleinschm. und Tschusi, in Niederösterreich. **2**: 16-18
- Weyhe, W. s. Hölzinger, J. (1972)
- Wicht, U. von (1972): Erstmals kolonieartiges Brüten des Höckerschwanen (*Cygnus olor*) am Bodensee. **11**: 164-167
- Wicht, U. von (1978): Zur Arealausweitung der Rötelschwalbe *Hirundo daurica* in Europa. **17**: 79-98
- Wicht, U. von s. Koenig, C. (1973)
- Willi, P. s. Suchantke, A. (1963)
- Willy, J. (1976): Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* in Bayern beobachtet. **15**: 99-100
- Willy, J. s. Heiser, F. (1972)
- Wilm, H. (1973): Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) bei Bamberg. **12**: 269
- Wilm, H. (1976): Brutnachweis des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* bei Bamberg. **15**: 96
- Wilm, H. (1984): Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* als Brutvogel bei Bamberg. **23**: 233-234
- Windesperger, W. s. Reichholz, J. (1972)
- Winkler, M. (1973): Die Fangstatistik von Rohrsängern und Grasmücken (Sylviidae) im Ismaninger Teichgebiet von 1958 bis 1971. **12**: 198-209
- Witt, K. (1970): Zur Verbreitung und Ökologie der Zippammer (*Emberiza cia*) im Hochschwarzwald. **9**: 197-201
- Witt, K. s. Reichholz, J. (1962)
- Wittenberg, J. (1962): Trinkende Grünspechte (*Picus viridis*). **6**: 282
- Wittenberg, J. (1985): Habicht *Accipiter gentilis* jagt zu Fuß in der Stadt. **24**: 180
- Wittenberg, J. (1999): Neue Gebäudebruten der Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* in Süddeutschland 1998. **38**: 55-59
- Wittenberg, J. s. Warncke, K. (1961)
- Wolf, G. (1941): Über die Zunahme des Kolkraaben (*Corvus corax*) im Allgäu. **3**: 163-164
- Wolf, H. (1979): Brütet der Wüstengimpel *Rhodopechys githaginea* auf Kreta? **18**: 196-197
- Wolf, H. (1985): Computerhilfen für eine Lokala-vifauna. **24**: 109-116
- Wolf, T. s. Leibl, F. (1993)
- Wörner, G. (1961): Der Zwergfliegenschnäpper – Brutvogel im Park Linderhof. **6**: 87
- Wotzel, F. (1961): Die Bestände des Großen Brachvogels und des Kiebitzes im Salzburger Flachgau und seinen oberösterreichischen Grenzgebieten. **6**: 42-54
- Wulffen, B. (1997): Aus der Geschichte der Ornithologie Bayerns. **36**: 73-79
- Wüst, W. (1930): Ornithologische Beobachtungen im Ampermoos. **2**: 101-107
- Wüst, W. (1932): Nachweis eines Blaukehlchenbrutplatzes bei München. **2**: 219-220
- Wüst, W. (1934): Ergebnisse einer Umwandlung des Chiemsees Ostern 1933. **2**: 323
- Wüst, W. (1934): Eine bemerkenswerte Privatsammlung: Die Vögel von Seon und Umgebung. **2**: 324-325
- Wüst, W. (1934): Zur Verbreitung des Berglaubvogels, *Phylloscopus b. bonelli* (Vieill.). **2**: 325
- Wüst, W. (1934): Streifzüge durch die Jäckelsche Weihergegend. **2**: 325-328
- Wüst, W. (1934): Rothalsgänse (*Branta ruficollis* [Pall.]) zum erstenmal auch in Bayern erlegt. **2**: 330
- Wüst, W. (1934): Beobachtungen im südlichen Ries. **2**: 330-331
- Wüst, W. (1937): Schmalschnäbliger Wassertretter, *Phalaropus lobatus* (L.) bei Ismaning erlegt. **2**: 449-450
- Wüst, W. (1938): Neues zum Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea* [L.]) in Südbayern. **3**: 9-10
- Wüst, W. (1939): Naturschutzgebiet Vogelfreistätte südlich der Fischteiche der Mittleren Isar. **3**: 39-42
- Wüst, W. (1940): 10 Jahre Ismaninger Teichgebiet. **3**: 65-75

- Wüst, W. (1941): Ein deutscher Ringfund vom Uhu, *Bubo b. bubo* (L.). 3: 162
- Wüst, W. (1941): Fragliche Beobachtung der Schwarzkehldrossel, *Turdus ruficollis atrogularis* Temminck. 3: 162
- Wüst, W. (1951): Entwicklung einer Mauserzugstation der Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.) bei Ismaning. 4: 22-28
- Wüst, W. (1953): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 13. Bericht: Mitte Juli 1950 bis Mitte April 1953. 4: 44-54
- Wüst, W. (1954): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 14. Bericht: Mitte April bis Ende Dezember 1953. 4: 107-117
- Wüst, W. (1954): Die Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. 4: 118-132
- Wüst, W. (1954): Der Rotkehlpieper, *Anthus cervinus* (Pallas) in Oberbayern. 4: 146-149
- Wüst, W. (1954): 25 Jahre Ismaninger Vogelparadies. 4: 197-260
- Wüst, W. (1956): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 16. Bericht: Anfang Oktober 1954 bis Ende Dezember 1955. 4: 390-401
- Wüst, W. (1957): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 17. Bericht: 1956. 4: 489-499
- Wüst, W. (1957): Landvögel an Bord auf hoher See: Weißkehlammer (*Zonotrichia albicollis*) im Atlantik. 4: 721
- Wüst, W. (1958): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), der Bayerischen Landesenergieversorgung. 18. Bericht: 1957. 5: 1-9
- Wüst, W. (1958): Die Entwicklung des Graureiherbestandes (*Ardea cinerea*) im Ismaninger Teichgebiet. 5: 10-16
- Wüst, W. (1958): Invasion von Zwergscharben (*Phalacrocorax pygmaeus*) in Süddeutschland. 5: 89-93
- Wüst, W. (1959): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landesenergieversorgung. 19. Bericht: 1958. 5: 167-180
- Wüst, W. (1960): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landesenergieversorgung. 20. Bericht: 1959. 5: 434-451
- Wüst, W. (1961): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landesenergieversorgung. 21. Bericht: 1960. 6: 1-20
- Wüst, W. (1961): Mehrmals kopfüber hängende Saatkrähe, *Corvus frugilegus*. 6: 91-92
- Wüst, W. (1961): Dunkler Sturmtaucher, *Puffinus griseus* (Gmelin), als Irrgast im deutschen Binnenland. 6: 183-184
- Wüst, W. (1962): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landesenergieversorgung. 22. Bericht: 1961. 6: 193-217
- Wüst, W. (1962): Weitere Sommervorkommen der Rotdrossel (*Turdus iliacus*) in den Bayerischen Alpen sowie im voralpinen Hügel- und Moorland. 6: 285-286
- Wüst, W. (1962): Prodrum einer "Avifauna Bayerns" 6: 305-358
- Wüst, W. (1963): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 23. Bericht: 1962. 6: 410-423
- Wüst, W. (1963): Wieder ein Bartgeier (*Gypaetus barbatus*) bei Rauris. 6: 472
- Wüst, W. (1963): 1. Nachtrag zum Prodrum einer "Avifauna Bayerns" 6: 557-558
- Wüst, W. (1963): Über einige Wirkungen des Jahrhundert-Winters 1962/63 auf die Vogelwelt. 6: 559-561
- Wüst, W. (1964): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 24. Bericht 1963. 7: 1-18
- Wüst, W. (1964): Mornellregenpfeifer *Eudromias morinellus* im Bayerischen Wald. 7: 123
- Wüst, W. (1965): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 25. Bericht 1964. 7: 233-248
- Wüst, W. (1966): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 26. Bericht 1964. 7: 521-535
- Wüst, W. (1966): Nordischer Laubsänger, *Phylloscopus borealis*, in München. 7: 863-865
- Wüst, W. (1967): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 27. Bericht 1966. 8: 1-12
- Wüst, W. (1968): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 28. Bericht 1967. 8: 225-234
- Wüst, W. (1969): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 29. Bericht 1968. 8: 434-445
- Wüst, W. (1972): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 30. Bericht 1969-1971. 11: 288-313
- Wüst, W. (1975): Zwei für Bayern neue Vogelarten: Häherkuckuck *Clamator glandarius* und Rötelschwalbe *Hirundo daurica*. 14: 87

- Wüst, W. (1975): Fichtenammer *Emberiza leucocephala* in Bayern. **14**: 319
- Wüst, W. (1976): Habichtsadler im Murnauer Moos, Obb. **15**: 216-217
- Wüst, W. (1976): Verlauf und Ergebnisse zweier Frühjahrsfahrten in den Jahren 1974 und 1975 durch Zentralasien: Usbekistan, Tadschikistan und (nur 1974) Kasachstan. **15**: 121-160
- Wüst, W. (1976): Hirtenstar *Acridotheres tristis* überwintert in München. **15**: 217-218
- Wüst, W. (1976): Weitere Karmingimpel *Capodacus erythrinus* in Oberbayern. **15**: 218-219
- Wüst, W. (1978): Europareservat Ismaninger Teichgebiet. 31. Bericht 1972-1973. **17**: 9-36
- Wüst, W. (1991): Adulte Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis* auf dem Olympiasee in München. **30**: 92-94
- Wüst, W. (1992): Neue Vögel des Nymphenburger Parks. **31**: 57-61
- Wüst, W., Sommerfeld, E. & W. Zedler (1967): Beringte Hausspätzin, *Passer domesticus* w, erreicht das neunte Lebensjahr. **8**: 178-181
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1963)
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1964a,b)
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1965a,b,c)
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1966a,b,c)
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1967a,b)
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1968a,b)
- Wüst, W. s. Bezzel, E. (1969a,b)
- Wüst, W. s. Greiner, H. (1976)
- Wüst, W. s. Reichholz, J. (1962)
- Zach, P. (1978): Erste Brut der Beutelmeise *Remiz pendulinus* im Rötelseeweihergebiet bei Cham. **17**: 182-183
- Zach, P. (1978): Erster Brutversuch des Rothalstauchers *Podiceps griseigena* in Bayern. **17**: 329-330
- Zach, P. (1980): Uferschwalben *Riparia riparia* als Brutvögel in Kiesaufschüttungen. **19**: 115-116
- Zahalka, H. (1974): Beobachtung eines Mäusebussards *Buteo buteo* in 1500 m Höhe über dem Grund (= 2300 m ü. NN). **13**: 98-99
- Zahner, V. & Loy, H. (2000): Baumbrütende Mauersegler *Apus apus* und Eichenwirtschaft im Spessart. **39**: 187-196
- Zedler, W. (1963): Wieder Felsenschwalben (*Ptyonoprogne rupestris*) an der Luegsteinwand bei Oberaudorf. **6**: 571-572
- Zedler, W. (1963): Ziehende Tafelenten (*Aythya ferina*) im Münchner Stadtgebiet. **6**: 469-470
- Zedler, W. (1963): Zum "Kopfüberhängen" von Raben- und Greifvögeln. **6**: 468-469
- Zedler, W. (1965): Beobachtungen an den Schlafplätzen des Stars (*Sturnus vulgaris* L.) im Zentrum von München. **7**: 283-298
- Zedler, W. (1966): Entenzählungen auf dem Innstausee Rosenheim **7**: 757-759
- Zedler, W. s. Wüst, W. (1967)
- Zeppetbauer, A. (1941): Mutmaßliche Beobachtung eines Papageitauchers. **3**: 158-159
- Ziegler, W. s. Strobel, G. (1987)
- Zink, G. (1951): Auffällige Schwankungen im Winterbestand einiger Vogelarten. **4**: 8-12
- Zink, G. (1957): Fundliste in Bayern beringter Mäusebussarde (*B. buteo*). **4**: 540-547
- Zintl, H. (1970): Gänsesäger (*Mergus merganser*) brütet im Nistkasten. **9**: 237-240
- Zintl, H. (1979): Ein Gänsesäger *Mergus merganser* von der oberen Isar in Finnisch Lappland **18**: 83
- Zintl, H. s. Bauer, U. (1974)
- Zintl, H. s. Bauer, U. (1995)
- Zintl, H. s. Janner, S. (1982)
- Zintl, H. s. Sturm, K. (1977)
- Zöllner, W. (1975): Versuche zur Ansiedlung und Beobachtungen zur Brutbiologie des Eisvogels *Alcedo atthis*. **14**: 196-205
- Zucchi, H. (1988): Eine weitere Beobachtung zur "Hochhaus-Übernachtung" des Kormorans *Phalacrocorax carbo*. **27**: 144-145
- Zumstein, F. (1924): Materialien aus der Rheinpfalz. **1**: 65-66; 85f
- Zumstein, F. (1928): Seltene Vogelarten aus der Rheinpfalz. **1**: 158-164
- Zumstein, F. (1933): Beiträge zur Vogelwelt der Pfalz. **2**: 281-286

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [40_1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Register Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern und Ornithologischer Anzeiger \(1919 bis 2000\) 65-111](#)