



## Bildteil




**Abb. 1.** Blick über das Westbecken, im Hintergrund München – *The western part of the reservoir, the skyline of Munich in the background.*

Foto: P. Dreyer



**Abb. 2.** Blick vom Norddamm nach Südosten zur Insel und zum Tafelberg, 24. Februar 1996 – *View from the north dam to south-eastward showing the island with the colony of Cormorants and Grey Herons and the „Tafelberg“. Peninsula.*

Foto: H. Rennau



**Abb. 3.** Am Einlauf, 18. Mai 2008 – *At the inflow.*

Foto: T. Grüner



Abb. 4. Einlaufbauwerk an den Fischteichen („Sprenkler“), 29. April 2005 – Inflow structure at the fish ponds („Sprenkler“).  
Foto: H. Rennau



Abb. 6. Kolbenente *Netta rufina* mit pull., 26. Juni 1999 – Red-crested Pochard with chicks. Foto: T. Grüner



Abb. 5. Blick über den Süddamm nach Osten. Links das Westbecken, rechts der Isarkanal. 1. Mai 1991 – View to eastward over the southern embankment. On the left, the western reservoir basin; on the right the Isar channel.  
Foto: H. Rennau



Abb. 7. Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana* und Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*, 23. September 1986 – Spotted Crake and Sedge Warbler.

Foto: T. Grüner




Abb. 9. Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula*, 26. April 2009 – Bluethroat.

Foto: T. Grüner



Abb. 8. Zwergrandläufer *Calidris minuta*, 20. September 1998 – Little Stint.

Foto: T. Grüner



Abb. 10. Schwarzhalsstaucher *Podiceps nigricollis*, Paar mit pull., 17. Juni 2006 – Black-necked Grebe pair with chicks.

Foto: T. Grüner



Abb. 11. Sonnenaufgang über den Fischteichen, 19. September 1999 – *Sunrise over the fish ponds.*

Foto: T. Grüner



Abb. 12. Große Rohrdommel *Botaurus [s.] stellaris*, 3. März 2005 – *Bittern.*

Foto: T. Grüner




Abb. 13. Beutelmeise *Remiz pendulinus* sammelt Nistmaterial, 1. Mai 2001 – *Penduline Tit collecting nest material.*

Foto: T. Grüner



**Abb. 14.** Streifengänse *Anser indicus* mit Graugänsen *Anser anser* und Lachmöwen *Larus ridibundus* – Bar-headed Geese together with Greylag Geese and Black-headed Gulls.

Foto: P. Dreyer



**Abb. 16.** Gemischte Vogelansammlung mit Graureiher *Ardea [c.] cinerea*, Blässhuhn *Fulica atra*, Kiebitz *Vanellus vanellus* und Graugänsen *Anser anser* – Mixed assemblage of birds with Grey Heron, Coot, Lapwing and Greylag Geese.

Foto: P. Dreyer



**Abb. 15.** Kiebitz *Vanellus vanellus* – Lapwing.

Foto: P. Dreyer



**Abb. 18.** Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*, 29. April 2008. – Great Reed Warbler. Foto: T. Grüner



**Abb. 17.** Morgennebel am Teichgut Birkenhof, 1. Mai 1990 – Morning mist near the "Birkenhof" fish farm.

Foto: T. Grüner

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [48\\_3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Bildteil 274-278](#)