

Kurze Mitteilungen

Zweitbruten bei der Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Der Verlauf des herbstlichen Durchzuges diesjähriger Wasserrallen im Ismaninger Teichgebiet läßt vermuten, daß Zweitbruten bei der Wasserralle regelmäßig vorkommen; dennoch fehlte der unmittelbare Nachweis an eigenen Brutvögeln.

Aus dem Jahre 1963 liegen nun zwei Nachweise aus dem Ismaninger Teichgebiet vor:

1. Am 15. September 1963 konnte eine ca. 10 Tage alte Wasserralle gefangen und beringt werden. Ein weiterer Jungvogel, der mit Sicherheit der gleichen Brut angehörte, wurde am 6. Oktober 1963 von M. SCHMITT, noch immer flugunfähig, gekennzeichnet.

Einer der zugehörigen Altvögel, der bereits 1961 im Gebiet Brutvogel war, wurde während der gesamten Brutsaison im selben Revier kontrolliert. Da in diesem Brutrevier eine bereits Ende Juni geschlüpfte Erstbrut durch Fang nachgewiesen werden konnte, darf man wohl mit Sicherheit annehmen, daß es sich hier um eine erfolgreiche Erst- und Zweitbrut des gleichen Paares handelt.

2. Ein Jungvogel einer weiteren Spätbrut wurde am 26. August 1963 im Alter von etwa 3 Wochen gefangen. Ob auch hier eine erfolgreiche Erstbrut vorausging, ist unbekannt.

Manfred S u m p e r , 8 München 42, Eckermannstr. 9

Anm. d. Schriftleitung: Über Spät- bzw. Zweitbruten bei der Wasserralle wurde bereits mehrfach berichtet, z. B. Beitr. Fortpfl. 1939, 15, p. 20; Org. Club Neerl. Vogelk. 6, p. 134 ff. und WITHERBY, The Handbook of British Birds.

Junge Rotmilane (*Milvus milvus*) fangen Insekten

Als ich am 6. 8. 1963 nachmittags in der ostwärtigen Lechniederung heimwärts radelte, entdeckte ich etwa 12 Kilometer nördlich von Augsburg zehn Greife. Bereits fünf konnte ich ohne Fernglas als junge Rotmilane ansprechen. Zum Anhalten zwangen mich jedoch erst ihre eleganten Wendungen. Mein Verdacht, daß die Greife Insekten fangen, verstärkte sich, als ich die Milane mit der zehnfachen Vergrößerung beobachtete. Ich versuchte auf den Feldwegen so nahe wie möglich unter die jungen Rotmilane zu gelangen. Und jetzt konnte ich zweifelsfrei Insektenfang feststellen. Wie bei einem ja-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [7_1](#)

Autor(en)/Author(s): Sumper Manfred

Artikel/Article: [Kurze Mitteilungen: Zweitbruten bei der Wasserralle \(*Rallus aquaticus*\) 121](#)