

Bruten von Greifvögeln auf Gittermasten

Werner Gleichner & Arno Bobbe

GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2013): Bruten von Greifvögeln auf Gittermasten. Apus 18: 161-163.

Aus dem Salzlandkreis werden Beobachtungen von Mastenbruten aus dem Zeitraum 1988 bis 2012 der Arten Rotmilan *Milvus milvus*, Schwarzmilan *Milvus migrans* und Mäusebussard *Buteo buteo* mitgeteilt. Alle Nachweise von Rotmilanen (1988 und 2011), von Schwarzmilanen (2004 und 2001 bis 2011) sowie ein Nachweis vom Mäusebussard (2012) gelangen auf Masten von 110 kV-Leitungen.

GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2013): Birds of prey breeding on Pylons. Apus 18: 161-163.

Breeding records of Red Kite, Black Kite and Common Buzzard on pylons in the county Salzlandkreis from 1988 to 2012 are documented. All records of Red Kite (1988 and 2011) and Black Kite (2004 and 2001 to 2011) and one record from Common Buzzard (2012) were on pylons of 110 kV electric lines.

Werner Gleichner, Dorfallee 14, OT Trado, 01920 Oßling. E-Mail: gleichner@freenet.de

Arno Bobbe, Fuhnestr. 9, 06406 Bernburg, E-Mail: christel.bobbe@t-online.de

Einleitung

Mastenbruten von Greifvögeln stellen auch in jüngster Vergangenheit keine Seltenheiten dar (z.B. KLAMMER 2011). Seit Jahrzehnten kartieren wir den Greifvogelbrutbestand des Altkreises Bernburg, ab dem Jahr 2000 auch im Rahmen des Monitoringprogramms „Greifvögel und Eulen“ der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hier wird über die dabei erfassten Bruten, alle auf Masten von 110 kV-Leitungen, berichtet.

Rotmilan

(1) H. SCHULTZ (1990) gelang bereits 1988 der Nachweis eines besetzten Horstes am Ende einer Quertraverse (Abb. 1). Der Mast stand zwischen den Orten Peißen und Kustrena, ca. 1,5 km westlich Peißen. Am 14.5. wurde der brütende Altvogel registriert. Am 15.7. befan-

den sich 2 fast flügge Jungvögel im Horst, die am 20.7. den Horst verlassen hatten.

(2) Erst 2011 erfolgte wieder ein Brutnachweis durch A. Bobbe, der am 15.5. den Horst auf einem Masten etwa 0,5 km nördlich Gramsdorf entdeckte. Der Horst befand sich im Mastinnenteil in Höhe der oberen Quertraverse (Abb. 2). Am 5.7. wurde 1 fast flügger Jungvogel bemerkt.

Neben unseren Nachweisen aus dem Salzlandkreis ermittelten wir aus der Literatur folgende Auswahl an Mastbruten des Rotmilans:

ORTLIEB (1989) führt insgesamt sechs Bruten des Rotmilans aus der Vergangenheit an: 2 x in der Rheinebene 1951 und 1962, 1 x in Hessen 1949, 1 x in Schleswig-Holstein 1955, 1 x im Müritzgebiet 1947 und 1 x bei Artern im ehemaligen Bezirk Halle.

SCHWARZ (1990) nennt eine erfolgreiche Rot-



milanbrut aus dem LSG „Saaletal“ zwischen Merseburg und Halle. W. Ufer entdeckte den Horst, der am 7.6. einen Jungvogel enthielt. Als Horstunterlage diente ein altes Krähenest auf einem 15-kV Mast.

FRITSCH (1992) nennt eine Rotmilanbrut im Altkreis Weißenfels südlich von Starsiedel. Der Horst befand sich auf einem Seitenträger und wurde auf einem Nest der Rabenkrähe errichtet. Der Wachplatz des 2. Altvogels befand sich auf dem Erdboden.

AEBISCHER (2009) zeigt das Foto einer Mastenbrut des Rotmilans in Vorarlberg, Österreich.

Schwarzmilan

(3) 2001 wurde die erste Brut auf einem Gittermast ca. 1 km nördlich von Aderstedt entdeckt, unweit der B 185. Im Folgejahr 2002 wurde der Horst auf dem 150 m südlicher stehenden Nachbarmast errichtet. Ab 2003 zog das Paar auf den Mast von 2001 zurück und brütete jährlich bis 2011 im selben Horst erfolgreich. 2011 wurde 1 Jungvogel flügge (Abb. 3).

(4) 2003 brütete ein Paar nordöstlich des Dröbel'schen Busches, ca. 1 km westlich Latdorf. Der Horst befand sich auf der unteren Traverse dicht am Mast (Abb. 5). Am 8.6. wurde ein Jungvogel bemerkt, der später auch flügge wurde.

Mäusebussard

(5) Am 6.4.2012 wurde auf dem Nachbarmast der von H. SCHULTZ (1990) nachgewiesenen

Rotmilanbrut aus dem Jahr 1988 (s.o.), ein Horst vom Mäusebussard errichtet, worin später 2 Jungvögel flügge wurden (Abb. 4).

Kolkrabe

Weiterhin wurden im Altkreis Bernburg 10 Kolkrabenhorste auf Elektromasten bekannt, so bei Aderstedt, Altenburg, Borsdorf, Bründel, Gnetsch, Haus Zeitz, Könnern, Latdorf, Peißen und Rothenburg. Keiner dieser Horste wurde bisher von Milanen oder Bussarden nachgenutzt, nur Turmfalke und Baumfalke waren Nachnutzer. Horste auf Seitenträgern sind vermutlich häufiger zu beobachten als solche im Mastinneren. Horste von Masten werden häufig durch Stürme abgetragen oder durch die Netzbetreiber entfernt. Masthorste weisen auf die Flexibilität beider Milanarten bei der Brutplatzwahl hin.

Literatur

- AEBISCHER, A. (2009): Der Rotmilan. Haupt Verlag, Bern.
- FRITSCH, G. (1992): Kolkraben- und Rotmilanbrut auf Hochspannungsmasten im Kreis Weißenfels. Apus 8: 91-92.
- KLAMMER, G. (2011): Neue Erkenntnisse über die Baumfalkenpopulation *Falco subbuteo* im Großraum Halle-Leipzig. Apus 16: 3-21.
- ORTLIEB, R. (1989): Der Rotmilan. Die Neue Brehm-Bücherei, Bd. 532, 3. überarb. Aufl. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
- SCHULTZ, H. (1990): Brut auf Hochspannungsmast. Apus 7: 267.
- SCHWARZ, U. (1990): Erfolgreiche Rotmilanbrut auf Hochspannungsmast. Apus 8: 59-61.





Abb. 1: Rotmilanhorst bei Peißen, links am Ende der Quertraverse. 1988. Foto: W. Gleichner.

Fig. 1: Red Kite nest near Peißen at the left end of the cross traverse. 1988.



Abb. 2: Rotmilanhorst bei Gramsdorf im Mastinneren. 2011. Foto: A. Bobbe.

Fig. 2: Red Kite nest near Gramsdorf in the inner part of the pylon. 2011.



Abb. 3: Schwarzmilanhorst bei Aderstedt, mittig rechts in der Quertraverse, zwei ad. wachen, ein flügger Jungvogel im Horst. 2011. Foto: A. Bobbe.

Fig. 3: Black Kite nest near Aderstedt in the middle of the right cross traverse. Two adults guard, one fledged juvenile in the nest. 2011.



Abb. 4: Mäusebussardhorst bei Peißen, mittig links in der Quertraverse, ein ad. wacht, zweiter ad. brütet. 6.4.2012. Foto: W. Gleichner.

Fig. 4: Common Buzzard nest near Peißen in the middle of the left cross traverse. One adult guards, second adult broods. 6.4.2012.



Abb. 5: Schwarzmilanhorst bei Latdorf im Mastinneren. 2003. Foto: A. Bobbe.

Fig. 5: Black Kite nest near Latdorf in the inner part of the pylon. 2003.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [18_2013](#)

Autor(en)/Author(s): Gleichner Werner, Bobbe Arno

Artikel/Article: [Bruten von Greifvögeln auf Gittermasten 161-163](#)