

Außergewöhnlich ist die Feststellung eines Vogels am 10. 12. vom Muldestausee bei Pouch. Der Strandläufer konnte aus geringer Entfernung durch das 26fache „Asiola“ ausgiebig betrachtet werden, wobei folgende Merkmale notiert werden konnten: Beine und Schnabel schwarz, letzterer gerade und etwa kopflang; Unterseite völlig weiß; Oberseite einfarbig graubraun, Federn ohne Säume; angedeuteter heller Überaugenstreif; Schwanz und Bürzel dunkel, Schwanzkanten hell; im Flug schwache helle Flügelbinde. Der Vogel machte einen gesunden Eindruck. Nach GLUTZ v. BLOTZHEIM et al. (1975) werden im November/Dezember in Mitteleuropa nur noch vereinzelte Nachzügler beobachtet. Die bisher späteste Feststellung aus dem Bezirk Halle nennt GNIELKA (1971) — 5. 11. 1954.

#### Sichelstrandläufer — *Calidris ferruginea*

Die ersten 5 Vögel konnten am 20. 8. im Restloch Paupitzsch beobachtet werden. Am 24. 8. hielten sich hier noch 2 Sichelstrandläufer auf. In der Grube Theodor II am 9., 20. und 24. 9. jeweils ein Tier, vermutlich ein und derselbe Vogel.

#### Sanderling — *Calidris alba*

Am 8. und 9. 9. hielt sich ein Sanderling im Ruhekleid in der Grube Theodor II unter Alpen-, Sichel- und Zwergstrandläufern auf, so daß eine gute Vergleichsmöglichkeit bestand.

#### Literatur:

- Glutz v. Blotzheim, U. N., Bauer, K. M., und E. Bezzel (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6. Charadriiformes (I. Teil). Wiesbaden.
- Gnielka, R. (1971): Der Durchzug von Limikolen an den Mansfelder Seen. *Hercynia N. F.* 8, 312—343
- Köck, U.-V. (im Druck): Beobachtungen an einem Schlafplatz des Großen Brachvogels (*Numenius arquata* L.). *Beitr. z. Vogelk.*

Uwe-Volkmar Köck 44, Bitterfeld, Saarstr. 1a

## Wasservogelzählungen an der Mittelelbe bei Havelberg 1978/79

Von Lothar Plath

1. Witterung, Wasserstände, Störungen: Die Zählungen an dem 13 km langen Elbeabschnitt zwischen Schönfeld (Elbe-km 409) und Havelberg (Elbe-km 422) erfolgten wiederum von der rechten Elbeseite aus. — Nach einem annähernd normalen Witterungsverlauf bis Ende Dezember 1978 setzte eine bis Anfang März 1979 anhaltende Frostperiode ein, während der extrem niedrige Temperaturen registriert wurden. Von Anfang Januar bis März 1979 lag eine geschlossene und stellenweise stark verwehte Schneedecke. Wegen dieser Verwehungen war der betreffende Elbeabschnitt zeitweise nicht passierbar, so daß eine geplante Zählung im Februar ausfallen und die im Januar vorzeitig abgebrochen werden mußte. Nach der Schneeschmelze im März stieg der Wasserstand der Elbe an, die Außendeichflächen blieben wochenlang überflutet und selbst bei der Kon-

trolle Ende Mai war der Mittelwasserstand noch nicht wieder erreicht. Störungen im Bereich der Elbaue wurden während dieser Zählperiode an den Zähltagen nicht registriert.

Zählung 11. 8. 1978: Wasserstand unter Mittelwasser, die Temporärgewässer im Bereich des Rüdows bei Schönfeld, beliebte Aufenthaltsorte von Wasservögeln, zum großen Teil trockengefallen.

Zählung 15. 9. 1978: Wasserstand etwa 30 cm unter Mittelwasser.

Zählung 20. 10. 1978: Wasserstand etwa 25 cm unter Mittelwasser.

Zählung 10. 11. 1978: Etwa Mittelwasserstand, Nebel, doch gerade noch ausreichende Sicht.

Zählung 21. 12. 1978: Wasserstand etwa 50 cm über Mittelwasser, am Tag der Kontrolle wie an den Vortagen leichter Frost bis  $-4^{\circ}\text{C}$ , Nebengewässer z. T. leicht vereist.

Zählung 19. 1. 1979: Wasserstand 60 cm über Mittelwasser. Die Kontrolle fiel in eine Frostperiode, in der Temperaturen bis  $-20^{\circ}\text{C}$  registriert wurden. Nebengewässer und Bühnenfelder bis zur Stromstreichlinie vereist, geschlossene Schneedecke mit starken Verwehungen. Vorzeitigen Abbruch der Kontrolle.

Zählung 16. 3. 1979: Wasserstand etwa 250 cm über Mittelwasser, die gesamte Elbaue zwischen den Deichen überflutet. Kontrolle nur vom Deich aus möglich.

Zählung 20. 4. 1979: Wasserstand 230 cm über Mittelwasser, Kontrolle wiederum nur vom Deich aus möglich.

Zählung 27. 5. 1979: Wasserstand 30 cm über Mittelwasser.

2. Ergebnisse: Die Zahl der registrierten Wasservögel, die Abundanzen und die Dominanzen sind der Tabelle zu entnehmen. Nach Vereisung der Nebengewässer und der Bühnenfelder Anfang Januar 1979 waren den Wasservögeln die Aufenthaltsräume, die Ruhigwasserzonen, genommen, sie waren abgewandert. — Bei der Zählung im Mai 1979 wurden am linken Elbeufer zwischen den Elbe-Kilometern 419—420 3 führende Grauganspaare festgestellt (die in der Tabelle ausgewiesene Zahl versteht sich als Summe von Alt- und Jungvögeln), die vermutlich im Uferbereich der Elbe gebrütet haben. Diese Vermutung wird dadurch erhärtet, daß im Frühjahr 1979 wegen des Hochwassers traditionelle Graugansbrutplätze (z. B. NSG Stremel oberhalb von Havelberg) den Gänsen nicht zur Verfügung standen und diese auf Ausweichbrutplätze angewiesen waren (so z. B. auch erstmalig Brut im NSG Düstere Lake oberhalb von Havelberg). Führende Brandganspaare wurden bei der Zählung Ende Mai noch nicht beobachtet.

Dipl.-Ing. Lothar Plath, 2520 Rostock 22, Rigaer Str. 18

Zahl der Wasservögel (Expl.), Abundanzen (Expl./10 Elbe-km) und Dominanzen (%) 1978/79 auf dem Elbeabschnitt Schönfeld—Havelberg (Elbe-km 409—422)

Art	11. 8. 78	15. 9. 78	20. 10. 78	10. 11. 78	21. 12. 78	19. 1. 79*	16. 3. 79	20. 4. 79	27. 5. 79
Haubentaucher	10	61	39	19	17	1	24	32	50
	7,69	46,92	30,00	14,62	13,08	1,43	18,46	24,62	38,46
Zwergtaucher	0,81	2,35	0,76	0,35	0,14	0,18	1,12	7,77	7,91
	—	—	2	7	4	—	—	—	—
Höckerschwan	—	—	1,54	5,38	3,08	—	—	—	—
	—	—	0,04	0,13	0,03	—	—	—	—
	9	63	147	91	213	28	17	19	88
Singschwan	6,92	48,46	113,08	70,00	163,85	40,00	13,08	14,62	67,69
	0,73	2,42	2,87	1,67	1,70	5,15	0,79	4,61	13,92
	—	—	—	1	29	2	—	—	—
Zwergschwan	—	—	—	0,77	22,31	2,86	—	—	—
	—	—	—	0,02	0,23	0,37	—	—	—
	—	—	77	3	19	—	—	—	—
Graugans	—	—	59,23	2,31	14,62	—	—	—	—
	—	—	1,50	0,06	0,15	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1	—	23
Kanadagans	—	—	—	—	—	—	0,77	—	17,69
	—	—	—	—	—	—	0,05	—	3,64
	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Brandgans	13	—	—	—	—	1,43	—	—	—
	10,00	—	—	—	—	0,18	—	—	—
	1,05	—	—	—	—	—	8	25	54
Pfeifente	—	—	22	7	—	—	6,15	19,23	41,54
	—	—	16,92	5,38	—	—	0,37	6,08	8,54
	—	—	0,43	0,13	—	—	—	2	—
Schnatterente	—	—	—	—	—	—	—	1,54	—
	—	—	—	—	—	—	—	0,49	—
	—	—	—	—	1	—	8	8	4
—	—	—	—	0,77	—	6,15	6,15	3,08	
—	—	—	—	0,01	—	0,37	1,94	0,63	

Art	11. 8. 78	15. 9. 78	20. 10. 78	10. 11. 78	21. 12. 78	19. 1. 79*	16. 3. 79	20. 4. 79	27. 5. 79
Krickente	156 120,00 12,64 766	249 191,54 9,58 1477	257 197,69 5,02 1334	273 210,00 5,01 1096	42 32,31 0,34 3752	— — — 197	24 18,46 1,12 292	40 30,77 9,71 171	4 3,08 0,63 245
Stockente	589,23 62,07	1136,15 56,63	1026,15 26,06	843,08 20,10	2886,15 30,03	281,43 36,21	224,62 13,59	131,54 41,40	188,46 38,77
Knäkente	2 1,54 0,16	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	7 5,38 1,70	11 8,46 1,74
Löffelente	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0,77 0,01	— — —	— — —	11 8,46 2,67	26 20,00 4,11
Tafelente	31 23,85 2,51	98 75,38 3,77	2666 2050,77 52,08	3735 2873,08 68,51	4235 3257,69 33,90	114 162,86 20,96	1222 940,00 56,86	17 13,08 4,13	61 46,92 9,65
Reiherente	— — —	3 2,31 0,12	145 111,54 2,83	79 60,77 1,45	257 197,69 2,06	50 71,42 9,19	68 52,31 3,16	29 22,31 7,04	20 15,38 3,16
Eiderente	— — —	— — —	1 0,77 0,02	1 0,77 0,02	1 0,77 0,01	— — —	— — —	— — —	— — —
Schellente	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0,77 0,01	68 97,14 12,50	46 35,38 2,14	16 12,31 3,88	— — —
Zwergsäger	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1,54 0,02	— — —	2 1,54 0,09	— — —	— — —
Mittelsäger	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0,77 0,16
Gänsesäger	— — —	— — —	— — —	— — —	83 63,85 0,66	57 81,43 10,48	70 53,85 3,26	3 2,31 0,73	— — —

Art	11. 8. 78	15. 9. 78	20. 10. 78	10. 11. 78	21. 12. 78	19. 1. 79*	16. 3. 79	20. 4. 79	27. 5. 79
Wasserralle	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	—	0,77	—	—	—	—	—	—	—
	—	0,04	—	—	—	—	—	—	—
Bleshuhn	247	647	429	140	3837	26	367	32	45
	190,00	497,69	330,00	107,69	2951,54	37,14	282,31	24,62	34,62
	20,02	24,89	8,38	2,57	30,71	4,78	17,08	7,77	7,12
Summe Expl.:	1234	2599	5119	5452	12494	544	2149	412	632
Summe Abund.:	949,23	1999,22	3937,69	4193,85	9610,77	777,14	1653,08	316,92	486,15
Summe Dom.:	99,99	100,00	99,99	100,02	100,01	100,00	100,00	100,02	99,98

\*) Kontrolle nur auf dem Abschnitt Elbe-km 415—422

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [4 3 1979](#)

Autor(en)/Author(s): Plath Lothar

Artikel/Article: [Wasservogelzählungen an der Mittelelbe bei Havelberg 1978/79 130-134](#)