

Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle

Zusammengestellt von Timm Spretke

Der 9. Jahresbericht berücksichtigt wieder Meldungen aus fast allen Teilen des Bezirkes. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß hier nicht alle Beobachtungen veröffentlicht werden können. Ein Teil der Daten ist bereits in den jüngsten Lokalavifaunen verarbeitet und soll hier nicht nochmals publiziert werden. So erscheinen, auch aus Platzgründen, besonders Brutnachweise, Durchzugserscheinungen, ökologische Besonderheiten und natürlich auch Seltenheiten, die unser Wissen ergänzen und erweitern. Trotzdem interessieren die anderen Daten auch, da sie das Erscheinungsbild einer Art abrunden und Grundlage für zusammenfassende Bemerkungen sind sowie auch Basismaterial für die Sachsen-Anhalt-Avifauna darstellen.

Allen Beobachtern, die Daten für den Jahresbericht geliefert haben, sei gedankt, auch wenn sie nicht immer namentlich erwähnt sind. Herr Reinhard Gnielka übernahm in dankenswerter Weise in diesem Bericht wieder die Zusammenstellung aller Beobachtungen von den Tauben bis zu den Sperlingen.

Bemerkungen zu den Ortsangaben: Siehe Jahresbericht 1977, Apus 5, 1—13. Bei weiteren Ortsangaben ist im speziellen Teil der Kreis durch drei bzw. vier (bei Querfurt und Quedlinburg) Großbuchstaben gekennzeichnet.

Beobachter: Die Namen sind in Klammern den Angaben nachgestellt.

Be — S. Beiche, Köthen	Sa — W. Sauerbier,
Ft — G. Fritsch, Leuna	Bad Frankenhausen
Gi — G. Girbig, Naumburg	Sb — P. Schubert,
Gn — R. Gnielka, Halle	Jeber-Bergfrieden
Ha — H. Hampe, Dessau	Sm — J. Schmiedel, Halle
Hb — G. Hildebrandt, Ghetsch	Sö — R. Schönbrodt, Halle
He — W. Haenschke, Dessau	Sp — T. Spretke, Halle
Ho — W.-D. Hoebel, Halle	Sr — R. Schwemler, Wallendorf
Hs — U. Heise, Dessau	St — Dr. A. Stiefel, Halle
Hz — E. Herz, Leuna	Sw — U. Schwarz, Merseburg
Ka — H. Kant, Halle-Neustadt	Sz — E. Schwarze, Roßlau
Kl — W. Klebb, Weißenfels	Ta — H. Tauchnitz, Halle
Kü — H. Kühnel, Köthen	Te — A. Teichmann, Halle
Lu — J. Luge, Köthen	Ti — G. Tiede, Coswig
Or — R. Ortlieb, Helbra	Uf — W. Ufer, Halle-Neustadt
Ry — A. Ryssel, Merseburg	Wa — Dr. B. Walther, Merseburg
Rz — R. Rochlitzer, Köthen	Wi — W. Wischhof, Halle
	Zu — Dr. U. Zuppke, Wittenberg

Weitere Abkürzungen:

ad. — adultus = Altvogel	E, S,
juv. — juvenilis = Jungvogel	W, N — Himmelsrichtungen
immat. — immaturus	p — Anzahl der Stichproben
= unausgefärbt	(= Meldungen)
dj. — diesjähriger Vogel	n — Anzahl der Vögel
BP — Brutpaar	Fg — Fachgruppe

Witterungsübersicht 1982: Das Jahr 1982 war wesentlich zu warm, zu trocken und zu sonnenscheinreich. Das Monatsmittel der Lufttemperatur lag in acht Monaten über den Normalwerten, drei Monate waren zu kalt. Die Monatssummen der Niederschlagshöhe unterschritten die Normalwerte

in sechs Monaten und überschritten diese in drei Monaten. Das Jahr 1982 gehört zu den drei trockensten Jahren dieses Jahrhunderts. Mildes Winterwetter wird ab Mitte Januar durch Frostwetter und einer vollständigen Schneedecke ersetzt. Der Februar war im gesamten Tiefland schneefrei und sonnenscheinreich. Ab Anfang März wieder eisfreie Gewässer. Danach sehr warme Witterung, besonders die Monate Juni bis Dezember. Der Sommer abwechslungsreich mit z. T. heftigen Niederschlägen. Nur Anfang November kühler und erste Bodenfröste.

Quelle:

Ornithologischer Jahresbericht der Fg Merseburg 1982. Auszüge aus dem Monatlichen Witterungsbericht durch Jens Fildebrandt.

Spezieller Teil

Prachtaucher: 6.—16. 11. — 1, Rattmannsdorf (Te, Uf, Ta). 8. 11. — 2, Rattmannsdorf (Ta). 5. 12. — 3, Muldestausee (Gn).

Sternaucher: 31. 10. — 1 (Sw) und 6. 11. — 1, Kiesgrube Hohenweiden/SAA (Ry). 5. 12. — 1, Muldestausee (Gn).

Haubentaucher: 87 BP, Kr. KÖT (Fg). 5 BP, Bösewig (Seifert). 14 BP, Kr. MER (Fg). 9 BP, Mansfelder Seengebiet (Sp). 6 Nestfunde, Kiesgrube Hohenweiden/SAA; durch Badebetrieb zerstört (Uf). 18. 7. — 24 ad. mit 23 juv., Klieken (Sz). 1. 7. — 1 BP mit 1 juv., Kühnauer See/DES; 8 Nester von Fischern zerstört (Lill). Konzentrationen: 24. 7. — 240, Helmestausee/SAN (See) und 5. 12. — 132, Muldestausee (Gn).

Rothalstaucher: 4 BP, Kr. KÖT (Fg). 3. 5. — 1 Paar, Gröbers (Klammer). 5. 12. — 5; 18. 12. — 4 (Te) und 31. 12. — 3, Rattmannsdorf (Ta).

Schwarzhalstaucher: 10 BP, Kr. KÖT (Fg). 6 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (Fg). 18. 7. — 5 BP mit 10 juv., Klieken (Sz). 20.+21. 10. — 1, Hufeisensee/HAL (Weis).

Ohrentaucher: 10. 1. — 2 und 17. 1. — 3, Elbe Kr. KÖT (Rz). 6. 11. — 1, Rattmannsdorf (Te).

Zwergtaucher: 58 BP, Kr. KÖT (Fg). 2 BP, Rahnsdorf/Klebitz/WIT (Seifert). 1 BP, Klieken (Sb). 1 BP, Coswiger Luch/ROS (Sb). 1 BP, Beiderseer Teichgebiet (Ho). 2 BP, Angersdorfer Teiche/SAA (Fg). 3 BP, westl. vom Mühlteich Mosigkau/DES (Ha). Brutverdacht, Saalealtarm bei Mukrenaber (Ho). 16. 5. — 2 Paare balzen, Tausendteich bei Röblingen/EIS (Merkel). Winterkonzentrationen: 2. 1. — 15, Wulfener Bruch/KÖT (Rz). 17. 1. — 23, Elbe km 188—223 (Fg WIT). 17. 10. — 36, Saale Bad Dürrenberg/Leuna/MER (Hz). 2. 11. — 15, Neolit (Rz).

Kormoran: Kr. KÖT (Fg): 15. 2.—7. 4. — p = 8, n = 14 und 20. 8.—19. 12. — p = 13, n = 165, überwiegend Elbe und Neolit. Helmestausee/SAN (Fg Nordhausen): 19. 3.—5. 5. — p = 10, n = 30 und 30. 8.—1. 10. — p = 15, n = 18. 31. 10. — 6, Hufeisensee/HAL (Weis). 25. 10. — 40, Halle-Nietleben nach S (Preuß). 25. 10. — 35, Elbe km 267 (Lill).

Graureiher: Gesonderte Zusammenstellung: Apus 6, 9—10, 1985.

Silberreiher: 1 vom 31. 8.—19. 9., Alte Elbe Melzig/WIT (Dittrich) und 1 am 19. 9., Kiesgrube Wallendorf/MER (Gerstenberger).

Rohrdommel: 15. 1. — 1 Totfund, Elbe Kr. KÖT (Lieske). 17. 1. — 1, Flutrinne nördlich Kollenbey (Te).

Zwergdommel: 9. 6. — 1, Teiche Edderitz/Maasdorf/KÖT (Behrendt). 26. 6. — 1, Mötzlich (Ka).

Weißstorch: 15. 3. — 1, Wulfener Bruch/KÖt (Schnurre). Brutbestand wird gesondert erfaßt.

Schwarzstorch: 1 BP mit 3 Jungen, Kr. WIT (Zehler, Zu). 23. 6. — 1 sucht, auf sumpfiger Wiese Futter, Neudorf/QUED (Weis). 29. 8. — 2 ad. mit 3 juv., Forst Olberg/KÖT (H. Keil), ab 20. 4. — 1—2 im Gebiet. Maximum am 19. 8. — 50, Buschgraben Kolk/KÖT (Lill, Ti).

Höckerschwan: 24 BP, Kr. KÖT (Fg). 18 BP, Kr. DES/ROS (Fg). Mind. 15 BP, Kr. WIT (Fg). 9 BP, Kr. MER (Fg). 8 BP, Kr. SAA (Fg). 3 BP, Mansfelder Seengebiet (Sp). Maximale Konzentration am 14. 3. — 603, Elbe km 198—214 (Fg WIT).

Singschwan: In den Wintermonaten überwiegend auf der Elbe, so z. B. vom 1. 1.—13. 2. — p = 4, n = 197, Elbe Kr. WIT (Fg) und am 12. 12. — 39, Elbe km 188 (Schulz). Ein nicht ganz flugtüchtiger Altvogel am 20. 6. auf der Unstrut zwischen Schönewerda und Kalbsrieth/ART (Sp).

Zwergschwan: 7. 2. — 2, Große Straube/WIT (Zu). 28. 3. — 2 ad., Wendel/WIT (Seifert). 23. 5. — 1 ad., Schladebach unter Höckerschwänen (Friedrich).

Saatgans: Schlafplatz Neolit ab Oktober befliegen, max. am 19. 11. — 10000 (Fg KÖT). Bis März und ab Oktober 2100—5500, Elbwiesen Kr. WIT (Fg). 5. 11.—17. 12. — p = 10, n = 1345, Kr. MER (Fg). 5. 12. — 500, Muldestausee (Gn).

Bleßgans: Unter Saatgänsen am Schlafplatz Neolit ab Oktober, max. 6. 11. — 850 (Fg KÖT). 5. 12. — mind. 10 unter Saatgänsen, Muldestausee (Gn).

Kurzschnabelgans: 15. 3. — 1, flugunfähig, später tot, Michelner Teich/KÖT (Graff).

Zwerggans: 18. 10. und 2. 11. — 2 ad., Neolit (Rz). 13. 11. — 1 immat., Neolit (Rz).

Graugans: 14. 11. — 2, Cösitz (Diessner). 12. 12. — 16, Elbe km 222 (Hirschfeld).

Schneegans: 18. 10.—14. 11. — 1 ad., Neolit (Fg KÖT).

Kanadagans: Weitere Zunahme der Beobachtungen. Kr. DES/ROS auf der Elbe, Mulde und in Klieken: Jan — p = 3, n = 49; Feb — p = 7, n = 115; März — p = 4, n = 61 (Fg). 17. 1. — 8, Elbe km 216—220 (Wenzel, Becher). 21. 2. — 2, Altwasser gegenüber Trebitz, später bis 14. 3. in der Saaleaue zw. Döblitz und Dobis/SAA (Ho, Fg SAA). 14. 3. — 1, Elbe km 187—196 (Schulz, Seifert).

Weißwangengans: 18. 10. — 1 ad. (Rz) und 23. 10. — 1, Neolit (Todte).

Streifengans: 19. 6. — 1 mit Fußring, Helmestausee/SAN (Scheuer).

Rostgans: 27. 11.—19. 12. — 1,1, Feldflur zw. Oebles, Goddula, Tollwitz und bei Wallendorf/MER (Fg). 2. 6. — 1,1, Cösitz (Hb).

Brandgans: 14. 1. — 2, Schellsitzer Aue/NAU (Kotschkar). März—Mai — 11 Beobachtungen, Helmestausee/SAN, max. 10. 4. — 5 (Krause, Scheuer). 14. 5. — 2,2, Elbe km 206 (Zu).

Mandarimente: 5 BP, Stadtgebiet Köthen (Fg).

Pfeifente: Winterdaten: 2. 1. — 2 ♀, Flutrinne nördl. Kollenbey (Te). 17. 1. — 4, Saale zw. Rothenburg und Rumpin/SAA (W. Müller); 1,2, Elbe Kr. KÖT (Rz). 31. 1. — 2,1, Saale zw. Friedeburg und Rumpin/SAA und 1,1, Wehr Wettin/SAA (Ho). 15. 2. — 3,3, Elbe Kr. KÖT (Rz). 19. 12. — 1, Neolit (Rz).

Schnatterente: 9. 1. — 1, Elbe bei Vockerode/GRÄ (Sb). 23. 1. — 1, Flutrinne nördl. Kollenbey (Te). 9. 6. — 1 ♂ und 12. 6. — 2,2, Edderitz/Maasdorf/KÖT (Behrendt). 13. 6. — 1,1, Schladebach (Friedrich).

Krickente: 3 BP, Kr. KÖT (Fg); am 3. 6. — 1 ♀ und 10 Eier ausgemäht, Wulfener Bruch/KÖT (Beinert). 28. 5. — 1 ♀ verleitet, Jägerloch Planena (Ta). Klieken und Schönitzer See/GRÄ: Mai — p = 2, n = 5, Juni — p = 3, n = 13 (Fg DES/ROS). Winteransammlung: 2. 1. — 34,10, Wulfener Bruch/KÖT (Rz); 20. 2. — 140, Mansfelder Seengebiet (Merker). Maximum Helmestausee/SAN am 29.—31. 10. — 5000 (Fg HAL).

Stockente: 500 BP, Kr. KÖT (Fg). Einige maximale Konzentrationen: 16. 1. — 8200, Flutrinne nördl. Kollenbey (Te). 31. 1. — 1000, Saale zw. Wettin und Rothenburg/SAA (Ho). 14. 2. — 10063, Elbe km 185—229 und Nebengewässer (Fg WIT). 22. 10. — 12000, Helmestausee/SAN (Willems). 14. 11. — 4695, Mansfelder Seengebiet (Sp).

Spießente: Winterdaten: 16.—17. 1. — 1 ♂, Saale zw. Brachwitz und Döblitz/SAA (Ho). 23. 1. — 2 ♂, Kanal Werder/MER (Te), am 31. 1. ebenda (Wa).

Knäkente: 16 BP, Kr. KÖT (Fg). 20. 5. — 1 ♂, bei Roßlau Brutverdacht (Sb). 23. 5.—11. 7. — p = 9, n = 17, Schladebach (Fg MER). Revier Kühnau/DES, Klieken und Schönitzer See/GRÄ: Mai — p = 8, n = 21, Juni — p = 3, n = 48, Juli — p = 2, n = 17 (Fg DES/ROS).

Löffelente: 20 BP, Kr. KÖT (Fg). 8. 5. und 19. 6. — 1,1, Schladebach (Friedrich, Hz). 18. 6. — 1 ♀ mit 7 pull., Spülbecken Mündungsgebiet der Bösen Sieben bei Wormsleben/EIS (Weber). Brutzeitbeobachtungen im Kr. WIT: Alte Elbe Bösewig, Gr. Streng und Durchstich (Fg). Brutversuch in der Gr. Aue Holleben/SAA durch Bodenbearbeitung und Melioration gestört (Uf). Herbstkonzentrationen: 9.—10. 10. — 300, Helmestausee/SAN (Fg Ilmenau). 23. 10. — 250, Neolit (Rz).

Kastanienente: Gefangenschaftsflüchtling: 11. 9. — 1 ♂ unter Stockenten, Götschemündung Trotha/HAL (Sm, Ho). 25.—31. 12. — 1 ♂, Ziegelwiese/HAL (Ka, Wi).

Kolbenente: 14. 5. — 1 ♂, Restloch Domsen/HOH (Angermann).

Tafelente: 133 BP, Kr. KÖT (Fg). 4 BP, Klieken, am 11. 7. mit 5, 4, 3 und 1 juv. (Apel). 3 BP, Wallendorf/MER und 1 BP, Schladebach (Fg MER). 1 BP, Helmestausee/SAN (Willems). Maximale Konzentrationen: 14. 2. — 2633, Elbe km 185—229 (Fg WIT). 27. 2. — 800, Flutrinne nördl. Kollenbey (Te). 19. 6. — 800 und 4. 9. — 1000, Helmestausee/SAN (Fg Nordhausen). 22. 11. — 2000 und 30. 12. — 1500, Neolit (Rz).

Moorente: 9. 5. und 27. 5. — 1 ♂, Dorfteich Zwintschöna/SAA (St, Wi).

Reiherente: 3 BP, Kr. KÖT (Fg). Bruten im Kr. WIT am Kl. Lausiger Teich, Ausreißerteich und Restwasser am Elbtor (Doms, Schulz, Becher). 2 BP (♀ mit Jungen), Helmestausee/SAN (Fg Jena). 5 BP, Wallendorf/MER und 3 BP, Schladebach (Fg MER). 8. 6. — 2 Paare, Planena (Ta). 3. 8. — ♀ mit 6 juv., Klieken (Apel). Maximale Konzentration am 6. 3. — 150, Michelner Teich/KÖT (Schnurre) und am 16. 6. und 11. 9. — 200, Helmestausee/SAN (Fg Nordhausen).

Eiderente: 25. 9. — 1 immat. rastet auf frisch geeegter Ackerfläche in der Elster-Luppe-Aue, südöstlich von Raßnitz/MER (Apus 6, 141—142, 1986).

Eisente: 14. 2. — 6, Elbe km 209 (Schnee, Becher). 25. 4. — 1, vermutl. junges ♂ im Schlichtkleid, Saale zw. Alsleben und Trebnitz/BER (Ho). 14. 11. — 6 ♀-farbige im Trupp, Elbe km 240 (Ha).

Trauerente: 18. 2. — 1 ♂, Helmestausee/SAN (Scheuer, Willems). 8. 3. — 2, Bergwitzsee (Köhler).

Samtente: 24. 1. — 0,1, Saale bei Merseburg (Wa). 12. 12. — 1 ♀, Helmestausee/SAN (Born, Scheuer).

Schellente: Maximum am 14. 2. — 137, Elbe km 185—229 (Fg WIT).

Zwergsäger: Von Januar bis März und im Dezember überwiegend auf Flußläufen, so z. B. Elbe Kr. DES/ROS: Jan — p = 5, n = 21, Feb — p = 5, n = 13, März — p = 2, n = 2. 14. 3. — 35, Elbe km 185—214 (Fg WIT).

Mittelsäger: 17. 1. — 3 ♂, Untermulde/DES (Hs). 24. 1. — 1 ♂, Elbe km 236 (Ti). 21. 2. — 1 ♂, fliegt saaleabwärts, Gr. Aue Holleben/SAA (Rost). 26. 3. — 1 ♀, 14. 4. — 5, 1 und 21. 4. — 3, 1, Helmestausee/SAN (Willems, Scheuer). 13. 11.—30. 12. — 1 ♀, Neolit (Fg KÖT).

Gänsesäger: Maximale Konzentrationen von Januar bis März, besonders auf der Elbe Kr. WIT, 14. 2. — 1356, Elbe km 185—229 (Fg WIT). 17. 1. — 120, Elbe km 276—282 (Arndt, Stenzel). 7. 3. — 180, Muldestausee (Gn). 26. 3. — 30, 31, Helmestausee/SAN (Willems).

Steinadler: 2. 1. — 1 immat., Wulfener Bruch/KÖT (Rz).

Schreiadler: 31. 5. — 1, Mulde aue südl. Sollnitz/GRÄ; 10. 7. — 1, Mulde aue bei Niesau/BIT (He).

Mäusebussard: 76 BP, Kr. KÖT (Fg). 40—50 BP, Kr. WIT (Fg). 21 Brutnachweise, Kr. MER (Fg). 25 BP, nordöstl. Saalkreis (Sö).

Sperber: 7 BP mit 2 ausgeflogenen Jungen im Gebiet mit den Eckpunkten Eisleben — Hornburg/QUER — Questenberg/SAN — Schwenda/SAN — Mansfeld/HET (Or).

Habicht: 9 BP mit 6 ausgeflogenen Jungen im Gebiet mit den Eckpunkten Helbra/EIS — Rothenschirmbach/QUER — Beyernaumburg/SAN — Gorenzen/HET — Mansfeld/HET (Or). 4 BP, Kr. KÖT (Fg). 13—16 BP, Kr. WIT, Tendenz leicht ansteigend (Fg und AG Falknerei). 2 BP, Kr. MER (Fg). 2 BP, nordöstlicher Saalkreis (Sö). 1 BP, NSG Hasenwinkel bei Wormsleben/EIS (Sp). 1 BP, Schleesen nördl. Stackelitz/ROS, am 4. 6. mit 2 Jungen (Sb).

Rotmilan: 25 BP, Kr. KÖT (Fg). 15—25 BP, Kr. WIT (Fg und AG Falknerei). 16 BP, Kr. MER (Fg). 23—25 BP, nordöstl. Saalkreis (Sö). 6 BP, südl. Alsleben bis Pfitzdorf/BER (Ho). 17 BP, Saaletal zw. Wettin und Rothenburg/SAA (Ho). 1 BP, Dölauer Heide/HAL (Kunze). Winterdaten: Kr. KÖT Jan/Feb — p = 5, n = 15, Dez — p = 3, n = 7 (Fg). 31. 1. — 9, Altwasser gegenüber Trebitz/SAA (Ho). Schlafplatz im Kollenbeyer Holz/MER vom 14. 5.—10. 10. befliegen, Maximum am 20. 9. — 55—75 (Sw). Konzentration durch tote Fische am Muldestausee am 2. 5. — 25 (Gn).

Schwarzmilan: 13 BP, Kr. KÖT (Fg). 10—12 BP, Kr. WIT (Fg und AG Falknerei). 5 BP, Kr. MER (Fg). 3 BP, Saaletal zw. Rothenburg und Wettin/SAA (Ho). 5—6 BP, nordöstl. Saalkreis (Sö). 1 BP, Gnölbzig/BER (Ho). Schlafplatz Kollenbeyer Holz/MER vom 9. 8.—1. 9. befliegen, Maximum am 9. 8. — 50—60 (Sw).

Seeadler: Brutversuch im Auwald Probstei bei Wittenberg (Apus 6, 93 bis 95, 1985). Von Januar bis März und von November bis Dezember überwiegend an der Elbe, so z. B. Kr. DES/ROS: Jan — p = 2, n = 4, Feb — p = 2, n = 3, März — p = 1, n = 2, Nov — p = 2, n = 4, Dez — p = 6, n = 10 (Fg).

Wespenbussard: 5-BP, Kr. KÖT (Fg). 5 BP, Kr. WIT (Fg und AG Falknerei). 1 BP mit 2 Jungen, südwestl. Annarode/EIS (Or). 6. 7. — Balz, Rosseltal bei Hundelufft/ROS (Sb). 25. 7. — 2, Geiersberg bei Bad Kösen/NAU (Gi). 8. 9. — 38, Helmestausee/SAN (Fg MER).

Rohrweihe: 80 BP, Kr. KÖT (Fg). 25—30 BP, Kr. WIT (Fg und AG Falknerei). 10 BP, Kr. MER (Fg). 6 BP, Gröbers (Klammer). Mind. 3 BP, Mansfelder Seengebiet (Merker, Sp). Bruten in Getreidefeldern: 2 BP, Kr. WIT (Fg). 16. 5. — 1 ♂, Getreidefelder bei Möllensdorf/ROS und 1 ♂, Getreide-

felder bei Cobbelsdorf-Köselitz/ROS (Sb). 27. 5. — 1 Paar, Feldflur bei Welfesholz/HET (Or). Zwei extreme Neststandorte im NSG Plötzkauer Auwald/BER (Falke 32, 263, 1985).

Kornweihe: 1. 5. und 13. 6. — 1 ♂, Roggenfeld Nähe Schladebach (Friedrich). 26. 5. — 1 ♂, Saatfeld am Hallgrund/SAA (Wi).

Steppenweihe: 1. 8. — 1 ♂, Klieken (Sb).

Wiesenweihe: 24. 4. — 1 Paar, Wulfener Bruch/KÖT (Rz, Lu).

Fischadler: Maximum am Helmestausee/SAN 4. 9. — 14 (Willems).

Baumfalke: 2 BP, Kr. KÖT (Fg). 1 BP, Ausreißerteich, Försterei Spitze/WIT (Jauer). 1 BP, Kiefernaltholz bei Grochewitz/ROS (Sb).

Wanderfalke: 1 BP, Bodetal/QUED.

Rotfußfalke: 23. 5. — 1 ♀, auf Leitung an der F 80 bei Bennstedt/SAA (Wi).

Turnfalke: 52 BP, Kr. KÖT (Fg). 20—30 BP, Kr. WIT (Fg und AG Falkneri). 2 BP, Saaletal zw. Wettin und Rothenburg/SAA (Ho). 3—6 BP, nordöstl. Saalkreis (Sö). 3 BP, Stadtgebiet Bad Frankenhausen/ART (Fg, Bad Frankenhausen). 9. 10. — 1 ♂ jagt erfolgreich Haussperlinge, Beesener Str./Huttenstr. in Halle (Gn).

Rebhuhn: Keine Brutzeitdaten aus dem Kr. KÖT (Fg). Abnehmende Tendenz Kr. WIT; seltener Brutvogel bei Rahnsdorf/WIT (Seifert); 22. 5. — 1, Kleinzerbst/WIT (Zu). 6 BP, Kr. MER (Fg). Mind. 6 BP, Halle-Neustadt (Koch). 8 Brutzeitdaten, Kr. SAA (Wi). 2 BP, Flugplatz Dessau (Hs). 2 BP, Feldflur Mosigkau/DES (Lill).

Wachtel: Anzahl der Brutzeitnachweise in den Kreisen KÖT — 6, WIT — 1, ROS — 3, MER — 5, SAA — 5, QUER — 1.

Kranich: 11. 5. — 1 BP, NSG Sarenbruch, Klieken/ROS (Sb). 14. 5. — 2, Sumpfgebiet bei Sollnitz/GRÄ (Jurgeit). Durchzug vom 3. 3.—18. 4. — p = 16, n = 202 und vom 15. 10.—14. 11. — p = 30, n = 1847, davon allein vom 4.—6. 11. — p = 21, n = 1458.

Wasserralle: 5 Paare Brutverdacht, Umgebung von Aken/KÖT (Todte). 25. 1. — 3 überwintern im Schilf, Zscherbener Weg Merseburg am Abwasereinfluß (Ry).

Tüpfelsumpfhuhn: 15. 5. — 1, Kleutscher Aue, Kühnbach/GRÄ (He). 29. 5. — 1, Coswiger Luch/ROS (Ti).

Kleines Sumpfhuhn: 14. + 21. 7. — 1, Teiche Edderitz/Maasdorf/KÖT. 22. 8. — 1 Totfund, Michelner Teich/KÖT (Rz).

Wachtelkönig: 19. 6. — 2, Helmestausee/SAN (Scheuer).

Teichhuhn: 5—10 BP, Kr. WIT (Fg). 14 Brutnachweise, Kr. SAA (Fg).

Bleßhuhn: 21 BP, Cösitz (Rz). 20 BP, Saaletal zw. Wettin und Rothenburg/SAA (Ho). Mind. 30 BP, Kr. MER (Fg). Maximum Helmestausee/SAN 1.—11. 9. 2000 (Fg MER).

Großtrappe: 2. 4. — 1 ♀, 4. 4. — 1 ♂, 25. 4. — 1 ♀, Gölzau-Ziebigk/KÖT (Schiller). 5. 6. — 1 ♂, Feldmark Susigke—Aken/KÖT (Eisen).

Austernfischer: 27. 7. — 2 ad mit 3 Jungvögel, Bleddiner Riß/WIT (Schulz).

Kiebitz: 145 BP, Kr. KÖT (Fg). 34 BP, Kr. MER (Te). 48 Gelegefunde, Gr. und Kl. Aue Holleben/SAA (Wi). Maximum Helmestausee/SAN am 22. 10. — 8000 (Willems).

Flußregenpfeifer: 11 BP, Kr. KÖT (Fg). 3—5 BP, Kr. WIT (Fg). 20 BP, Kr. MER (Te). 1 Brutverdacht Plattenwerk Halle-Neustadt (Koch). 12 BP, Mansfelder Seengebiet (Linke). 7 BP, Kr. DES/ROS (Fg).

- Bekassine:** 9 BP, Kr. KÖT (Fg). An 3 Stellen Balz, Kr. DES/ROS (Fg). An 4 Stellen Balz, Kr. WIT (Fg). 13./14. 5. — 1 balzt, überschwemmte Wiesen bei Leuna/Kröllwitz/MER (Ft). 24. 4. — 3 balzen, Gr. Aue Holleben/SAA (Ka), später durch Meliorationsarbeiten gestört (Wi). 2. 6. — 1 balzt, Brandbergsumpf/HAL (Buschendorf). Maximale Konzentration am 5. 10. — 160, Klieken (Sb).
- Zwergschnepfe:** 5. 12. — 1, Quellsumpf Nordufer Muldestausee (Gn).
- Waldschnepfe:** 13. 5. — 1, Ziegelei Zieko/ROS (Puhlmann). 27. 6. — 1 balzt, Mosigkauer Heide/DES (He); 5. 10. — 1, Südfriedhof/HAL (Gn).
- Großer Brachvogel:** 7 BP, Elbe Kr. KÖT (Rz). 8 BP, Elbwiesen Kr. WIT (Fg). 28. 12. — 30, Luzernefeld an der Kreisgrenze SAA bei Wiedemar/Kr. Delitzsch, Bz. Leipzig (Ry).
- Regenbrachvogel:** 17. 4. — 2, Helmestausee/SAN (Fg Liebenstein). 18. 4. — 2, Flur östlich Kollenbey (Te). 22. 5. — 1, Wallendorf/MER (Te). 31. 8. — 1, Helmestausee/SAN (Fg Jena).
- Uferschnepfe:** 3—5 BP, Elbwiesen Kr. WIT (Zu, Ha).
- Waldwasserläufer:** Brutverdacht Juni/Juli am Schönitzer See/GRÄ (Ha).
- Rotschenkel:** 4. 5. — 2, Balzstrophe, Gr. Aue Holleben/SAA (Wi).
- Flußuferläufer:** 1 BP, Elbe Kr. KÖT (Keil). 1 erfolgreiche Brut, Mündungsgebiet Weiße Elster südl. Halle (Apus 6, 131—133, 1986).
- Graubruststrandläufer:** 25. 9. — 1, Michelner Teich/KÖT (Falke 30, 312 bis 313, 1983).
- Alpenstrandläufer:** Maximum Helmestausee/SAN am 17. 10. — 270 (Scheuer). 11. 12. — 1, Klieken (Sw, Apel).
- Sumpfläufer:** 11.—13. 6. — 1, Mündungsgebiet der Bösen Sieben, Spülbecken bei Wormsleben/EIS (Linke, Weber).
- Kampfläufer:** Mitte April bis Mitte Mai — 50—80, Bösewig, mit Balz (Fg WIT).
- Säbelschnäbler:** 17. 9.—2. 10. — 2, Michelner Teich/KÖT (Fg).
- Stelzenläufer:** 5. 9. — 1, Helmestausee/SAN (Krause).
- Schmarotzerraubmöwe:** 11. 9. — 1, Michelner Teich/KÖT (Graff). 21. 10. und 29.—31. 10. — 1 immat., Helmestausee/SAN (Scheuer, Fg HAL).
- Falkenraubmöwe:** 4. 9. — 1, Michelner Teich/KÖT (Graff).
- Sturmmöwe:** 5 BP, Cösitz (Rz). Schlafplatz Gotthardteich/MER maximal 70 am 10. 1. unter Lachmöven (Ry). 18. 12. — 4 ad. + 50 immat., Tagebau Kayna Süd (Hz).
- Lachmöwe:** 2500 BP, Cösitz (Rz). 2000 BP, Wallendorf/MER (Wa). 250 BP, Klieken (Sz). 98 Nestfunde, Gröbers (Klammer). 20 Nester, Gr. Aue Holleben/SAA (Wi). 8. 6. — 8 Nestfunde, Spülbecken bei Wormsleben/EIS im Mündungsgebiet der Bösen Sieben (Weber).
- Trauerseeschwalbe:** Keine Brut im NSG Bösewig (Fg WIT).
- Flußseeschwalbe:** 8. 5. — 1, Helmestausee/SAN (Willems). 12. 6. — 1, Schönitzer See/GRÄ (Ha).
- Raubseeschwalbe:** 8. 6. — 1, unter Lachmöven, Spülbecken bei Wormsleben/EIS im Mündungsgebiet der Bösen Sieben (Weber). 25. 7. — 1 ad + 1 immat., Rattmannsdorf (Ta). 11. 8. — 1, Klieken (Apel).
- Zwergseeschwalbe:** 10. 7. — 1, Mötzlich (Dotschkal).
- Straßentaube:** Brut im Stammquirl einer Linde, 6,7 m hoch, etwa am 25. 6. flügge. Lauchstädter Str./Leninallee Halle (Gn).

Hohltaube: 10. 4. — mind. 10 Réviere, Altbuchen Stackelitz/ROS; 20. 6. — ca. 10 BP, Laubwald Serno/ROS (Sb). 4. 7. — 1 bis 2 rufen, Wergzahna/WIT (Seifert). 10. 7. — 2 rufen, Altbuchen Eisenhammer/GRÄ (Zu). 24. 7. — 2 bis 3 rufen NSG Thielenheide/GRÄ (Rehn). 18. 9. — 75 rasten, Stoppefeld Dabrun/WIT (Zu). Sonst verstreute Vorkommen in den Elbauwäldern und regelmäßig in allen Altbuchenbeständen des Südharzes und des Hügellandes.

Ringeltaube: 12. 4. — Gelege 29 m hoch auf Kranbahn, Bunawerk/MER (Uf). 11. 10. — 500, Acker am Schönitzer See/GRÄ (Ha). 17. 10. — 360+63 +210+18 nach WSW, Halle Süd (Gn). 17. 10. — 7.00 bis 9.30 ziehen 1045 nach W, südl. MER (Fg).

Türkentaube: 20. 2. — 565, Schlafplatz in jungen Laubbäumen, Kantstr./HAL (Gn). 19. 12. — 225, Schlafplatz Nähe Bahnhof Köthen (Rz).

Kuckuck: 2. 7. — juv. in Halbhöhle bei Gartenrotschwanz, Gartenkolonie Roßlau (Sb). 3. + 7. 7. — in 2 Neuntötternestern bei Aken je 1 fast flügger Jungvogel (Todte).

Steinkauz: Vereinzelt Vorkommen in der Elbaue ROS/WIT (Fg).

Sumpfohreule: 24. 4. — 1 bei Gölzau/KÖT (Schäfer). 3. 10. — 1 auf Mais- und Rübenacker bei MER (Hz). 21. 2. + 24. 10. — 1, Wallendorf/MER (Hz, Wa). Sonst keine gemeldet!

Ziegenmelker: Ca. 10 BP, Kiefernforst SE Aken (H. Keil). 17. 6. — 1 BP, Bernsdorfer Heide/ROS (Sz). 14. 7. — 3, Altkiefern Mosigkauer Heide (He). 12. 9. — 1 ad., Verkehrsofener Halle-Neustadt (Fg).

Mauersegler: Ca. 20 BP in Bauwerkritzen, Viadukt Mücheln/MER (Hz, Sr).

Eisvogel: 16. 6. — 1 BP, Schönitzer See/GRÄ (Ha).

Blauracke: 16.+30. 5. — 1 NE Rahnsdorf/WIT (Seifert). 23. 7. — 1 b. Raßnitz/MER (Kunz über Sr).

Wiedehopf: 28. 3. — 1 kurz auf Rasenfläche, Waldrand Halle-Dörlau (Rost). 17. 4. — 1 b. Lieskau/SAA (R. Müller). 18. 4. — 1 b. Goseck/WEI (Koschkar). 25. 5. — ruft bei Friedeburg/HET (Spiegel). 25. 6. — 2, Kiefern Warthenburg/WIT (Zu). 24. 7. — 1, Trebbichau/KÖT (Rz).

Blutspecht: 10. 7. — ♂ westl. Aken (Falke 30, 353, 1983).

Mittelspecht: 2 BP, Propsteiwald/WIT (Schnee). Im Auwald zwischen Aken und Lödderitz verbreitet (Rz). Im Fläming selten: 20. 3. + 10. 4. — ♂, Altbuchen Stackelitz/ROS; 21. 3. — 1, Laubwald Serno; 14. 8. — ♀ b. Stackelitz (Sb).

Wendehals: 23. + 25. 5. — 9 rufen, Nordufer Süßer See (Sp). 26. 6. — 3 rufen, Kliebigtal/EIS (Gn). 25. 5. — 2, NSG Brambach/ROS (He). 22. 5. — 1, Mosigkauer Heide/DES (He). Sonst verstreut, warme Hänge Saale, Unstrut, Südharz.

Heidelerche: Zug schon am 1. 9. — 8, 5. 9. — 20, 11. 9. — 12, Porphyrkuppen Döblitz/SAA (Wi). 2. 10. — 50 im lockeren Trupp über Jeber-Bergfrieden/ROS nach SW (Sb).

Ohrenlerche: Nur im nördlichsten Zipfel des Bezirks bei Jeber-Bergfrieden/ROS aufgetreten. 21. 11. — 50, 24. + 27. 11. — 3, 28. 11. + 5. 12. — 1 (Sb).

Rauchschwalbe: 5. 9. — 4000, 25. 9. — 5000, Neolit/KÖT (Rz).

Mehlschwalbe: 30. 5. — 100 bis 110 BP an Betonbrücke über Einlauf Muldestausee bei Pouch/BIT (Vopel).

Uferschwalbe: Frühe Erstbeobachtung: 11. 4. — 8, Teiche Gerlebogk/BER (Schäfer). Brutvorkommen werden gesondert ausgewertet.

Kolkraße: 12—16 BP. Kr. WIT (Fg). Neue Brutvorkommen: 1 BP, Kühnauer Forst/DES (Fg). Seit 1981 besetztes Revier im oberen Hagental bei Gorenzen/HET, kein Horstfund (Or). Brut in Fichte bei Emseloh/SAN (Störmer). 23. 5. — 1, Nahrungsgast, Kiesgr. Wallendorf/MER (Wa). Ansammlungen: 29. 3. — 45, 26. 6. — 50, Apollensdorf/WIT (Jakobs). 17. 12. — 187, 29. 12. — 162, sammeln sich vor Abflug zum Schlafplatz in der Flur Stackelitz/ROS (Sb). 27. 12. — 390 bei Cobbelsdorf-Köselitz/ROS (Sb).

Dohle: 4 BP in Eichen, Neue Wiesen/DES; füttern am 8. 6. noch 5 juv. (Lill).

Tannenhäher: 29. 9. — 2 W Breitung/SAN (Gn).

Tannenmeise: Nach trockenem Sommer früher Durchzug; regelm. ab 5. 9., Südfriedhof Halle (Gn). Siehe auch Heideleerche.

Haubenmeise: Auftreten abseits der großen Nadelwälder: 11. 7. — 2, 31. 7. — 3, Fichtenbestand im MÜchelholz/MER (Ft, Hz, Lies).

Weidenmeise: Weitere Ausbreitung. Brutzeitdaten aus bislang nicht besiedelten Gebieten: 3. 7. — 1, 31. 7.—21. 8. — 2, Hanggehölz aus Birken und Kiefern bei Aisleben/BER (Ho). 27. 6. — ruft im Nelbener Grund/BER (Ho). 27. 6. — ruft im NSG Dobis/SAA (Ho). 27. 5. — 1, Laweke bei Wils/SAA (Wi). 5. 6. — singt, Hufeisensee Halle-Ost (Patzak). 22. 5. — singt, Pfingstanger Halle Süd (Uf). 11. 3. — 2 rufen; 9. 6. + 11. 7. — 1, MÜchelholz (Hz).

Beutelmeise: Daten zur Ausbreitung: 35 BP + 19 unverpaarte ♂, Kr. Köthen (Fg). 16. 5. — 1, Brutnachweis bei Naumburg (Girbig). Nestfunde nach der Brutzeit im Kreis SAN: Emseloh — 2, Edersleben und Oberröblingen je 1 (Oßke). 20 BP, Kr. MER (Fg). Zug: EB am 4. 4. — Tonlöcher bei MER (Wa). LB: 14. 11. — 1, Weiher Zaschwitz/SAA (Ho, Sm). Maximum Mitte Sept., z. B.: 15. 9. — 6 + 15 + 20, Mötzlicher Teiche/HAL (Ka); 19. 9. — ca. 25 + 5, Kiesgr. Wallendorf/MER (Wa).

Bartmeise: Brutplatz „Grube Freiheit IV“/BIT: 16. 5. — 2 ♂; 23. 5. — 2 ♂ kämpfen, flattern senkrecht bis 8 m hoch. 11. 6. — Nest mit 5 juv., 6 Tage alt, + 1 taubes Ei, von oben gut gedeckt auf geknickten Halmen im Rohr 25 cm über dem Schlamm (Hillert), am 11. 6. juv. noch im Nest (Kuhlig). 24. 6. — 2 Familien (4 ad. + 3 juv., Hillert). 12. 7. — 3,3 ad. und 9 juv. (Hillert).

25. 9. — 1, Neolit/KÖT (Graff). 19. 12. — 2♂, Röhricht Sandgrube Landsberg/SAA (Klammer), 12 km vom Brutplatz Bitterfeld entfernt.

Wasseramsel: 20. 6. — Nest mit 5 kleinen Jungen, Thyraabrücke Rottlebode/SAN (Gn).

Wacholderdrossel: Weitere Brutvorkommen: 17. 4. — Nest in Pappel, 10 Vögel im Gebiet, alte Saale Trebnitz/MER (Ft). Brutverdacht bei Kollenbey/MER (Fg). 24. 4. + 1. 5. — Nest besetzt, Auwald Salzmünde/SAA, später juv. (Sm). 8. 5. — 2 BP in Eichen, Auewiesen Holleben/SAA (Fg). 25. 4. — 2 beim Nestbau, Garten, Teich Beuchlitz/SAA (Fg). Brutverdacht an weiteren 7 Stellen im Nahbereich der Saale, jeweils einzelne Paare, Benkendorf bis Kloschwitz/SAA (Fg).

Rotdrossel: Winter: 25. 1. — 1 beringt, Merseburg (Uf); 19. 2. — 1 vorj. beringt, Halle-Planena (Ta).

Ringdrossel: 17. 4. — 1,1 b. Köthen (Fröde). 28. 4. — 1,1 b. Milzau/MER (Sw, Lies). 2. 5. — 1 ♂ b. Brachstedt/SAA (Klammer).

Steinschmätzer: 25. 4. — 12 BP, Tagebau Kayna Süd/MER (Ft). 8. 5. — 3 BP, Leunahalde (Hz).

Braunkehlchen: Brutet im Kr. WIT auch in mit Birken durchsetzten Kiefern-kulturen (Seifert).

Hausrotschwanz: 12. 12. — 1, Tagebau Kayna Süd/MER (Ft).

Blaukehlchen: 6. 4. — 1 bei Hundeluft/ROS (Schlüter), 14. 4. — 1, Wasserwerk/DES (Sz), 17. 4. — 1 ♀ b. Holleben/SAA (Uf), 21. 4. — 1, Rodleben/ROS (Sz), 24. 4. — ♂, Wulfener Bruch/KÖT (Rz), 8. 5. — ♂, Susigke b. Aken/KÖT (Wietschke).

Schlagschwirl: Vorkommen im Raum Dessau s. Apus 6, 135—141, 1986. Kr. MER: Wahrscheinlich 5 BP, Gesang 9. 5.—9. 7., feuchte Gehölze an Saale, Elster und Luppe (Fg), 19.+22. 5. — singt in Weide, Pfingstanger/HAL (Uf), hier auch am 24. 5. und 7. 6. gehört (Ta), 15. 5. — singt, Beidersee/SAA (Ta), hier am 2. 6. ein ♀ mit Brutfleck gefangen, ♂ singt 30 m entfernt (Sm, Ta), 23. 5. — ♂ gefangen, Halle-Planena (Ta), 27. 5.—3. 6.: singt, Quellgebüsch SE Brachwitz/SAA (Ho), 18. 6. — singt, Gehölz W Friedeburg/HET (Ho), 22. 5. — singt, Aue Holleben/SAA (Uf), 12. 5.—12. 6.: 1 singt, Elbaue W Aken (Rz), 26. 5. — 1 singt, Diebzig/KÖT (Mai), 14. 5. — singt, Muldeane bei Sollnitz/GRÄ (Jurzeit), 14. 5. — Weidenheger Wartenburg/WIT; 25. 6. — bei Melzweg/WIT (Zu).

Rohrschwirl: 19. 5. + 2. 6. + 29. 6. — 1 singt, Cösitz/KÖT (Rz), 4. 5. — 1 singt, Gotthardtteich MER (Hz), 11. 5. — singt, Saarenbruch Klieken/ROS (Sb), 20. 7. — 1 singt, Schilfgebiet Döllnitz/SAA (Ta).

Drosselrohrsänger: An den Bergsenkungsteichen des Kreises KÖT noch mind. 20 Reviere (Rz).

Schilfrohrsänger: Jedes Brutzeitvorkommen interessiert! 18. 5. — Balzflug, Schilf Schladebach/MER (Hz), 2. + 3. 6. — singt, Beidersee/SAA (Ho, Sm), 5. 6. — 3 ♂, Elster-Luppe-Aue E Kollenbey/MER (Te), 12. 5. — 4 singen, Coswiger Luch/ROS (Ti), 8 Reviere, Cösitz—Gölzau—Cosa (Hb, Rz), 29. 5. — 2 singen, Teich bei Bösewig/WIT (Ha), später hier mit Futter (Ta).

Sperbergrasmücke: Gesang vom 12. 5.—17. 7., Kr. KÖT (Fg), 6 BP, Nordufer Süßer See (Sp), 29. 5. — 1 ♂ bei Hirschroda/NEB (Gi), In der Elster-Luppe-Aue verbreitet (Fg MER), 1 BP auf 0,4 ha großem Kahlschlag im Auwald, Tragarth/MER; 25. 6. — 3 juv. beringt (Tamm, Sl), 23. 5. — 5 singen, Laweketal Schochwitz bis Müllersdorf/SAA (Fg), 17. 6. — Familie in Hecke, Plantage Pfützthal/SAA (Sm), 25. 6. — Vorkommen in Kiefern-schonung bei Wartenburg/WIT (Zu).

Wintergoldhähnchen: 1. Brutnachweis im Kreis MER: 23. 7. — ♂ mit 6 flüggen juv., füttert; Nest 5 m hoch in Fichte, hoher Fichtenbestand Nordseite Müchelholz/MER (Ft), Zug nach trockenem Sommer schon ab 28. 8., Südfriedhof Halle (Gn).

Sommergoldhähnchen: 1. Brutnachweis für den Kreis MER: 12. 6. — füttert flügge Junge, kleiner dichter Fichtenbestand im Müchelholz/MER; 11. 7. — Gesang an 3 Stellen, 18. 7. — Gesang an 2 Stellen, Müchelholz (Hz).

Zwergschnäpper: 10. 6. — 1 schlichter Vogel, Südfriedhof Halle (Gn), 12. 6. — singt ausdauernd in hohen Laubbäumen, Sprachenbachtal 2,5 km NE Stolberg/SAN (Herz, Sö), 2. 9. — 1 beringt, Helmestausee/SAN (Fg MER).

Brachpieper: 29. 5. — 1 BP, Kahlschlag b. Kropstädt/WIT (Seifert), 5. 6. — 4 singen, Tagebau „Emma“/MER (Hz), 13. 7. — 2 singen, Tagebau Roßbach Süd/MER (Ft), 17. 7. — 1 mit Futter, + 1, Tagebau Kayna Süd (Ft), 19. + 25. 7. — 1 singt, Tagebaurand Klobikau/Stöbnitz/MER (Ft), 23. 7. — 2, auch Gesang, Grube bei Frankleben/MER (Ft), 28. 8. — 1 juv. bettelt

ad. an, N Lettewitz/SAA (Ho). 3. 7. — 2, Kiefernkultur bei Weiden/ROS (Sb). 13. 6. — 1, Kiesgrube Marke/BIT (Ha).

Wiesenpieper: Auf den Quellwiesen des Südharzes im Kr. SAN in 320 bis 480 m Höhe von 1979 bis 1982 in den Gebieten Horla, Breitenbach, Hayn, Schwenda und Hainfeld 60—120 BP (Gn). 26. 6. — führen Jungvogel, kleine Quellwiese bei Piskaborn/HET (Gn). Mai/Juli — mind. 3 BP, Tagebaurestloch Domsen/HOH (Angermann). 27. 5. — 5 Eier, Wulfener Bruch/KÖT (Bein). Zug: 10. 10. — 120 auf Luzerne, Roßbach/MER (Hz). Nachmeldung 1981: Ca. 10 BP, Feuchtwiesen am Helmeeinlauf, Stausee Berga-Kelbra (Donau).

Rotkehlpieper: 8. 5. — 1, Staubecken Schladebach/MER (Friedrich).

Wasserpieper: Die weitaus meisten Daten sind von der Fg MER gemeldet:

	Jan.			Feb.			Apr.			Okt.			Nov.			Dez.		
	1	2	3	1	2	3	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
n = 10	38	53	—	33	31	2	3	11	43	2	34	—	—	13	1			
p = 1	3	3	—	2	2	2	1	3	8	1	3	—	—	2	1			

Bis April fast ausschließlich Aue bei Kollenbey, max. 33 am 31. 1. (Te) u. mind. 30 am 21. 2. (Hz). Im Herbst vor allem am Staubecken Schladebach, aber auch bei Döllnitz (14. 11. — 20, Lehmer) und auf Güllespülfäche im Tagebau Kayna Süd (12. 12. — 5, Ft). EB: 10. 10.

Aus anderen Teilen des Bezirks: 23. 10. — 12 im Trupp, Alte Elbe Klieken/ROS (Ha). 21. 11. — 10 bei Kühnau/DES (Ha). 16. 12. — 25, Elbaue Rodleben/ROS (Sz).

Bachstelze: 31. 12. — 10, Güllespülfäche Tagebau Kayna Süd (Hz, Sl).

Gebirgsstelze: 7. 6. — Ca. 10 BP, Rossel von Grochewitz bis Meinsdorf/ROS (Sb). 10. 7. — Brut in Holzstapel, Köhlerei Eisenhammer/GRÄ (Zehler).

Nordische Schafstelze (Mot. fl. thunbergi): 8. 5. — mind. 10, Wiesen Kollenbey/MER (Te). 16. 5. — 4 ♂, Kiesgrube Wallendorf/MER (Hz).

Seidenschwanz: 1. 1.—18. 4. (20, Aken, Todte): p = 32 Meldungen von insgesamt 1131 Vögeln, alle aus dem elbnahen Raum, keine aus den mittleren und südlichen Kreisen. Welche ökologischen Gegebenheiten binden die Vögel im Gebiet der Mittelelbe? Höchstzahlen: 1. 1. — 50, Aken (Ka); 20. 2. — 120, W Aken (Mai); 21. 3. — 250, Wörlitzer Park (Fg DES); 14. 4. — 32, Aken (H. Keil).

Star: Massenschlafplätze: 28. 3. — 10 000, Schilfstück östlich von Aken, von Acker umgeben (Todte). 26. 8. — 15 000, 10. 10. — 12 000, 30. 10. — 4 000, Trebbichauer Teiche/KÖT (Rz).

Berghänfling: Bis 24. 3. (2, Wallendorf/MER, Hz) und ab 20. 10. (120, Wulfen-Diebig/KÖT, Kü). Höhere Zahlen: 2. 1. — 160 + 40 auf Stoppeln bei Döblitz/SAA (Fg). 4. 1. — 200 bei Halle-Neustadt (Koch). 13. 1. — 150 + 30, 7. 3. — 130, Wallendorf (Hz). 28. 2. — 300 bei Döblitz/SAA (Ho, Sm). 30. 10. — 50, 21. 11. — 195, 19. 12. — 130, Kiesgrube Wallendorf/MER (Hz, Wa). 7. 11. — 80, Tagebau Kayna Süd/MER (Hz). 30. 12. — 100 + 30 im Leunawerk (Ft).

Birkenzeisig: 11. 5. — ♂ singt, Saarenbruch Klieken/ROS (Sb). Erreicht die Ausbreitungswelle auch unseren Bezirk? Besonders im Harz wäre zur Brutzeit auf die Art zu achten! 1982 kaum Wintervorkommen: 27. 1. — 6 + 10 nach W, Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb). 26. 12. — 3, Südpark Halle (Patzak). 30. 12. — 1 b. Döblitz (Ho).

Fichtenkreuzschnabel: Außerhalb des Harzes nur einzelne umherstreifend. 28. 4.—31. 7.: p = 6, n = 8.

Gimpel: 10. 7. — brütet in Fichtenschonung, Eisenhammer/GRÄ (Zehler).

Bergfink: 9. 5. — 1, Kollenbey/MER (Lies, Uf).

Goldammer: Auch im Fläming selten geworden: 25. 5. — nur 1 ♂ auf 2 km Nutheniederung; 7. 6. — nur 1 ♂ auf 16 km Exkursionsstrecke bei Hundeluft; 2. 7. — 1 ♂ auf 20 ha Kiefernplantation bei Bräsen/ROS (Sb).

Ortolan: Es erfolgt eine gesonderte Auswertung der Umfrage. Zur Zeit ein Bestandstief.

Rohrhammer: 26. 6. — singt in Gerstenfeld bei Friedeburg/HET (Ho).

Schneeammer: Nur 3 Daten: 21. 11. — 1 auf Feld, Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb). 5. 12. — 1 überfliegt rufend den Muldestausee/BIT (Gn). 12. 12. — 1, Coswiger Luch/ROS (Sb).

Spornammer: 28. 3. — 1,1 im Coswiger Luch/ROS (Ti).

Hausperling: Erfolgreiche Freibrut in Fichte, Südfriedhof Halle; Legebeginn 2. 5. (Gn).

Timm Spretke, Hermannstr. 4, Halle, 4020

Ergebnisse der Wasservogelzählung 1983/84, 1984/85 und 1985/86 im Bezirk Halle

von Eckart Schwarze

1. Vorbemerkung

Mit den folgenden drei Zusammenstellungen wurden seit 1978/79 insgesamt 8 Zählperioden bezirksintern ausgewertet (SCHWARZE, 1980, 1982, 1983). Allen Mitarbeitern, die mit gewohnter Zuverlässigkeit dafür sorgten, daß auf den 77 bearbeiteten Zählstrecken ein nahezu vollständiges Ergebnis erzielt wurde, ist hierfür zu danken. Diese optimale Erfassung der durchziehenden bzw. überwinterten Wasservögel steht zumindest in der DDR — auch was die Kontinuität der Zählungen anbetrifft — ohne Beispiel da. Nach Abschluß der 10. bezirklich ausgewerteten Saison 1987/88 ist eine detailliertere Auswertung mit grafischen Darstellungen für die wichtigsten Arten vorgesehen. Trotzdem soll schon versucht werden, gewisse Trends verbal zu werten.

2. Witterung, Wasser- und Eisverhältnisse

2.1. 1983/84

Der Oktober und die 1. Novemberhälfte waren niederschlagsarm und mild. Nur selten traten Nachtfröste auf. Ab Mitte November gab es reichliche Regenfälle und Nachtfröste, Anfang Dezember die ersten Eistage, die Vereisung der stehenden Gewässer bis Mitte der 3. Monatsdekade hervorriefen. Die letzte Dezemberdekade war wieder mild, ebenso die ersten beiden Januardekaden. Um Mitte Dezember gab es einige Tage eine geringfügige Schneedecke und etwas Eisgang auf der Elbe. Stehende Gewässer waren ab Ende Dezember bis einschließlich der 2. Januardekade wieder eisfrei. Das letzte Januardrittel brachte etwas Frost, einige Tage eine zusammenhängende Schneedecke und erneute Vereisung der stehenden Gewässer bis in die ersten Februartage. Nach vorübergehender Milderung setzte sich ab 15. 2. eine etwa 10tägige Frostperiode (bis -13°C) durch. Die nochmalige Vereisung stehender Gewässer blieb nun bis in die 1. Märzpentade erhalten. Nachtfröste hielten bis zum 25. 3. an. Nennenswerte Niederschläge fielen in der 1. Februarhälfte meist als Regen, nur vom

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [6 5 1987](#)

Autor(en)/Author(s): Spretke Timm

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle 193-204](#)