

Polyporus.

P. nigricans Fr. — Ein 7 bis 8 Jahre altes Exemplar dieses Pilzes wurde bei Nekow unweit Malschin gesammelt, und von E. Boll mir zugesandt.

Hydriacei.

Irpex Fr.

I. fusco-violaceus Fr. — Auf Tannenzweigen an einem Baum im Dorfe Bokup.

Stereum.

St. Pini Fr. — An trocknen Tannenzweigen.

Clavaria.

Cl. aurea Schaeff. — Bei Schwerin, Dr. A. Brückner.

Ord. II. Discomycetes.

A. Annui et fugaces.

† Excipulo ceraceo, ascis persistentibus.

Fam. VII. Helvellacei.

Morchella Dill.

M. esculenta Pers. — Schultz prodr. p. 497. *Phallus esculentus* Linn. Timm prodr. p. 263.

β. *vulgaris*. — Sch. l. c. *Octospora Mentzeliana* Timm l. c.

Die gemeine Morchel findet sich in Wäldern, auf Wiesen und Grasplätzen, und liebt einen kalkig- oder sandig-lehmigen Boden. Im Frühling bei warmer feuchter Witterung.

Helvella Linn.

H. esculenta Pers. — Speisemorchel, Steinmorchel.

Diese beliebte Morchel bewohnt die Nadelwälder der Sand- und Haide-Flora, und erscheint im Frühling, bei feuchtem und warmem Wetter schon Anfangs April, an gelichteten Stellen, besonders da, wo gerodet, oder der Boden zur Besaamung frisch aufgebrochen wurde, auch an Wegerändern und Wagen Spuren in manchen Jahren sehr zahlreich.

H. lacunosa Afzel. — *H. Mitra* Pers. Sch. p. 496.

Octospora Mitra Timm p. 262.

α. major. — *H. Mitra* Pers. Sch. p. 496.

β. minor. — *H. Mitra* Pers. *β. Monacella* Sch. l. c.

In Nadelwäldern an Baumstüben und in deren Nähe.

H. crispa Fr. — Vom Dr. Brückner im Herbst 1856 auf dem Schelfwerder bei Schwerin gefunden.

H. sulcata Afzel. — Sch. p. 496.

Verpa Sw.

V. conica Sw. — *Phallus conicus* fl. Dan. Timm p. 263.

Auf sumpfigen Wiesen selten: Neumühle bei Schwerin (Wüstnei).

Mitrula Fr.

M. cucullata Fr. — *Leotia Mitrula* Pers. Dittm. in N.B. 1806, 46.

M. paludosa Fr. — An sumpfigen Orten, auf faulenden Blättern.

Spathulea Fr.

S. flavida Fr. — Fiedler in Rabenh. herb. myc. Ed. I. nr. 815. In Nadelwäldern zwischen Moosen.

Geoglossum Pers.

G. carneum Schultz pr. p. 496.

G. hirsutum Pers. — Sch. p. 495.

G. viride Pers. — Sch. I. c. Ditm. in Sturm t. 48.

Peziza Dill.

I. *Aleuria*.

P. Acetabulum Linn. — *Octospora acetabulum* Timm p. 260.

P. abietina Pers. — Ditm. in N. B. 1808. 50.

P. leporina Batsch. — Sch. pr. p. 498.

P. onotica Pers. — Ditm. in Sturm t. 16.

P. aurantia Oed. — Sch. p. 498.

P. cochleata Huds. — Bei Rostock (Link), Schwerin (Brückner).

P. repanda Wahlenb. — Die größte einheuliche *Peziza*; ich fand Exemplare von 8 Zoll Breite.

P. Marsupium Pers. — Bei Schwerin (Brückner).

P. vesiculosa Bull. — *Octospora lycoperdoides* Timm p. 260.

P. macropus Pers. — *P. stipitata* Huds. Sch. p. 498.

P. tuberosa Bull. — *Octospora tuberosa* Hedw. Timm p. 260. Auf *Sclerotium roseum* bei Schwerin (Wistner).

P. cupularis Linn. — In Saubwäldern bei Rostock (Link) und Schwerin.

P. leucoloma Rebent. — Sch. p. 501.

II. *Lachnum*.

a. *Sarcoseyphus*.

P. coccinea Jacq. — Sch. p. 499. *Octospora coccinea* Timm p. 261.

P. fusco-atra Rebent. — *P. strigosa* Pers. Sch. p. 499.

P. hemisphaerica Wigg. — Sch. p. 498. *P. replicata* Tode (Wallr.).

- P. umbrosa* Linn.
P. scutellata Linn. — Sch. p. 499. Timm p. 261.
P. stercorea Pers. — Sch. p. 499.

b. *Dasyscyphus*.

- P. ciliaris* Schrad.
P. virginea Batsch. — Sch. p. 500.
P. nivea Fr.
P. calycina Schum. — Sch. p. 500.
P. bicolor Bull.
P. cerina Pers. — Bei Schwerin (Wüßtnei).
P. sericea Alb. & Schwein. — Bei Schwerin (Wüßtnei).
P. clandestina Bull. — Fiedl. in Rab. h. myc. Ed. I.
 nr. 1129.
P. caulicola Fr.
P. sphaerocephala Wallr.
P. corticalis Pers.
P. flammea Alb. & Schw. — Bei Schwerin (Wüßtnei).
P. hispidula Schrad.
P. rufo-olivacea Alb. & Schw. — Bei Schwerin (Wüßtnei), Dömitz.
P. flavo-fuliginea Alb. & Schw. — Ditm. in N. B. 1809. 8.
P. Pineti Batsch. — Wüßtnei.
P. aterrima Lasch. — Auf Fichtennadeln (Lasch), auf *Peltigera canina* (Wüßtnei).
P. sulphurea Pers. — Sch. p. 499.
P. Arundinis Fr.
P. punctiformis Fr.

c. *Tapezia*.

- P. anomala* Pers.
P. poriaeformis De Cand.

P. fibrillosa Wallr.

P. caesia Pers. — Ditm. in Sturm t. 31.

P. Kneiffii Wallr.

P. sanguinea Pers. — Bei Schwerin (Brückner u. Wülfnei).

d. *Fibrina*.

P. pinicola Rebert. — Bei Schwerin (Wülfnei).

P. Lonicerae Alb. & Schwein.

III. *Phiala*.

a. *Hymenosecyphus*.

P. fructigena Bull. — Fiedl. l. c. nr. 828.

P. coronata Bull. — Fiedl. l. c. nr. 1128.

P. Personii Moug. — Fiedl. l. c. Ed. II. nr. 229.

β. *crassipes et concolor*. Fiedl. l. c. Ed. I. nr. 725.

P. striata Nees.

P. Capula Act. hafn.

P. cyathoidea Bull.

P. Volutella Fr. — *Volutella nuda* Tode I. p. 29.

b. *Calyculus*.

P. Calyculus Sowerb. — Sch. p. 500. *Octospora Calyculus* Batsch. Timm p. 261.

P. aeruginosa Pers. — Ditm. in N. B. 1806 nr. 8.

P. citrina Batsch. — Sch. p. 500. *Octosp. citrina* Hedw. Timm p. 262.

P. chionia Fr.

P. lenticularis Bull. — Sch. p. 501.

P. salicella Fr.

P. herbarum Pers.

P. humuli Lasch.

P. faginea Pers.

P. epiphylla Pers.

c. Mollisia.

- P. Ulmariae* Lasch.
P. chrysocoma Bull.
P. cinerea Batsch.
P. uda Pers. — Ditm. in N. B.
P. cinerea Batsch.
P. lacustris Fr.
P. Pteridis Alb. & Schw.
P. atrata Pers.

d. Patelléa.

- P. Artemisiae* Lasch,
P. epiblastematica Wallr.

IV. Helotium.

- P. acicularis* Fr. — *Helotium aciculare* Pers. Ditm. in N. B.
P. aurea Fr.
P. fimetaria Fr.

†† Excipulo subgelationoso, ascis erumpentibus.

Fam. VIII. Bulgariacei.

Leotia Hill.

- L. lubrica* Pers. — Ditm. in N. B. 1808. 50.

Bulgaria Fr.

- B. inquinans* Fr. — *Tremella agaricoides* Retz. Timm
 p. 252. *Peziza inquinans* Pers. Sch. p. 497.
B. sarcoides Fr. — *Peziza sarcoides* Pers. Sch. p. 498.

Ascobolus Pers.

- A. furfuraceus* Pers. — Ditm. in N. B.
A. denudatus Fr. — Auf Holz, nach Angabe der Flori-
 sten. Tode fand diesen Pilz im Spätherbst an trock-
 nen Halmen der *Aira canescens*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins
Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [12_1858](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Ord. II. Discomycetes. A. Annui et fugaces. 49-54](#)