

## c. Mollisia.

- P. Ulmariae Lasch. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. chrysocoma Bull. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. cinerea Batsch. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. uda Pers. — Ditm. in N. B.  
 P. cinerea Batsch. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. lacustris Fr. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. Pteridis Alb. & Schw. — Ditm. in N. B.  
 P. atrata Pers. — Ditm. in N. B.

## d. Patellaea.

- P. Artemisiae Lasch. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. epiblastemata Wallr. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. acicularis Fr. — Helotium aciculare Pers. Ditm. in N. B.  
 P. aurea Fr. — Ditm. in N. B. 1808. 49.  
 P. simetaria Fr. — Ditm. in N. B. 1808. 49.

† Excipulo subgelationoso, ascis erumpentibus.

## Fam. VIII. Bulgariacei.

## Leotia Hill.

- L. lubrica Pers. — Ditm. in N. B. 1808. 50.  
 Bulgaria Fr. — Ditm. in N. B. 1808. 50.  
 B. inquinans Fr. — Tremella agaricoides Retz. Timm. p. 252. Peziza inquinans Pers. Sch. p. 497. q  
 B. sarcoides Fr. — Peziza sarcoides Pers. Sch. p. 498.

## Ascobolus Pers.

- A. furfuraceus Pers. — Ditm. in N. B. 1808. 50.  
 A. denudatus Fr. — Auf Holz, nach Angabe der Floristen. Tode fand diesen Pilz im Spätherbst an tropischen Hälmen der Aira canescens.

Excipulo suberoso, ascis desciscentibus.

Fam. IX. Dermatei.

Tubicularia Tode.

T. vulgaris Tod. I. p. 18. Sch. p. 1436. Sphaeria tremelloides Weig. Timm p. 278.

Auf der Rinde und abgestorbenen Nesten vieler Bäume und Sträucher und nach diesen Standorten an Größe und Färbung viele Abänderungen darbietend.

T. confluens Pers.

T. granulata Pers.

T. ciliata Ditm. in Sturm t. 14.

T. persicina Ditm. l. c. t. 49. Fiedl. l. c. Ed. I. nr. 1163.

Kommt in feuchten Frühlingen und an feuchten Standorten auf vielen Aecidien vor, z. B. auf Tussilago, Cornus, Circaea, Epilobium, Convallaria, Rhamnus etc.

Dermatea Fr.

D. carpinea Fr. — Tubicularia fasciculata Tode I. p. 20.

Ditiola Fr.

D. radicata Fr.

D. volvata Fr. — Tubularia volvata Tod. I. p. 20.

D. sulcata Fr. — Tubularia sulcata Tod. I. p. 21.

D. paradoxa Fr. — Fiedl. l. c. nr. 986.

Volutella Tod.

V. volvata Tod. I. p. 28.

B. Perennes et persistentes.

† Excipulo orbiculari integrō.

Fam. X. Patellariacei.

Cenangium Fr.

C. ferruginosum Fr. — Fiedl. l. c. Ed. II. nr. 514.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins  
Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [12\\_1858](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Fam. VIII. Bulgariacci. Leotia Hill. 54-55](#)