

Ufer des Teiches bei der hintersten Mühle! und im Nemerower Holz am Seeufer! Malchin, Rothenmoor! u. s. w. (S. 39 und 126).

31. *Equisetum limosum* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

32. *Equisetum palustre* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

33. *Equisetum pratense* Ehrh. (Schultz 1819 als *umbrosum*) Röp. S. 147. in den Wäldern um Neubrandenburg nicht selten! Neustrelitz in der Bürgerhorst; in der Wollwoschen Haide (Zabel), bei Güstrow in den Hasenhören, — gewiß auch noch weiter verbreitet, aber nicht beachtet.

34. *Equisetum sylvaticum* L. (L. Sch. 1777) Röp. 146.

35. *Equisetum Telmateja* Ehr. (Röp. 1843 S. 146) bei Klocksin und Grubenhagen am Malchiner See und zwar die var. *serotina*; am Ufer der Trave und des Dassower Sees; in der Römnitz bei Naumburg. — In Mr. Strelitz (namentlich bei Neubrandenburg), wo es nach Schultz 2. Nachtrag wachsen soll, noch nicht gefunden.

36. *Equisetum arvense* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 32 und 126.

$\beta.$ *serotinum* Mey. = *E. campestre* Schultz sup. 1, vergl. Milde in der Denkschrift d. Schlesischen Gesell. u. s. w. 1853 S. 186.

IV. Musci frondosi.

(Nach Fiedler 1844, mit einigen Emendationen.)

110. Sphag-
neae.

1. *Sphagnum cymbifolium* Dill. (L. Sch. 1777).

$\beta.$ *compactum* Brid.

2. *Sphagnum squarrosum* Pers. (Bland. 1804).

3. *Sph. subsecundum* N. E. (Schultz 1819).
β. contortum Schultz bei Jatzke unv. Friedland!
4. *Sph. acutifolium* Ehr. (T. 1788).
5. *Sph. cuspidatum* Ehr. (Crome 1803).
β. plumosum Brid. (Schultz 1828) = *Sph. laxifolium* C. Müll.
6. *Splachnum ampullaceum* L. (T. 1788). 111. *Splach-*
naceae.
7. *Physcomitrium pyriforme* Brid. (T. 1788). 112. *Funari-*
aceae.
8. *Ph. sphaericum* Schwäg. sp. (Schultz 1819) bei
 Neubrandenburg am fl. Thülenpohl.
9. *Ph. fasciculare* Hedw. sp. (Bl. 1804).
10. *Funaria hibernica* Hook. (Crome 1805) selten,
3. *B.* an den Zippendorfer Anhöhen bei Schwerin.
11. *F. hygrometrica* Hedw. (L. Sch. 1777).
12. *Phascum serratum* Schreb. (T. 1788). 113. *Phasea-*
ceae.
13. *Ph. muticum* Schr. (T. 1788).
14. *Ph. Floerkeanum* W. M. (Flörke nach 1816) bei
 Rostock.
15. *Ph. patens* Hedw. (Sch. 1806) auf feuchtem Lehmb-
 und Thonboden ziemlich selten.
16. *Ph. cuspidatum* Schr. (T. 1788).
17. *Ph. bryoides* Dick. (Sch. 1806) auf sandigem,
 nacktem Boden ziemlich selten.
18. *Ph. curvicollum* Hedw. (Fied. 1844) in hoch-
 gelegenen Wäldern an Grabenrändern selten.
19. *Ph. nitidum* Hedw. (T. 1788).
20. *Ph. crispum* Hedw. (Sch. 1806) ziemlich selten.
21. *Ph. subulatum* L. (T. 1788).
22. *Pottia cavifolia* Ehr. (T. 1788). 114. *Pottia-*
ceae.
23. *P. minutula* Fürn. (Sch. 1806).

24. *Pottia truncata* Hedw. sp. (T. 1788).
 β. *intermedia* Schwägr. sp.
25. *Anacalypta lanceolata* Hedw. sp. (T. 1788).
 β. *aciphylla* Wahlb. (Bl. 1809).
- ^{115.} Tricho-
stomeae. 26. *Barbula unguiculata* Hedw. (T. 1788). — Hier-
her gehören als Var.: *B. cuspidata*, *apiculata*, *micro-*
carpa, *obtusifolia* Schultz.
27. *B. fallax* Hedw. (Bl. 1804).
28. *B. brevicaulis* Schwäg. (Sch. 1823) „in prae-
ruptis sylvestribus Duc. Megap. Starg.“, fehlt bei Fiedler.
29. *B. gracilis* Schwäg. (F. 1844) selten auf thonig-
sandigen Feldern.
30. *B. Hornschuchiana* Schultz (1819 als *revoluta*)
Neubrandenburg bei der Brandmühle.
31. *B. convoluta* Hedw. (T. 1788).
32. *B. muralis* L. sp. (L. Sch. 1777).
33. *B. subulata* L. sp. (T. 1788).
34. *B. laevipila* Br. Sch. (Wüst. 1844) bei Schwerin
am alten Wege nach Ludwigslust an Weiden.
35. *B. latifolia* Br. Sch. (F. 1844) bei Schwerin an
alten Bäumen in der Pappelallee am faulen See.
36. *B. ruralis* L. sp. (L. Sch. 1777).
37. *Trichostomum rigidulum* Hedw. sp. (Bl. 1809) selten.
38. *Tr. tortile* Schr. (T. 1788) nicht häufig.
39. *Tr. homomallum* Hedw. sp. (Sch. 1806) in Wäl-
dern an Höhlwegen nicht häufig.
40. *Tr. pallidum* Hedw. (Bl. 1803) im Brodaer Holz
bei Neubrandenburg; Malschin am Fuchsberge.
41. *Distichium capillaceum* Hedw. sp. (Sch. 1806)
Fiedler No. 46.

42. *Gymnostomum rutilans* Hedw. (Sch. 1828) sel⁼ 110. Weisiae.
ten an schattigen, sandigen, nackten Anhöhen und Graben-
rändern (in M. Strelitz, — nach Schulz).
43. *Hymenostomum microstomum* Hedw. sp. (Bl. 1803).
β. *obliquum* N. H. (Sch. 1828).
44. *Weisia controversa* Hedw. (T. 1788).
45. *W. cirrhata* L. sp. (T. 1788).
46. *W. recurvirostra* Hedw. (T. 1788).
47. *Trematodon ambiguus* Horn. (G. Brück. 1818),
nur bei Ludwigslust gefunden, wo es aber in neuerer Zeit
vergebens gesucht ist.
48. *Ceratodon cylindricus* Hedw. sp. (Sch. 1819)
auf sandigen Anhöhen bei Neubrandenburg.
49. *C. purpureus* L. sp. (T. 1788).
50. *Dicranum cerviculatum* Hedw. (Bl. 1804).
β. *pusillum* Hedw. (Sch. 1806).
51. *D. pellucidum* L. sp. (T. 1788).
52. *D. strumiferum* Hedw. sp. (Sch. 1806) selten
auf schwammigen, bewaldeten Wiesen an alten Wurzelstöcken.
53. *D. flexuosum* L. sp. (T. 1788).
54. *D. Schreberi* Sw. (Sch. 1806).
55. *D. varium* Hedw. (T. 1788).
β. *rigidulum* Sw. (Sch. 1819).
56. *D. rufescens* Sm. (Sch. 1806) nicht häufig.
57. *D. crispum* Hedw. (F. 1844) auf feuchtem Sand-
boden am Rande der Wege und Gräben nicht häufig.
58. *D. heteromallum* L. sp. (T. 1788).
59. *D. subulatum* Hedw. (Sch. 1819) seltener.
60. *D. longifolium* Ehr. (Bl. 1804) im Mühlenholz bei
Neubrandenburg am Fußsteige nach der h. Mühle an Steinen.

61. *Dicranum flagellare* Timm! (1791) in Wäldern auf verfaulstem, an der Erde liegendem Holz: bei Malchin, Bassin (unw. Stargard), Mildenitz.
62. *D. scoparium* L. sp. (L. Sch. 1777).
β. orthophyllum Brid. (Sch. 1819).
63. *D. majus* Sm. (Sch. 1806 als *recurvatum*, welches hierher, und nicht zur vorhergehenden Art gehört, vergl. Archiv VIII. 95); bei Neubrandenburg, Malchin, Sternberg.
64. *D. undulatum* Ehr. (T. 1788).
65. *D. Schraderi* W. M. (Bl. 1804) ziemlich selten.
66. *D. spurium* Hedw. (T. 1788) am Wege von Malchin nach Schwinkendorf auf den Hügeln in den Tannen; in den Hufentannen bei Stargard.
67. *D. glaucum* L. sp. (T. 1788).
68. *Thysanomitrion pyriforme* Schultz sp. (1819) Fiedler Nr. 45; bei Bassin unw. Stargard im Holz hinter dem Hofgarten.
- ^{117.} *Bryaceae.* 69. *Mnium stygium* Sw. sp. (Bl. 1808) bei Neubrandenburg im Brüderbruch, unweit Kratzburg am Wege nach Neustrelitz, Waren, Rövershagen, Schwerin.
70. *M. punctatum* Schreb. sp. (T. 1788).
71. *M. undulatum* Hedw. (T. 1788).
72. *M. hornum* L. sp. (T. 1788).
73. *M. serratum* Brid. (Bl. 1804) Neubrandenburg am Starg. Berge.
β. orthorrhynchum Blandow sec. Schultz 1828.
74. *M. rostratum* Schwäg. (Bl. 1804) Neubrandenburg am hohen Ufer auf Steinen, Loitz unw. Stargard.
75. *M. cuspidatum* Schreb. sp. (T. 1788).
76. *M. affine* Blandow (1804).

77. *Mnium stellare* Dill. sp. (T. 1788) Malchitz im Ralenschen Holz im ersten Hohlwege; Neubrandenburg im Mühlensholz, bei Loitz in dem Holz an der Bassiner Gränze an dem Ufer eines Wasserlaufes.

78. *Bryum cernuum* Br. Sch. (Fiedl. 1860!) auf dem Kalkwerder bei Schwerin auf ausgeschütteten Kalkresten.

79. *B. lacustre* Blandow (1804) bei Waren; auch am Wentower See an der Südgränze von M. Strelitz durch Struck entdeckt.

80. *B. inclinatum* Sw. sp. (Bl. 1804) selten in Wäldern an feuchter Erde.

81. *B. strictum* Schultz (1828) an feuchten, grasigen und übersandeten Orten bei Neubrandenburg.

82. *B. Warneum* Blandow (1806) bei Waren.

83. *B. latifolium* Br. Sch. (Bland. 1809?) sehr selten, fehlt bei Fiedler!

Um. Diese Art wurde von Bl. in Mecklenburg gefunden und ohne nähere Angabe des Standortes an Bridel mitgetheilt, der sie als *Weisia fornicata* bestimmt; vergl. C. Müller Synopsis Muscorum II. p. 571. (Mittheilung von Hrn. Struck).

84. *B. nutans* Schreb. (T. 1788).

85. *B. elongatum* Hedw. sp. (Bl. 1809) seltener.

86. *B. crudum* L. sp. (T. 1788).

87. *B. annotinum* L. sp. (T. 1791).

88. *B. carneum* L. (T. 1788) nicht häufig.

89. *B. pyriforme* L. sp. (L. Sch. 1777).

90. *B. intermedium* Brid. (Sch. 1806) nicht häufig.

91. *B. bimum* Schreb. (Schultz 1806).

92. *B. pseudo-triquetrum* Hedw. sp. (T. 1788).

93. *B. Duvalii* Voith. (Sch. 1828).

94. *Bryum roseum* Schreb. (T. 1788).
 95. *B. turbinatum* Hedw. (Crome 1803) Schwerin
am Österfer See beim Galgenberge.
 96. *B. capillare* L. sp. (T. 1788).
 97. *B. pallens* Sw. (Bl. 1817) bisher nur bei Neubrandenburg, Waren und Schwerin (auf dem Kalkwerder, von Fiedler!) gefunden.
 98. *B. caespiticium* L. (T. 1788).
 99. *B. erythrocordon* Schwäg. (Sch. 1806) bei Milvenitz an der Wolfshagener Gränze bei dem alten Thurme (nicht bei Stargard!).
 100. *B. atropurpureum* W. M. (Bl. 1808) nicht häufig.
 101. *B. argenteum* L. (T. 1788).
 102. *Timmia megapolitana* Hedw. (T. 1788) nur bei Malchin am Lärberge gefunden.
 103. *Aulacomnion palustre* Schreb. sp. (T. 1788).
 104. *A. androgynum* L. sp. (T. 1788).
 118. Meesia-
ceae.
 105. *Paludella squarrosa* L. sp. (T. 1788).
 106. *Meesia uliginosa* Hedw. sp. (T. 1788).
 107. *M. longiseta* Hedw. sp. (T. 1788).
 108. *M. Albertini* Br. Sch. (Beuthe! ap. Sch. 1828)
bei Neustrelitz (nicht: Neubrandenburg!) und Schwerin.
 109. *M. tristicha* Br. Sch. (Sch. 1828).
 110. *Amblyodon dealbatus* Hedw. sp. (Bl. 1804).
 119. Bartra-
mieae.
 111. *Bartramia ithyphylla* Brid. (Sch. 1806).
 112. *B. pomiformis* L. sp. (T. 1788).
 β. *crispa* Sw. (Sch. 1806).
 113. *B. marchica* Brid. (Bl. 1806 in d. N. B.) bei Woldeck am Todtensee, bei Ludwigslust auf den Teteriner Wiesen.

114. *Bartramia fontana* L. sp. (T. 1788).
 115. *Schistidium ciliatum* Hedw. sp. (T. 1788).
 116. *Grimmia apocarpa* L. sp. (T. 1788).
 117. *G. pulvinata* L. sp. (T. 1788).
 118. *G. trichophylla* Grev. (Sch. 1819) bei Gevezin
(nicht: Neubrandenburg!) an Granitblöcken.
 119. *Gümbelia crinita* Brid. sp. (Struck 1860!) bei
Wismar vor dem Alt-Wismar. Thore zwischen dem Schutt
der abgebrochenen Wassermühle.
 120. *Racomitrium lanuginosum* Hedw. sp. (T. 1788)
selten an Granitblöcken.
121. *R. heterostichum* Hedw. sp. (T. 1788).
 122. *R. canescens* Weis sp. (T. 1788).
 123. *R. ericoides* Schrad. (Sch. 1819).
 124. *Orthotrichum cupulatum* Hoffm. (Sch. 1806, ^{121. Ortho-}
Crome?). ^{trichacea.}
125. *O. anomalum* Hedw. (T. 1788).
 126. *O. Ludwigii* Schwäg. (Fied. 1844) Schwerin
im Steinfelder Hölz.
 127. *O. obtusifolium* Schrad. (Bl. 1804).
 128. *O. pumilum* Schwägr. (Bl. 1804).
 129. *O. tenellum* Bruch (Fied. 1844) an Pappeln
am faulen See bei Schwerin.
 130. *O. fallax* Bruch (Fied. 1844).
 131. *O. affine* Schr. (Sch. 1806).
 132. *O. fastigiatum* Bruch (Fied. 1844) an alten
Bäumen am faulen See bei Schwerin.
 133. *O. speciosum* N. E. (Fied. 1844).
 134. *O. coarctatum* P. B. (Fied. 1844).
 135. *O. crispum* Hedw. (T. 1788).

136. *Orthotrichum crispulum* Horn. (Fied. 1844) selten.

137. *O. stramineum* Horn. (Fied. 1844).

138. *O. diaphanum* Sch. (Bl. 1803).

139. *O. Lyellii* Hook. (Fied. 1844).

140. *O. leiocarpum* Br. Sch. (T. 1788).

^{122.} Encalyptae.

141. *Encalypta vulgaris* Hedw. (T. 1788).

^{123.} Buxbaumiae.

142. *E. streptocarpa* Hedw. (Sch. 1819).

143. *Diphyscium foliosum* L. sp. (T. 1788).

^{124.} Tetraphideae.

144. *Buxbaumia aphylla* Hall. (T. 1788).

^{125.} Polytrichaceae.

145. *Tetraphis pellucida* L. sp. (T. 1788).

146. *Polytrichum undulatum* L. sp. (T. 1788).

147. *P. tenellum* Röhl. (T. 1788 undul. β.).

148. *P. angustatum* Brid. (Sch. 1819) Neubrandenburg vor dem Burgholze und bei der hintersten Mühle.

149. *P. nanum* Dill. (T. 1788).

150. *P. aloides* Hedw. (T. 1788).

151. *P. urnigerum* L. (T. 1788).

152. *P. gracile* Menz. (Sch. 1806).

153. *P. juniperinum* W. (T. 1788).

154. *P. strictum* Menz. (Bl. 1804 junip. var. affine).

155. *P. piliferum* Schreb. (T. 1788).

156. *P. formosum* Hedw. (Sch. 1806).

157. *P. commune* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 126.

^{126.} Fontinaliaeae.

158. *Fontinalis antipyretica* L. (T. 1788).

159. *F. squamosa* L. (Sch. 1806) Neubrandenburg im Bach bei der Birzowischen Mühle unter der Freiarche.

^{127.} Ripariaeae.

160. *Cinclidotus fontinaloides* P. B. (Fied. 1844) an Steinen in einem Waldbach im Wahrholze bei Schwerin.

^{128.} Hypnaceae.

161. *Leucodon sciurooides* L. sp. (T. 1788).

162. *Leptohymenium filiforme* Timm sp. (1788).

163. *Anomodon viticulosus* L. sp. (T. 1788 p. 221).
164. *A. curtipendulus* L. sp. (T. 1788).
165. *Neckera pennata* Hedw. (Sch. 1806).
166. *N. crispa* L. (T. 1788).
167. *Leskea trichomanoides* Schreb. (T. 1788).
168. *L. complanata* L. sp. (L. Sch. 1777).
169. *L. sericea* L. sp. (T. 1788).
170. *L. subtilis* Hedw. (Sch. 1819) bei Stolpe unweit Stargard im Holz am See.
171. *L. polyantha* Schreb. (T. 1789).
172. *L. paludosa* Hedw. (Bl. 1806).
173. *L. polycarpa* Ehr. (Bl. 1808) nicht häufig.
174. *L. attenuata* Schreb. (T. 1788).
175. *Climacium dendroides* L. sp. (T. 1788).
176. *Hypnum exiguum* Blandow (1804).

Autm. — Nach Treviranus eine gute, selbstständige Art, die auch auf den Ruinen der Burg Godesberg bei Bonn wächst. Trev. sagt über dieselbe: „Dies Moos wird in Weber und Mohrs Flora Deutschlands mit *H. serpens* verbunden, von dem es sich durch den Standort sehr unterscheidet, sowie durch die lineal-pfriemenförmigen, ziemlich gedrängt stehenden Blätter, deren Nerv bis zur Spitze läuft, die kleinere, heller gefärbte Frucht, vor Allem aber durch den Deckel, der sich mit einer langen, aufwärts gebogenen Spitze endigt. Schwägrichen vereinigt dasselbe mit *H. tenellum* Dicks., aber Beschreibung und Abbildung desselben entsprechen dem Godesberger Moose so wenig, als Exemplare des *H. tenellum*, welche ich Hrn. Dr. Hooker verdanke. Dagegen stimmt dasselbe mit der Beschreibung und Abbildung des *H. exiguum* von Blandow in Sturm's Flora, so wie mit einem Ex. der auf der Stadtmauer von Neubrandenburg (hinter dem Schauspielhause!) aufgenommenen Pflanze, welches ich von Hrn. Dr. A. F. Brückner daselbst habe, außs vollkommenst überein.“ (Verhandl. des naturhist. Ver. der preuß. Rheinlande III, S. 18 f.). Auch bei Rostock entdeckte Blandow dies Laubmoos.

177. *Hypnum serpens* L. (T. 1788).
178. *H. velutinum* L. (T. 1788).
179. *H. Starkii* Brid. (Bl. 181?) selten).
180. *H. piliferum* L. (Crome 1803).
181. *H. incurvatum* Schr. (Bl. 1806) bei der Birzew-
schen Mühle unw. Neubrandenburg vor der Freiarche.
182. *H. albicans* Neck. (Sch. 1806. Crome?)
183. *H. glareosum* Br. Sch. (Fied. 1844) bei Schwei-
rin nicht selten.
184. *H. salebrosum* Hoffm. (Crome 1803).
185. *H. nitens* Schreb. (T. 1788).
186. *H. lutescens* Huds. (T. 1788).
187. *H. populeum* Hedw. (Bl. 1804).
188. *H. plumosum* L. (Sch. 1806) selten.
189. *H. rutabulum* L. (T. 1788).
190. *H. cordifolium* Hedw. (Bl. 1804).
191. *H. cuspidatum* L. (T. 1788).
192. *H. Schreberi* W. (T. 1788).
193. *H. purum* L. (T. 1788).
194. *H. trifarium* W. M. (Sch. 1806) selten: bei
Woldeck am Todten See, Dätzke im Bruch an der Eich-
horster Gränze, Schwerin a. m. O.
195. *H. stramineum* Dicks. (Bl. 1808).
196. *H. myurum* Poll. (T. 1788).
197. *H. myosuroides* L. (Sch. 1828) seltener als das
vorige und mit diesem zusammen.
198. *H. alopecurum* L. (Sch. 1806) selten.
199. *H. abietinum* L. (T. 1788).
200. *H. Blandowii* W. M. (Bl. 1807 ap. W. M.).
201. *H. tamariscinum* Hedw. (L. Sch. 1777).

202. *Hypnum splendens* Hedw. (L. Sch. 1777).
203. *H. sylvaticum* L. (Crome 1803).
204. *H. denticulatum* L. (T. 1788).
205. *H. undulatum* L. (Häcker 1848 ap. Rabh.) an d. mecklenb. Gränze bei Lübeck, im Ludwigsluster Schloßgarten bei dem Mausoleum (Dr. A. Brückn. jun.).
206. *H. riparium* L. (T. 1788).
207. *H. ruscifolium* Neck. (Brück. 1803).
208. *H. murale* Neck. (T. 1791) selten, z. B. an der Neubrandenburger und Malchiner Stadtmauer.
209. *H. confertum* Dick. (Fied. 1844).
210. *H. megapolitanum* Bland. (1804).
211. *H. Schleicheri* Hedw. (Fied. 1844) um Schwerin nicht selten.
212. *H. praelongum* L. (T. 1788).
213. *H. Stockesii* Turn. (Bl. 1808).
214. *H. strigosum* Hedw. (T. 1788).
β. *obtusifolium*.
215. *H. longirostrum* Ehr. (T. 1788).
216. *H. brevirostre* Ehr. (Crome 1803).
217. *H. triquetrum* L. (T. 1788).
218. *H. loreum* L. (T. 1788).
219. *H. stellatum* Schreb. (T. 1788) bei Malchin auf der Weide beim Falärberge, bei der Brandmühle unw. Neubrandenburg.
220. *H. chrysophyllum* Bried. (Sch. 1806).
221. *H. squarrosum* L. (T. 1788).
222. *H. cypressiforme* L. (T. 1788).
223. *H. silesiacum* P. B. (Häcker 1848) an der mecklenb. Gränze unw. Lübeck.

224. *Hypnum fluviatile* Sw. (Sch. 1806).
 225. *H. filicinum* Hedw. (T. 1788).
 226. *H. commutatum* Hedw. (Bl. 1808).
 227. *H. Crista castrensis* L. (T. 1788).
 228. *H. molluscum* Hedw. (T. 1788).
 229. *H. fluitans* L. (T. 1788).
 230. *H. aduncum* L. (T. 1788).
 231. *H. uncinatum* Hedw. (Sch. 1806).
 232. *H. lycopodioides* Schwäg. (Sch. 1806) bei Neubrandenburg und Eichhorst an sumpfigen Stellen.
 233. *H. scorpioides* L. (T. 1788).
 234. *H. palustre* L. (Bl. 1806).
 129. *Fissidens* incurvus Schwäg. (Fied. 1844) an
denteae. Grabenrändern an der Westseite des Neustädtischen Kirch-
hofs bei Schwerin.
 236. *F. bryoides* L. sp. (T. 1788).
 237. *F. osmundoides* Hedw. (Bl. 1803).
 238. *F. taxifolius* L. sp. (T. 1788).
 239. *F. adiantoides* L. sp. (T. 1788).

V. Hepaticae.

(Nach Wüstnei 1854.)

130. Riccia-
ceae.
 1. *Riccia fluitans* L. (T. 1788).
 2. *R. crystallina* L. (T. 1788).
 3. *R. natans* L. (Sch. 1819) bei Eichhorst unweit
Friedland, und von Wüstnei (briefliche Mitth.) auch bei
Schwerin gefunden.
 4. *R. ciliata* Hoffm. (Sch. 1806) nur bei Neubran-
denburg auf lehmigen Brachräcken gefunden.
 5. *R. glauca* L. (T. 1788).

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins
Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [14_1860](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [IV. Musci frondosi. 330-342](#)