

114. *Hagenia ciliaris* L. sp. (T. 1788).
 115. *Evernia furfuracea* L. (Sch. 1806 *Parmelia*).
 116. *Evernia prunastri* L. (T. 1788).
 117. *Ramalina pollinaria* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).
 118. *Ramalina fraxinea* L. (T. 1788).
 119. *Ramalina calicaris* L. (T. 1788).
 120. *Ramalina farinacea* L. (T. 1788).
 152. *Usnea-*
ceae. 121. *Cornicularia aculeata* Schreb. (T. 1788).
 122. *Bryopogon jubatus* L. (T. 1788).
 123. *Usnea barbata* L. (T. 1788).
 124. *Usnea florida* L. (T. 1788).

VIII. Fungi.

(Geordnet nach Ravenhorst 1844.)

Anm. Aus dieser Classe sind in neuerer Zeit nur einige Familien genauer durchforscht und von Dr. Fiedler (vergl. S. 154) bearbeitet worden, nämlich die Familien 153 und 160 ff.; die Kenntniß der übrigen läßt noch sehr viel zu wünschen übrig. — Hinsichtlich der Standorte muß ich der Raumersparniß wegen auf die Quellen-schriften und auf Ravenhorst's Kryptogamen-Flora verweisen.

Ordo I. Coniomycetes (Rostpilze).

153. *Uredi-*
nei. 1. *Rhizosporium Solani* Wal. Rabh. 3. (Boll 1860).
Uredo utriculosa Cord. R. 8 (F. 1848).
U. olivacea DC. R. 9 (F. 1853).
U. Caricis Pers. R. 10. (T. 1848).
U. sitophila Ditm. 1812 t. 34. R. 11.
U. segetum Pers. R. 12. Ditm. t. 33. (Sch. 1806).
U. Maydis DC. R. 14. (F. 1848).
U. longissima Sow. R. 18. (F. 1848).
U. Anemones Pers. R. 20. (Sch. 1806).
 10. *U. apiculata* Strauss R. 26. (F. 1848).
U. Ficariae Alb. Schw. R. 29. (F. 1848).
U. Geranii DC. R. 32. (F. 1848).

13. *Uredo argentatum* Schultz sp. 1806. R. 35. (= *Impatientis* Rab.).
U. appendiculata Pers. R. 38. (Sch. 1806).
U. muricella Wallr. R. 42. (F. 1848).
U. Scrophulariae Lasch. R. p. 579 (F. 1848).
U. suaveolens Pers. R. 43. (Sch. 1806).
U. flosculosorum Alb. Schw. R. 44. (Sch. 1806).
U. formosa Rab. 45. (F. 1848).
20. *U. Polygonorum* DC. R. 47. (F. 1848).
U. Rumicum DC. R. 48. (F. 1848).
U. Violarum DC. R. 49. (F. 1848).
U. Betae Pers. R. 50. (F. 1848).
U. Galii Rab. 53. (F. 1848).
U. Armeriae Dub. R. 61. (F. 1848).
U. Leguminosarum Rab. 62. (Sch. 1806).
U. Evonymi Mart. R. 64. (F. 1848).
U. Poterii R. 67. (F. 1848).
U. Lini DC. R. 68. (F. 1848).
30. *U. Euphorbiae* Pers. R. 70. (Sch. 1806).
U. Capraearum DC. R. 72. (Sch. 1806).
U. epitea Kze. Rab. 73. (F. 1848).
U. mixta Steud. R. 75. (F. 1848).
U. gyrosa Reb. R. 78. (F. 1848).
U. populina Jacq. R. 79. (Sch. 1806).
U. Valerianae DC. R. 80. (F. 1848).
U. Pulsatillae Steud. R. 81. (F. 1860).
U. Potentillarum DC. R. 84. (F. 1848).
U. Pyrolae Schultz sp. 1806 R. 85.
40. *U. Labiatarum* DC. R. 86. (Sch. 1806).
U. Alchemillae Pers. R. 87. (F. 1860).
U. Campanularum Pers. R. 95. (F. 1848).
U. Rhinanthacearum DC. R. 96. (1848).
U. Circeae Alb. Schw. R. 98. (Siems. 1806).
U. Caryophyllacearum Rab. 100. (F. 1848).
U. miniata Pers. R. 102. (F. 1848).

47. *Uredo Ruborum* DC. R. 103. (Sch. 1806).
U. Rosae Pers. R. 104. (Sch. 1806).
U. Hypericorum DC. R. 106. (F. 1848).
50. *U. fulva* Schum. C. 109. (Sch. 1806).
U. Senecionis Schum. R. 110. (F. 1848).
U. Artemisiae Rab. 111. (F. 1848).
U. oblonga R. 113. (F. 1860).
U. linearis Pers. R. 117. (F. 1848).
U. Rubigo-vera DC. R. 118. (F. 1848).
U. candida Pers. R. 123. (Sch. 1806).
Physoderma gibbosum Wallr. R. 125. (F. 1848).
Aecidium Convallariae Schum. R. 145. (F. 1848).
Ae. Compositarum Mart. R. 149. (Sch. 1806).
60. *Ae. rubellatum* Rab. 150. (Sch. 1806).
Ae. Cichoriacearum DC. R. 152. (F. 1848).
Ae. Asperifolii Pers. R. 161. (F. 1848).
Ae. Urticae Schum. R. 162. (F. 1848).
Ae. Grossulariae DC. R. 163. (Sch. 1806).
Ae. Violae Schum. R. 166. (F. 1860).
Ae. Parnassiae Rab. 168. (F. 1848).
Ae. punctatum Pers. R. 169. (Sch. 1806).
Ae. leucospermum DC. R. 170. (Sch. 1806).
Ae. Ranunculacearum DC. R. 181. (F. 1848).
70. *Ae. Periclymeni* DC. R. 182. (F. 1860).
Ae. Euphorbiae Pers. R. 185. (Sch. 1806).
Ae. Leguminosarum Lk. sp. R. 186. (Sch. 1806).
Ae. elongatum Rab. 187. (Sch. 1806).
Ae. Phaseolorum Wallr. R. 189. (F. 1848).
Ae. cornutum Pers. R. 190. (Sch. 1806).
Ae. Scrophularinarum Lsch. R. p. 579 (F. 1848).
Ae. Ari Rudolphi (F. 1848).
Ae. Umbelliferarum Schl. (Sch. 1806 No. 1286).
Ae. Adoxae Grav. (F. 1860).
80. *Ae. Orchidearum* Fied. ed. 1. No. 1690 (1860).
Ae. Sweetiae Ditm. (Siems. 1806).

82. *Roestelia cancellata* L. sp. R. 192. (Sch. 1806).
Peridermium Pini Wallr. R. 193. (Tode 1793).
Puccinia Graminis Pers. R. 198. (Sch. 1806).
P. arundinacea Hedw. R. 199. (F. 1848).
P. Caricis DC. R. 201. (F. 1848).
P. Asparagi DC. R. 204. (F. 1848).
P. Polygonorum Schl. R. 207. (Sch. 1806).
P. Calthae Lk. R. 208. (Sch. 1806).
90. *P. Circeae* Pers. R. 213. (Sch. 1806).
P. Glechomatis DC. R. 215. (Sch. 1806).
P. Veronicarum DC. R. 216. (F. 1848).
P. Menthae Pers. R. 218. (F. 1848).
P. Compositarum Schl. R. 221. (F. 1848).
P. Discoidearum Lk. R. 222. (F. 1800).
P. Bardanae Corda R. 231. (F. 1848).
P. Tragopoginis Corda R. 232. (F. 1848).
P. Galiorum Lk. R. 235. (F. 1848).
P. Umbelliferarum DC. R. 237. (F. 1848).
100. *P. Aegopodii* Lk. R. 238. (F. 1848).
P. Aethusae Lk. R. 239. (F. 1848).
P. Pimpinellae Lk. R. 240. (F. 1848).
P. Saniculae Rab. ed. 2. No. 350 (F. 1860).
P. Cicutae Lasch. (F. 1848).
P. Adoxae DC. R. 241. (F. 1848).
P. Ribis DC. R. 243. (F. 1848).
P. Epilobii DC. R. 244. (F. 1848).
P. Prunorum Lk. R. 247. (F. 1848).
P. Anemones Pers. R. 248. (Sch. 1806).
10. *P. Noli tangeris* Corda R. 249. (F. 1848).
P. Acerum Lk. R. 250. (Siems. ap. Link 1813).
P. Violarum Lk. R. 251. (F. 1848).
P. Lychnidearum Lk. R. 252. (Sch. 1806).
P. Spergulae Lasch (F. 1860).
P. Stellariae Dub. R. 253. (F. 1848).
Triphragmium Ulmariae Lk. R. 265. (F. 1848).

117. *Sporidesmium atrum* Lk. R. 298. (Lk. 1809).
Phragmidium incrassatum Lk. R. 311. (Sch. 1806).
Ph. asperum Wallr. R. 314. (F. 1848).
20. *Exosporium Tiliae* Lk. R. 317. (Lk. 1809).
Torula expansa Pers. 328. (F. 1860).
T. herbarum Lk. R. 341. (Lk. 1809).
T. aurea Pers. sp. R. 356. (Lk. 1809).
T. heterospora Rab. Herb. 1268. (F. 1860).
T. Casei Corda Rab. ed. 2 No. 674 (F. 1860).
Helicomycetes roseus Lk. R. 370. (Dit. 1809 ap. Lk.).
Conoplea hispidula Pers. R. 378. (F. 1860).
Bispora monilioides Rab. 380. (Dit. 1806).
Phragmotrichum Bullaria Corda. R. 387. (F. 1848).
154. Tubercularii. 30. *Fusidium griseum* Lk. R. 397. (Dit. 1809; und 1812 t. 17):
F. flavo-virens Ditm. 1812, 18. R. 398.
F. aureum Lk. 18 9. R. 404.
F. candidum Lk. 1809. R. 405.
Septoria populi Desmz. Rab. Herb. 1958. (F. 1860).
Melanconium sphaerospermum Pers. sp. R. 421. (Sch. 1806).
M. glomeratum Lk. 1809 (atrum). R. 433.
Stilbospora angustata Pers. R. 461. (F. 1860).
Sporocadus Fiedleri Rab. Herb. 882. (F. 1860).
Myrothecium inundatum Tode 1790. R. 486. Dit. t. 3.
40. *M. Verrucaria* A. S., R. 487. (Ditm. 1812, 4.).
M. roridum Tode 1790. R. 488.
Fusarium roseum Lk. 1809. R. 498.
F. lateritium Nees. R. 504. (F. 1860).
F. Stilbaster Lk. R. 505. (Dit. 1809. ap. Lk.).
F. Betae Rab. Fungi europ. No. 69. (F. 1860).
Dacryomyces Urticae Pers. sp. R. 517. (Sch. 1806).
D. lacrymalis Pers. sp. R. 519. (Ditm. 1806).
Tubercularia vulgaris Tode 1790. R. 527. (T. 1788).
T. confluens Pers. (F. 1858).

150. *Tubercularia granulata* Pers. (F. 1858).
T. ciliata Ditm. 1812, 14. R. 538.
T. persicina Ditm. 1812, 49. R. 539.
Dermatea carpinea Fr. (Tode 1790).
Ditiola paradoxa Hedw. sp. R. 550. (F. 1858).
D. radicata Fr. (F. 1858).
D. volvata Tode sp. 1790. R. 551.
D. sulcata Tode sp. 1790. R. 552.
Epicoccum versicolor R. 562. (Lk. 1813).
 α. nigrum Lk.
 β. purpurascens Ehrb. (Fiedl.).

Ordo 2. *Hyphomycetes* (Schimmelpilze).

- Hypha papyracea* Pers. sp. R. 578. (Sch. 1806). ^{155. Byssa-}
60. *Xylostroma corium* R. 580. (Tode 1790). ^{cel.}
Ozonium auricomum Lk. 1809. R. 581.
O. candidum Huds. sp. R. 581. (Sch. 1806).
Dematium nigrum Lk. 1809. R. 601.
Rhizomorpha subcorticalis Pers. R. 611. (Sch. 1806).
R. subterranea Pers. R. 612. (Sch. 1806).
Taphrina populina Schum. sp. R. 618. (Sch. 1806).
Erineum roseum Schultz 1806. R. 621.
E. betulinum Schum. R. 622. (Lk. 1809).
E. populinum Pers. R. 625. (Sch. 1806).
70. *E. alneum* Pers. R. 626. (Sch. 1806).
E. fagineum Pers. R. 627. (Sch. 1806).
E. purpurascens Gärtn. R. 631. (Lk. 1809).
Phyllerium tiliaceum Pers. R. 633. (Sch. 1806).
Ph. pyrinum Pers. sp. R. 638. (Sch. 1806).
Ph. acerinum Pers. sp. R. 639. (Sch. 1806).
Epochnium monilioides Lk. 1809. R. 656. ^{156. Muce-}
Collarium nigrospermum Lk. R. 663. (Siems. ap. ^{dinel.}
 Lk. 1809).
Mycogone rosea Lk. 1809. R. 665.
M. cervina Ditm. 1812, 53. R. 666.

180. *Sepedonium mycophilum* Lk. 1809. R. 667.
Chloridium viride Lk. R. 693. (Ditm. ap. Lk. 1809).
Geotrichum candidum Lk. 1809. R. 720.
Sporotrichum laxum N. E. R. 726. (F. 1860).
Sp. candidum Lk. 1809. R. 727.
Sp. Fiedleri Rab. Herb. N. 1573. (F. 1860).
Sp. densum Lk. R. 735. (Ditm. ap. Lk. 1809).
Sp. griseum Lk. 1809. R. 746.
Sp. luteo-album Lk. 1809. R. 749.
Sp. vitellinum Lk. R. 752. (Siems. 1808).
90. *Sp. aureum* Lk. 1809. R. 754.
Sp. croceum Pers. Lk. sp. R. 756. (Sch. 1806).
Sp. roseum Lk. 1813. R. 757.
Sp. fuscum R. 766. (Lk. 1809).
Sp. virescens Lk. R. 770. (*Medusula labyr.*
Tode 1790).
Sp. olivaceum Pers. sp. R. 772. (Lk. 1809).
Byssocladium fenestratum Roth sp. R. 777. (Ditm.
sp. 1812. t. 1).
Fusisporium aurantiacum Lk. 1809. R. 778.
F. Solani Mast. R. p. 579. (Boll 1860).
Acremonium verticillatum Lk. 1809. R. 796.
200. *A. alternatum* Lk. R. 797. (Ditm. 1809. ap.
Sturm 1812 t. 2).
Trichothecium roseum Lk. 1809. R. 808.
Oidium Fusisporioides Fr. R. 822. (F. 1860).
O. Aceris Rab. Herb. 1892. (F. 1860).
O. Lamii R. l. c. 1777. (F. 1860).
Peronospora Rumicis Corda. R. 830. (F. 1860).
P. Umbelliferarum Rab. Herb. ed. 2. 169. (F. 1860).
Stachylidium terrestre Lk. 1809. R. 832.
St. bicolor Lk. 1809. R. 833.
Monilia digitata Pers. R. 841. (T. 1788).
10. *Penicillium glaucum* Lk. R. 844 (T. 1788).
P. candidum Lk. 1809. R. 845.

212. *Coremium vulgare* Corda. R. 863. (Lk. 1809).
Aspergillus glaucus L. sp. R. 866. (T. 1788).
A. virens Lk. 1809 R. 868.
A. candidus Lk. 1809. R. 871.
A. flavus Lk. 1809. R. 874.
Dactylium nigrum Lk. sp. R. 878. (Ditm. 1809).
D. macrosporum Ditm. sp. 1809 und 1812, 50.
 R. 884.
D. dendroides Fr. R. 886. (Ditm. 1812 t. 51).
20. *Botrytis grisea* Lk. 1809. R. 889.
B. vulgaris Lk. 1809. R. 895.
B. umbellata Pers. sp. R. 905. (Lk. ap. Fries 1832).
B. parasitica Pers. R. 907. (Lk. 1809).
B. elegans Lk. 1809. R. 909.
B. densa Ditm. 1812, 52. R. 910.
B. nigra Lk. R. 913. (Ditm. 1809).
B. polyspora Lk. 1809. Ditm. 1812, 35. R. 914.
B. bruneola Rab. ed. 2, 771. (F. 1860).
Acrostalagmus cinnabarinus Corda R 916. (F. 1860).
30. *Verticillium allochromum* Lk. sp. R 922. (Ditm. 1809).
Haplotrichum capitatum Lk. 1809. R. 932.
Acladium conspersum Lk. 1809. R. 936.
A. microspermum Lk. 1809. R. 937.
Gonosporium puccinoides Lk. R. 950. (F. 1860). ^{157. Mucorini.}
Arthrinium caricicola Kze. R. 951. (F. 1860).
Rhacodium cellare Pers. R. 959. (Lk. 1809).
Myxotrichum murinum Ditm. sp. 1812, 36. R. 964.
Helminthosporium velutinum Lk. 1809. R. 982.
H. arundinaceum Corda. R. 995. (F. 1860).
40. *Cladosporium herbarum* Lk. R. 1028. (Sch. 1806).
C. epiphyllum Pers. sp. R. 1033. (Sch. 1806).
C. fasciculare Fr. R. 1037. (Sch. 1806).
C. nodulosum Corda. R. 1046. (F. 1860).
Cephalotrichum rigescens Lk. R. 1065. (Ditm. 1809).
Periconia Stemonitis Pers. R. 1071 (Dit. 1806).

246. *Stilbum vulgare* Tode 1790. R. 1093. Dit. t. 58.
St. bulbosum Tode 1790. R. 1094.
St. turbinatum Tode 1790. R. 1097.
St. luteum Pers. R. 1098. (Tode 1790).
50. *St. xanthocephalum* Ditm. 1812, 60. R. 1105.
(Tode 1790).
St. erythrocephalum Ditm. 1812, 45. R. 1106.
St. rigidum Pers. (Ditm. 1812 t. 59.). R. 1107.
St. pubidum Tode 1790. R. 1109.
St. tomentosum Schrad. R. 1111. (Ditm. 1812, 46).
St. rubicundum Tode 1790. R. 1120.
St. herbarum Rab. ed. 2, 763. (F. 1860).
Ceratium hydroides Alb. Schw. R. 1136. (Lk. 1809).
Epichysium argenteum Tode 1791. R. 1142.
Isaria farinosa Dicks. sp. R. 1155. (Dit. 1812, 54).
60. *I. arachnophila* Ditm. 1812, 55. R. 1156.
I. sphaecophila Ditm. 1812, 57. R. 1159.
I. citrina Pers. R. 1161. (Ditm. 1812, 37).
I. clavata Ditm. 1812, 56. R. 1165.
I. glauca Ditm. 1812, 19. R. 1166.
I. sulphurea Fiedler 1860. Rab. Fung. europ. 60.
Sporodinia grandis Lk. R. 1174. (Ditm. 1809).
Ascophora Mucedo Tode 1790. R. 1177.
A. elegans Lk. sp. R. 1183. (Ditm. 1809).
Mucor Mucedo L. R. 1188. (Sch. 1806).
70. *M. caninus* Pers. R. 1189. (Sch. 1806).
M. minimus Tode sp. 1791. R. 1198.
M. tenellus Tode sp. 1791. R. 1199.
M. stercoreus Tode sp. 1791. R. 1200.
M. fimetarius Lk. 1809. R. 1204.
M. Juglandis Lk. 1809. R. 1207.
M. flavidus Pers. R. 1210. (Ditm. 1806).
Eurotium herbariorum Wig. sp. R. 1214. (Sch. 1806).
Syzygites megalocarpus Ehrb. R. 1220. (Sch. 1806).

279. *Chordostylum capillare* Tode 1790. R. 1228.
80. *Pilobolus crystallinus* Tode 1790. R. 1229.

Ordo 3. Dermatomyces.

- Depazea juglandina* Fr. R. 1240. (F. 1860).
D. *Ribicola* Fr. R. 1244. (F. 1860).
D. *Linnaeae* Ditm. R. 1249. (v. Kptz. 1806).
D. *Brassicaecola* Fr. R. 1255. (F. 1860).
D. *Calthaecola* DC. R. 1261. (F. 1860).
D. *vagans* Fr. R. 1265. (F. 1860).
D. *Lysimachiae* Lsch. R. Herb. N. 989. (F. 1860).
D. *Aquilegiae* R. l. c. N. 1651. (F. 1860).
D. *Saponariae* DC. R. l. c. N. 1653. (F. 1860).
90. D. *Petroselini* Fiedler 1860.
Leptostroma scirpinum Fr. R. 1273. (F. 1858).
L. *Scirpi* Rab. 1274 (F. 1858).
L. *caricinum* Fr. R. 1275. (F. 1858).
L. *juncinum* Fr. R. 1276. (F. 1858).
L. *filicinum* Fr. R. 1277 (F. 1858).
L. *Spiraeae* Fr. R. 1278 (F. 1858).
L. *areolatum* Lk. R. 1281. (Wust. 1858).
L. *herbarum* Fr. R. 1282. (F. 1858).
L. *hysterioides* Fr. R. 1285 (F. 1858).
300. L. *Sedi* Lk. R. 1290. (Wust. 1858).
L. *Loniceraecola* Rab. (F. 1858).
L. *Phragmitis* Fr. (F. 1858).
Actinothyrium graminis Kze. R. 1291. (F. 1860).
Labrella Ptarmicis Desmz. R. Herb. 1394. (F. 1860).
Phoma saligna Pers. sp. R. 1296. (Sch. 1806).
P. *Pustula* Pers. sp. R. 1297. (Sch. 1806).
Ascochyta Heraclei Lib. R. 1318. (F. 1860).
Nemaspora aurea Fr. R. ed. 2. 584. (F. 1860).
Cytispora leucomyxa R. Herb. 1352. (F. 1860).
10. C. *rubescens* Fr. R. 1346. (F. 1860).
Sphaeronema subulatum Tode sp. 1791. R. 1349.

312. *Sphaeronema aciculare* Fr. R. 1351. (Tode 1791).
Sph. Acrospermum Tode sp. 1791. R. 1353.
Sph. conicum Tode sp. 1791. R. 1356.
Sph. cylindricum Tode sp. 1791. R. 1357.
Sph. parabolicum Tode sp. 1791. R. 1358.
Sph. Uredineorum Fiedler 1860. R. Herb. 1659.
Sph. Piceae Fiedl. 1860. R. l. c. 664.
Excipula strigosa Lib. sp. R. 1379. (F. 1860).
20. *Hysterium pulicare* Pers. R. 1393. (Sch. 1806).
H. contortum Ditm. 1812, 32. R. 1396.
H. elongatum Wahlb. R. 1397. (F. 1858).
H. angustatum Pers. R. 1402. (Sch. 1806).
H. lineare Fr. R. 1403 (Wüst. 1858).
H. degenerans Fr. R. 1408. (F. 1858).
H. Fraxini Pers. R. 1409. (F. 1858).
H. conigenum MN. R. 1410. (F. 1858).
 Anm. *H. quercinum* Pers. cf. No. 650.
H. Rubi Pers. R. 1415. (F. 1858).
H. Pinastri Schr. R. 1417. (Sch. 1806).
30. *H. apiculatum* Fr. R. 1428 (F. 1858).
H. herbarum Fr. R. 1430. (F. 1858).
H. commune Fr. R. 1431. (F. 1858).
H. scirpinum Fr. R. 1432. (F. 1858).
H. arundinaceum Schr. R. 1433. (F. 1858).
H. culmigenum Fr. R. 1434. (F. 1858).
H. Taxi Pers. (F. 1858) R. 1448?
Phacidium coronatum Fr. Dit. t. 63. R. 1438 (T. 1788).
Ph. Rubi Fr. 1440. (F. 1858).
Ph. dentatum Schm. R. 1442 (F. 1806).
40. *Ph. Pini* Fr. R. 1450. (F. 1858).
Ph. carbonaceum Fr. R. 1453. (F. 1858).
Ph. pulverulentum Schm. R. 1455. (F. 1858).
Ph. Patella Tode sp. 1791. R. 1457.
Ph. caliciiforme Spr. R. 1459. (F. 1858).
Ph. pityum Fr. R. 1461. (F. 1858).

346. *Phacidium Plinthis* Fr. (F. 1858).
Ph. Buxi Lasch. (F. 1858).
Rhytisma Urticae Fr. R. 1463. (Sch. 1806 No. 1017).
R. punctatum Fr. R. 1465 (F. 1858).
50. *R. acerinum* Fr. R. 1466. (Sch. 1806).
R. confluens Fr. (Wust. 1858).
R. salicinum F. R. 1467 (F. 1858).
R. Andromedae Fr. R. 1468 (Sch. 1806).
R. Euphorbiae Schub. R. 1469 (F. 1858).
R. giganteum Fr. R. 1470 (F. 1858).
R. umbonatum Rab. 1471 (F. 1858).
Actidium hysterioides Fr. R. 1472 (Sch. 1806).
Lophium mytilinum Pers. sp. R. 1473 (Sch. 1806).
Stegilla Ilicis R. 1478 (F. 1858).
60. *Dothidea Ribesia* Pers. sp. R. 1481 (Sch. 1806),
D. Sambuci Pers. sp. R. 1482 (Sch. 1806).
Polystigma rubrum Pers. sp. R. 1503. (Sch. 1806).
P. Ulmi Schultz sp. No. 1190 (1806) R. 1506.
P. Pteridis Reb. sp. R. 1507 (Thede 1806).
Pestalozzia phacidioides Cesati. R. Herb. 724
(F. 1860).
Sphaeria punctiformis Pers. R. 1514 (Sch. 1806).
S. maculaeformis Pers. R. 1515 (Sch. 1806).
S. alnea Pers. sp. R. 1530 (Sch. 1806).
S. Grossulariae Fr. R. 1531 (F. 1860).
70. *S. Artocreas* Tode 1791 R. 1534.
S. Eryngii Fr. R. 1537 (F. 1860).
S. tubaeformis Tode 1791 R. 1550.
S. Gnomon Tode 1791 R. 1551.
S. setacea Pers. R. 1558 (Sch. 1806).
S. Lingam Tode 1791 R. 1561.
S. Doliolum Pers. R. 1562. (Sch. 1806).
S. pulveracea Ehr. = *mollis* Tode 1791 R. 1563.
S. sanguinea Sibth. R. 1571. (Ditm. 1806).
S. herbarum Pers. R. 1576 (Tode 1791).

380. *Sphaeria acuta* Hoffm. R. 1579. (F. 1851).
S. comata Tode 1791. R. 1581.
S. pulvis pyrius Pers. R. 1585 (Sch. 1806).
S. spermoides Hoffm. R. 1588 (Tode 1793).
S. moriformis Tode 1791 R. 1590.
S. mammaeformis Pers. R. 1592 (Sch. 1806)
S. Bombarda Batsch. R. 1593 (Sch. 1806).
S. mobilis Tode 1791. R. 1599.
S. trichostoma Wallr. R. 1614. (F. 1851).
S. orthoceras Fr. R. 1619 (F. 1860).
90. *S. rubella* Pers. R. 1620 (Tode 1791).
S. foveolaris Fr. R. 1632 (F. 1851).
S. inquinaus Tode 1791 R. 1637.
S. Xylostei Pers. R. 1639 (Sch. 1806).
S. ditopa Fr. R. 1648 (F. 1851).
S. ocellata Fr. R. 1651 (F. 1851).
S. pileata Tode 1791 R. 1660.
S. macrostoma Tode 1791 R. 1663.
S. Arundinis Fr. R. 1667 (F. 1851).
S. rostellata Fr. R. 1678 (F. 1851).
400. *S. stricta* Pers. R. 1683 (Ditm. 1806).
S. rostrata Tode 1791 R. 1684.
S. dryina Pers. R. 1686 (F. 1851).
S. lagenaria Pers. R. 1689 (F. 1851).
S. Trifolii Pers. R. 1694 (Sch. 1806).
S. Podagrariae Roth. R. 1695 (F. 1851).
S. Aegopodii Schultz! 1806. R. p. 580.
S. Asteroma Wallr. R. 1704 (F. 1851).
S. Anemones DC. sp. R. 1705 (F. 1851).
S. frondicola Fr. R. 1706 (Sch. 1806).
10. *S. fimbriata* Pers. R. 1707 (T. 1788).
S. Evonymi Kze. R. 1709 (F. 1851).
S. Graminis Pers. R. 1711 (Sch. 1806).
S. episphaerica Tode 1691. R. 1714.
S. Peziza Tode 1791. R. 1715.

415. *Sphaeria lecanodes* Cesati. R. ed. 2. 525 (F. 1860).
S. Anethi Pers. R. 1724 (F. 1851).
S. nebulosa Pers. R. 1725 (Sch. 1806).
S. longissima Pers. R. 1726. (F. 1851).
S. rudis Fr. R. 1741 (F. 1851).
20. *S. exigua* Fiedler 1860 R. Herb. 970.
Anm. „*S. exili* A. *S. simillima*, sed differt perithecio globoso, ascis clavatis, sporis ellipticis. — Ad ligna pinea.“ Fiedler.
- S. calva* Tode 1791. R. 1747.
S. pilosa Pers. R. 1750 (Ditm. 1806).
S. hispida Tode 1791. R. 1752.
S. mutabilis Pers. R. 1765 (Ditm. 1812, 64).
S. mucida Fr. R. 1767 (Tode 1791).
S. ovina Pers. R. 1768 (Tode 1791).
S. tristis Tode 1791. R. 1776.
S. byssiseda Tode 1791. R. 1778.
S. Aquila Fr. R. 1779. (Tode 1791).
30. *S. fissa* Pers. (= *Myrothecium dubium* Tode 1790)
R. 1791.
S. Spartii NE. R. 1792 (F. 1851).
S. Dulcamarae Schm. R. 1796 (F. 1851).
S. Dothidea Moug. R. 1799 (F. 1851).
S. Berberidis Pers. R. 1807 (F. 1851).
S. Cucurbitula Tode 1791. R. 1810.
S. Laburni Pers. R. 1816 (F. 1851).
S. Coluteae Rab. Herb. 1239 (F. 1860).
S. Pteleae Rab. Herb. 1238 (F. 1860).
S. Ribis Tode 1791 R. 1818.
40. *S. coccinea* Pers. R. 1819 (Tode 1791).
S. cinnabarina Tode 1791. R. 1823.
S. convergens Tode 1791. R. 1825.
S. quaternata Pers. R. 1830 (Sch. 1806).
S. pulchella Pers. R. 1840 (Sch. 1806).
Sphaeria stilbostoma Fr. R. 1845. (Tode 1791).

446. *S. ambiens* Pers. R. 1846 (Tode 1791).
S. salicina Pers. R. 1848 (Tode 1791).
S. deplanata NE. R. 1849 (F. 1860).
S. turgida Pers. R. 1851 (Sch. 1806).
50. *S. tessellata* Pers. R. 1860 (Thede 1806).
S. leucostoma Pers. R. 1874 (Tode 1791).
S. nivea Hoffm. R. 1875 (Tode 1791).
S. Carpini Pers. R. 1877 (Sch. 1806).
S. Hystrix Tode 1791 R. 1886.
S. ceratosperma Tode 1791. R. 1887.
S. ferruginea Pers. R. 1888 (F. 1851).
S. lata Pers. R. 1897 (Tode 1791).
S. spinosa Pers. R. 1900. (F. 1851).
S. insitiva Tode 1791. R. 1903.
60. *S. quercina* Pers. R. 1906 (Sch. 1806).
S. scabrosa DC. R. 1909. (Ditm. 1808).
S. uda Pers. R. 1910 (Ditm. 1806).
S. flavovirens Pers. R. 1911 (Sch. 1806).
S. disciformis Hoffm. R. 1915 (Sch. 1806).
S. Stigma Hoffm. R. 1917 (Sch. 1806).
S. bullata Ehr. R. 1919 (Tode 1791).
S. lenta Tode 1791. R. 1920.
S. succenturiata Tode 1791. R. 1923.
S. nummularia DC. R. 1924 (Tode 1791).
70. *S. deusta* Hoffm. R. 1927 (Tode 1791).
S. incrustans Pers. R. 1928 (Sch. 1806).
S. confluens Tode 1791. R. 1930.
S. rubiginosa Pers.? Tode 1791. R. 1934.
S. rosea Pers. R. 1939 (Ditm. 1808).
S. gelatinosa Tode 1791. R. 1944.
S. multiformis Fr. R. 1946. (F. 1851).
S. cohaerens Pers. R. 1948 (Sch. 1806).
S. fusca Pers. R. 1949 (Sch. 1806).
S. fragiformis Pers. R. 1952 (Tode 1791).
480. *S. concentrica* Bolt. R. 1953 (T. 1788).

481. *Sphaeria Delphinii* Rab. Herb. 747 (F. 1860).
S. Carduorum Wallr. R. l. c. 1560 (F. 1860).
S. Racodium Pers. R. l. c. ed. 2. 649 (F. 1860).
Hypoxyton vulgare Lk. R. 1954 (Sch. 1806).
H. polymorphum Pers. sp. R. 1956. (Sch. 1806).
H. carpophilum Pers. sp. R. 1958 (Sch. 1806).
Poronia punctata L. sp. R. 1961 (T. 1788).
Cordyceps ophioglossoides Ehr. sp. R. 1965
 (Sch. 1806).
- Illosporium roseum* Fr. R. 1967 (Sch. 1806). 159. Lycoperdacei.
90. *Perisporium populinum* Pers. sp. R. 1992 (Sch. 1806).
Erysibe macularis Schl. R. 2011. (T. 1788).
E. holosericea Lk. R. 2014. (F. 1860).
E. lamprocarpa Lk. R. 2016 (F. 1860).
E. communis Lk. R. 2019 (F. 1851).
E. lenticularis Wallr. sp. R. 2020 (F. 1860).
E. guttata Lk. R. 2021 (Sch. 1806).
E. horridula Wallr. sp. R. 2025 (F. 1860).
E. adunca Wallr. sp. R. 2026 (F. 1860).
E. penicillata Wallr. sp. R. 2027 (F. 1860).
500. *E. tridactyla* Wallr. R. 2030 (F. 1860).
Antennataria cellaris Fr. R. 2034 (Sch. 1806).
Sclerotium Clavus DC. R. 2037 (F. 1851).
S. Pustula DC. R. 2039 (Sch. 1806).
S. immersum Tode 1790 R. 2058.
S. muscorum Pers. R. 2065 (Tode 1790).
S. truncorum Fr. R. 2066 (Tode 1790).
S. fungorum Pers. R. 2067 (Sch. 1806).
S. Semen Tode 1790 R. 2077.
S. complanatum Tode 1790. R. 2080.
10. *S. aurantiaco-fuscum* Rab. Herb. 936 (F. 1860).
S. populinum Pers. R. l. c. ed. 2. 494. (F. 1860).
S. calathiforme Lk. 1813 p. 45.

Num. „Flavicans, durum, hinc convexum, inde excavatum. In superficie terrae tanta copia et tam subito

saepe provenit in Ducatu Megapolitano, ut crediderint semina e coelo delapsa. Interior compages vesiculosa seminum contextum vesiculosum non male refert. Aestate praesertim pluviosa provenit.“

513. *Acrospermum pyramidale* Tode 1790. R. 2084.
A. compressum Tode 1790. R. 2088.
A. graminum Lib. R. 2090 (F. 1860).
Anixia glabra Fr. R. 2091 (Tode 1790).
Endogone pisiforme Lk. 1809. R. 2094.
Tuber cibarium Sib.? R. 2103 (Boll 1860: soll auf dem Sonnenberge bei Pärchiu gefunden sein).
Spumaria alba DC. R. 2131 (Sch. 1806).
20. *Aethalium septicum* L. sp. R. 2133 (T. 1788).
Reticularia maxima Fr. R. 2135 (Lk. 1809).
R. umbrina Fr. R. 2137 (Ditm. 1808 u. 1817, 38).
R. muscorum AS. sp. R. 2140 (Ditm. 1809).
Lycogala epidendron Buxb. sp. R. 2145. (T. 1788).
Arcyria ochroleuca Trentep. sp. R. 2149 (Ditm. 1817, 8).
A. nutans Bull. sp. R. 2151 (Sch. 1806).
A. cinerea Pers. R. 2153 (Sch. 1806).
A. incarnata Pers. R. 2157 Ditm. t. 44. (Sch. 1806).
A. punicea Pers. R. 2159 (T. 1788).
30. *Trichia varia* Pers. R. 2162 (Sch. 1806).
T. circumscissa Wallr. R. 2163 (F. 1860).
T. chrysosperma Bull. R. 2164 (T. 1788).
T. clavata Pers. R. 2168 Ditm. t. 25. (Sch. 1806).
T. fallax Pers. R. 2169 (Ditm. 1806).
T. pyriformis Hoff. R. 2172 (Ditm. 1806).
T. rubiformis Pers. R. 2173 (T. 1788).
Perichaena strobilina AS. sp. R. 2176. (Ditm. 1817, 20).
Licea contorta Ditm. sp. 1817, 5. R. 2189.
L. variabilis Schr. R. 2192 (Thede 1806).
40. *Tubulina cylindrica* DC. R. 2193 (Sch. 1806).

541. *Dictydium umbilicatum* Schr. R. 2205 (Sch. 1806).
D. trichoides Bull. sp. R. 2207 (Sch. 1806).
Stemonitis fusca Roth. R. 2211 (T. 1788).
St. typhoides Bull. sp. R. 2213 (Sch. 1806).
St. ovata Pers. R. 2216 (T. 1788).
Diachea elegans Trent. sp. R. 2223 (Dit. 1806).
Cupularia leucocephala Pers. sp. R. 2224 (Ditm. 1817, 11.).
Craterium pedunculatum Trent. R. 2227 Dit. t. 9. (Lk. 1809).
C. pyriforme Ditm. 1817, 10. R. 2228.
50. *Physarum album* Fr. R. 2234 (F. 1860).
Ph. sinuosum Bull. sp. R. 2237 (Ditm. 1808).
Ph. conglobatum Ditm. 1817, 40. R. 2240.
Ph. virescens Ditm. 1817, 61. R. 2241.
Ph. bullatum Ditm. 1817, 22. R. 2257.
Ph. psittacinum Ditm. 1817, 62. R. 2258.
Ph. alatum Trentepohl 1800? R. 2262.
Ph. sulcatum Lk. 1809. R. 2263.
Ph. aureum Pers. R. 2267. (Ditm. 1817, 23).
Ph. nutans Pers. R. 2268. Ditm. t. 24 u. 41 (Lk. 1809).
60. *Cionium farinaceum* Lk. 1809. R. 2269.
C. xanthopus Dit. 1817, 43. R. 2270.
C. Iridis Lk. 1809. R. 2271. Dit. t. 7.
Didymium cinereum Pers. sp. R. 2273 (Sch. 1806).
D. rufipes Fr. R. 2281 (Sch. 1806).
D. farinaceum Pers. sp. R. 2287 (Sch. 1806).
D. nigripes Lk. sp. 1809. R. 2288. Dit. t. 42.
D. leucopus Lk. sp. 1809. R. 2291.
Diderma muscicola Lk. 1809. R. 2292.
D. contextum Pers. R. 2294 (Dit. 1817, 39).
70. *D. ochraceum* Hoffm. R. 2295 (Sch. 1806).
D. globosum Pers. R. 2305 (Ditm. 1817, 6).
Leocarpus vernicosus Pers. sp. R. 2312 (Sch. 1806).
L. spermoides Lk. 1809. R. 2313.

574. *Leocarpus calcareus* Lk. R. 2314 (Dit. 1809).
L. cyanescens Fr. R. Herb. 992 (F. 1860).
Leangium floriforme Pers. sp. R. 2315 (Lk. 1809).
L. stellare Pers. sp. R. 2316 (Dit. 1806).
L. lepidotum Ditm. 1817, 21. R. 2318.
Aegerita candida Pers. R. 2321 (Lk. 1809).
80. *Trichoderma viridis* Pers. R. 2328 (Tode 1790).
T. dubium AS. R. 2330 (Tode 1790).
Hyphelia terrestris Fr. R. 2332 (F. 1860).
Onygena equina Pers. R. 2338 (Sch. 1806).
O. corvina AS. R. 2339 (Dit. 1817, 12).
Asterophora agaricoides Fr. R. 2341 (Dit. 1817, 26).
Elaphomyces granulatus NE. R. 2346 (T. 1788).
Scleroderma vulgare Fr. R. 2370. (Sch. 1806).
Tulostoma mammosum Fr. R. 2376 (Lk. 1795).
T. fimbriatum Fr. R. 2378. (Sch. 1806).
90. *Lycoperdon pyriforme* Schäf. R. 2381 (Sch. 1806).
L. gemmatum Batsch. R. 2382 (T. 1788).
L. Bovista L. R. 2385 (Sch. 1806).
Bovista plumbea Pers. R. 2388 (Lk. 1809).
B. nigrescens Pers. R. 2390 (Sch. 1806).
Geaster rufescens Pers. sp. R. 2393 (Sch. 1806).
G. fimbriatus Batsch sp. R. 2396 (Lk. 1795).
G. striatus Fr. R. 2398 (Lk. 1832? pr. Rostock).
Sphaerobolus stellatus Tode 1790. (R. 2400).
Thelebolus stercoreus Tode 1790. R. 2403.
600. *Polyangium vitellinum* Lk. R. 2405 (Dit. 1809;
 1817, 27).
Cyathus Crucibulum Hoffm. R. 2411 (T. 1788).
C. Olla Pers. R. 2412 (T. 1788).
C. striatus W. R. 2413 (T. 1788).
Phallus impudicus L. R. 2415 (Sch. 1806).
Ph. caninus Huds. R. 2416 (Tode 1792 *semel
 tantum lectum!*)
Pyrenium terrestre Tode 1790. R. 2427.

607. *Tremella sarcoides* With. R. 2435 (Tode 1790).
Exidia repanda Fr. R. 2446 (F. 1855).
E. glandulosa Fr. R. 2449 (T. 1788).
10. *E. recisa* Fr. R. 2451 (Dit. 1808 u. 1817 t. 13).
E. Auricula Judae Fr. R. 2452 (Sch. 1806).
Cyphella muscigena Fr. R. 2457 (F. 1855).
Helotium glabrum Tode 1790. R. 2461.
H. hirsutum Tode 1790. R. 2462.
Pistillaria pusilla Fr. R. 2464 (F. 1855).
P. ovata Fr. R. 2466 (F. 1855).
P. quisquilinaris Fr. R. 2467 (F. 1855).
P. culmigena Fr. R. 2468 (F. 1855).
P. coccinea Fr. R. 2469 (F. 1855).
20. *P. micans* Fr. R. 2470 (F. 1855).
Typhula Todei Fr. R. 2472 (Tode 1790).
Calocera cornea Fr. R. 2483 (T. 1788).
C. viscosa Fr. R. 2485 (Boll 1845!).
Clavaria contorta Holms. R. 2494 (F. 1855).
C. Lingula Schaeff. R. 2495 (Lk. 1795).
C. pistillaris L. R. 2496 (T. 1788).
C. fragilis Holms. R. 2501 (F. 1855).
C. inaequalis Mull. R. 2504 (F. 1855).
C. formosa Pers. R. 2522 (Ditm. 1806).
30. *C. rugosa* Bull. R. 2531 (Ditm. 1809).
C. cristata Pers. R. 2532 (F. 1855).
C. coralloides L. R. 2534 (T. 1788).
C. muscoides L. R. 2536 (T. 1788).
C. fastigiata L. R. 2537 (T. 1788).
C. amethystina Bull. R. 2538 (F. 1855).
C. flava Pers. R. 2540 (Lk. 1795).
Geoglossum carneum Schultz 1806. R. 2541.
G. hirsutum Pers. R. 2544 (Sch. 1806).
G. viride Pers. Ditm. t. 48. R. 2550 (Sch. 1806).
40. *Mittrula paludosa* Fr. R. 2552 (F. 1858).
M. cucullata Fr. R. 2553 (Thede 1806).

161. Clavariaceae.

162. Helvel-
lacc.
642. *Spathulea flavida* Fr. R. 2554 (F. 1858).
Sparassis crispa Fr. R. 2555 (Sch. 1806).
Stictis versicolor Fr. R. 2557 (F. 1858).
St. radiata Fr. R. 2567 (Tode 1790).
St. arundinacea Pers. R. 2569 (F. 1858).
St. Lecanora Fr. R. 2572 (F. 1858).
St. longa Reb. 2574 (Sch. 1806).
St. Tiliae Lasch (F. 1858).
50. *Cenangium ferruginosum* Fr. R. 2575 (F. 1858).
C. quercinum Fr. R. 1411 (Tode 1791).
C. Urceolus Fr. R. 2576 (F. 1858).
C. Aucupariae Fr. R. 2580 (Tode 1791).
C. Prunastri Fr. R. 2581 (F. 1858).
C. Ribis Fr. R. 2583 (Sch. 1806).
C. Populi Lasch (F. 1858).
Tympanis conspersa Fr. R. 2585 (Tode 1791
Sphaeria fissivela).
T. cupularis Wallr. R. 2586 (Tode 1791).
T. saligna Tode 1790. R. 2587.
60. *T. obtexta* Wallr. R. 2596 (F. 1860).
T. viticola Schw. R. Herb. 139 (F. 1860).
Volutella volvata Tode 1790 R. 2602.
Bulgaria sarcoides Fr. R. 2604 (Sch. 1806).
B. inquinans Fr. 2606 (T. 1788).
Ascobolus furfuraceus Pers. R. 2619 (Ditm. 1806).
A. denudatus Fr. R. 2620 (Tode 1790).
Lecanidion atrum R. 2623 (F. 1858).
Peziza fimetaria Fr. R. 2626. (F. 1858).
P. acicularis Fr. R. 2628 (Ditm. 1806).
70. *P. aurea* Fr. R. 2629 (F. 1858).
P. epiblastematica Wallr. R. 2632 (F. 1858).
P. Artemisiae Lasch. R. 2636 (F. 1858).
P. atrata Pers. R. 2651 (F. 1858).
P. Pteridis Alb. Schw. R. 2662 (Thede 1806).
P. lacustris Fr. R. 2663 (F. 1858).

676. *Peziza cinerea* Batsch. R. 2664 (F. 1858).
P. uda Pers. 2665 (Ditm. 1806).
P. chrysocoma Bull. R. 2671 (F. 1858).
P. Ulmariae Lasch (F. 1858).
80. *P. epiphylla* Pers. R. 2677 (F. 1858).
P. faginea Pers. R. 2678 (F. 1858).
P. Humuli Lasch (F. 1858).
P. herbarum Pers. R. 2679 (F. 1858).
P. salicella Fr. R. 2686 (F. 1858).
P. lenticularis Bull. R. 2688 (Sch. 1806).
P. chionea Fr. R. 2690 (F. 1858).
P. citrina Batsch. R. 2692 (T. 1788).
P. aeruginosa Pers. R. 2694 (Ditm. 1806).
P. Calyculus Sow. R. 2697 (T. 1788).
90. *P. Volutella* Fr. R. 2701 (Tode 1790).
P. cyathoidea Bull. R. 2705 (F. 1858).
P. Capula Act. Hafn. R. 2706 (F. 1858).
P. striata Nees. R. 2708 (F. 1858).
P. Personii Moug. R. 2715 (F. 1858).
P. coronata Bull. R. 2718 (F. 1858).
P. fructigena Bull. R. 2721 (F. 1858).
P. Lonicerae Alb. Schw. R. 2724 (F. 1858).
P. Pinicola Reb. R. 2732 (W. 1858).
P. sanguinea Pers. R. 2741 (Schultz 1806 N. 1500).
700. *P. Kneiffii* Wallr. R. 2744 (F. 1858).
P. caesia Pers. R. 2746 (Ditm. 1817. 31).
P. fibrillosa Wallr. R. 2747. (F. 1858).
P. poriaeformis DC. R. 2749 (F. 1858).
P. anomala Pers. R. 2750 (F. 1858).
P. punctiformis Fr. R. 2753 (F. 1858).
P. Arundinis Fr. R. 2754 (F. 1858).
P. sulphurea Pers. R. 2757 (Sch. 1806).
P. aterrима Lasch. R. 2763 (W. 1858).
P. pineti Batsch. R. 2765 (W. 1858).
10. *P. flavo-fuliginea* Alb. Schw. R. 2768 (Ditm. 1809).

711. *Peziza rufo-olivacea* Alb. Schw. R. 2769 (W. 1858).
P. hispidula Schr. R. 2773 (F. 1858).
P. flammea Alb. Schw. R. 2774 (Wüst. 1858).
P. corticalis Pers. R. 2775 (F. 1858).
P. sphaerocephala Wallr. R. 2783 (F. 1858).
P. caulicola Fr. R. 2784 (F. 1858).
P. clandestina Bull. R. 2785 (F. 1858).
P. sericea Alb. Schw. R. 2788 (Wüst. 1858).
P. cerina Pers. R. 2789 (Wüst. 1858).
20. *P. bicolor* Bull. R. 2790 (F. 1858).
P. calycina Schum. R. 2791 (Sch. 1806).
P. nivea Fr. R. 2794 (Link 1795).
P. virginea Batsch. R. 2796 (Sch. 1806).
P. ciliaris Schr. R. 2797 (F. 1858).
P. stercorea Pers. R. 2802 (Sch. 1806).
P. scutellata L. R. 2805 (T. 1788).
P. umbrosa L. R. 2807 (F. 1858).
P. hemisphaerica Wig. R. 2815 (Tode 1790?).
P. fusco-atra Reb. R. 2817 (Sch. 1806).
30. *P. coccinea* Jacq. R. 2821 (T. 1788).
P. leucoloma Rehb. R. 2840 (Sch. 1806).
P. cupularis L. R. 2855 (Link 1795).
P. tuberosa Bull. R. 2863 (T. 1788).
P. macropus Pers. R. 2866 (Sch. 1806).
P. vesiculosa Bull. R. 2873 (T. 1788).
P. Marsupium Pers. R. 2874 (A. Brück. 1858).
P. repanda Wahl. R. 2876 (F. 1858).
P. cochleata Huds. R. 2878 (Link 1795).
P. aurantia Oed. R. 2879 (Sch. 1806).
40. *P. onotica* Pers. R. 2880 (Ditm. 1817 t. 16).
P. leporina Batsch. R. 2881 (L. Sch. 1777).
P. abietina Pers. R. 2883 (Ditm. 1808).
P. Acetabulum L. R. 2889 (T. 1788).
Leotia lubrica Pers. R. 2892 (Ditm. 1808).
Verpa conica Sw. R. 2895 (T. 1788).

746. *Helvella esculenta* Pers. R. 2911 (F. 1858).
H. lacunosa Afz. R. 2913 (L. Sch. 1777).
H. crispa Fr. R. 2914 (A. Brück. 1858).
H. sulcata Afz. (Lk. 1795).
50. *Morchella esculenta* Pers. R. 2915 (L. Sch. 1777).
 Vergl. S. 112.
Phlebia merismoides Fr. R. 2932 (F. 1855). 163. Pileat.
Thelephora calcea Pers. R. 2934 (Sch. 1806 N. 1499).
Th. comedens Fr. R. 2938 (F. 1855).
Th. incarnata Pers. R. 2945 (F. 1855).
Th. cinerea Pers. R. 2946 (F. 1855).
Th. quercina Pers. R. 2947 (Sch. 1806).
Th. cinnamomea Pers. R. 2953 (F. 1855).
Th. sulphurea Fr. R. 2954 (Sch. 1806).
Th. radiosa Fr. R. 2959 (F. 1855).
60. *Th. lactea* Fr. R. 2960 (Sch. 1806).
Th. gigantea Fr. R. 2961 (F. 1855).
Th. aurea Schaef. (A. Brück. 1858).
Th. mesenterica Pers. R. 2970 (T. 1788).
Th. Pini Fr. R. 2976 (F. 1858).
Th. rugosa Pers. R. 2978 (F. 1858).
Th. tabacina Fr. R. 2984 (F. 1855).
Th. rubiginosa Schr. R. 2985 (F. 1855).
Th. sanguinolenta Alb. Schw. R. 2987 (F. 1855).
Th. spadicea Pers. R. 2988 (F. 1855).
70. *Th. hirsuta* Willd. R. 2989 (Lk. 1795).
Th. purpurea Schum. R. 2990 (Sch. 1806 N. 1498).
Th. ferruginea Pers. R. 2995 (Sch. 1806).
Th. chalybaea Pers. R. 2996 (F. 1855).
Th. domestica Fr. R. 2997 (Sch. 1806).
Th. puteanea Schum. R. 3001 (F. 1855).
Th. laciniata Pers. R. 3007 (T. 1788).
Th. terrestris Ehr. R. 3011 (F. 1855).
Th. caryophyllea Pers. R. 3014 (F. 1855).
Th. radiata Fl. D. R. 3016 (F. 1855).

780. *Craterellus cornucopioides* Fr. R. 3021 (T. 1788).
Grandinia crustosa Fr. R. 3023 (F. 1855).
Radulum fagineum Fr. R. 3028 (Sch. 1806).
R. quercinum Fr. R. 3031 (Sch. 1806).
R. orbiculare Fr. R. 3032 (F. 1855).
Jrpex fusco-violaceus Fr. R. 3040 (F. 1858).
Hydnum mucidum Pers. R. 3052 (F. 1855).
H. macrodon Pers. R. 3055 (F. 1855).
H. cirrhatum Pers. R. 3066 (Sch. 1806).
H. gelatinosum L. R. 3067 (T. 1788).
90. *H. Erinaceus* Bull. R. 3068 (Dr. A. Brück. 1855).
H. coralloides Scop. R. 3069 (G. Brück. 1855).
H. Auriscalpium L. R. 3070 (T. 1788).
H. tomentosum L. R. 3072 (F. 1855).
H. connatum Schultz 1806. R. 3075.
H. ferrugineum Fr. R. 3081 (F. 1855).
H. compactum Pers. R. 3083 (F. 1855).
H. repandum L. R. 3088 (T. 1788).
H. laevigatum Sw. R. 3090 (Sch. 1806).
H. imbricatum L. R. 3093 (T. 1788).
800. *Fistulina hepatica* Fr. R. 3094 (T. 1788).
Merulius lacrymans Schum. R. 3099 (Tode 1790?)
M. serpens Tode 1790? R. 3100.
M. Corium Fr. R. 3105 (F. 1855).
M. tremellosus Schr. R. 3106 (F. 1855).
Daedalea unicolor Fr. R. 3108 (Sch. 1806).
D. quercina Pers. R. 3109 (T. 1788).
Trametes gibbosa Fr. R. 3110 (F. 1855).
Tr. suaveolens Fr. R. 3113 (T. 1788). S. 126.
Polyporus reticulatus NE. R. 3116 (F. 1855).
10. *P. vaporarius* Fr. R. 3118 (F. 1855).
P. Radula Fr. R. 3119 (F. 1855).
P. sanguinolentus Fr. R. 3120 (W. 1855).
P. obducens Fr. R. 3125 (F. 1855).
P. mucidus Fr. R. 3127 (W. 1855).

815. *Polyporus Medulla panis* Fr. R. 3128 (T. 1788).
P. micans Fr. R. 3129 (F. 1855).
P. violaceus Fr. R. 3130 (F. 1855).
P. rufus Fr. R. 3132 (F. 1855).
P. contiguus Fr. R. 3135 (Sch. 1806).
20. *P. abietinus* Fr. R. 3138 (T. 1788).
P. versicolor Fr. R. 3140 (T. 1788).
P. velutinus Fr. R. 3142 (W. 1855).
P. hirsutus Fr. R. 3143 (Link 1795).
P. radiatus Fr. R. 3149 (W. 1855).
P. marginatus Fr. R. 3159 (Sch. 1806).
P. salicinus Fr. R. 3162 (F. 1855).
P. conchatus Fr. R. 3163 (F. 1855).
P. Ribis Fr. R. 3164 (W. 1855).
P. fulvus Fr. R. 3165 (Sch. 1806).
30. *P. ignarius* Fr. R. 3166 (T. 1788).
P. nigricans Fr. R. 3167 (Siemerling 1858).
P. fomentarius Fr. R. 3168 (T. 1788). ☉. 126.
P. applanatus Fr. R. 3169 (F. 1855).
P. betulinus Fr. R. 3171 (Sch. 1806).
P. hispidus Fr. R. 3178 (F. 1855).
P. amorphus Fr. R. 3179 (W. 1855).
P. adustus Fr. R. 3182 (F. 1855).
P. fumosus Fr. R. 3183 (F. 1855).
P. rutilans Fr. R. 3184 (Sch. 1806).
40. *P. destructor* Fr. R. 3187 (F. 1855).
P. alligatus Fr. R. 3196 (F. 1855).
P. sulphureus Fr. R. 3198 (F. 1855).
P. giganteus Fr. R. 3200 (Sch. 1806).
P. cristatus Fr. R. 3203 (F. 1855).
P. frondosus Fr. R. 3205 (F. 1855).
P. umbellatus Fr. R. 3206 (Sch. 1806).
P. lucidus Fr. R. 3207 (T. 1788).
P. varius Fr. R. 3210 (T. 1788).
P. Michelii Fr. R. 3215 (F. 1855).

850. *Polyporus squamosus* Fr. R. 3217 (T. 1788).
P. pictus Fr. R. 3219 (Sch. 1806).
P. perennis Fr. R. 3220 (T. 1788).
P. leptcephalus Fr. R. 3223 (Sch. 1806).
P. brumalis Fr. R. 3226 (F. 1855).
Boletus cyanescens Bull. R. 3236. (F. 1855).
B. scaber Bull. R. 3238. (Sch. 1806).
B. edulis Bull. R. 3243. (G. Brück. 1849).
B. luridus Schaef. R. 3246. (F. 1855).
B. pachypus Fr. R. 3250. (F. 1855).
60. *B. subtomentosus* L. R. 3255. (Link 1795).
B. variegatus Fr. R. 3257. (F. 1855).
B. piperratus Bull. R. 3260. (Dit. 1806).
B. bovinus L. R. 3264. (T. 1788).
B. luteus L. R. 3267. (T. 1788).
Lenzites sepiaria Fr. R. 3270. (Sch. 1806).
L. trabea Fr. R. 3271. (W. 1855).
L. betulina Fr. R. 3273 (F. 1855).
Schizophyllum commune Fr. R. 3274 (T. 1788).
Cantharellus crispus Fr. R. 3275 (Sch. 1806).
70. *C. lobatus* Fr. R. 3278 (F. 1855).
C. retirugus Fr. R. 3279 (F. 1855).
C. muscigenus Fr. R. 3283 (Sch. 1806).
C. cinereus Fr. R. 3284 (Dr. A. Brück. 1858).
C. lutescens Fr. R. 3286 (W. 1855).
C. tubaeformis Bull. sp. R. 3287 (Ditm. 1806
und 1817 t. 30).
C. umbonatus Fr. R. 3289 (F. 1855).
C. aurantiacus Fr. R. 3290 (Sch. 1806).
C. cibarius Fr. R. 3291 (T. 1788).
Nyctalis asterophora Fr. R. 3292 (Ditm. 1806).
80. *Russula alutacea* Pers. R. 3298 (F. 1855).
R. emetica Fr. R. 3307 (T. 1788).
R. virescens Pers. R. 3310 (Ditm. 1817 t. 47).
R. adusta Pers. R. 3318 (Sch. 1806).

884. *Gomphidius glutinosus* Fr. R. 3320 (Link 1795).
Rhymovis pannoides Fr. R. 3322 (F. 1855).
R. atro-tomentosa Fr. R. 3323 (Sch. 1806).
R. involuta Fr. R. 3324 (Link 1795).
Agaricus domesticus Pers. R. 3329 (Lk. 1795).
A. radiatus Bolt. R. 3330 (Dit. 1808).
90. *A. narcoticus* Batsch. R. 3331 (T. 1788).
A. deliquescens Bull. R. 3335 (F. 1858).
A. papillatus Batsch. R. 3337 (Lk. 1795).
A. micaceus Bull. R. 3339 (Sch. 1806).
A. fimetarius L. R. 3341 (T. 1788).
A. atramentarius Bull. R. 3346 (Sch. 1806).
A. comatus Müll. R. 3348 (Sch. 1806).
A. disseminatus Pers. R. 3349 (Sch. 1806).
A. papilionaceus Bull. R. 3362 (Sch. 1806).
A. campanulatus L. R. 3363 (T. 1788).
900. *A. titubans* Bull. R. 3366 (Sch. 1806).
A. spadiceo-griseus Schäf. R. 3375 (Sch. 1806).
A. callosus Fr. R. 3381 (Sch. 1806).
A. fascicularis Huds. R. 3399 (T. 1788).
A. lateritius Batsch. R. 3401 (Sch. 1806).
A. semiglobatus Batsch. R. 3403 (Sch. 1806).
A. stercorarius Schum. R. 3404 (A. Brück. 1858).
A. squamosus Pers. R. 3405 (Lk. 1795).
A. aeruginosus Curt. R. 3407 (F. 1855).
A. arvensis Schäf. R. 3414 (Lk. 1795).
10. *A. campestris* L. R. 3415 (T. 1788). ☉. 112.
A. depluens Batsch. R. 3419 (Sch. 1806).
A. variabilis Pers. R. 3420 (Sch. 1806).
A. mollis Schäf. R. 3424 (Lk. 1795).
A. Hypnorum Bat. R. 3430 (Sch. 1806).
A. tener Schäf. R. 3436 (Dit. 1808).
A. carbonarius Fr.? R. 3468 (Lk. 1795).
A. fastibilis Pers. R. 3484 (Sch. 1806).
A. geophyllus Bull. R. 3488 (Ditm. 1806).

919. *Agaricus rimosus* Bull. 3491 (Sch. 1806).
20. *A. mutabilis* Schäf. R. 3502 (Lk. 1795).
A. adiposus Bat. R. 3508 (F. 1855).
A. squarrosus Müll. R. 3511 (T. 1788).
A. radicosus Bull. R. 3513 (Lk. 1795).
A. praecox Pers. R. 3514 (F. 1855).
A. castaneus Bull. R. 3526 (W. 1855).
A. bulbosus Sow.? R. 3546 (Dit. 1806).
A. bivelus Fr. R. 3547 (Dit. 1808).
A. cinnamomeus L. R. 3552 (T. 1788).
A. violaceus L. R. 3568 (T. 1788).
30. *A. fulgens* A. Schw. R. 3585 (F. 1855).
A. euchrous Pers. R. 3619 (Dit. 1806).
A. clypeatus L. R. 3636 (T. 1788).
A. phlebophorus Dit. 1817 t. 15. R. 3642.
A. nanus Pers. R. 3646 (F. 1858).
A. cervinus Schäf. R. 3652. Dit. t. 28 (Lk. 1795).
A. volvaceus Bull. R. 3656 (Wüst. 1855).
A. applicatus Bat. R. 3662 (T. 1788).
A. nidulans Pers. R. 3667 (T. 1855).
A. mitis Pers. R. 3672 (Sch. 1806).
40. *A. stypticus* Bull. R. 3673 (T. 1788).
A. serotinus Pers. R. 3674 (F. 1855).
A. petaloides Bull. R. 3675 (F. 1855).
A. conchatus Bull. R. 3676 (T. 1788).
A. ulmarius Bull. R. 3686 (Wüst. 1855).
A. tigrinus Bull. R. 3692 (F. Koch 1858).
A. umbelliferus L. R. 3701 (T. 1788).
A. pyxidatus Bull. R. 3706 (F. 1855).
A. corticola Pers. R. 3715 (Sch. 1806).
A. stylobates Pers. R. 3720 (Dit. 1817 t. 29).
50. *A. citrinellus* Pers. R. 3722 (Sch. 1806).
A. vulgaris Pers. R. 3723 (Sch. 1806).
A. alliaceus Jacq. R. 3732 (T. 1788).
A. atro-albus Bolt. R. 3741 (Sch. 1806).

954. *Agaricus galericulatus* Scop. R. 3743 (F. 1855).
A. *lacteus* Pers. R. 3749 (Lk. 1795).
A. *rosellus* Fr. R. 3757 (Sch. 1806).
A. *epiphyllus* Pers. R. 3763 (Sch. 1806).
A. *perforans* Hoffm. R. 3764 (Wüst. 1855).
A. *Rotula* Scop. R. 3765 (Sch. 1806).
60. A. *androsaceus* L. R. 3766 (T. 1788).
A. *ramealis* Bull. R. 3769 (Sch. 1806).
A. *scorodoni* Fr. R. 3771 (W. 1855).
A. *Clavus* L. R. 3779 (T. 1788).
A. *dryophilus* Bull. R. 3781 (Sch. 1806).
A. *oreades* Bolt. R. 3790 (F. 1855).
A. *tuberosus* Bull. R. 3798 (Sch. 1806).
A. *confluens* Pers. R. 3802 (Sch. 1806).
A. *velutipes* Curt. R. 3804 (Sch. 1806).
A. *radicatus* Relh. R. 3812 (F. 1855).
70. A. *laccatus* Scop. R. 3813 (Lk. 1795).
A. *gibbus* Pers. R. 3828 (Dit. 1806).
A. *candicans* Pers. R. 3835 (Sch. 1806).
A. *odorus* Bull. R. 3847 (A. Brück. 1855).
A. *nebularis* Bat. R. 3864 (Sch. 1806).
A. *glyciosmus* Fr. R. 3869 (W. 1855).
A. *rufus* Scop. R. 3873 (F. 1855).
A. *subdulcis* Bull. R. 3876 (Sch. 1806).
A. *volemus* Fr. R. 3880 (W. 1855).
A. *deliciosus* L. R. 3894 (Lk. 1795).
80. A. *vellereus* Fr. R. 3895 (F. 1855).
A. *piperatus* L. R. 3896 (T. 1788).
A. *pergamenus* Sw. R. 3898 (Lk. 1795).
A. *torminosus* Schäf. R. 3918 (F. 1855).
A. *scrobiculatus* Scop. R. 3919 (F. 1855).
A. *brevipes* Bull. R. 3923 (F. 1855).
A. *personatus* Fr. R. 3928 (F. 1855).
A. *graveolens* Pers. R. 3934 (W. 1855).
A. *chrysenderus* Bull. R. 2940 (Fleischer 1844).

989. *Agaricus sulphureus* Bull. R. 3945 (W. 1855).
 90. *A. vaccinus* Pers. R. 3957 (Lk. 1795).
 A. Columbetta Fr. R. 3959 (Sch. 1806).
 A. rutilans Schaef. R. 3963 (F. 1855).
 A. Russula Schaef. R. 3964 (Lk. 1795).
 A. equestris L. R. 3973 (F. 1855).
 A. conicus Scop. R. 3978 (Sch. 1806).
 A. puniceus Fr. R. 3980 (F. 1855).
 A. coccineus Pers. R. 3982 (Sch. 1806).
 A. virgineus Jacq. R. 3990 (F. 1855).
 A. pratensis Pers. R. 3991 (Lk. 1795).
 1000. *A. limacinus* Scop. R. 3997 (Sch. 1806).
 A. hypothejus Fr. R. 4000 (W. 1855).
 A. eburneus Bull. R. 4004 (Sch. 1806).
 A. mucidus Schr. R. 4008 (W. 1855).
 A. melleus Vahl. R. 4011 (Sch. 1806).
 A. granulatus Bat. R. 4023 (Sch. 1806).
 A. cepaestipes Sow. R. 4024 (Lehmeyer 1855).
 A. cristatus Fr. R. 4030 (Sch. 1806).
 A. excoriatus Schaef. R. 4036 (W. 1855).
 A. procerus Scop. R. 4037 (Sch. 1806).
 10. *A. vaginatus* Bull. R. 4038 (F. 1855).
 A. rubescens Fr. R. 4044 (W. 1855).
 A. pantherinus DC. R. 4049 (Sch. 1806).
 A. muscarius L. R. 4050 (T. 1788). S. 140.
 A. phalloides Fr. R. 4052 (Sch. 1806).

* * *

1015. *Wüstneia sordida* Rab. (W. 1859) vergl. Archiv
 XIII. S. 3. — Wo diese Pilzgattung einzureihen
 sei, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen
 können.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [14_1860](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [VIII. Fungi. 362-392](#)