

Herrn Pastor Grietvant und aus der Necknitz bei Sülz durch Herrn Geh. Amtsrath A. Koch. — Im Gränzgebiete kommt sie vor: bei Hamburg in der Elbe (Dr. L. Brückner), bei Lübeck in der Trave (C. Pfeiffer) und bei Stettin in der Oder (A. v. Maltzan).

3. *Paludina tentaculata* L. St. p. 92. *P. impura* Dr. Sch. p. 110. R. f. 65. gemein in allen Gewässern.

4. *Paludina similis* Drap. St. p. 93. Nils. p. 120. (ohne Namen!) Kleeberg p. 30. no. 4. (ohne Namen!) *P. inflata* Hansén in Hornschuch's Archiv scandinav. Beiträge Band II. S. 330. (aber nicht *P. inflata* Farr., welche = *P. rubens* Menke ist). Bei weitem seltener als die vorige, ihr nahe stehende Art; sie ist bisher nur gefunden in der Umgegend von Schwerin (Segnitz) und in der Necknitz bei Sülz (A. Koch).

Anm. Ob die von Stein bei Berlin gefundene *P. acuta* Mich. (p. 95) wirklich unsere in der Ostsee, so wie in dem mit süßem Wasser gefüllten curischen und frischen Haff lebende und nach A. v. Chamisso auch im Torf bei Greifswald fossil vorkommende *P. thermalis* L. (*muriatica* Lam. Archiv I. S. 96) sei, wie ich aus seiner Abbildung und der Bemerkung schließen möchte, daß sie auch in Frankreich an der Meeresküste häufig im Brackwasser vorkomme, wage ich noch nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden.

C. Rhiphidiglossata.

1. Fam. Neritacea.

Neritina.

1. *Neritina fluviatilis* L. St. p. 96. Sch. p. 115. R. f. 118. 119. in fließenden Gewässern und Seen auf Steinen sehr gemein, in vielen und schönen Farbenvarietäten (die schönsten besitze ich aus der Tollense).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [5_1851](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [C. Rhipidiglossata. 1. Fam. Neritacea. 70](#)