

## Avium conspectus

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.oegeschichte.at  
quae in Republica Peruana reperiuntur et pleraeque obser-  
vatae vel collectae sunt in itinere

a

Dr. J. J. de Tschudi.<sup>1)</sup>

Ordo I. **Accipitres** Lin. Syst. Nat. 1735.

Fam. 1. **Vulturidae** C. Bonap. Saggio 1831.

1. Gen. **Sarcoramphus** Dum. Zool. anal. 1806.

*Gypagus* Vieill. 1816.

1. 1. *S. condor* Dum. l. c. p. 32.

*Vultur gryphus* Lin. Syst. Nat. Gmel. XIII. 1. p. 245. 1.

*Cathartes gryphus* Temm. pl. col. 133 mas; pl. 408  
fem. juv.

*Sarcoramphus gryphus* Goldfuss Naturh. Atlas tab. 107.

Condor et Buytre Hispan. Cuntur Indigen.

2. 2. *S. papa* Dum. l. c. p. 32.

*Vultur papa* Lin. Gmel. XIII. 1. p. 246. 3.

*Iriburubicha* Azar. Apunt. Nr. 1.

2. Gen. **Cathartes** Jllig. Prodr. 1811.

*Catharista* Vieill. 1816.

3. 1. *C. foetens* Jllig. Prodr. p. 236.

*Vultur atratus* Wils. Amer. Ornith. pl. 45. fig. 2.

*Cathartes jota* Bonap. Synops. p. 23.

*Vultur jota* Molin. Hist. nat. Chile p. 235.

*Iribu* Azar. Apunt. Nr. 2.

Gallinazo Incol.

4. 2. *C. aura* Jllig. Lichtenst. Doubl. Verzeichn. 1823.  
Nr. 663.

*Vultur aura* Lin. Gmel. XIII. 1. p. 246. 5.

*Urubu* Marcg. Bras. p. 207.

*Iribi* — *Acabiray* Azar. Apunt. Nr. 3.

Gallinazo a cabeza colorada Incol

<sup>1)</sup> Genera quaedam nova, quae hoc in conspectu obveniunt, proposita sunt a Dom. J. Cabanis, Assist. Mus. Zool. Berol., qui ad constituendam hanc enumerationem observationes suas benevole mecum communicavit.

Fam. 2. Falconidae C. Bonap. Sagg. 1831.

3. Gen. **Polyborus** Vieill. Anal. d'une nouv. Ornith. syst. 1816.

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.oogeschichte.at  
*Caracara* Cuv. 1817. *Milvago* Spix 1824. *Phalcoboenus* d'Orbig. 1837.

5. 1. *P. vulgaris* Vieill. et Oudart Gall. des Ois. p. 23. tab. 7.

*Falco cheriway* Jacq. Beitr. p. 17. Nr. XII. tab. 4.

*Falco brasiliensis* Lath. Syn. p. 63. 74.

*Polyb. Caracara* Spix Av. Bras. I. tab. 1a.

*Caracara* Marcgr. Bras. p. 214.

6. 2. *P. megalopterus* Cab.

*Aquila megaloptera* Meyen Reise III. p. 188. tab. XVII. (foem.).

*Phalcoboenus montanus* d'Orbig. de Lafres. Synopsis Avium etc. in Guerin Mag. Zool. 1837. p. 2. Voyage dans l'Amer. mérid. Ois. p. 51. tab. 2. fig. 1. 2.

Huarahuau Indig.

7. 3. *P. chimango* Vieill. Encycl. Meth. III. p. 1180.

*Aquila pezoporus* Meyen l. c. p. 186. tab. XVI.

8. 4. *P. taeniurus* Tsch.

P. supra ex fusco cinereus; tectricibus superioribus nonnullis maculis dilutioribus; remigibus primi secundique ordinis fasciis transversis nigris; gula pectoreque flavis striolis nigris; abdomine obscuriore fasciis transversis spadiceis; cauda permultis (23) fasciis fuscis; rostro coeruleo-corneo; pedibus flavis, unguibus nigris; iride flava.

Longit. tot. 1' 8".

4. Gen. **Hypomorphnus** Cabanis.

Rostrum Buteonis sed longius minusque arcuatum; nares puncto osseo, minus conspicuo quam in Polyboris, instructae; loro deplumato. Alae mediocres, breviores quam in Buteonibus. Cauda mediocris, subaequalis. Pedes Buteonis, tarsi autem longioribus, digitis unguibusque brevioribus. Color praevallens niger aut rufus. Cauda nigra, fascia alba.

(Typus: *Falco urubitinga* Lin. Gmel. *Falco rutilans* Lichtenst.)

9. 1. *H. urubitinga* Cab.

*Falco urubitinga* Lin. Gmel. XIII. 1. p. 265. 7. Temm. pl. col. tab. 55. jun.

*Falco longipes* Jllig. Mus. Berol.

*Aquila picta* Spix Av. Bras. tab. 1c.

*Urubitinga* Marcgr. Bras. p. 214.

landeskultur *Gavilan mixto negro* Azar. Apunt. Nr. 20. *Gavilan mixto*  
chorreado ibid. Nr. 17. *Gavilan mixto pintado* ibid.  
Nr. 18.

10. 2. *H. rutilans* Cab.

*Circus rufulus* Vieill. Encycl. meth. III. p. 1216.

*Falco rutilans* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 627.

*Buteo rutilans* Less. Man. Ornith. I. p. 104.

*Falco rutilans* Temm. pl. col. 25.

*Gavilan de estero acanelado* Azar. Apunt. Nr. 11.

11. 3. *H. unicinctus* Cab.

*Falco unicinctus* Temm. pl. col. 313.

*Falco Harrisii* Audubon Ornith. Biogr. V. p. 30.

*Nisus unicinctus* Less. Trait. p. 61.

*Astur unicinctus* d'Orbig. Lafres. Syn. l. c. p. 5.

*Gavilan mixto oscuro y canela* Azar. Apunt. Nr. 19.

5. Gen. *Buteo* Cuv. Leç. Anat. comp. 1800.

12. 1. *B. aguya* Cab.

*Falco aguya* Temm. pl. col. 302.

*Spizaetus melanoleucus* Vieill. Encycl. III. p. 1256.

*Haliaetus aguya* Less. Trait. p. 42.

*H. melanoleucus* d'Orbig. de Lafresn. Syn. l. c. p. 3.

*Aquila oscura y blanca* Azar. Apunt. Nr. 8.

13. 2. *B. pterocles* Less. <sup>1)</sup>

*Falco pterocles* Temm. pl. col. 56. adult. — pl. 139. junior.

*Buteo pterocles* Less. Trait. p. 80.

*Buteo tricolor* d'Orbig. de Lafres. Syn. l. c. p. 6. Voy.

p. 106. tab. 3. fem. adult. — *Buteo unicolor* d'Orb.

de Lafres. Syn. l. c. p. 7.

*Aquila coliblanca* Azar. Apunt. Nr. 10.

6. Gen. *Circaëtus* Vieill. Orn. Anal. 1816.

14. 1. *C. solitarius* Tsch.

*C. ardesiacus*; hypochondriis femoribusque nigricantibus;  
remigibus nigris; cauda fascia lata alba in medio et altera an-

---

<sup>1)</sup> Differt. ab hac specie *Buteo braccatus* nob. (*Aquila braccata* Meyen Reise III. p. 189. Tab. 18. *Buteo tricolor* d'Orbig. Voyage tab. 3. fig. 1. mas) Republicae chilensis incola. Dom. D'Orbigny *Aquilam braccatam* perperam *Buteonis tricoloris* marem esse putat.

gusta in apice; cera flava, rostro nigricante; pedibus flavis; unguibus nigris.

Long. tot. 2' 3".

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.oögeschichte.at

7. Gen. **Ictinia** Vieill. Orn. Anal. 1816.

15. 1. *I. plumbea* Vieill. Encycl. meth. III. p. 1208.

*Falco plumbeus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 282. 117. Temm.  
pl. col. 130. juv.

8. Gen. **Morphnus** Cuv. Regn. anim. I. 1817.

*Harpyia* Cuv. *Thrusaetos* G. R. Gray. 1840.

16. 1. *M. harpyia* Cab.

*Falco harpyia* Lin. Gmel. XIII. I. p. 251. 34.

*Falco destructor* Daud. Temm. pl. col. 14.

*Harpyia maxima* Vieill. Encycl. III. p. 1249.

*H. ferox* Less. Trait. p. 50.

*Harpyia destructor* d'Orbig. de Lafres. Syn. l.c. p. 4. 1.

9. Gen. **Nisus** Cuv. Leg. Anat. comp. 1799.

17. 1. *N. pileatus* Less. Man. d'Ornith. I. p. 98.

Avis adult. *Falco pileatus* Prinz Max. Beitr. III. p.  
107. Tem. pl. col. 205.

*Nisus pileatus* Less. Trait. p. 57.

*Esparvero azulejo* Azar. Apunt. Nr. 26.

Avis junior. *Falco poliogaster* Natt. Temm. pl. col. 264.

*Nisus poliogaster* Less. Trait. p. 62.

Avis juven. *Falco poliogaster* Temm. pl. col. 265.

? *Esparvero pardo y goteado* Azar. Apunt.  
Nr. 24.

18. 2. *N. leucorrhöus* Cab.

*Falco leucorrhöus* Quoy et Gaim. Zool. de l'Uranie  
pl. 13.

*Daedalion leucorrhöus* Less. Trait. p. 66.

19. 3. *N. magnirostris* Less. Trait. p. 57.

*Falco magnirostris* Lin. Gmel. XIII. I. p. 281. 115.

*Falco insectivorus* Spix Av. Bras. p. 17. tab. 8a.

10. Gen. **Climacocercus** Cab.<sup>1)</sup>

*Brachypterus* Less. 1837. *Micrastur* G. R. Gray 1841.

20. 1. *C. concentricus* Cab.

*Falco concentricus* Jllig. Mus. Berol.

*Nisus concentricus* Less. Trait. p. 60.

---

<sup>1)</sup> Hujus Generis typus est: *Falco brachypterus* Temm.

11. Gen. **Harpagus** Vig. Zool. Journ. 1824.  
*Bidens* Spix 1824. *Diodon* Less. 1831. *Diplodon*  
Nitzsch 1840.  
landeskulturdirektion Oberösterreich · download www.oegeschichte.at
21. 1. *H. bidentatus* Vig. Sket. of Ornith. in Zool. Journ.  
l. p. 338.  
*Diodon brasiliensis* Less. Trait. p. 95.  
Mas adult. *Falco diodon* Temm. pl. col. 198.  
*Bidens femoralis*<sup>1)</sup> Spix l. c. tab. 8. et *B.*  
*cinerascens* Spix l. c. p. 15.  
Avis junior (an fem.): *Falco bidentatus* Lath. Temm.  
pl. col. 38.  
*Falco rufiventer* Spix l. c. tab. 6.  
Avis juven. *Falco bidentatus* Temm. pl. 228.  
*Bidens albiventer* Spix l. c. tab. 7.
12. Gen. **Falco** Lin. Syst. Nat. 1748.
22. 1. *F. femoralis* Temm. pl. col. 343. mas adult. tab.  
121. Av. jun.  
*Alconillo aplomado* Azar. Apunt. Nr. 39.
23. 2. *F. sparverius* Lin. Gmel. XIII. l. p. 284.  
Cernicalo Incol.
13. Gen. **Circus** Lacep. Mém. Inst. 1800.  
*Circus* et *Strigiceps* Bonap.
24. 1. *C. poliopterus* Tsch.  
C. supra nigro - fuscus, dorsi plumis concoloribus, ca-  
pitis tectricibusque alarum superioribus pogoniis rufo-ma-  
culatis; remigibus cinereis, pogonio interno fasciis transversis  
nigris; tectricibus inferioribus albis rufo-maculatis; campterio  
albo; regione parotica e ferrugineo et nigro variegata; pectore  
fusco, fasciis numerosis transversis albis; abdomine albo fa-  
sciis rufis; crisso abdomine concolore; cera flava; rostro ni-  
gro; pedibus flavis, unguibus nigerrimis.  
Long. tot. 1' 9½".
- Fam. 3. Strigidae. Swain. 1837.  
(*Strixideae* d'Orbig.!)
14. Gen. **Noctua** Savigny Mém. Ois. d'Egypt. 1809.
25. 1. *N. melanota* Tsch.  
An *Strix hylophila* Temm. hujus speciei juven.?

<sup>1)</sup> *Bidens femoralis* Spix ad hanc speciem pertinet neque ad  
*Falconem femoralem* Temm. ut Lesson putat et D'Orbigny repetit.

N. capite dorsoque saturate fuscis; alis dilutioribus, fasciis transversis albicantibus; tectricibus alarum superioribus dorso concoloribus, inferioribus rufescentibus; superciliis et collari albis; pectore ex ferrugineo-fusco rufomaculato; abdomine fasciis transversis variis fuscis et albis; hypochondriis crissoque flavescentibus; cauda saturate fusca, fasciis angustis et apice albis; cera flava, rostro luteo; pedibus fulvis; iride sulphurea.

Long. tot. 1' 8½".

26. 2. *N. dominicensis* Cab.

*Strix dominicensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 296. 40.

*Suinda* Azar. Apunt. Nr. 45.

27. 3. *N. urucurea* Less. Trait. p. 103.

*Strix grullaria* Temm. pl. col. 146.

*Noctua grullaria* Less. Trait. p. 102.

*Athene cunicularia* Bonap. List of the Birds etc. p. 6. 31.

*Noctua cunicularia* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 8. 3.

*Strix cunicularia* Molina.

*Urucurea* Azar. Apunt. Nr. 47.

28. 4. *N. ferruginea* Cab.

*Strix ferruginea* Prinz Max. Beitr. III. p. 234. Temm. pl. col. 199.

15. Gen. **Scops** Savig. Mém. Ois. d'Egypt. 1809.

29. 1. *Sc. choliba* d'Orb. de Lafr. Syn. p. 8. 1.

*Strix choliba* Vieill. Encycl. III. p. 1279.

*Strix decussata* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 615.

*Strix crucigera* Spix l. c. tab. 9.

*Choliba* Azar. Apunt. Nr. 48.

16. Gen. **Bubo** Cuv. Regn. Anim. I. 1817.

30. 1. *B. virginianus* Less. Trait. p. 115.

*Strix virginiana* Lin. Gmel. XIII. I. p. 287. 13.

*Bubo magellanicus* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 9.

*Nacurutu* Azar. Apunt. Nr. 42.

Chushec Indig.

17. Gen. **Otus** Cuv. Anat. comp. 1799.

31. 1. *O. brachyotus* Less. Trait. p. 111.

*Strix ulula et brachyotos* Lin. Gmel. XIII. I. p. 289.

18. Gen. **Strix** Lin. Syst. Nat. 1748.

32. 1. *St. perlata* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 613.

*St. perlata* Prinz Max. Beitr. III. p. 263.

*Lechuza* Azar. Apunt. Nr. 46.

landeskulturdirektion Oberösterreich; download [www.oegeschichte.at](http://www.oegeschichte.at)

**Ordo II. Passeres** Lin. Syst. Nat. 1735.

Fam. I. **Caprimulgidae** C. Bonap. Syn. Vert. 1837.

1. Gen. **Nyctibius** Vieill. Anal. nouv. Orn. 1816.

33. 1. *N. cornutus* de Lafres. Guér. Mag. 1837.

*C. cornutus* Vieill. Nouv. Dict. X. p. 245.

*C. jamaicensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 1029. 6.

*Urutau* Azar. Apunt. Nr. 308.

34. 2. *N. longicaudatus* Tsch.

*Caprimulgus longicaudatus* Spix Av. Bras. II. t. 3. fig. 1.

2. Gen. **Caprimulgus** Lin. Syst. Nat. XII. 1766.

35. 1. *C. ocellatus* Tsch.

*C. nigro-fuscus*, innumerabilibus lineolis transversis nigris et griseis varius; semitorque albo, pectore albo-maculato; remigibus primi et secundi ordinis nigricantibus, pogonio externo ferrugineo maculato, tertii ordinis dorso concoloribus, apice macula subrotunda zona ferruginea cincta ornatis; tectricibus alarum superioribus apice albo maculatis; inferioribus nigro-fumosis, striis duabus albescentibus; rectricibus intermediis fasciis transversis nigricantibus, externis obscurioribus apice albis; rostro brunnescente, apice nigro; pedibus colore carneo; iride flava.

Long. tot. 9".

36. 2. *C. decussatus* Tsch.

*C. capite cinereo*, plumis nigerrimis intermixtis, dorso lineis transversis ex fusco et nigro vario; remigibus primariis nigro-fumosis fascia alba notatis, secundariis ferrugineo-maculatis; parapteris medio nigerrimis pogoniis rufescente-notatis; tectricibus alarum superioribus pogonio externo macula albicante, inferioribus rufescentibus nigro-vittatis; rectricibus lateralibus fascia et apice albis; semitorque albo; abdomine ex albo-rufescente transversim nigro-striato; crisso rufescente; rostro nigro; pedibus fuscis; iride fusca.

Long. tot. 9" 6".

37. 3. *C. pruinusus* Lichtenst. Mus. Berol.

*C. supra cinerascens*, numerosis lineolis transversis non-

nullisque longitudinalibus nigris varius; remigibus cinereo-fuscis fascia alba; subtus ex albo flavescens, permultis fasciis angustis nigris; gula alba, pectore dorso concolore, cauda fasciata, aequali; vibrissis brevissimis, mollibus; rostri parte plumis denudata brevissima, nigra; pedibus fuscis.

Long. tot. 7" 6".

38. 4. *C. climacocercus* Tsch.

C. supra lineolis transversis alternis helveolis et nigris varius, remigibus nigris albo-fasciatis, parapteris tectricibusque superioribus pogonio externo ex rufo, albicante-marginato; rectricibus intermediis duabus et externis eadem longitudine caeteris gradatim brevioribus, intermediis dorso concoloribus, sed fasciis transversis incompletis nigris, externis pogonio interno albo, externo nigro et fusco notato; gula alba; pectore dorso dilutiore; abdomine albo; rostro nigro, pedibus rubris; iride flava.

Long. tot. 11", cauda 6".

39. 5. *C. trifurcatus* Nat. Mus. Vin.

Fam. 2. Hirundineae d'Orb. de Lafres. Syn. Av. l. c. 1837.

3. Gen. *Hirundo* Lin. Syst. Nat. 1735.

40. 1. *H. andecola* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 69.

41. 2. *H. purpurea* Lin. Gmel. XIII. I. p. 1020. 5.

*Golondrina domestica* Azar. Apunt. Nr. 300.

Palomita de Santa Rosa Incol.

42. 3. *H. leucoptera* Lin. Gmel. XIII. I. p. 1022. 26.

*Golondrina de la rabadilla blanca* Azar. Apunt. Nr. 304.

43. 4. *H. melanopyga* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 57. 593.

*H. minuta* Prinz Max. Beitr. III. I. p. 369. Temm. pl. col. 209. fig. 1.

*Golondrina de los timoneles negros* Azar. Apunt. Nr. 303.

Fam. 3. Ampelidae C. Bonap. Sagg. 1831.

4. Gen. *Ampelis* Lin. Syst. Nat. 1748.

44. 1. *A. maynana* Lin. Gmel. XIII. I. p. 840. 5.

*Cotinga maynana* Briss. Av. II. p. 341. 2. tab. 34. fig. 2.

45. 2. *A. viridis* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 40. 3.

46. 3. *A. elegans* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 385. 1.

*A. aureopectus* de Lafres. Guér. Mag. 1843. livr. VII. p. 39 (foemin. fig. accur.).

47. 4. *A. cineta* Tsch. Wieg. Arch. l. c. p. 385. 2.

48. 5. *A. rufaxilla* Tsch.

*A. fronte superciliisque viridi-emereis, pileo plumis elongatis rubris, nonnullis nigris intermixtis, facie gulaque ex albicante ferrugineis; collo pectoreque griseo-viridibus; dorso parapterisque obscurioribus, striis longitudinalibus nigricantibus; remigibus nigro-fuscis: tectricibus alarum superioribus rufis, inferioribus pectori concoloribus; rectricibus nigris; abdomine sulphureo, striis longitudinalibus nigerrimis; rostro nigro, basi maxillae inferioris coerulescente; pedibus viridi-nigris, iride colore igneo.*

Long. tot. 8" 10".

5. Gen. *Ptilogonys* Swains. Zool. Journ. 1824.

*Hypothymis* Boje 1826.

49. 1. *Pt. leucotis* Tsch.

*Pt. cinnamomeus, pileo cerviceque nigris; dorso, uropygio tectricibusque alarum superioribus cinnamomeis, parapteris dilutioribus; fascia lata alba a rostri angulo ad auriculas porrigente; gula, pectore, abdomine crissoque nigerrimis; hypochondriis rufis; remigibus primariis nigris, pogonii interni basi alba, secundariis pogoniis externis rufescentibus, internis nigricantibus; rectricibus sex internis nigris: externis apice albis; maxilla superiore nigra, inferiore flava; pedibus nigerrimis; iride colore igneo.*

Long. tot. 9".

50. 2. *Pt. griseiventer* Tsch.

*Pt. supra ex olivaceo-rufescens, fronte cinerea, pileo olivaceo nonnullis maculis rufescentibus, tectricibus alarum superioribus nigris, pogonio externo apiceque rufo-terminatis; remigibus primariis fuscis pogonio externo olivaceis, secundariis basi pogonii interni albis; crisso rufo: rectricibus alarum duabus intermediis dorso concoloribus, duabus externis parte pogonii interni postica albis, caeteris nigris apice albis; subtus griseus; tectricibus caudae inferioribus dilute olivaceis; albo variegatis; rostro pedibusque fuscis; iride nigricante.*

Long. tot. 7".

6. Gen. **Proctas** Jllig. Prodr. 1811.*Tersina* Vieill.51. 1. *P. ventralis* Jllig. Prodr. p. 229.*Ampelis tersa* Lin. Gmel. XIII. I. p. 841. 7.*Ters. coerulea* Vieill. Nouv. Dict. d'hist. nat. XXIV. 1818.*Proc cyanotropus* Pr. Max. Reise nach Bras. B. I. p. 187.7. Gen. **Cephalopterus** Geoffr. St. H. An. Mus. XIII. 1809.*Coracina* Temm. Man. Ornith. 1820.52. 1. *C. ornatus* Geoffr. An. Mus. I. c. tab. 15.*Coracina cephaloptera* Temm. pl. col. 255.*Coracina ornata* Spix Av. Bras. I. tab. 149. (fig. non accur.).*Tunqui negro* Indig.

## Fam. 4. Pipridae de Lafres. Revue Zool. 1839.

8. Gen. **Rupicola** Briss. Ornith. 1760.53. 1. *R. peruviana* Ch. Dumont. Dict. Scienc. nat. XLVI. p. 453.*Tunqui colorado* Indig. (mas). *Tunqui mulata* Indig. (foem.).9. Gen. **Pipra** Lin. Syst. Nat. XII. 1766.54. 1. *P. filicauda* Spix Av. Bras. II. p. 5. tab. 6. fig. 1. 2. mas et foem.55. 2. *P. chloris* Natt. Temm. pl. col. 172. fig. 2.56. 3. *P. chloromeros* Tsch.*P. nigra*, pileo, nucha facieque coccineis; tibiis stramineis; rostro flavo; pedibus coeruleis; iride coerulea.

Long. tot. 3".

57. 4. *P. coeruleo-capilla* Tsch.*P. nigra*, pileo uropygioque coeruleis; rostro pedibusque nigricantibus; iride fusca. Differt a *Pipra coronata* Spix uropygio coeruleo.

Long. tot. 2" 9".

## Fam. 5. Muscicapidae Less. Trait. Orn. 1831.

10. Gen. **Psaris** Cuv. Regn. Anim. I. 1817.*Pachyrhynchus* Spix.

58. 1. *P. semifasciatus* Jard. et Selby Illust. Orn. part. IV. Synops. Nr. 3.

*Pachyrhynchus semifasciatus* Spix Av. Br. II. tab. 44. fig. 2.

*Titura personata* Jard. et Selb. Illust. Orn. Part. II. tab. 24.

11. Gen. *Scaphorhynchus* Prinz Max. Beitr. 1831.

59. 1. *Sc. audax* Tsch.

*Muscicapa audax* Lin. Gmel. XIII. I. p. 934. 34.

*Tyrannus solitarius* Vieill. Nouv. Dict. III p. 88.

*Tyrannus audax* Vieill. Enc. Meth. II. p. 846. 1823.

*Suiriri chorreado todo* Azar. Apunt. Nr. 196.

60. 2. *Sc. chrysocephalus* Tsch.

Sc. supra ex cinereo-virescens, pileo plumis elongatis, citrinis, apice virescentibus; fronte occipiteque cinereis, superciliis albis, macula nigra ante oculos; facie nigricante, fascia alba a rostri angulo ad auriculas porrigente; remigibus rectricibusque fuscis, pogonio externo cinnamomeo-terminatis, interno flavicante-limbatis; rectricibus fuscis margine dilutioribus; subtus flavus, gula candida, pectore rufescente, tectricibus alarum inferioribus abdomini concoloribus; rostro nigro; pedibus chalybeis; iride coccinea.

Long. tot. 9" 3".

12. Gen. *Tyrannus* La Cep. Mém. Mus. 1799.

61. 1. *T. melancholicus* Vieill. Nouv. Dict. XXXV. p. 48. (1819).

*Muscicapa despotes* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 567 a.

*M. furcata* Spix Av. Bras. II. tab. 19.

*Tyrannus crudelis* Swain.

*Suiriri guazú* Azar. Apunt. Nr. 198.

Papamosca Incol.

62. 2. *T. Cinchoneti* Lichtenst. Mus. Berol. 1844.

T. supra virescens fronte superciliisque flavis; remigibus fuscis; subtus flavus; rostro pedibusque nigris.

Long. tot. 6" 6".

13. Gen. *Myiarchus* Cab.<sup>1)</sup>

*Muscapa* et *Tyrannus* Auctor. part. *Tyrannula* Swain.<sup>2)</sup>

1827. *Pyrocephalus* Gould. 1838.

<sup>1)</sup> *μύια* musca, *ἄρχος* princeps.

<sup>2)</sup> except. *Muscicapa barbata* Gmel. et aliae species eidem similes, quae ad genus *Myiobius* Gray spectant.

63. 1. *M. ferox* Cab.

*Muscicapa ferox* Lin. Gmel. XIII. I. p. 934. 32.

*Tyrannus ferox* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 845.  
Landeskulturdirektion Oberösterreich; download [www.oögeschichte.at](http://www.oögeschichte.at)

64. 2. *M. rufiventris* Cab.

*Tyrannus rufiventris* d'Orb. de Lafr. Syn. I. c. p. 45. 12.

id. Voy. Ois. p. 312. tab. 32. fig. 3. 4.

65. 3. *M. nigricans* Cab.

*Tyrannula nigricans* Swains. Phil. Mag. N. S. I. p. 367.

*Muscicapa nigricans* Audub. Ornith. Biogr. V. p. 302.

id. Birds of Amer. pl. 434. fig. 6.

66. 4. *M. ferrugineus* Cab.

*Todus ferrugineus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 446. 12.

*Tyrannus bellicosus* Vieill. Nouv. Dict. XXXV. p. 74.

*Platyrhynchus hirundinaceus* Spix Av. Bras. II. p. 11.

tab. 13. fig. 1.

*Platyrhynchus rupestris* Pr. Max. Beitr. III. 2. p. 977.

*Hirundinea bellicosa* d'Orb. de Lafr. Syn. I. c. p. 46.

*Suiriri roxo oscuro* Azar. Apunt. Nr. 189.

67. 5. *M. coronatus* Cab.

*Muscicapa coronata* Lin. Gmel. XIII. I. p. 932. 25.

*Muscipeta coronata* d'Orb. de Lafr. Syn. I. c. p. 47. 3.

*Pyrocephalus coronatus* Gould Zool. of Beagle. 1838.

*Curinche* Azar. Apunt. Nr. 177.

*Putilla colorada* Incol.

68. 6. *M. atropurpureus* Cab.

*Muscicapa atropurpurea* Lichtenst. Mus. Berol.

*Putilla mulata* Incol.

*M. atrofumosus* nonnullis plumulis coccineis intermixtis; capite nigricante: abdomine purpureo-lavato; rostro pedibusque nigerrimis.

Long. tot. 5" 6".

14. Gen. **Euscarthmus** Prinz Max. Beitr. 1831.

69. 1. *E. pileatus* Tsch.

*E.* supra viridis, pileo rufo-fusco; remigibus retribusque nigris externi pogonii margine viridibus; subtus flavescens, gutture cinereo; rostro nigricante, mandibula inferiori alba; pedibus plumbeis, unguibus flavis; iride fusca.

Long. tot. 3" 9".

70. 2. *E. rufipes* Tsch.

*E.* supra olivaceus, pileo cinereo; remigibus tectricibusque

nigris margine pogonii externi virescentibus; subtus albicans, gutture candido; tectricibus alarum inferioribus flavescens; rostro majori quam in specie praecedenti, fusco; pedibus rufis; iride fusca.

Long. tot. 3" 6'''.

15. Gen. **Copurus** Strickl. An. of Zool. 1841.

*Platyrrhynchus* Spix part.

71. 1. *C. filicauda* Strickl. l. c. p. 427.

*Muscicapa monacha* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 550.

*Platyrrhynchus filicauda* Spix Av. Bras. II. p. 12. tab. 14.

*Colon* Azar. Apunt. Nr. 180.

16. Gen. **Elaenia** Sundevall Vetensk. Acad. Handling. for ar 1835.

*Paroides* Less. 1837. *Muscipeta* d'Orb. de Lafr. 1837.

72. 1. *E. cayanensis* Cab.

*Muscicapa cayanensis* Lin. Gmel. XIII. l'p. 937. 12.

*Muscipeta cayanensis* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 47. 1.

*Muscicapa similis* Spix Av. Bras. II. tab. 25.

73. 2. *E. obscura* Cab.

*Muscipeta obscura* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 48. 6.

74. 3. *E. modesta* Tsch.

*E.* supra cinereo-fusca, pileo plumis elongatis albis, apice fuscis; remigibus rectricibusque fuscis margine dilutioribus; subtus cinerea, ventre albo; tectricibus alarum inferioribus, hypochondriis crissoque dilute flavicantibus; mandibula superiori fusca, inferiori albicante; pedibus nigris; iride fusca.

Long. tot. 5" 10'''.

75. 4. *E. brevirostris* Tsch.

*E.* supra ex cinereo olivacea, pileo obscuriore; remigibus rectricibusque fuscis; tectricibus alarum superioribus fuscis apice pogonii externi albo-maculatis; subtus flavescens; gutture albo; rostro brevi, fusco; pedibus nigris; iride fusca.

Long. tot. 5" 10'''.

76. 5. *E. viridiflava* Tsch.

*E.* supra virescens, capite griseo; remigibus tectricibusque nigricantibus margine viridi-flavis; rectricibus fuscis, viridimarginatis; subtus flavescens; gula albicante; pectore ex cinereo

flavescente; alarum tectricibus inferioribus dorso concoloribus; rostro pedibusque nigris; iride fusca.

Long. tot. 4" 6'''.

landeskulturdirektion Oberösterreich; download [www.oogeschichte.at](http://www.oogeschichte.at)

#### 17. Gen. *Mionectes* Cab. <sup>1)</sup>

Rostrum capite brevius, subrectum, latius quam altum, culmine vix distincto, apice parum deflexum, incisulum; nares laterales, rotundae, cartilagine instructae. Vibrissae fere nullae. Alae mediocres, remigibus primariis interdum praecipue versus apicem angustatis, acuminatis ut in Tyrannis, earum secunda linearis vel filiformis ut in Psaridibus et Ampelidibus nonnullis. Cauda mediocris, aequalis. Pedes mediocres. Sunt hujus generis species parvae, habitu Lipangis similes.

Typus: *M. poliocephalus* Tsch. — *Muscicapa oleaginea* Lichtenst.

#### 77. 1. *M. poliocephalus* Tsch.

*M.* supra prasinus, pileo facieque coeruleo-cinereis; remigibus nigro-fuscis pogonii externi margine viridibus, interni helvis; subtus sulphureus, gutture cinereo, albo-striato; pectore dorso dilutiore; alarum tectricibus inferioribus helvolis; rectricibus remigibus concoloribus; rostro basi fusco, apice nigro; pedibus fuscis; iride fusca.

Long. tot. 5" 6'''.

#### 18. Gen. *Leptopogon* Cab. <sup>2)</sup>

Rostrum mediocre, vix latius quam altus, subrectum, apice deflexum parum emarginatum; nares laterales, oblongae. Vibrissae longae, tenues. Alae, cauda pedesque mediocres. Hoc genus transitum a Muscicapis ad Sylvias facit. Sunt aves parvae, habitu coloribusque Regulis similes.

Typus: *Leptopogon superciliaris* Tsch. — *Muscicapa ventralis* Natt. Temm.

#### 78. 1. *L. superciliaris* Tsch.

*L.* supra viridis, pileo saturate cinereo, superciliis griseis; remigibus fuscis pogonio externo viridi-marginatis, interno basi albicantibus; alarum tectricibus superioribus pogonio ex-

<sup>1)</sup> μειονέκτης damnum faciens.

<sup>2)</sup> λεπτός tenuis, πώγων barba.

terno apice albo-maculatis; subtus viridi-albus, gula cinerascens; rectricibus fuscis margine viridibus; rostro nigro, mandibula basi alba; pedibus nigricantibus; iride fusca.

Long. tot. 5" 2".

79. 2. *L. cinereus* Tsch.

L. supra cinereus, pileo nigricante, remigibus saturate fuscis; tectricibus alarum superioribus apice albo limbatis; cauda nigerrima; subtus dorso dilutiore; rostro pedibusque nigro-fuscis; iride coccinea.

Long. tot. 4".

19. Gen. *Setophaga* Swains. Zool. Journ. 1827.

80. 1. *S. verticalis* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 50. 2.  
Voy. tab. 35. fig. 1.

81. 2. *S. melanocephala* Tsch.

S. supra ex coeruleo-cinerascens, pileo nigerrimo, fronte et regione ophthalmica aureis; macula nigra ante oculos; remigibus nigris; rectricibus intermediis 4 nigris, lateralibus albis; subtus aurea; alarum tectricibus albis; crisso flavicante; rostro pedibusque nigris; iride flavicante.

Long. tot. 5" 9".

82. 3. *S. chrysogaster* Tsch.

S. supra colore Linariae viridis, pilei plumis basi aureis; remigibus fuscis, viridi-marginatis; subtus lutea; rostro fusco; pedibus flavescentibus; iride fusca.

Long. tot. 5"

20. Gen. *Culicivora* Swains. Zool. Journ. 1827.

83. 1. *C. reguloides* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 57. 2.  
id. Voy. Ois. pl. 36. fig. 1.

21. Gen. *Ptyonura* Gould. G. R. Gray Gen. of Birds. 1840.

*Lessonia* Swains. 1831. *Muscisaxicola* d'Orb. de Lafr. 1837. *Ptyonura* (?) Gould. 1840.

84. 1. *Pt. albifrons* Tsch.

Pt. supra ex olivaceo cinerea, pileo subfusco, fronte facieque ante oculos candidis; remigibus bruneis apice dilutioribus; subtus grisea; rectricibus nigricantibus, lateralibus

marginē apiceque albicantibus; rostro pedibusque nigerrimis; iride fusca.

Long. tot. 9"

85. 2. *Pt. rufivertex* Cab.

*Muscisaxicola rufivertex* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 66.

1. id. Voy. Ois. pl. 40. fig. 2.

86. 3. *Pt. mentalis* Cab.

*Muscisaxicola mentalis* d'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 66.

2. id. Voy. Ois. pl. 40. fig. 1.

22. Gen. *Ochthites* Cab. <sup>1)</sup>

*Muscigralla* d'Orb. de Lafr. 1837.

87. 1. *O. breviceauda* Cab.

*M. breviceauda* d'Orb. de Lafr. l. c. p. 61. 1. id. Voy.

Ois. pl. 39. fig. 1.

Fam. 6. Laniadae d'Orb. de Lafr. Guér. Mag.

Zool. 1837.

23. Gen. *Cyclorhis* Swains. Zool. Journ. 1824.

*Laniagra* d'Orb. de Lafr. 1837.

88. 1. *C. guayanensis* Swains. Zool. Journ. I. p. 30.

*Tanagra guayanensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 893. 30.

*Lanius guayanensis* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 527.

*Lanius supercilialis* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 737.

*Thamnophilus guayanensis* Pr. Max. Beitr. III. p. 1016.

*Laniagra guayanensis* D'Orb. de Lafr. Syn. l. c. p. 9.

id. Voy. Ois. p. 160.

*Lindo verde frente de canela* Azar. Apunt. Nr. 97.

24. Gen. *Thamnophilus* Vieill. Meth. 1816.

89. 1. *Th. major* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 744.

*Lanius stagurus* Licht. Doubl. Verz. Nr. 487.

*Thamn. albiventer* Spix. Av. Bras. II. p. 341.

*Thamn. stagurus* Pr. Max. Beitr. III. p. 990.

*Batará major* Azar. Apunt. Nr. 211.

90. 2. *Th. doliatus* Prinz Max. Beitr. III. p. 995.

*Lanius doliatus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 309. 16.

*Thamn. radiatus* Spix Av. Bras. II. p. 24. tab. 35. fig. 2. tab. 38. fig. 1. fem.

*Thamn. radiatus* Vieill. Tabl. encycl. et meth. p. 746.

*Batará listado* Azar. Apunt. Nr. 212.

<sup>1)</sup> in ripa degens. ὄχθη ripa.

91. 3. *Th. lineatus* Spix Av. Bras. II. tab. 33.

*Thamn. fasciatus* Swains. Zool. Journ. II. p. 88.

landeskulturdi *Lanius palliatus* Lichtenst Doubl. Verz. Nr. 492. 493.

*Thamn. palliatus* Pr. Max. Beitr. III. p. 1010.

92. 4. *Th. luctuosus* Tsch.

*Th. nigerrimus*, tectricibus alarum superioribus rectricibusque apice candidis; uropygii plumis basi albis; rostro pedibusque nigris; iride coccinea.

Long. tot. 6".

93. 5. *Th. mentalis* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 12. 15.

id Voy. Ois. p. 177.

*Myiothera mentalis* Temm. pl. col. 179. fig. 3.

*Myiothera poliocephala* Pr. Max. Beitr. III. p. 1098.

94. 6. *Th. olivaceus* Tsch.

*Th. supra olivaceus*, pileo rufo-fusco; remigibus nigricantibus, pogonio externo fuscis; tectricibus alarum superioribus nigris apice olivaceo-limbatis; subtus flavescens, gula albicante; pectore cinereo; camptorio albicante; cauda fusca; rostro nigerrimo; mandibula inferiore subtus linea coerulescente; pedibus plumbeis; iride subfusca.

Long. tot. 4" 9".

95. 7. *Th. axillaris* Tsch.

*Th. supra cinereo-virescens*, capite rubello-fusco, superciliis albis; tectricibus alarum superioribus nigris margine semicirculo albo-limbatis, remigibus fuscis, olivaceo marginatis; rectricibus nigris apice et lateralibus attamen margine pogonii externi albis; subtus subflavus; rostro nigro, mandibula inferiore albicante; pedibus coerulescentibus; iride fusca.

Long. tot. 4" 10".

25. Gen. *Formicivora* Swains. Zool. Journ. 1824.

96. 1. *F. atra* Ménétr. Myothères Nr. 29.

*Drymophila atra* Swains. Zool. Journ. VI. p. 153. 6.

*Thamnophilus aterrimus* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 11. 10.

*Formicivora atra* d'Orb. Voy. Ois. pl. 5. fig. 2.

Fam. 7. Myiotherinae Swains. 1837.

26. Gen. *Pithys* Vieill. Anal. Nouv. Ornith. 1816.

97. 1. *P. leucophrys* Tsch.

*P. ardesiacus*, fronte superciliisque candidis, pileo obscu-

riore; remigibus rectricibusque schistaceis; gula nigra; rostro nigro; pedibus fuscis; iride ignea.

Long. tot. 5" 2".

landeskulturdirektion Oberösterreich; download [www.oogeschichte.at](http://www.oogeschichte.at)

27. Gen. **Conopophaga** Vieill. Anal. Nouv. Orn. elem. 1816.

98. 1. *C. ardesiaca* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 13. 3.  
id. Voy. Ois. p. 188.

28. Gen. **Corythopsis** Sundeval Vet. Acad. Handl. 1835.

99. 1. *C. torquata* Tsch.

C. supra ex olivaceo-fusca, pileo laetiore; tectricibus alarum superioribus minoribus cinereis, reliquis, remigibus re-  
ctricibusque nigricantibus; subtus alba, gula candida; pectore  
fascia nigra; hypochondriis tibiisque subfuscis; mandibula su-  
periore nigra, inferiore albicante; pedibus flavescentibus;  
iride fusca.

Long. tot. 5" 10".

29. Gen. **Tinactor** Prinz Max. Beitr. III. 1831.

*Oxypyga* Ménétr. 1834.

100. 1. *T. fuscus* Prinz Max. l. c. p. 1106.

*Myiothera longirostris* Cuv. Gal. Paris.

*Thamnophilus caudacutus* Vieill. Nouv. Dict. II. p. 742.

*Myiothera umbretta* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 471.

*Oxypyga scansor* Ménétr. Myioth. tab. 11.

30. Gen. **Cinclus** Bechst. Naturg. Deutschl. 1802.

*Sturnus* Lin. part. *Hydrobata* Vieill. 1816.

101. 1. *C. leucocephalus* Tsch.

C. nigricans; capite, gutture pectoreque albis; rostro ni-  
gerrimo; pedibus flavicantibus; iride fusca.

Long. tot. 7".

Jacupishu Indig.

31. Gen. **Chamaeza** Vig. Zool. Journ. 1825.

*Grallaria* Swains. *Myioturdus* Prinz Max. part.

102. 1. *Ch. olivacea* Tsch.

Ch. meruloidi affinis, sed differt longitudine tarsorum, co-  
lore pectoris rostrique.

Ch. supra olivacea, pileo obscure fusco; remigibus con-

coloribus nigricantibus; rectricibus intermediis ferrugineis, lateralibus fuscis ante apicem fascia nigra, apice helvolis; subtus helva, gula pectoreque ferrugineis plumis nigro-marginatis; crisso rufescente; rostro valido, nigro; pedibus fuscis; iride fusca.

Long. tot. 8" 6".

32. Gen. **Grallaria** Vieill. Anal. Nouv. Ornith. elem. 1816.

*Turdus* Lin. Gmel. Lath. part. *Myioturdus* Boje 1826.

*Myrmothera* Vieill. 1816.

103. 1. *G. fusca* Vieill. Gal. d'Ois. pl. 154.

*Turdus rex* Lin. Gmel. XIII. l. p. 828. 100.

*Myioturdus rex* Prinz Max. Beitr. III. p. 1027.

104. 2. *G. tinniens*.

*Turdus tinniens* Lin. Gmel. XIII. l. p. 827. 96.

Fam. 8. Turdidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837.

33. Gen. **Turdus** Lin. Syst. Nat. 1748.

105. 1. *T. serranus* Tsch.

*T.* supra obscure fuscus, pilei plumis scapis ferrugineis, remigibus rectricibusque nigricantibus; subtus ex olivaceo fuscus, pectore ferrugineo-fusco; crisso saturiore; rostro nigro culmine dilutiore; pedibus flavis; iride straminea.

Long. tot. 11".

Chihuaco Incol.

106. 2. *T. fuscater* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 16. 1.  
id. Voy. Ois. p. 200. tab. 9. fig. 4.

107. 3. *T. Wilsoni* Bonap. Syn. p. 76.

*T. mustelinus* Wils. (nec Gmel.) Amer. Ornith. V. p. 98  
tab. 43. fig. 2 (nec fig. 3. ut saepe citatur).

34. Gen. **Mimus** Boje Isis 1826.

*Turdus* Lin. part. *Orpheus* Swains. 1827.

108. 1. *M. longicaudatus* Tsch.

*M.* supra ex cinereo fuscus, alis saturioribus, albo-vittatis, cauda longa, fusca, apice alba; subtus albicans, pectore dorso concolore; rostro nigro; pedibus fuscis; iride fusca.

Long. tot. 11" 6".

35. Gen. **Opetiorhynchus** Temm. Man. Ornith. 1815.*Furnarius* Vieill. 1816. *Figulus* Spix 1824.109. 1. *O. ruficaudus*<sup>1)</sup> Prinz Max. Beitr. III. p. 671.*Merops rufus* Lin. Gmel. XIII. 1. p. 465. 20.*Turdus badius* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 451.*Furnarius rufus* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 513.*Figulus albogularis* Spix Av. Bras. I. tab. 78.36. Gen. **Cillurus** Cab.<sup>2)</sup>*Furnarius* Less. part. *Opetiorhynchus* Kittl. *Uppuc-  
certhia* d'Orb. de Lafres. *Cinclodes* G.R. Gray  
1840.110. 1. *C. palliatus* Tsch.*C.* supra ex ferrugineo-fuscus, capite cerviceque cinereis,  
alis nigris, fascia alba; cauda nigricante apice alba; subtus al-  
bus; rostro pedibusque nigerrimis; iride fusca.

Long. tot. 11" 6'''.

111. 2. *C. montanus* Cab.*Uppucerthia montana* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c.  
1838 p. 22. 4. (vide notam 1!) — id. Voy. Ois. tab.  
56. fig. 1.112. 3. *C. nigrofumosus* Cab.*Uppucerthia nigrofumosa* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c.  
p. 32. 6. id. Voy. Ois. tab. 57. fig. 2.

## Fam. 9. Troglodytinae Swains. 1837.

37. Gen. **Pteroptochus** Kittl. Mem. Ac. Petersb. 1837.*Megalonyx* Less. 1830. *Leptonyx* Swains. 1832. *Myio-  
thera* Prinz Max. part. *Malocorhynchus* Ménétr.  
part. *Platyurus* Swains. part.113. 1. *Pt. femoralis* Tsch.*Pt.* supra ardesiacus, pileo, alis caudaque nigris; subtus  
laetior, uropygio, hypochondriis femoribusque fasciis trans-

<sup>1)</sup> Celeb. Meyen in „Reise um die Erde Tom. III. p. 205 (1834)  
novum avium descripsit genus nomine *Ochethorhynchus* speciemque  
*O. ruficaudus* nec *Oppetiorhynchus ruficaudus*, ut Dominis A. d'Or-  
bigny et A. de Lafresnaye in Synops. Avium parte altera p. 22. Guér.  
Mag. Zool. 1838 scribere placuit.

<sup>2)</sup> *κύλλουρος* nom. prop.

versis ferugineis et nigris variis; rostro nigro; pedibus flavescens; iride fusca.

Long. tot. 5" 6'''.

landeskundlichen Oberösterreich; download [www.oegeschichte.at](http://www.oegeschichte.at)

114. 2. *Pt. acutirostris* Tsch.

Praecedenti similis sed minor, rostro tenui, acuto; tarsis longioribus.

Pt. supra ex cinereo-nigricans; uropygio subfusco; alis nigro-fuscis; subtus cinereus; rostro fusco; pedibus flavescens; iride fusca.

Long. tot. 4".

38. Gen. *Cyphorhinus* Cab.<sup>1)</sup>

Habitus et characteres fere ut in *Merulaxidibus*, rostrum vero multo magis compressum, mesorhinium culminatum, gibbosum; nares non fornicatae (ut in caeteris hujus familiae generibus) sed patulae, rotundae, membrana circumdatae; podotheca non squamata vel reticulata, sed caligata.

115. 1. *C. thoracicus* Tsch.

C. supra fuscus dilute ferrugineo-lavatus, fronte laetiore, facie nigricante; tectricibus alarum superioribus remigibusque nigris, ferrugineo-limbatis; subtus fuscus, gula, regione auriculari pectoreque intense ferrugineo-rufis; rostro nigricante; pedibus dilute fuscis, unguibus corneis; iride fusca.

Long. tot. 5" 9'''.

39. Gen. *Troglodytes* Vieill. Ois. Am. Sept. 1806.

116. 1. *Tr. tecellatus* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 25. 4.

id. Voy. Ois. p. 232.

117. 2. *Tr. audax* Tsch.

Cucarachero Indig.

Tr. supra ex cinereo-fuscus, tectricibus alarum superioribus, remigibus pogonio externo, rectricibusque ex rufo-fuscis nigro fasciatis; uropygio ferrugineo; subtus rufescens, facie gulaque griseis; rostro nigro, mandibula inferiori albicante; pedibus brunescens; iride fusca.

Long. tot. 4" 6'''.

118. 3. *Tr. leucophrys* Tsch.

Tr. supra cinnamomeus; capite nuchaque ex olivaceo ni-

<sup>1)</sup> *αῦρος* gibba, *ὄιν* nasus.

gricantibus; superciliis candidis; tectricibus alarum superioribus dorso dilutioribus; remigibus nigris pogonio externo rufo-marginatis; rectricibus brevibus, fuscis; gula ex albo et nigra varia; pectore cinereo; camptorio griseo; abdomine crissoque dorso lactioribus; rostro nigro; pedibus bruneis; iride rufa.

Long. tot. 4" 8".

Fam. 10. Sylviadae d'Orb. de Lafres. Guér.

Mag. Zool. 1837.

40. Gen. *Synalaxis* Vieill. Nouv. Dict. Sc. Nat. 1819.

*Sphaenura* Lichtenst. part. *Parulus* Spix 1824.

119. 1. *S. ruficapilla* Vieill. Nouv. Dict. Scienc. Nat. XXXII. p. 210.

*Sphaenura ruficeps* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 42.

*Parulus ruficeps* Spix Av. Bras. II. tab. 86.

41. Gen. *Anthus* Bechst. Gemeinnütz. Naturg. d. Vög. Deutschl. 1802.

*Alda* Lin. part.

120. 1. *A. Chii* Vieill. Nouv. Dict. Sc. Nat. XXVI. p. 490.

*Chii* Azar. Apunt. Nr. 146.

42. Gen. *Myiodiotes* Audub. Syn. of the Birds of North Am. 1839.

121. 1. *M. coronatus* Tsch.

M. supra olivaceo-virescens; pileo ex flavo rufescens, striis duabus nigris longitudinalibus a rhinariis ad occiput porrigentibus; superciliis, nucha facieque griseis; remigibus rectricibusque fuscis, pogonio-externo viridi-limbatis; subtus citrinus, gula albicante; tectricibus alarum inferioribus virescentibus; rostro nigricante; pedibus bruneis; iride fusca.

Long. tot. 5" 6".

122. 2. *M. tristriatus* Tsch.

M. supra virescens; pileo nigro; fronte, superciliis fasciaeque longitudinali in capitis medio albicantibus, hac initio flavescens; remigibus rectricibusque ut in specie praecedente; subtus stramineus, regione auriculari et anteorbitali nigris, facie alba; rostro bruneo, mandibula inferiori albicante; pedibus roseis; iride brunea.

Long. tot. 5" 4".

43. Gen. *Sylvia* (Lath.) d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. 1837.

123. 1. *S. concolor* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 20 5.  
id. Voy. Ois. p. 216. tab. 18. fig. 1. fide d'Orbign.

44. Gen. *Hylophitus* Temm. Planch. color. 1838?

124. 1. *H. frontalis* Tsch.

H. supra virescens, fronte helvola; tectricibus alarum superioribus dorso concoloribus, inferioribus olivaceis; remigibus nigro-fuscis pogonio externo olivaceo-, interno albicante-marginatis; rectricibus bruneis; subtus ex viridi flavescens, gula laetiore; pectore crissoque subrufis; rostro fusco; pedibus coeruleis; iride brunea.

Long. tot. 6" 3".

125. 2. *H. olivaceus* Tsch.

H. affinis H. thoracico. Temm. pl. col. 173. fig. 1.

Supra olivaceus cinereo lavatus, superciliis flavis; remigibus ardesiacis pogonio externo olivaceo-limbatis; campterio stramineo; subtus flavus, crisso albicante; rostro roseo; pedibus carneis, unguibus flavicantibus; iride fusca.

Long. tot. 4" 6".

Fam. 11. Tanagridae C. Bonap. Syn. Vert.  
Syst. 1837.

45. Gen. *Euphonia* Desm. Hist. Nat. Tangr. 1805.

126. 1. *E. chlorotica*. Licht. Doubl. Verz. p. 29. 315.  
*Tanagra chlorotica* Lin. Gmel. XIII. 1. p. 890. 5. β.  
*Lindo azul y oro* <sup>1)</sup> Azar. Apunt. Nr. 393.

127. 2. *E. viridis* Cab.

*Tanagra viridis* Vieill. Temm. pl. col. 36. fig. 3.

46. Gen. *Procnopis* Cab. <sup>2)</sup>

Genus Callospizae simile, sed habitu graciliore, rostro brevior, magis depresso, basi latiore, alis longioribus, cauda aequali vel subaequali, pedibus parvis; ptilosi molliore.

Typus: *P. atrocoerulea* Tsch. *T. vittata* Temm. pl. col. 48.

<sup>1)</sup> *Lindo azul y oro* ad hanc speciem neque ad *Emphoniam* violaceam spectat.

<sup>2)</sup> *πρόκνη* hirundo, ὤψ facies.

128. 1. *P. atrocoerulea* Tsch.

P. supra atra, capite colloque viridi-coeruleis, sincipite macula dilute straminea, nitente; tectricibus alarum superioribus, tergo uropygioque coeruleis; remigibus rectricibusque nigris ex violaceo coeruleo-marginatis; subtus coerulea; gutture cinereo lavato; rostro pedibusque atro-coeruleis; iride fusca.

Long. tot. 6".

129. 2. *P. argentea* Tsch.

P. supra e coeruleo-cinerea, splendore argenteo; pileo nigerrimo; remigibus rectricibusque pogonio externo coeruleo-limbatis; subtus niger, gutture stramineo-fusco; hypochondriis dorso concoloribus; rostro pedibusque nigro fuscis; iride flava.

Long. tot. 5" 6".

47. Gen. *Callospiza* G. R. Gray List of Gen. of Birds 1840.

*Tanagra* Lin. part. *Calliste* Boje 1826. *Aglaia* Swains. 1827.

130. 1. *C. pulchra* Tsch.

C. fronte aurantio, pileo, collo abdomineque luteis, plumis rostri basi et regione parotica nigerrimis; dorsi plumis nigris, citreo-marginatis; remigibus atris; pogonio interno albo-marginatis; tectricibus alarum superioribus minoribus aureis, mediis et majoribus nigris, viridi-cinctis; camptorio nigerrimo; tectricibus alarum inferioribus niveis; gutture ex aurantio-fusco; tergo uropygioque auratilibus; rectricibus nigerrimis; rostro atro, mandibula inferiore fusca; pedibus coeruleo-plumbeis; iride fusca.

Long. tot. 6" 3".

131. 2. *C. xanthocephala* Tsch.

C. pileo aurantio, regione parotica citrea; fronte, facie gulaque nigris; auchenio nigro, dorsi plumis, tectricibus alarum superioribus, remigibus rectricibusque atris ex coeruleo viridi-cinctis; tergo, uropygio, thorace hypochondriisque viridi-glaucis, resplendentibus; abdomine tectricibusque alarum inferioribus ex albido silaceis; rostro nigerrimo; pedibus atro-coeruleis; iride subflava.

Long. tot. 5" 3".

132. 3. *C. yeni* Cab.

*Aglaiia chilensis* Vig. Proceed. Z. S. 1832 p. 3.

*Aglaiia yeni* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 31. 1.

*Tanagra yeni* d'Orb. Voy. Ois. p. 270. tab. 24. fig. 2.

Siete color incol.

133. 4. *C. Schrankii* Cab.

*Tanagra Schrankii* Spix Av. Bras. II. p. 38. tab. 51. fig. 1. 2. mas et foem.

*Aglaiia Schrankii* d'Orb. de Lafres. Syn l. c. p. 31. 3.

134. 5. *C. calliparaea* Lichtenst. Mus. Berol.

*C. viridis*, fascia, tergo tectricibusque caudae inferioribus smaragdineis, vertice, regione auriculari, tectricibusque caudae superioribus ex aurantio fuscis; remigibus rectricibusque nigris, viridi-marginatis; gutture atra, thorace hypochondriisque viridibus; abdomine coeruleo; rostro nigro; pedibus corneis.

Long. tot. 5".

135. 6. *C. gyrola* Cab.

*Tanagra peruviana viridis* Briss. Av. III. p. 23. 13. tab. 4. fig. 1.

*Tanagra gyrola* Lin. Gmel. XIII. I. p. 891. 7.

*Aglaiia gyrola* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 32. 10.

136. 7. *C. cyanicollis* Cab.

*Aglaiia cyanicollis* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 33. 11.

*Tanagra cyanicollis* d'Orb. Voy. Ois. p. 271. tab. 25. f. 1.

137. 8. *C. punctata* Cab.

*Tanagra punctata* Lin. Gmel. XIII. I. p. 897. 21.

48. Gen. *Tanagra* Lin. Syst. Nat. XII. 1766.

*Thraupis* Boje 1826.

138. 1. *T. Sayaca* Lin. Gmel. XIII. I. p. 897. 20.

*T. episcopus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 896. 19.

139. 2. *T. olivascens* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 32. 351.

*T. palmarum* Prinz Max. Beitr. III. p. 489. 11.

140. 3. *T. frugilegus* Tsch.

Frutero incol.

*T.* supra olivacea, capite, collo, gutture et tectricibus alarum superioribus coeruleis; plumis basi rostri et regione ophthalmica nigris; remigibus et rectricibus atris pogonio externo e cinereo-coeruleo marginatis; pectore, abdomine uropygioque aurantiis; crisso laetiore; tectricibus alarum inferioribus vi-

ridi-cinereis; tibiis albis; rostro nigro, mandibula inferiore albicante; pedibus fuscis; iride brunea.

Long. tot. 7" 7'''

Landeskulturdirektion Oberösterreich; download [www.oegeschichte.at](http://www.oegeschichte.at)

141. 4. *T. analis* Tsch.

T. supra viridi-cinerea, auchenio coeruleo-lavato; pileo ardesiaco; fronte, facie et regione parotica nigerrimis; tectricibus alarum superioribus remigibusque nigris viridi-coeruleo-marginatis; rectricibus atro-fuscis pogonio externo cinereo limbatis; subtus ex albido helvola, gutture aurantio; hypochondriis olivaceis; tectricibus alarum inferioribus abdomini concoloribus; crisso ferrugineo; rostro albicante, culmine atro; pedibus coeruleo-fuscis; iride subflava.

Long. tot. 6" 9'''.

142. 5. *T. igniventris* d'Orb. Voy. Ois. p. 275. pl. 25. fig. 2.

*Aglaia igniventris* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 32. 5.

49. Gen. ***Ramphocelus*** Desm. Monog. Tangr. 1805.

*Ramphopsis* Vieill. 1816.

143. 1. *R. atrosericeus* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 34. 1. id. Voy. Ois. p. 280. tab. 25. fig. 1.

50. Gen. ***Phoenisoma*** Swains. Nat. hist. of Birds 1837.

*Tanagra* Lin. part. *Pyranga* Vieill. 1807. *Saltator* Vieill. part.

144. 1. *Ph. Azarae* Cab.

Mas *Saltator ruber* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 792.

*Tanagra missisipensis* Lichtenst. (nec Gmel.) Doubl. Verz. Nr. 333.

*Pyranga missisipensis* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 33. 1.

*Pyranga Azarae* d'Orb. Voy. Ois. p. 264.

*Habia punzo* Azar. Nr. 88.

Foem. *Saltator flavus* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 791.

*Tanagra Saira* Spix Av. Bras. I. p. 35. tab. 48.

*Habia amarilla* Azar. Apunt. Nr. 87.

145. 2. *Ph. ardens* Tsch.

Ph. coccineum, fronte scapulisque nigerrimis; remigibus atris pogonio interno albo-limbatis; tectricibus alarum superioribus minoribus albis, mediis pogonio externo apice albo-

maculatis; cauda nigra; rostro atro-coeruleo; pedibus coeruleo-plumbeis; iride fusca.

Long. tot. 6".

Mas juv. Supra viridi-flavus; subtus citreus.

51. Gen. **Tachyphonus** Vieill. Anal. nouv. Orn. elem. 1816.

146. 1. *T. flavinucha* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 26. 2.  
id. Voy. Ois. p. 279. tab. 21. fig. 1.

52. Gen. **Saltator** Vieill. Anal. nouv. Ornith. elem. 1816.

*Tanagra* Lin. part. *Spermagra* Swains. 1837.

147. 1. *S. coerulescens* Vieill. Nouv. Dict. XIV. p. 105.  
id. Tabl. encycl. et meth. II. p. 791.

*Tanagra superciliaris* Spix Av. Bras. II. p. 44. tab. 57.  
fig. 2.

*Habia de la ceja blanca* Azar. Apunt. Nr. 81.

148. 2. *S. olivaceus* Vieill. Gal. Ois. tab. 77.

*Tanagra magna* Lin. Gmel. XIII. I. p. 890. 26.

149. 3. *S. similis* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 36. 5.  
id. Voy. Ois. p. 290. tab. 18. fig. 2.

150. 4. *S. elegans* Tsch.

S. ex prasino smaragdineus, tectricibus alarum superioribus laetioribus, nitidis; remigibus primariis nigris pogonio externo viridi-marginatis, secundariis pogonio externo viridibus, interno nigro-fumosis; fronte, facie, gula crissoque ex ferrugineo fuscis, hoc dilutius; rectricibus intermediis dorso, reliquis remigibus concoloribus; rostro pedibusque ex auran-  
tio rubris, unguibus flavicantibus; iride coccinea.

Long. tot. 9".

151. 5. *S. melanopis* Vieill. Nouv. Dict. XX. p. 194.

*Tanagra melanopis* Lath. Syn. II. I. p. 222. 10.

*Tanagra atra* Lin. Gmel. XIII. I. p. 898. 39.

*Saltator atra* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 36. 7.

53. Gen. **Bethylus** Cuv. Mus. Par. Regn. Anim. I. 1817.

*Cissopis* Vieill. 1816.

152. 1. *B. picatus* Cuv.

*Lanius picatus* Lath. Syn. I. p. 192. 49.

*Lanius leverianus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 302. 31.

*Cissopis bicolor* Vieill. Nouv. Dict. XXVI. p. 417.

Pallar Indig.

54. Gen. **Arremon** Vieill. Nouv. Anal. Ornith. 1816.

153. 1. *A. rufinucha* d'Orb. Voy. Ois. p. 283. tab. 27. fig. 2.  
*Embernagra* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 34. 4.

Differunt hujus speciei aves, quas in republica peruana reperimus, ab iis a Dom. d'Orbigny in Bolivia collectis, colore notaei olivaceo, pileo silaceo, et facie collique lateribus nigris, concoloribus.

154. 2. *A. frontalis* Tsch.

A. supra olivaceus, pileo ferrugineo-rufus, fronte nigerima striis tribus albis; superciliis, facie et regione parotica atris, remigibus rectricibusque nigro-fuscis pogonio externo olivaceo-marginatis, campterio flavo; subtus albus, gutture candido, semitorque nigerrimo, pectoris lateribus hypochondriisque cinereis; tectricibus caudae inferioribus olivaceis; rostro nigerimo, pedibus fortibus, atris, unguibus fuscis; iride brunca.

Long. tot. 8".

Fam. 12. Fringillidae C. Bonap. Sag. 1834.

55. Gen. **Emberiza** (Lin.) d'Orb. de Lafres. 1837.

155. 1. *E. fulviceps* d'Orb. de Lafres. Syn. p. 77. 9.  
 id. Voy. Ois. tab. 46. fig. 2.

Fide d'Orbigny.

56. Gen. **Phytotoma** Molina Sag. Ist. Nat. Chile 1782.

156. 1. *Ph. rara* Molina Hist. nat. du Chile p. 235.  
*Ph. silens* Kittl. Vögel von Chile p. 3. tab. 1. fig. 1. 2.  
*Ph. Bloxhami* Jard. et Selby Illust. of Ornith. I. tab. 4.  
*Ph. Molina* Less. Instit. 1834. Nr. 72. p. 316. 2.

57. Gen. **Zonotrichia** Swains. Hist. nat. of Birds. 1837.

*Emberiza* Vieill. *Passerina* Vieill. part. *Cynchramis* Boje part. 1826.

157. 1. *Z. matutina* Cab.  
*Fringilla matutina* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 25. 246.  
*Fr. chilensis* Meyen Reise III. p. 212.  
*Pyrgita peruviansis* Less. Inst. 1834 Nr. 72. p. 316. 3  
 Gorrión incol.

58. Gen. **Phrygilus** <sup>1)</sup> Cab.

Genus inter Euspizas et Fringillas (Struthus Boje) locum

<sup>1)</sup> *φρυγίλος* Aristotel.

habens. Differt ab illis statura graciliore, rostro longiore, magis compresso, maxilla basi parum sinuata, ab his vero maxilla minus sinuata, tuberculo palati nullo; alis brevioribus; cauda brevior, minus emarginata, rectricibus emarginatis.

Typus: *Fr. Gayi* Eyd. Gerv. — *Emberiza guttata* Meyen.

158. 1. *Ph. Gayi* Cab.

*Fr. Gayi* Eyd. et Gerv. Guér. Mag. Zool. 1834.

*Emberiza Gayi* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 75. 7.

159. 2. *Ph. atriceps* Cab.

*Emberiza atriceps* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 79. 16.

id. Voy. Ois. tab. 47. fig. 2.

160. 3. *Ph. unicolor* Cab.

*Emberiza unicolor* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 79. 16.

161. 4. *Ph. plebejus* Tsch.

Ph. supra ex cinereo brunescens striis longitudinalibus fuscis; remigibus rectricibusque nigricantibus, albo-marginatis; tectricibus caudae superioribus coerulescentibus; subtus dilute griseus, gutture crissoque albis; rostro fusco, mandibula inferiore albicante; pedibus bruneis; iride fusca.

Long. tot. 5" 9".

162. 5. *Ph. rusticus* Cab.

*Fringilla rustica* Lichtenst. Mus. Berol.

Ph. coeruleo-cinereus, uropygio dilutior; remigibus rectricibusque ardesiacis pogonio externo margine ex olivaceo-cinereis; subtus griseus; abdomine albicante.

Foem. et juv. Ph. supra olivaceus; subtus ex olivaceo-griseus; rostro fusco; pedibus plumbeis; unguibus fuscis.

Long. tot. 4" 9".

59. Gen. *Chrysomitris* Boje Isis 1828.

*Fringilla* Lin. part. *Spinus* (Moehr.) Brehm. part.

163. 1. *Ch. magellanica* Bonap. List. of Birds p. 33. 227.

*Fringilla magellanica* Vieill. Nouv. Dict. XII. p. 168.

*Fr. icterica* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 26. 259.

*Fr. campestris* Spix Av. Bras. p. 48. tab. 61. fig. 3. mas.

*Carduelis magellanicus* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 83. 1.

*Gaffaron* Azar. Apunt. Nr. 134.

60. Gen. **Sycalis** Boje Isis p. 324. 1828.164. 1. *S. luteocephala* Cab.

*Emberiza luteocephala* d'Orbig. de Lafres. Syn. l. c.  
p. 74. 4. Id. Voy. Ois. tab. 44. fig. 2.

165. 2. *S. luteoventris* Cab.

*Fringilla luteoventris* Meyen Reise III. p. 211. tab. 22.  
fig. 3.

61. Gen. **Spiza** Bonap. An. Lyc. of New-York 1828.

*Emberiza* Lin. part. *Passerina* Vieill. part. *Loxigilla* Less. part.

166. 1. *Sp. jacarina* Cab.

*Tanagra jacarina* Lin. Gmel. XIII. I. p. 890. 4.  
*Passerina jacarini* Vieill. Nouv. Dict. XXV. p. 14.  
*Fringilla splendens* Vieill. Nouv. Dict. XII. p. 173.  
*Euphonia jacarina* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 30. 319.  
*Emberiza jacarini* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 81. 23.  
*Volatin* Azar. Apunt. Nr. 138.

62. Gen. **Sporophila**<sup>1)</sup> Cab.

*Pyrrhula* Tem. part. *Spermophila* Swains. 1827.

167. 1. *S. luctuosa* Cab.

*Pyrrhula luctuosa* Lichtenst. Mus. Berol.

S. supra atro-nitens; remigibus primariis et secundariis  
basi albis apice nigris; subtus candida, gutture dorso con-  
colore; rectricibus nigro-fumosis; rostro albido, basi mandi-  
bulae inferioris coeruleo; pedibus nigricantibus.

Long. tot. 4" 7½".

168. 2. *S. Telasco* Cab.

*Pyrrhula Telasco* Less. Zool. de la Coq. tab. 15.

169. 3. *S. alaudina* Cab.

*Pyrrhula alaudina* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 88. 9.

63. Gen. **Callyrhynchus** Less. Rev. Zool. 1842.170. 1. *C. peruvianus* Less. Rev. Zool. 1842 p. 209.

Fide Lesson.

64. Gen. **Pithylus** Cuv. Regn. Anim. I. 1817.

*Loxia* Lin. part.

171. 1. *P. olivaceus* Less. Instit. 1834 Nr. 72. p. 316. 4.

Fide Lesson.

<sup>1)</sup> σπορος sperma.

172. 2. *P. luteus* Less. Instit. 1834 Nr. 72. p. 316. 5.  
Fide Lesson.

65. Gen. **Coccyoborus** Swains. Hist. nat. of Orn. 1837.  
*Loxia* Lin. part. *Guiraca* Swains 1827. *Pithylus* Less.  
part.

173. 1. *C. chrysogaster* Cab.  
*Pithylus chrysogaster* Less. Cent. Zool. pl. 67.

Fam. 13. Sturnidae Vig. Zool. Journ. 1825.

66. Gen. **Icterus** Briss. Ornith. 1760.

*Psarocolii hymeniorhini* Wagl. Syst. Av. 1827. *Agelaius*  
Vieill. *Passerina* Vieill. part.

174. 1. *I. brevirostris* d'Orb. de Lafres. Syn. 1838 p. 7. 12.  
*Chopi jun. Nosedá* apud Azar. Apunt. Nr. 62. p. 282.

175. 2. *I. militaris* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 4. 3.  
*Icterus guayanensis* Briss. Orn. II. p. 107. tab. 11. fig. 2.  
*Oriolus guayanensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 388. 9.  
*Oriolus americanus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 386. 29.  
*Tanagra militaris* Lin. Gmel. XIII. I. p. 895. 17.  
*Agelaius militaris* Vieill. Nouv. Dict. XXXIV. p. 554.  
*Psarocolius militaris* Wagl. Syst. Av. 11.

176. 3. *I. persicus* Lichtenst. Doubl. Verz. Nr. 179.  
*Tanagra bonariensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 898. 38.  
*Passerina discolor* Vieill. Nouv. Dict. XXXIV. p. 552.  
*Icterus fringillarius* Spix Av. Bras. I. tab. 65. fig. 1. foem.,  
fig. 2. juv.  
*Icterus minor* Spix Av. Bras. II. tab. 63. fig. 2.  
*Psarocolius sericeus* Wagl. Syst. Av. 31.  
*Tordo comun* Azar. Apunt. Nr. 61.

177. 4. *I. jamacaii* Tsch.  
*Oriolus jamacaii* Lin. Gmel. XIII. I. p. 391. 39.  
*Xanthornos brasiliensis* Briss. Ornith. II. p. 120. 24.  
*Pendulinus jamacaii* Vieill. Nouv. Dict. V. p. 319.  
*Agelaius longirostris* Vieill. l. c. p. 319.  
*Icterus jamaicensi!!* d'Orb. de Lafres. Syn. l. c. p. 6. 9. <sup>1)</sup>  
*Jamacaii* Maregr. Bras. p. 190.

67. Gen. **Sturnella** Vieill. Anal. nouv. Ornith. elem.  
1816.

*Sturnus* Auctor part.

178. 1. *St. militaris* Vieill. Nouv. Dict. XXXII. p. 206.  
*Sturnus militaris* Lin. Gmel. XIII. I. p. 803. 6.

<sup>1)</sup> An *Icterus jamaicensis* aut forsan *I. jamacaii*?

*Tordo degollado primero* Azar. Apunt. Nr. 68.

*Tordo degollado segundo* Azar. Apunt. Nr. 69.

68. Gen. **Cassicus** Cuv. Regn. Anim. I. 1817.

*Cacicus* Briss. part. *Oriolus* Lin. part. *Psarocolii gymnorhini* Wagl. Syst. Av. 1827.

179. 1. *C. icteronotus* Vieill. Nouv. Dict. V. p. 365.

*Oriolus persicus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 388. 7.

*Psarocolius icteronotus* Wagl. Syst. Av. 5.

180. 2. *C. palliatus* Tsch.

*Oriolus oryzivorus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 386. 30.

*Cassicus ater* Vieill. Nouv. Dict. Z p. 363.

*Psarocolius palliatus* Wagl. Syst. Av. 7.

*Tordo grande* Azar. Apunt. Nr. 60.

Chivillo Indig.

181. 3. *C. yuracares* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 2. 3.

id. Voy. Ois. tab. 51. fig. 1.

182. 4. *C. atrovirens* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 2. 2.

id. Voy. Ois. tab. 51. fig. 2.

Hujus speciei aves quas in montibus peruanis reperimus, ab iis a Dom. d'Orbigni in provincia Yungasensi Republicae bolivianae collectis fronte luteo differunt.

183. 5. *C. cristatus* Vieill. Nouv. Dict. V. p. 357.

*Oriolus cristatus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 387. 33.

*Yapu* Azar. Apunt. Nr. 57.

Chihuaco grande Indig.

Fam. 14. Corvidae C. Bonap. Sagg. 1831.

69. Gen. **Garrulus** Briss. Ornith. 1760.

*Corvus* Lin. part. *Pica* Wagl. 1827. *Garrula* Temm. 1838.

184. 1. *G. peruvianus* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 9. 2.

*Corvus peruvianus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 373. 37.

*Pica chloronota* Wagl. Syst. av. 12.

Quienquien Indigen.

185. 2. *G. viridi-cyanus* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c.

p. 9. 4. id. Voy. Ois. tab. 33. fig. 1.

Fam. 15. Certhiadae Less. Trait. d'Ornith. 1831.

70. Gen. **Conirostrum** d'Orb. de Lafr. Syn. I. c. p. 25.

186. 1. *C. cinereum* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 25. 1.

id. Voy. Ois. tab. 59. fig. 1.

Fide d'Orbigny.

71. Gen. **Dacnis** Cuv. Regn. anim. I. 1817.*Certhia* Lin. part. *Coereba* Vieill. part. 1817.187. 1. *D. cyunater* Less. Trait. d'Ornith. p. 458.*Motacilla cyanocephala* Lin. Gmel. XIII. I. p. 990. 163.*Sylvia cyanocephala* Lath.*Coereba coerulea* Vieill. Nouv. Dict. XIV. p. 46. Prinz

Max. Beitr. III. p. 766.

*Nectarinia cyanocephala* Swains. Zool. Jllust. II. tab. 117.*Dacnis cyunater* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 21. 2.*Dacnis cyanocephalus* d'Orb. Voy. Ois. p. 221.188. 2. *D. plumbeus* Cab.*Sylvia plumbea* Lath.72. Gen. **Certhiola** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1835.*Certhia* Lin. part. *Coereba* Vieill. part.189. 1. *C. flaveola* Vet. Acad. Handl. 1836 p. 99.*Certhia flaveola* Lin. Gmel. XIII. I. p. 479. 18.*Coereba flaveola* Vieill. Gal. p. 288.*Nectarinia flaveola* Swains. Zool. Jllust. III. pl. 142.73. Gen. **Diglossa** Wagl. Isis 1832.*Campylops* Lichtenst. 1837. *Serrirostrum* d'Orb. de Lafres. 1837. *Dendroma* Swains. 1837. *Agrilorhinus* Bonap. 1838. *Uncirostrum* de Lafres. 1839.190. 1. *D. melanopis* Tsch.

*D. coerulescens* fronte facieque nigerrimis; remigibus rectricibusque atris pogonio externo coeruleo-marginatis; hypochondriis crissoque dilutioribus; rostro nigro, pedibus fuscis; iride rubra.

Long. tot. 6" 3".

74. Gen. **Xenops** Jllig. Prodr. 1811.*Certhia* Lin. part.191. 1. *X. rutilus* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 17. 158. |

Temm. pl. col. 72. fig. 2.

75. Gen. **Anabates** Temm Man. d'Ornith. 1820.*Philydor* Spix 1821192. 1. *A. auritus* Lichtenst. Mus. Berol.

*A. supra* olivaceo-fuscus, striis longitudinalibus flavican-  
tibus; pileo nigro; tectricibus alarum superioribus atris apice  
fulvo-marginatis; remigibus pogonio externo rufo-fuscis, in-

terno nigricantibus; regione parotica nivea plumis elongatis; subtus albescens plumis nigro-limbatis, hypochondriis, tibiis crissoque helvolis; tectricibus ferrugineis; rostro nigro, mandibula inferiore albicante; pedibus plumbeis.

Long. tot. 9".

193. 2. *A. montanus* Tsch.

A. supra olivaceus, pileo obscuriore, uropygio dilutior; superciliis albescentibus, regione parotica nigricante; remigibus pogonio externo dorso concoloribus; interno nigro-fuscis, basi helvolo-marginatis; rectricibus dilute ferrugineis; subtus ex viridi albicans, gula albida; facie juguloque aliquantulum testaceis; rostro bruneo, mandibula inferiore flava; pedibus coerulescentibus; unguibus flavis; iride rufa.

Long. tot. 7" 2".

194. 3. *A. ochrolaemus* Tsch.

A. supra ex olivaceo fuscus, pileo nigro-fusco; crisso rufo; remigibus ex ferrugineo fuscis pogonio externo nigricantibus et basi interni helvolo-marginatis; rectricibus ferrugineis; subtus dorso laetior, gutture ochroleuco, facie fulva; tectricibus caudae inferioribus rufescentibus; rostro bruneo; mandibula inferiore albicante; pedibus nigro-fuscis; iride brunea.

Long. tot. 7" 10".

195. 4. *A. melanorhynchus* Tsch.

A. supra fuscus, pileo nigricante, striis longitudinalibus ochroleucis, uropygio rufo, rectricibus ferrugineis; remigibus nigro-fuscis pogonio externo dilutioribus et basi interni helvolis; subtus ochraceus, gutturis plumis dilute nigro-marginatis; tectricibus alarum inferioribus fulvis; rostro nigerrimo; pedibus fuscis; iride fusca.

Long. tot. 9" 6".

76. Gen. *Dendrocolaptes* Jllig. Prodr. 1811.

196. 1. *D. Chunchotambo* Tsch.

D. supra olivaceo-fuscus, pileo nuchaeque nigris, hac albicante-striato, illo guttato; remigibus primariis fuscis pogonii interni apice nigricantibus, basi et secundariis ferrugineis; crisso rufo; rectricibus intense ferrugineo-fuscis; subtus olivaceus, gula albicante, jugulo testaceo, pectore striolato,

tectricibus alarum inferioribus ochroleucis; rostro corneo, mandibula inferiore albicante; pedibus nigro-fuscis; iride brunea.

Long. tot. 9".

Landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.oegeschichte.at

197. 2. *D. validus* Tsch.

D. supra ex olivaceo fuscus, striis albicantibus longitudinalibus et maculis nigris ornatus, superciliis testaceis; tectricibus alarum superioribus scapis rufis et macula parva rotunda nigra; remigibus ferrugineis, primariis apice nigro-fuscis; crisso intense rufo; rectricibus ferrugineo-fuscis; subtus ochraceus, striis transversalibus nigris notatus, gula testacea, pectore olivaceo plumis in medio stria longitudinali albicante lata, utrinque angusta nigra notatis; tectricibus inferioribus abdomini concoloribus; rostro valido, fusco, apice et mandibula inferiore albicante; pedibus ex fusco-plumbeis; iride brunea.

Long. tot. 11" 6".

Fam. 16. Trochilidae C. Bonap. Sagg. 1831.

77. Gen. *Trochilus* Lin. Syst. Nat. 1748.

1. Subgen. *Polytmus* Briss.

198. 1. *Tr. pygmaeus* Spix Av. Bras. I. p. 78. tab. 80. fig. 1.

199. 2. *Tr. apicalis* Lichtenst. Mus. Berol.

Tr. supra viridis nitens; remigibus chalybeo-nitidis; tectricibus caudae superioribus albo-marginatis; rectricibus duabus intermediis acuminatis, elongatis, apice niveis; subtus cinereo-lavatus, gula rufescente, crisso dilutiore; rostro angulato, nigro; mandibula inferiori aurantiaca; pedibus fuscis.

Long. tot. 6" 6".

2. Subgen. *Cynanthus* Swains.

200. 3. *Tr. chrysurus* Cuv. Gal. Mus. Par. et Regn. Anim. I. p. 436.

*Tr. spargurus* Shaw Gen. Zool. of Birds p. 291. 11.

*Ornismya Sapho* Less. Man. Ornith. II. p. 83.

*Orthorhynchus chrysurus* d'Orb. de Lafres. Syn. I. c. p. 26. 3.

3. Subgen. *Coeligena* Less.

201. 4. *Tr. Anaïs* Less. Rev. Zool. 1838 p. 315.

202. 5. *Tr. furcatus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 486. 26.  
*Ornismya furcata* Less. Ois. mouch. tab. 18.
4. Subgen. *Platurus* Less. *Heliothrix* Boje part.
203. 6. *Tr. platurus* Vieill. Tabl. encycl. et meth. II. p. 569.  
*Ornismya platura* Less. Ois. mouch. tab. 40.  
*Cynanthus platurus* Swains. Zool. Journ. III. p. 357.
5. Subgen. *Phaetornis* Swains.
204. 7. *Tr. Cora*.  
*Orthorhynchus Cora* Less. Garn. Zool. Coq. pl. 31. 4.  
*Ornismya Cora* Man. Ornith. II. p. 82.
6. Subgen. *Lophornis* Less. *Petasophora* G.R. Gray.
205. 8. *Tr. petasophorus* Prinz Max. Reise nach Bras. II. p. 191. id. Beitr. IV. p. 76. Temm. pl. col. 203. fig. 3.  
*Ornismya petasophora* Less. Man. Ornith. II. p. 78.  
*Trochilus janthinotus* Natt. in nonnullis Museis.  
*Colibri coipus* Spix Av. Bras. p. 81. tab. 1.
7. Subgen. *Lampornis* Swains.
206. 9. *Tr. Amazilia*.  
*Orthorhynchus amazilia* Less. Garn. Zool. Coq. pl. 31. fig. 3.
207. 10. *Tr. amethysticollis* Tsch.  
*Orthorhynchus amethysticollis* d'Orbig. de Lafresn. Syn. I. c. p. 31. id. Voy. Ois. tab. 60. fig. 2.
- Specimina, in Republica Peruana a nobis reperta, magnitudine et torque albo a Boliviansibus, quae a Dom. d'Orbigny I. c. descripta et depicta sunt, differunt.
208. 11. *Tr. phaeopygus* Lichtenst. Mus. Berol.  
*Tr.* supra viridi-aureus, resplendens; remigibus violaceo-micantibus; rectricibus chalybeis; subtus cinereus; gula smaragdinea nitida; hypochondriis splendore aureo; rostro pedibusque nigris.  
Long. tot. 3"  $1\frac{1}{2}$ ".
209. 12. *Tr. leucogaster* Tsch.  
*Tr.* supra viridis, nitens, fronte splendore aureo; remigibus subfuscis violaceo-nitidis, rectricibus aequalibus, suba-cutis, aeneis, pogonio interno, duabus intermediis exceptis, albis; subtus albus, hypochondriis viridi-micantibus; rostro

subarcuato, nigro; mandibula inferiori straminea, apice nigra; pedibus fuscis; iride brunea.

Long. tot. 4" 4'''

210. 13. *Tr. opacus* Lichtenst. Mus. Berol.

Tr. nigro-fuscus, splendore cupreo; remigibus aeneis, camptorio rufo; rectricibus magnifice aureo-purpurino resplendentibus, aequalibus, rotundis; abdomine crissoque plumulis cinereo-marginatis; rostro recto pedibusque nigerrimis.

Long. tot. 5".

211. 14. *Tr. insectivorus* Tsch.

Tr. viridis, resplendens; remigibus violaceo-nitidis, rectricibus intermediis dorso concoloribus, caeteris albis, apice viridibus; gula abdomineque smaragdineo-nitidis, pectore candido; rostro recto, longissimo, nigro; pedibus stramineis, unguibus fuscis; iride subflava.

Long. tot. 6".

212. 15. *Tr. Otero* Tsch.

Tr. supra viridis, resplendens, fronte coeruleo-nitido; remigibus ex violaceo-nigricantibus; rectricibus intermediis brevioribus aeneo-micantibus, caeteris e nigro coeruleis; subtus dorso aliquantulum dilutiore, pectore smaragdineo-nitente; rostro recto, latiusculo, nigro; pedibus nigris, unguibus fuscis; iride rufescente.

Long. tot. 5" 6'''.

Fam. 17. Momotidae Prinz Max. Beitr. 1831.

78. Gen. **Prionites** Jllig. Prodr. 1811

*Momotus* Briss. 1760. *Baryphonus* Vieill. 1816. *Crypticus* Swains. 1837.

213. 1. *P. brasiliensis* Jllig. (Cuv. Regn. Anim. I. p. 443.)

*Momotus brasiliensis* Lath. Syn. I. 1. p. 338. 1. tab. 10.

*Ramphastos momota* Lin. Gmel. XIII. I. p. 357. 8.

*Baryphonus cyanocephalus* Vieill. Nouv. Dict. XXI. p. 215.

Frayle Incol.

214. 2. *P. ruficapillus* Jllig. Lichtenst. Doubl. Verz.

p. 21. 206.

*Tutu* Azar. Apunt. Nr. 52.

215. 3. *P. Martii* Spix Av. Bras. II. p. 64. tab. 60. (fig. non satis accurata).

*Crypticus platyrhynchus* Jard. et Selby Illust. Ornith. tab. 106.

*Crypticus Martii* C. Bonap. Proceed. Z S. 1837. p. 119. 1.

Fam. 18. Halcyonidae Vig. Zool. Journ. 1825.

79. Gen. *Alcedo* Lin. Syst. Nat. 1766.

216. 1. *A. americana* Lin. Gmel. XIII. I. p. 451. 23.

*Martin-pescador verde obscuro* Azar. Apunt. Nr. 421.

217. 2. *A. torquata* Lin. Gmel. XIII. I. p. 452. 8.

*Martin-pescador celeste obscuro* Azar. Apunt. Nr. 417.

218. 3. *A. amazona* Vieill. Nouv. Dict. XIX. p. 399. Tabl. encycl. et meth. I. p. 229. 25.

*Martin-pescador obscuro dorado* Azar. Apunt. Nr. 419.

*Martin-pescador de garganta roja* Azar. Apunt. Nr. 420.

### Ordo III. **Scansores** Jllig. Prodr. 1811.

Fam. 1. Galbulidae C. Bonap. Sagg. 1831.

*Galbulae* Less. 1831. *Jacamaciridae* Prinz Max. 1832.

1. Gen. *Galbula* Moehr. Gen. Av. 1752.

219. 1. *G. tombacea* Spix Av. Bras. I. p. 55. tab. 58. foem.

Fam. 2. Cuculidae C. Bonap. Sag. 1831.

2. Gen. *Coccyzus* Vieill. Anal. nouv. Orn. elem. 1816.

220. 1. *C. cayanus* Temm.

*Cuculus cayanus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 417. 14.

*Tingazú* Azar. Apunt. Nr. 353.

Huichrao Indig.

3. Gen. *Crotophaga* Lin. Syst. Nat. XII. 1766.

*Crotophaga* Briss. 1760.

221. 1. *C. major* Lin. Gmel. XIII. I. p. 363. 3.

*Annó-güazú* Azar. Apunt. Nr. 348.

222. 2. *C. Casasii* Less. Garn. Zool. de la Coq. 1re Part.

2. p. 19. Cent. Zool. tab. 11.

*C. sulcirostris* Swains.

Guarda Cavallos Incol.

4. Gen. **Trogon** Moehr. Gèn. Av. 1752.223. 1. *Tr. heliothrix* Tsch.

*Tr.* supra viridi-aureus, resplendens, pileo uropygioque coeruleo smaragdineo-nitidis; remigibus nigris, pogonio externo albo-marginatis; tectricibus alarum superioribus lineolis innumerabilibus albis et nigris variis; rectricibus duabus intermediis dorso aliquantulum obscurioribus, caeteris apice albis et fasciis transversis albis et nigris variis; subtus carmineus; fronte, facie guttureque nigris, semitorque albo; rostro vitellino; pedibus plumbeis; iride flava.

Long. tot. 11".

Fam. 3. **Buceonidae** Prinz Max. Beitr. 1832.5. Gen. **Lypornia** Wagl. Syst. Av. 1827.224. 1. *L. rufa* Wagl. Syst. Av. 5.

*Bucco rufus* Spix Av. Bras. I. p. 52. tab. 40. fig. 1 (fig. non satis accurata).

225. 2. *L. ruficapilla* Tsch.

*L.* supra ex olivaceo-cinerea; pileo rufo, nucha dilute cinerea, remigibus primariis nigro-fuscis, secundariis pogonio externo flavicante-marginatis, omnibus basi pogonii interni helvolis; rectricibus ex cinereo-fuscis; subtus ex flavicante rufa, crisso dilutiore; facie collique lateribus griseis, alarum tectricibus inferioribus helveolis; rostro nigro, basi mandibulae inferioris albicante; pedibus virescentibus; iride fusca.

Long. tot. 5" 9".

6. Gen. **Capito** Vieill. Anal. nouv. Ornith. elem. 1816.

*Bucco* Lin. part. *Micropogon* Temm.

226. 1. *C. macrorhynchus* Wagl. Syst. Av. 1.

*Bucco macrorhynchus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 406. 5.

Le Vaill. Ois. Parad. II. p. 92. tab. 93.

227. 2. *C. cyphos* Wagl. Syst. Av. 1.

*Cyphos macrodactylus* Spix Av. Bras. I. tab. 39. fig. 2.

228. 3. *C. collaris*.

*Bucco capensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 406. 1.

*Bucco collaris* Lath. Syn. I. 2. p. 497. 2.

229. 4. *C. elegans* Vieill. Tabl. encycl. et meth. III. p. 14. 24. 4.

*Bucco elegans* Lin. Gmel. XIII. I. p. 406. 4.

*Bucco maynanensis* Briss. Av. IV. p. 102. 5. tab. 7. fig. 3.  
Buff. Enlum. Nr. 330.

230. 5. *C. melanotis* Temm. pl. col. 94.

*Bucco chacuru* Vieill. Tabl. encycl. et meth. p. 1320.

*Bucco strigilatus* Lichtenst. Doubl. Verz.

*Chacuru* Azar. Apunt. Nr. 261.

231. 6. *C. senilis*.<sup>1)</sup>

*Bucco senilis* Poeppig. Mus. Lips.

232. 7. *C. glaucogularis* Tsch.

C. supra prasinus, pileo nuchaque viridi-flavis; remigibus nigricantibus pogonio externo viridi-olivaceis, basi pogonii interni flavescentibus, rectricibus olivaceo-viridibus; subtus stramineus striis longitudinalibus viridibus, fronte, facie guttureque glauco-coeruleis, regione parotica nigra, semitorque intense vitellino, pectore coeruleo-viridi, campterio stramineo, tectricibus alarum inferioribus helveolis; rostro basi viridi, apice tomisque flavis; pedibus viridi-plumbeis; iride flava.

Long. tot. 6".

Fam. 2. Ramphastidae C. Bonap. Sag. 1831.

7. Gen. **Ramphastos** Lin. Syst. Nat. 1748.

233. 1. *R. vitellinus* Jllig. Mus. Berol.

Levaill. Ois. Parad. tab. 17. p. 19. Swains. Zool. Jllustr. Nr. 10. tab. 56.

234. 2. *R. carinatus* Swains. Zool. Jllust. I. tab. 45.

*R. piscivorus* Lin. Gmel. XIII. 1. p. 355. 4.

*R. tucanus* Shaw. Gen. Zool. p. 362.

*R. callorhynchus* Wagl. Syst. Av. 6.

*R. poecilorhynchus* Mus. Berol.

235. 3. *R. Cuvieri* Wagl. Syst. Av. 5.

236. 4. *R. ambiguus* Swains. Zool. Jllust. Nr. 34. tab. 108.

*R. tocard* Vieill. Nouv. Dict. XXXIV. p. 281.

*Tocard* Levaill. Ois. Par. tab. 9. p. 25.

*R. Swainsoni* Gould Monogr. of Ramph.

8. Gen. **Pteroglossus** Jllig. Prodr. 1811.

1. Subgen. Pteroglossus Jllig.

237. 1. *Pt. Azarae* Wagl. Syst. Av. 3.

*Ramphastos Azarae* Vieill. Nouv. Dict. XXXIV. p. 282.

<sup>1)</sup> An forsán Lypornix?

238. 2. *Pt. pluricinctus* Gould Proceed. Z. S. 1835 p. 157.

239. 3. *Pt. castanotis* Gould Proceed. Z. S. 1835 p. 159.  
landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.oogeschichte.at

2. Subgen. *Aulacoramphus* G. R. Gray. *Aulacorhynchus* Gould.

240. 4. *Pt. Derbianus* Gould Monogr. der tunkanartigen Vögel, deutsch übersetzt von Sturm.

*Aulacorhynchus Derbianus* Gould Proc. Z. S. 1835. p. 49.

241. 5. *Pt. atrogularis* Gould Monogr. der tunkanartigen Vögel, deutsch übersetzt von Sturm.

242. 6. *Pt. coeruleo-cinctus* Tsch.

*Aulacorhynchus coerulei-cinctus* d'Orb. Voy. Ois. tab. 66. fig. 2. sine descriptione.

*Pteroglossus Lichtensteini* Gould Monogr. der tunkanartigen Vögel, deutsch übersetzt von Sturm.

3. Subgen. *Selenidera* Gould.

243. 7. *Pt. Gouldii* Natt. Proceed. Z. S. 1837 p. 44.

*Selenidera Gouldii* Gray List of Birds p. 50.

244. 8. *Pt. Langsdorfii* Wagl. Syst. Av. 12.

Fam. 3. *Picidae* Vig. Zool. Journ. 1825.

9. Gen. *Picumnus* Tem. Man. d'Ornith. 1820.

245. 1. *P. albosquamatus* d'Orb. Voy. Ois. tab. 64. fig. 2. sine descr.

10. Gen. *Picus* Lin. Syst. Nat. 1748.

1. Subgen. *Dryocopus* Boje.

246. 1. *P. albirostris* Vieill. Nouv. Dict. XXVI. p. 69

*P. comatus* Jllig. Mus. Berol.

*Carpintero de lomo blanco* Azar. Apunt. Nr. 249.

247. 2. *P. lineatus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 425. 4.

*Ipecu* Marcgr. Bras. p. 207.

*Carpintero negro* Azar. Apunt. Nr. 248.

248. 3. *P. haematogaster* Tsch.

*P. pileo, nucha, colli lateribus et uropygio coccineis, notaco stramineo, tergo fasciis transversalibus nigris, fronte et regione parotica atris, fascia ab oculi angulo posteriore et altera a rostri basi ad aurículas porrigentibus, alis caudaque nigerrimis, remigibus pogonio interno albo-binotatis, pogonii externi apice albis; campterio tectricibusque alarum inferiori-*

bus flavescentibus; gastraeo coccineo; rostro nigricante apice tantummodo albicante; pedibus ardesiacis; iride coccinea.

Long. tot. 1' 2" 6"

andesskulturrektion Oberösterreich; download [www.oegeschichte.at](http://www.oegeschichte.at)

## 2. Subgen. *Picus* Lin.

249. 4. *P. passerinus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 427. 6.

*P. ruficeps* Spix Av. Bras. I. tab. 56. fig. 2.

*P. maculifrons* Spix Av. Bras. I. tab. 56. fig. 1. mas juv.

*P. haematostigma* Natt. in nonnullis Museis.

250. 5. *P. puncticeps* d'Orb. Voy. Ois. tab. 64. fig. 1. sine descr.

251. 6. *P. fumigatus* d'Orb. Voy. Ois. tab. 63. fig. 1. sine descr.

## 3. Subgen. *Gecinus* Boje Isis 1831.

252. 7. *P. cactorum* d'Orb. Voy. Ois. tab. 62. fig. 2. sine descr.

253. 8. *P. canipileus* d'Orb. Voy. Ois. tab. 63. fig. 2. sine descr.

## 11. Gen. *Colaptes* Swains. Nat. Hist. of Birds 1837.

254. 9. *C. rupicola* d'Orb. Voy. Ois. tab. 62. fig. 1. sine descr.

## Fam. 4. Psittacidae Vig. Zool. Journ. I. 1825.

## 12. Gen. *Psittacus* Lin. Syst. Nat. 1748.

*Amazona* Less.

255. 1. *P. mercenarius* Tsch.

A. supra sordide viridis plumis cinereo-cinctis, sincipite, facie guttureque prasinis; subtus ex flavo viridis, plumis obscure marginatis; crisso flavescente; remigibus nigerrimis pogonio externo basi viridi; remigibus secundariis pogonio externo viridibus basi ignea, apice cyaneo et nigro, pogonio interno nigris; tectricibus alarum superioribus et scapularum alis prasinis; campterio luteo; tectricibus inferioribus viridiflavis, rectricibus intermediis obscure viridibus, caeteris pogonio interno macula rotunda ornatis, externis pogonio externo cyaneis, omnibus apice flavescentibus; rostro corneo basi flavescente; pedibus coeruleo-cinereis; iride subflava.

Long. tot. 1' 6".

255. 2. *P. tumultuosus* Tsch.

A. supra prasinus, infra melino-viridis, sincipite gulaque rubris; remigibus viridibus prima et secunda fascia longitudinali nigra, omnibus apice albicante-marginatis; campterio luteo rectricibus intermediis dorso concoloribus, caeteris pogonio interno rubro-notatis; crisso aurantio-rubro; rostro flavo tomio mandibulae superioris angulo recto exciso; pedibus coeruleis; iride fusca.

Long. tot. 11".

13. Gen. *Conurus* Kuhl Monogr. Psitt. 1820.

*Psittacara* Vig. 1825.

257. 1. *C. Jlligeri* Tsch.

*Psittacus fuscatus* Jllig. Mus. Berol.

*Psittacus Jlligeri* Kuhl.

*Arara purpuro-dorsalis* Spix Av. Bras. I. tab. 24.

*Psittacara Jlligeri* Bourjot St. Hilaire et Werner  
Hist. nat. des Perroq. 1837. 38.

258. 2. *C. mitratus* Tsch.

C. supra viridis; subtus laetior, sincipite regionibus ophthalmicis et paroticis nonnullisque corporis maculis sanguineis; remigibus viridibus pogonio interno olivaceo-marginatis, rectricibus dorso concoloribus; rostro albedo; pedibus robustis flavescentibus; iride fusca.

Long. tot. 1' 1".

259. 3. *C. rupicola* Tsch.

C. supra prasinus, fronte fusco, pileo plumis spadiceis, apice albicante marginatis, ornato; nucha smaragdinea; remigibus atris pogonio externo viridi-cyaneis; campterio tectricibusque alarum superioribus primariis coccineis scapis albis, reliquis viridibus; rectricibus dorso obscurioribus; subtus melino-viridis, gutture helveolo, pectore fasciis transversalibus fuscis et flavicantibus vario; tectricibus caudae inferioribus viridi-cyaneis; rostro fusco, apice coerulescente; pedibus nigrinis; iride flava.

Long. tot. 10" 9".

260. 4. *C. sitophagus* Tsch.

C. supra viridis, remigibus pogonio externo cyaneis, in-

terno atris, tectricibus alarum inferioribus nigris; rectricibus dorso aliquantulum saturatoribus; fronte, gula, pectore abdomineque luteis, hypochondriis crissoque viridi-flavis; rostro albescente; pedibus flavescentibus; iride flava.

Long. tot. 7" 3''' (caudae 3" 6''').

Haec species valde affinis est Psittaco (Lathamo) auri-fronti, Novae Zeelandiae incolae, a Dom. Lesson in Cent. Zool. p. 63 descripto et tab. 18. depicto.

#### Ordo IV. **Columbae** Temm. Man. Ornith. 1815.

Fam. Columbidae C. Bonap. Sag. 1831.

*Gyrantes* Bonap.

##### 1. Gen. **Columba** Lin. Syst. Nat. 1748.

###### 1. Subgen. *Columba*.

261. 1. *C. fasciata* Say Long. Exposit. Vol. II. p. 10.

###### 2. Subgen. *Turtur* Ray.

262. 2. *C. meloda* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 385. 4.

###### 3. Subgen. *Peristera* Swains.

263. 3. *C. cinerea* Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. p. 126. tab. 28.

*Peristera cinerea* Swains. Zool. Journ. III. p. 360.

264. 4. *C. jamaicensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 782. 25.

*C. rufaxilla* Richard et Bernard Act. Soc. Hist. nat. Paris. I. P. 1. 1772 p. 118. tab. 74.

*C. frontalis* Temm. pl. col. tab. 10.

*Leptotila rufaxilla* Swains. Hist. nat. of Birds.

*Paloma parda tapadas rojas* Azar. Apunt. Nr. 320.

###### 4. Subgen. *Chaemepelia* Swains.

265. 5. *C. passerina* Lin. Gmel. XIII. I. p. 787. 34.

Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. p. 24. tab. 13 et 14.  
Fide Lesson.

266. 6. *C. talpacoti* Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. p. 22. tab. 12.

*Columbina Cobacolo* Spix Av. Bras. II. tab. 75. fig. 1.

*Paloma roxiza* Azar. Apunt. Nr. 323.

267. 7. *C. monticola* Tsch.

*C. erythrothorax* Meyen Reise III. p. 222. tab. XXVI.

268. 8. *C. gracilis* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 385. 3.

5. Subgen. *Zenaida* Bonap.269. 9. *C. aurita* Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. p. 60. tab. 25.*C. martinicana* et *C. leucoptera* Lath. Ind. Ornith. II. p. 599.*Zenaida amabilis* C. Bonap. Amer. Ornith. pl. 17. fig. 2.*Columba Zenaida* C. Bonap. List of Birds p. 41.*Paloma parda manchada* Azar. Apunt. Nr. 322.6. Subgen. *Starnoenas* Bonap.270. 10. *C. melancholica* Tsch.

*C. supra* rufo-fusca, pileo ex violaceo fusco; fronte facieque helvolis; remigibus ardesiacis pogonio externo et apice dilute ferrugineo marginatis; tectricibus alarum superioribus violaceo-ferrugineis, majoribus apice rufescente-notatis; re-  
ctricibus ferrugineo-fuscis; subtus rufescente-albida; gula albicante; pectore violaceo-lavato; tectricibus alarum inferioribus helveolis; rostro basi coeruleo, apice et mandibula inferiori flavis; pedibus flavescentibus; iride sulphurea.

Long. tot. 9" 6'''.

271. 11. *C. frenata* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 386. 5.Ordo V. **Rasores** Jllig. 1811.*Gallinae* Keys. et Blas.Fam. 1. *Chionidae* C. Bonap. Sag. 1831.1. Gen. ***Thinocorus*** Eschscholtz Zool. Atlas 1829.272. 1. *Th. Ingae* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 387. 8.Fam. 2. *Tetraonidae* C. Bonap. Syn. Vert.

Syst. 1837.

2. Gen. ***Odontophorus*** Vieill. Anal. nouv. Ornith. meth. 1816.273. 1. *O. speciosus* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 387. 10.274. 2. *O. pachyrhynchus* Tsch.

*Odonthophoro guayanensi* similis, sed differt coloribus, praecipue gastraei, saturatioribus, abdomine fasciis nigris et fuscis vario, pedibus validioribus, digitis longioribus et rostro multo altiore.

Long. tot. 11".

## Fam. 3. Crypturidae C. Bonap. Sag. 1831.

*Tinamidae* Gray 1840.3. Gen. *Ortygis* Jllig. Prodr. 1811.*Turnix* Bon. 1790 part.275. 1. *O. ocellata* Meyen Reise III. p. 225. tab. XXVII.4. Gen. *Crypturus* Jllig. Prodr. 1811.*Tinamus* Lath. 1790. *Cryptura* Vieill. 1816. *Pezus* Spix 1824.276. 1. *C. tataupa* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 68.*Tinamus tataupa* Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. III. p. 590. pl. col. 4.*Cryptura tataupa* Vieill.*Pezus Niambu* Spix Av. Bras. II. tab. 78 a.*Tataupa* Azar. Apunt. Nr. 329.277. 2. *C. noctivagus* Wagl. Syst. Av. 6.*Tinamus noctivagus* Prinz Max. Reise nach Bras. I. p. 160 id. Beitr. IV. p. 504. 2.*Pezus Zabale* Spix Av. Bras. II. tab. 77.278. 3. *C. adpersus* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 68.*Tinamus vermiculatus* Temm. pl. col. 369.*Crypturus vermiculatus* Wagl. Syst. Av. 4.279. 4. *C. cinereus* Wagl. Syst. Av. 6.*Tetrao cinerea* Lin. Gmel. XIII. I. p. 768. 64.*Tinamus cinereus* Lath. Syn. II. p. 726. 2. Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. III. p. 574.*Cryptura cinerea* Vieill.280. 5. *C. obsoletus* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 68.*Tinamus obsoletus* Temm. Hist. nat. Pig. et Gall. III. p. 588. pl. col. 106.*Cryptura coerulescens* Vieill.*Ynambú azulado* Azar. Apunt. Nr. 330.281. 6. *C. atro-capillus* Tsch.

*C.* supra ex violaceo fuscus, permultis fasciis nigris et rufofuscis in achenio obsoletis varius; pileo atro, fronte fusca, macula rufa postorbiculari ad auriculas porrigente, tetricibus alarum superioribus parapterisque dorso dilutioribus pogonio externo maculis subflavis signatis; remigibus ardesiacis pogonio externo fuscis; subtus ex rufo flavescens, gula fulva, gutture et epigastrio ferrugineo-rufis, crisso dilutiore,

pectore et hypochondriis ex fusco-plumbeis, innumerabilibus lineolis nigris vermiculatis; tibiis fasciis transversis nigris et flavidis variis; tectricibus alarum inferioribus albis; rostro nigro, mandibula inferiori flava; pedibus flavis; iride fusca.

Long. tot. 1' 1".

282. 7. *C. Kleei* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 387. 9.

5. Gen. ***Tinamotis*** Vig. Proceed. Zool. Soc. 1836.

*Eudromia* d'Orb. et Geoffr. 1832.

283. 1. *T. Pentlandii* Vig. Proceed. Z. S. IV. p. 79.

Fam. 4. Cracidae G. R. Gray Gen. of Birds 1840.

6. Gen. ***Crax*** Lin. Syst. Nat. 1748.

284. 1. *C. alector* Lin. Gmel. XIII. I. p. 735. 1.

*C. Guyanensis* Briss. Av. I. p. 298. 12. tab. 29.

*Mitu* Azar. Apunt. Nr. 338.

285. 2. *C. Temminckii* Tsch.

*Crax peruvianus* Briss. Av. I. p. 305. 16. Variété de la femelle du Hocco de la Guayane. Bonat. Tabl. encycl. et meth. Ornith. 174. var. c.

*Crax rubra* b) Lin. Gmel. XIII. I. p. 736.

*Crax spadicea*, collo annulis alternis nigris albisque vario. Lath. Syn. II. 2. tab. 63.

*Crax rubra* Temm. Hist. nat. Pig. et Gallin. III. p. 21. et p. 687. foem.

La para grande Incol.

7. Gen. ***Ourax*** Cuv. Regn. Anim. I. 1817.

*Pauxi* Temm. 1813.

286. 1. *O. galeata* Cuv. Regn. Anim.

*Crax galeata* Lath. Ind. Ornith. II. p. 614. 4.

*C. pauxi* Lath. Ind. Ornith. p. 624.

*Crax mexicanus* Briss. Av. I. p. 302. 14.

287. 2. *O. mitu* Temm. pl. col. 103.

*Crax mitu* Lin. Gmel. XIII. I. p. 736. β.

*Crax brasiliensis* Briss. Av. I. p. 276. 11.

Fam. 5. Penelopidae C. Bonap. Sag. 1831.

8. Gen. ***Penelope*** Lin. Syst. Nat. XIII. 1788.

1. Subgen. *Salpiza* Wagl.

288. 1. *P. cristata* Lin. Gmel. XII. I. p. 733. 2. Temm.

Hist. nat. Pig. et Gall. III. p. 46. Guan Edwards  
Glean. of Nat. Hist. tab. 13.

*Meleagris cristata* Lin. Syst. Nat. XII. I. p. 269. 2.

*Gallopavo brasiliensis* Briss. Ornith. I. p. 162.

*P. jacupemba* Merrem Beitr. 2. p. 42. tab. 11.

*P. jucuacu* Spix Av. Bras. II. tab. 68.

289. 2. *P. marail* Lin. Gmel. XIII. I. p. 734. 5.

*Marail* Bonat. Tabl. encycl. et meth. Ornith. p. 171.  
tab. 83. fig. 4.

*Maraye* Bajon Mem. sur Cayenne I. p. 383. tab. 3 et 4.

*Penelope jacucaca* Spix Av. Bras. II. tab. 69. var.

## 2. Subgen. Penelope.

290. 3. *P. aburri* Goud. Less. Man. Ornith. II. p. 215.  
*Pava aburrida* Incol.

291. 4. *P. pipile* Lin. Gmel. XIII. I. p. 734. 4. Lath. Ind.  
Ornith. II. p. 620. 2.

*Penelope cumanensis* Lath. Ind. Ornith. II. p. 620. 2.

*Crax cumanensis* Jacq. Beitr. Vög. p. 25. tab. 10.

*Yacou* Bajon Mem. Cay. I. p. 398. tab. 5.

*Penelope leucolophos* Merr. Icon. p. 45. tab. 12. fig. accur.

*P. jacutinga* Spix Av. Bras. II. tab. 70. fig. accur.

## 3. Subgen. Ortalida Merr.

292. 5. *P. adspersa* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 386. 7.

293. 6. *P. rufiventris* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 386. 6.

## Ordo VI. **Cursores** Jllig. Prodr. 1811.

Fam. Struthionidae Vig. Zool. Journ. 1835.

1. Gen. **Rhea** Moehr. Gen. Av. 1752.

294. 1. *Rh. americana* Lath. Vieill. Gal. pl. 224.

*Rhea* Briss. Ornith. V. p. 8. 1.

*Struthio rhea* Lin. Gmel. XIII. I. p. 727. 3.

## Ordo VII. **Grallatores** Jllig. Prodr. 1811.

Fam. 1. Charadriidae C. Bonap. Sag. 1831.

1. Gen. **Oedienemus** Temm. Man. Ornith. 1815.

295. 1. *Oc. superciliaris* Tsch. Wieg. Archiv 1843. I.  
p. 387. 11.

2. Gen. **Charadrius** Lin. Syst. Nat. 1748.

296. 1. *Ch. virginiacus* Borkh.

landeskulturdirektion, Oberösterreich, download www.oegeschichte.at

*Charadrius pluvialis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 688. 7. var.  $\gamma$   
Briss. Av. V. p. 48. 3. tab. 6. fig. 1.

*Charadrius pectoralis* Vieill. Nouv. Dict. XXVII. p. 145.

*Charadrius marmoratus* Wagl. Syst. Av. 42.

*Mbatitui del pecho listado* Azar. Apunt. Nr. 389. Av. jun.

*Mbatitui del pecho de marmol* Azar. Apunt. Nr. 390.  
Avis adult.

297. 2. *Ch. brevirostris* Prinz Max. Beitr. IV. p. 769.  
Chorlito Incol.

298. 3. *Ch. Winterfeldti* Tsch. Wieg. Archiv 1843. I.  
p. 388. 12.

299. 4. *Ch. resplendens* Tsch. Wieg. Archiv 1843. I.  
p. 388. 13.

Fraylesco Incol.

3. Gen. **Strepsilas** Jllig. Prodr. 1811.

300. 1. *St. collaris* Temm. Man. Ornith. II. p. 553.

*Tringa interpres* Wils. Am. Ornith. VII. p. 32. tab. 57.  
fig. 2.

*Arenaria interpres* Vieill. Gal. pl. 237.

*Strepsilas melanocephala* Vig. Zool. Journ. IV. 1829 p. 356.

Fam. 2. Ardeadae Swains. Hist. nat. of  
Birds 1837.

4. Gen. **Ardea** Lin. Syst. Nat. 1748.

*Egretta* C. Bonap. 1831.

301. 1. *A. egretta* Wils. Ornith. VII. p. 111. tab. 61. 4.

*A. leuce* Jllig. Mus. Berol.

*Egretta leuce* C. Bonap. List of Birds p. 47.

*Garza blanca mayor* Azar. Apunt. Nr. 350.

302. 2. *A. alba* Lin. Gmel. XIII. I. p. 639. 24.

*A. candida* Briss. Av. V. p. 428. 15.

*A. egrettoides* S. Gmel. Itin. II. p. 193. tab. 25.

*Garza blanca mediana* Azar. Apunt. Nr. 351.

303. 3. *A. candidissima* Jacq. Beitr. p. 18. 13.

*Egretta candidissima* C. Bonap. List of Birds p. 47.

*Garza blanca chica con capa* Azar. Apunt. Nr. 349.

304. 4. *A. cocoi* Lin. Gmel. XIII. I. p. 629. 14.

*Ardea palliata* Jllig. Mus. Berol.

*A. maguari* Spix Av. Bras. II. p. 171. tab. 90.  
*Garza aplomada* Azar. Apunt. Nr. 347.

305. 5. *A. agami* Lin. Gmel. XIII. I. p. 629. 35.

306. 6. *A. tigrina* Lin. Gmel. XIII. I. p. 638. 55.  
*Garza jaspeada* Azar. Apunt. Nr. 353.

5. Gen. ***Nycticorax*** Steph. Gen. Zool. 1819.

*Ardea* Auct. part.

307. 1. *N. americanus* C. Bonap. List of Birds. p. 48.

*Ardea nycticorax* Lin. Gmel. XIII. I. p. 624. 9.

*A. Hoactli* Lin. Gmel. XIII. I. p. 630. 37.

*A. mexicana cristata* Briss. V. p. 418. 11.

*Tayazu-Guirá* Azar. Apunt. Nr. 357.

Av. juven. *Ardea Gardeni* Lin. Gmel. XIII. I. p. 645. 87.

*Ardea maculata* Frisch Av. II. tab. 9. neque *Ardea maculata* Vieill.

Foem. adult. *Ardea jamaicensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 625. 29.

6. Gen. ***Mycteria*** Lin. Syst. Nat. XII. I. 1766.

308. 1. *M. americana* Lin. Gmel. XIII. I. p. 616. 1.

*Cigüeña del collar rojo* Azar. Apunt. Nr. 343.

7. Gen. ***Platalea*** Lin. Syst. Nat. XII. I. 1766.

309. 1. *Pl. Ajaja* Lin. Gmel. XIII. I. p. 614. 2.

*Platea rosea* Briss. Av. V. p. 356. 2. tab. 30.

*Espatula* Azar. Apunt. Nr. 345.

Fam. 3. Tantalidae C. Bonap. Sag. 1831.

8. Gen. ***Tantalus*** Lin. Syst. Nat. XII. I. 1766.

310. 1. *T. loculator* Lin. Gmel. XIII. I. p. 647. 1.

*Cangui* Azar. Apunt. Nr. 122.

9. Gen. ***Ibis*** Cuv. Regn. Anim. 1817.

1. Subgen. *Ibis*.

311. 1. *I. plumbea* Temm. pl. col. tab. 235.

*I. coerulescens* Vieill. Nouv. Dict. XVI. p. 18.

*Curucá aplomado* Azar. Apunt. Nr. 363.

12. 2. *I. Ordi* C. Bonap. List of Birds p. 49.

*Tantalus mexicanus* Ord. nec Lin. Gmel.

*Tantalus et Ibis falcinellus* Auctor. part.

2. Subgen. *Theristocus* Wagl.

313. 3. *I. melanopis* Forst. MS.

*Tantalus melanopis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 653. 19.

landeskulturstiftung Oberösterreich, download www.oegeschichte.at

*Mandurria o Curucau* Azar. Apunt. Nr. 362.

*Bandurria* Indig.

Fam. 4. *Scolopacidae* C. Bonap. Sag. 1831.

10. Gen. *Tringa* Lin. Syst. Nat. 1748.

314. 1. *Tr. fuscicollis* Vieill. Nouv. Dict. XXIV. p. 461.

*Tr. minutilla* Vieill. Nouv. Dict. XXXIV. p. 466.

*Tr. campestris* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 74. Nr. 764.

11. Gen. *Actitis* Boje (Jllig. 1811).

315. 1. *A. macularius* C. Bonap. List of Birds p. 51.

*Tringa macularia* Wils. nec Totanus macularius Prinz

Max. Beitr. IV. p. 727.

12. Gen. *Totanus* Bechst. Gemeinnütz. Naturg. d. Vög. Deutschl. 1802.

316. 1. *T. chloropygius* Vieill. Nouv. Dict. VI. p. 401.

Tabl. encycl. et meth. III. p. 1100. 20.

*Tringa solitaria* Wils. Am. Ornith. VII. p. 53.

317. 2. *T. flavipes* Vieill. Nouv. Dict. VI. p. 410. Tabl. encycl. et meth. III. p. 1106. 39.

*Scolopax flavipes* Lin. Gmel. XIII. I. p. 659. 31.

*Chorlito pardo picado de blanco* Azar. Apunt. Nr. 396.

13. Gen. *Scolopax* Lin. Syst. Nat. 1766.

*Gallinago* Steph. 1824.

318. 1. *Sc. frenata* Jllig. Mus. Berol. Lichtenst. Doubl. Verz. p. 75. 770.

*Scolopax Gallinago* Wils. Amer. Ornith. VI. p. 18.

*Gallinago Wilsoni* C. Bonap. Syn. p. 330.

*Becasina segunda* Azar. Apunt. Nr. 388.

14. Gen. *Rhynchoea* Cuv. Regn. Anim. I. 1817.

319. 1. *R. Hilaerea* Val. Gal. de Paris. Less. Trait. d'Ornith. p. 557.

Fam. 4. *Rallidae* C. Bonap. Sag. 1831.

15. Gen. *Rallus* Lin. Syst. Nat. 1766.

320. 1. *R. nigricans* Vieill. Nouv. Dict. XXVIII. p. 560.

321. 2. *R. caesius* Tsch.

*Gallinula caesia* Spix. Av. Bras. II. tab. 95.

*Rallus nigricans* Prinz Max. Beitr. IV. p. 782.

16. Gen. **Crex** Bechst. Gemeinnütz. Naturg. der Vögel  
Deutschl. 1802.

322. 1. *C. facialis* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 388. 14.

323. 2. *C. femoralis* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 388. 15.

17. Gen. **Gallinula** Briss. Ornith. 1760.

324. 1. *G. galeata* Prinz Max. Beitr. IV. p. 808.

*Crex galeata* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 80. Nr. 826.

*Yahana* Azar. Apunt. Nr. 379.

325. 2. *G. pileata* Prinz Max. Beitr. IV. p. 802.

326. 3. *G. plumbea* Vieill. Nouv. Dict. XII. p. 404. Tabl.  
encycl. et meth. I. p. 344. 12.

*Gallinula Sarracura* Spix Av. Bras. II. p. 75. tab. 98.

*Chiricote aplomado* Azar. Apunt. Nr. 369.

18. Gen. **Fulica** Lin. Syst. Nat. 1748.

327. 1. *F. gigantea* Souleyet. Voy. de la Bonite p. 102.  
tab. 8 (fig. medioc.).

Auash sinqui Indig.

328. 2. *F. ardesiaca* Tsch. Wieg. Arch. 1831. I. p. 389. 17.

Fam. 6. Recurvirostridae C. Bonap.

Sag. 1831.

19. Gen. **Himantopus** Briss. Ornith. 1760.

329. 1. *H. mexicanus* Wils. Am. Ornith. VII. p. 52. tab. 58.  
fig. 2.

Fam. 7. Phoenicopteridae C. Bonap.

Sag. 1831.

20. Gen. **Phoenicopterus** Lin. Syst. Nat. 1748.

330. 1. *Ph. ignipalliatu*s Is. Geoffr. St. Hil. An. Sc.  
Nat. XVII. p. 454.

*Ph. ruber* Wils. Amer. Ornith. VIII. p. 360. tab. 60.

*Ph. ruber* Lin. Gmel. XIII. I. p. 612. 1. part.

*Ph. chilensis* Molina Hist. nat. Chile p. 214.

*Flamenco* Azar. Apunt. Nr. 348.

Parreona Incol.

Ordo VIII. **Natatores** Jllig. Prodr. 1811.

*Anseres* Lin. 1735.

landeskulturdirektion Oberösterreich download www.oogeschichte.at

Fam. 1. **Laridae** C. Bonap. Sag. 1831.

1. Gen. **Sterna** Lin. Syst. Nat. 1748.

*Phaetusa* Wagl. 1831.

331. 1. *St. magnirostris* Lichtenst. Doubl. Verz. p. 81.

835. Spix Av. Bras. II. tab. 104.

*Phaetusa magnirostris* Wagl. Isis 1832 p. 1224.

*Hatis de la cabeza negra* Azar. Apunt. Nr. 413.

332. 2. *St. erythrorhynchos* Prinz Max. Beitr. IV. p. 857.

333. 3. *St. Inca* Less. Zool. de la Coq. tab. 47.

334. 4. *St. acutirostris* Tsch. Wieg. Archiv 1843. I. p. 389. 18.

335. 5. *St. exilis* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 389. 19.

2. Gen. **Rhynchops** Lin. Syst. Nat. XII. 1766.

336. 1. *R. nigra* Lin. Gmel. XIII. I. p. 611. 1.

*R. fulva* Lin. Gmel. XIII. I. p. 614. 2. Barr. Av. 20.  
Pescador Incol. et navigat.

3. Gen. **Larus** Lin. Syst. Nat. 1748.

337. 1. *L. modestus* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 389. 16.

338. 2. *L. serranus* Tsch.

Quiulla Indig.

*L. candidus* capite nigro; alis dilute cinereis; remigibus  
nigris ante apicem nigrum albo notatis; scapis albis; rectrici-  
bus niveis; rostro pedibusque purpureis; iride fusca.

Long. tot. 1' 2".

4. Gen. **Procellaria** Lin. Syst. Nat. 1748.

*Daption* Steph. General Zoology 1825.

339. 1. *P. capensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 565. 5.

Pintado Incol. littor. et navigat.

340. 2. *P. glacialisoides* Smith Jllustr. Zool. South Afric.  
Tab. 51. Mas.

---

<sup>1)</sup> Nequaquam ad hanc speciem *Hatis del pico corto* Azar. Apunt.  
Nr. 310, ut Dom. Lichtenstein Doubl. Verz. p. 81 putat, referenda.

5. Gen. ***Pelecanoides*** Lacep. Mem. Inst. 1800.

*Procellaria* Lin. part. *Haladroma* Jllig. 1811. *Puffinus* Less. 1828.

landeskulturdirektion Oberösterreich; download [www.oegeschichte.at](http://www.oegeschichte.at)

341. *P. Garnoti* Tsch.

*Puffinus* *Garnoti* Less. Man. Ornith. II. p. 394. id. Voy. de la Coquille tab. 46.

*Haladroma* *Berardi* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrol. autour du monde tab. 37. Temm. pl. col. 517.

## Fam. 2. Anatidae (Leach.) C. Bonap.

Sag. 1831.

6. Gen. ***Anser*** Briss. Ornith. 1760.

Subgen. *Chloephaga* Eyton.

342. 1. *A. anticola* Tsch.

*A. montana* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 390. 21.

7. Gen. ***Anas*** Lin. Syst. Nat. 1748.

1. Subgen. *Cairina* Flemm. *Carina* Eyton.

343. 1. *A. moschata* Lin. Gmel. XIII. I. p. 515. 16.

*Anas silvestris* Marcgr. Bras. p. 213.

*Pato grande ó real* Azar. Apunt. Nr. 427.

2. Subgen. *Poecilonetta* Eyton.

344. 2. *A. bahamensis* Lin. Gmel. XIII. I. p. 516. 17.

*Anas Bahamensis* Briss. Ornith. VI. p. 358. 12.

*Poecilonetta bahamensis* Eyt. Monogr. anat. p. 116.

*Pato de pico roxo y aplomado* Azar. Apunt. Nr. 433.

3. Subgen. *Dendrocygna* Swains.

345. 3. *A. viduata* Lin. Gmel. XIII. I. p. 536. 38.

*Pato de la cara blanca* Azar. Apunt. Nr. 435.

4. Subgen. *Querquedula* Steph.

346. 4. *A. oxyptera* Meyen Reise III. p. 245. tab. 36.347. 5. *A. Puna* Lichtenst. Mus. Berol.

A. supra ex fusco et albedo varia; pileo nuchaque atrovirentibus; tectricibus alarum superioribus dilute plumbeis; speculo alae viridi-nitente duabus fasciis albis cincto; parapteris fuscis, splendore pupureo-violaceo, fasciis longitudinalibus albicantibus; crisso tectricibusque fuscis striolis transversalibus albis; subtus cinerea, permultis striolis transversalibus

fuscis; gutture collique lateribus albis; pectore dilute ex albo  
brunescente, maculis subcordatis, fuscis, tectricibus alarum  
inferioribus albis; hypochondriis fasciis transversalibus albis  
et fuscis variis; rostro virescente, culmine tomiorumque mar-  
gine nigris; pedibus purpureis.

Long. tot. 1' 8".

8. Gen. ***Erismatura*** C. Bonap. Sag. 1831.

348. 1. *E. leucogenys* Tsch.

*Anas leucogenys* Tsch. Wieg. Arch. 1843. I. p. 390. 22.

Fam. 3. *Pelecanidae* C. Bonap. Sag. 1831.

9. Gen. ***Pelecanus*** Lin. Syst. Nat. 1748.

*Onocrotalus* Moehr. 1753.

349. 1. *P. thajus*<sup>1)</sup> Molina Hist. Nat. de Chile p. 212.

Alcatraz incol. lit. et navigat.

10. Gen. ***Sula*** Briss. Ornith. 1760.

*Pelecanus* Lin. part. *Dysporus* Jllig. 1811. *Morus*  
Vieill. 1816.

350. 1. *S. variegata* Tsch.

*Dysporus variegatus* Tsch. Wieg. Archiv 1843. I. p.  
390. 20.

11. Gen. ***Phalacrocorax*** Briss. Ornith. 1760.

*Pelecanus* Lin. part. *Corvus* Ray part. *Carbo* Meyer.  
Lacep. 1800. *Halieus* Jllig. 1811. *Hydrocorax*  
Vieill. 1816.

351. 1. *Ph. Gaimardii* Tsch.

*Carbo Gaimardi* Less. Man. Ornith. II. p. 373.  
*Pelecanus Gaimardi* Less. Voy. de la Coq. tab. 48.

352. 2. *Ph. albigula* Tsch.

*Carbo albigula* Brandt.

12. Gen. ***Fregata*** (Ray) Cuv. Leg. Anat. comp. 1800.

*Pelecanus* Lin. part. *Halieus* Jllig. part. *Tachypetes*  
Vieill. 1816.

---

<sup>1)</sup> Differt haec species a *Pelecano fusco* Lin. et ab *Onocrotalo Hernandezii* Wagl. Isis 1832 p. 1233, qui ad *Pelecanum fuscum* spectat.

353. 1. *F. aquila* Cuv. Regn. Anim. I. p. 563.

*Fregata* Ray Av. p. 153.

*Pelecanus aquilinus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 572. 2.

*Haliaeetus aquilus* Jllig. Prodr. p. 279.

*Tachypetes aquilus* Vieill. Gal. tab. 274.

13. Gen. **Phaeton** Lin. Syst. Nat. 1766.

*Lepturus* Briss. 1760.

354. 1. *Ph. aethereus* Lin. Gmel. XIII. I. p. 581. 1.

*Rabijuncos* Ulloa Viage II. p. 305.

14. Gen. **Plotus** Lin. Syst. Nat. 1766.

355. 1. *P. anHINGA* Lin. Gmel. XIII. I. p. 580. 1.

*P. melanogaster* Lin. Gmel. XIII. I. p. 580. 2. Vieill.  
Gal. pl. 278.

*Zarmagullon chorreado* Azar. Apunt. Nr. 424.

Fam. 4. Colymbidae Less. Man. Orn. 1827.

15. Gen. **Podiceps** Lath. Ind. Ornith. 1790.

356. 1. *P. calipareus* Less. Voy. de la Coq. Zool.  
tab. 47. Pernetty Voy. II. p. 15.

Fam. 5. Alcedae Swains. Nat. Hist. of  
Birds 1837.

16. Gen. **Spheniscus** Briss. Ornith. 1760.

*Diomedea* Lin. part. *Aptenodytes* Forst. part. *Eud-  
dyptes* Vieill. 1816.

357. 1. *Sph. Humboldtii* Meyen Reise III. p. 234. tab.  
XXXI.

Berolini Mens. Januar. 1844.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [10-1](#)

Autor(en)/Author(s): Tschudi Johann Jakob von

Artikel/Article: [Avium conspectus 262-317](#)