

# Uebersicht der Rhamphastiden

nach Gould *Proceed. of the Zool. Soc. Pars III.* 1835. p. 158.

## RHAMPHASTIDAE. (\*)

- I. Cauda brevior, quadrata; rostro maximo. Nigri;  
guttur caudaeque tegminibus discoloribus.

### RHAMPHASTOS.

\*\*\* Caudae tegminibus superioribus flavis vel flavescentibus

= Pectore albo

Rostro ut plurimum nigro

lateribus compressis 1. *culminatus*. (1)

— convexis . 2. *Cuvieri*. Wagl.

Rostro ut plurimum rubro 3. *erythrorhynchus*. Gmel.

= Pectore pallide lutescente . . 4. *citreopygus*. Gould. (2)

= — flavo . . . . . 5. *osculans*. Gould. (3)

\*\*\* Caudae tegminibus superioribus  
albis

= Pectore albo . . . . . 6. *Toco*. Auct.

= Pectore flavo

Rostro pluricolore . . . . 7. *carinatus*. Swains.

— oblique dimidiatum

flavo . . . . . 8. *Swainsonii*. Gould. (4)

\*\*\* Caudae tegminibus superioribus  
coccineis

= Rostro nigro

Auribus albis . . . . . 9. *vitellinus*.

— pectori concolori-

bus, flavis . . 10. *Ariel*. Vig. (5)

= Rostro viridescente . . . . . 11. *discolorus*.

II. Cauda longiore gradata; rostro maiore. Viridescentes, capite, gastraeo tegminibusque caudae superioribus plerumque discoloribus:

PTEROGLOSSUS.

§ Gastraeo bi- vel pluricolore, coloribus discretis.

\*\*\*Pectore ventrequé flavis fasciatis

= Fascia ventrali coccinea lata.

Maxillae superioris lateribus sor-

dide albis . 1. *Aracari*. Ill.

— — —

oblique dimi-

diatis nigris

2. *castanotis* Gould. (6)

= Fascia ventrali antice nigra, postice coccinea.

Pectore macula nigra

notato . . . . 3. *regalis*. (7)

— torque lata ni-

gra cincto . . 4. *pluricinctus*. (8)

\*\*\*Pectore coccineo

Torque pectorali vel nulla

vel angusta flava . . . . 5. *bitorquatus*. Vig. (9)

— —

latissima nigra 6. *Azarae*. Wagl.

\*\*\*Pectore ventrequé flavis haud fasciatis

Maxillae superiore dimidia-

tim flava et aurantiaca . . 10. *viridis*. Ill.

Maxilla superiore flava ni-

gro inscripta

maxilla inferiore

nigra . . . . 11. *Humboldtii*. Wagl.

— infer. superiori

concolore . . 12. *inscriptus*. Swains.

\*\*\*Pectore gutturi concolore, ventre discolore

Maxilla superiore nigro ma-

culata albescente . . . . 13. *maculirostris*. Licht.

Max. sup. ut plurimum rubra

nigro maculata

apice concolore 14. *Nattereri*. G. (10)

— nigrescente 15. *Reinwardtii*. Wagl.

Maxillis nigris

basin versus rubris . . 16. *Culik*. Wagl.

paullum cinerascentibus 17. *Langsdorffii*. Wagl.

## § Gastraeo unicolore vel subunicolore

## \*\*\* Gastraeo stragulo discolore

- gastraeo flavo, rubro intermixto 7. *ulocomus*. G. (<sup>11</sup>)  
 — coeruleo-cano . . . . . 8. *hypoglaucus*. G. (<sup>12</sup>)  
 — flavo . . . . . 9. *Bailloni*. Wagl.

## \*\*\* Gastraeo stragulo subconcolore

## = Crisso discolore

Mandibulae superioris basi

flavescente 18. *prasinus*. Licht. (<sup>13</sup>)— — — nigra . 19. *pavoninus*. G. (<sup>14</sup>)

## = Crisso concolore

— Uropygio concolore

Rectricum apicibus con-

coloribus 20. *sulcatus*. Swains.

— intermedia-

rum duarum apicibus

castaneis . . . . . 21. *derbiamus*. G. (<sup>15</sup>)— Uropygio coccineo . . . . . 22. *haematopygos*. G. (<sup>16</sup>)

Aulacorhynchus. Gould.

## A n m e r k u n g e n .

(\*) Der Conspectus erstreckt sich nur auf die dem Verf. durch Autopsie bekannten Arten. Die neu angestellten sind im 3ten Theile seiner *Monography of the Rhamphastidae or family of Toucans*. London 1835. fol. abgebildet.

(1) *Rhamphastos culminatus*, Gould. *Rhamph. rostro nigro, culmine, fasciaeque basali stramineis, lateribus compressis subconcavis*.

Long. tot. 18—20 poll.; rostri 4—5, alae  $8\frac{1}{2}$ —9, caudae  $6\frac{1}{2}$ —7, tarsi 2.

*Rhamphastos culminatus*, Gould. in *Proceedings Zool. Soc. Part. I.* p. 70.

Descr. R. Cuvieri simillimus, sed minor; mandibula superior compressa, nec ad latera convexa. Tectrices caudae superiores postice in aurantio-coccineum vergentes.

(2) *R. citreopygus*. *R. tectricibus caudae superioribus sulphureis*.

Long. tot. 20",  $5\frac{1}{8}$ ", alae  $9\frac{1}{4}$ ", caudae 6", tarsi 2".

Habitat in Brasilia?

Rostrum (pro corporis ratione) minus, nigrum, fascia basali culmineque prope basin flavis. Pectus albidum flavescente tinctum. Torques

pectoralis coccinea latiuscula. Orbitae tarsique plumbei, hi saturatiores. *Proc. Zool. Soc.* 1835. p. 156.

(3) *R. osculans*. *R. rostro nigro, culmine fasciaque basali stramineis, pectore in medio aurantiaco.* www.oegeschichte.at

Long. tot. 18'', rostri 4½'', alae 7½, caudae 6½; tarsi 1⅔''.

Habitat in Brasilia.

*R. culminato* Gould. quam proxime accedit. Pectus aurantiacum, latera versus in flavum transiens; gula regioque parotica albae. Torques pectoralis subangustata. *Proc. p.* 156.

(4) *Rhamphastos Swainsonii*, Gould, *Rhamph. rostro oblique dimidiatim flavo, torque pectorali linea alba antice aucta.*

Long. tot. 18 unc., rostri 5½—6, alae 9, caudae 6¼, tarsi 1⅕.

*Rhamphastos Swainsonii*, Gould. in *Proceedings Zool. Soc. Part. I.* p. 29.

Tocard? *Le Vaill., Ois. de Par. Tom. II. Pl.* 9.

*Rhamphastos ambiguus?* Swains., *Zool. Ill. Pl.* 168.

Hab. in Columbia et in Mexico Australi.

Descr. Rostrum pars superior flava; pars inferior (pro tempore?) colore variat, quippe aliquando nigra, aliquando rufa nigro, praesertim antice, cincta. Guttur flavum, a torque pectorali coccinea linea alba sejunctum. Irides, orbitaeque coeruleae.

(5) *R. Temminckii*. Wagl. cf. Wagl. *Isis* 1829. p. 506.

(6) *Pteroglossus castanotis* G. *Pter. gastraeo flavo, fascia lata coccinea; auribus castaneis.*

Long. tot. 17½ unc., rostri 5, alae 6¼, caudae 7½, tarsi 1⅜.

*Pteroglossus castanotis*, Gould, in *Proc. Zool. Soc. Part. I.* p. 119.

Hab. in Brasilia.

Descr. *Pteroglossus Aracari* simillimus, nisi rostri capitisque coloribus. Rostrum flavum, culmine, maxilla inferiore (praeter lineam elevatam flavam basalem), maxilla superiore oblique dimidiatim, serraturisque nigris. Genae auresque vel etiam gula nuchaque castaneae.

(7) *Pterogl. regalis*. Licht. *Pt. torquatus*. Wagl. *Isis* 1829. p. 508.

(8) *Pterogl. pluricinctus*. G. *Pt. gastraeo flavo, fascia pectorali nigra, alteraque subventrali antice nigra, postice coccinea.*

Long. tot. 20'', rostri 4½'', alae 6½'', caudae 8¼''.

Hab. in Brasilia.

*Pt. regali* Licht. affinis. Rostrum ad basin linea elevata flava cinctum, maxillae superioris culmen, linea intrabasalis, tomique pars posterior nigrae; latera aurantiaco-flava apicem versus pallescentia; maxilla inferior nigra. Caput collumque nigra; feminae regio parotica castanea, fasciaque guttur postice cingens coccinea. Pectus et venter maculis indistinctis sparsis coccineis notata. Femora olivacea.

(9) *Pt. bitorquatus*. Vig. s. Wagler *Isis* 1829. p. 507.

(10) *Pt. Nattereri*, Gould. *P. ventre flavo, femoribus castaneis, crisso coccineo; rostro rubro, culmine, macula prope basin utriusque mandibulae, plurimisque transversis ad serraturas nigris.*<sup>ie.at</sup>

Long. tot.  $13\frac{1}{2}''$ , rostri  $2\frac{5}{8}''$ , alae  $5\frac{1}{2}''$ , caudae  $5''$ , tarsi  $1\frac{1}{2}''$ .

Hab. in Brasilia. *P. maculirostri* Licht. admodum affinis, in sexu utroque. Rostrum colores toto coelo diversi; sicut et ventris femorumque. *Proc. Zool. Soc.* 1835. p. 157.

(11) Schon im 1. Jahrg. dieses Archives 2. p. 310. habe ich darauf hingewiesen, daß diese Art früher von Wagler unter dem Namen *P. Beauharnaisii* beschrieben ist.

(12) *Pter. hypoglaucus*, Gould. *Pter. subtus coeruleo-canus, crisso coccineo.*

Long. tot.  $18\frac{1}{4}$  unc., rostri 4, alae  $6\frac{3}{4}$ , caudae 7, tarsi  $1\frac{3}{4}$ .

*Pter. hypoglaucus*, Gould, in *Proc. Zool. Soc. Part. I.* p. 70.

Hab. in Columbia.

Descr. Colorum diversitate singularis admodum. Corpus totum subtus praeter crissum coccineum, coeruleo-canum. Caput caudaque nigrae. Nucha coeruleo-cana. Interscapulium, tergum, et pteromata olivaceo-brunnea. Uropygium flavum. Remiges secundarii virides. Rectrices ad apices brunnei. Mandibularum basis oblique flava, utrinque macula fasciaeformi nigra notata; superior, nisi ad basin, sanguinea; inferioris dimidium apicale nigrum. Orbitae coeruleae

(13) Ist *Pt. pavoninus* Wagl. *Isis* 1829. p. 507. *Rhamph. pavoninus* Gmel.

(14) *Pt. pavoninus* Mus. Mon. Gould. *Proc. Z. S.* 1835. p. 158.

*Pt. supra prasinus, subtus pallidior, crisso rectricumque apicibus brunneis, rostro inferne et ad basin nigro.*

Long. tot. 13—14'', rostri vix  $3\frac{1}{2}''$ , alae  $5\frac{1}{4}''$ , caudae  $5\frac{1}{2}''$ , tarsi  $1\frac{5}{8}''$ .

Hab. in Mexico.

*Pter. prasino* Licht. propemodo affinis. Rostrum nigrum, ad basin linea aurantiaca cinctum; mandibula superior pro maxima parte apicem versus flava in coeruleo-viridem superne transiens. — Ist wohl nur ein junger Vogel der vorigen Art; unser Museum besitzt ein gleiches Exemplar.

(15) *Pt. Derbianus*. *Pt. rostro castaneo, antice in brunnescenti-nigrum transeunte, ad basin fascia angusta flavescenti-albida cincto: viridis, supra brunneo parum tinctus; capite coerulescenti-viridi; remigibus nigrescenti-brunneis; rectricum intermediarum duarum apicibus castaneis; orbitis rufo-brunneis; tarsis coeruleo-plumbeis.*

(16) s. dieses Archiv 1. Jahrg. 2. p. 310.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1836

Band/Volume: [2-1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Übersicht der Rhamphastiden 307-311](#)