

größert, man sieht von außen die Gliederung und 2 Früchte; *b* Gliederröhren stark vergrößert; bei * Spuren ihrer dichotomischen Theilung; *c* dichotomisch getheilte Gliederröhren aus der Nähe der Epidermis.

Fig. 6. *Melobesia membranacea* Lamx. *a* natürliche Größe auf einem Stück *Sphaerococcus nervosus*; *b* ein Stück schwach vergrößert; *c* ein Theil desselben stärker vergrößert.

Zur Verbreitung von *Cyprinus Farenus*.

Notiz von Kröyer.

In Bezug auf die Mittheilung vom Herrn Dr. v. Siebold, daß *Cyprinus Farenus* sich in Westpreußen finde, bemerkt Herr Kröyer, daß er ihn schon mehrere Jahre als einen dänischen Fisch kenne, obwohl er bisher in keinem Verzeichnisse der dänischen Fische aufgeführt sei. Er finde sich häufig auf Seeland, zum Beispiel im Lyngby-See, in großer Menge im Nivaa n. s. w. Als Merkwürdigkeit verdiene aber angeführt zu werden, daß er auch im nördlichsten Theil des Sundes vorkomme. In der Sammlung des naturhistorischen Vereins zu Kopenhagen findet sich ein ungewöhnlich großes Exemplar, welches im Spätjahre 1835 bei Snedkersteen in einer Aalreue gefangen wurde. Der gemeine Mann kennt den Fisch unter dem Namen Flirc.

(Kröyer *Naturhistorisk Tidskrift*. Heft 4. p. 414.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1837

Band/Volume: [3-1](#)

Autor(en)/Author(s): Kröyer H.

Artikel/Article: [Zur Verbreitung von Cyprinus Farenus. 393](#)