

## Ueber ein neues amerikanisches Dipteron.

Von

Dr. F. Karsch.

---

Hierzu Taf. I, Fig. 1—2.

---

*Parydra bicuspidata*, nov. spec., ♂.

Brunneo-nigra, nitida, alis cinereo-hyalinis, venis transversis nigro-limbatis, vena longitudinali tertia valde curvata; scutellum bicuspidatum. Long. corporis 4,2 mm.

Die Art ist der *Parydra bituberculata* H. Loew (Monogr. N.-Amer. Dipt., 1862, I, p. 165, 1) sehr ähnlich, unterscheidet sich aber namentlich durch folgende zwei Merkmale auffallend: Zunächst zeigt das Geäder der etwas getrübbten Flügel darin eine wesentliche Abweichung, dass die dritte Längsader nicht wie bei *P. bituberculata* gerade, sondern stark nach vorn convex gekrümmt verläuft; zweitens sind die Fortsätze des Hinterrandes des Scutellum im Verhältniss viel länger, dünner und spitzer, dornförmig, bei *bituberculata* mehr warzenartig, kurz.

Die Figuren 1, 1a der Tafel I veranschaulichen das Verhältniss von Scutellum und Flügelnervatur bei *P. bituberculata*, Fig. 2, 2a bei *P. bicuspidata*.

Es liegt nur 1 Exemplar aus Porto Allegre im Berliner Museum vor.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [47-1](#)

Autor(en)/Author(s): Karsch Anton Ferdinand Franz

Artikel/Article: [Über ein neues amerikanisches Dipteron. 15](#)