

Uebersicht der im Jahre 1837 neu aufgestellten

Genera und Arten

der Raubvögel, Singvögel
und Klettervögel,

welche im Jahresberichte des vorigen Jahrganges unerwähnt
bleiben mußten.

(Nachtrag zum zweiten Bande des vor. Jahrganges)

I. *Raptatores.*

Jeracidea Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. 140).

Rostrum, ut in genere *Falco* dicto; alis attamen minus rigidis, remige tertio longissimo, tarsis longioribus, gracilioribus, et antice squamis hexagonalibus tectis; digitis gracilioribus, digito postico brevior, unguibus minus robustis.

Typus: *Falco Berigora* Vig. et Horsf.

Haliaetus sphenurus Gould. (Pr. Z. S. 138). H. capite, nucha, guttureque pallide cervinis, corpore supra alisque intense fuscis, singulis plumis ad apicem pallide cervinis, cauda cuneiformi, ad basin albescenti-cervina, apicem versus fusca, ad apicem alba; pectore fusco, plumis cervino-marginatis; abdomine cervino fuscoque picto, crisso, caudaque subtus albis; rostro fusco; tarsis flavis. Long. tot. 32 unc.; rostri, 2; alae, 25; caudae 14½; tarsi, 3½. Hab. in terra Van Diemen.

H. leucosternus Gould. ibid. H. capite, collo, pectore, abdomineque summo niveis; dorso, alis, abdomine imo, femoribus crissoque laete castaneis, primariis ad apicem nigris; cauda castanea, subtus pallidiore, rectricibus sex internodiis ad apicem cinerescentibus; rostro ad basin plumbaceo, ad apicem flavescente, pedibus flavescenti-plumbaceis. Long. tot. 22½ unc.; rostri, 1⅝; alae, 15½; caudae, 9; tarsi, 2. Hab. in Australia.

Pandion leucocephalus Gould. (Pr. Z. S. 139). P. vertice, nucha, gula, abdomine, femoribus crissoque albis, plumis pectoris fusco ad apicem notatis; plumis auricularibus fusciscenti-nigris; colli lateribus fuscis; dorso, alis, caudaque brunneis, singulis plumis nota alba angusta apicali ornatis; primariis nigris; rostro nigro, tarsis olivaceo-plumbaceis. Long. tot. 21 unc.; rostri, 1½; alae, 16½; caudae, 8; tarsi 2½. Hab. in Australia.

Lepidogenys suberistatus Gould. (Genus *Lophotes* Less. Pr. Z. S. V. p. 140). L. vertice, genis, plumis auricularibus, dorsoque superiore fusciscenti-cinereis; occipite, cristaque occipitali nigrescenti-fuscis; dorso, scapularibusque fuscis, alis supra fuscescenti-cinereis, subtus argenteo-cinereis, primariis secundariisque fasciis duabus nigris notatis; uropygio, tectricibusque caudae superioribus fuscis; cauda fuscescenti-cinerea, nigro fasciata, et ad apicem large nigra; gula, pectore, humeri parte, crissoque cinereis rufo tinctis; corpore subtus pallide cervino, castaneo fasciato; rostro pallide plumbeo, tarsi flavis. Long. tot. 18 unc.; rostri, $1\frac{1}{4}$; alae, 13; caudae, $8\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{1}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Polyborus galapagoensis Gould. (Pr. Z. S. 9). P. intense fuscus, primariis nigris; secundariorum pogoniis internis albo et fusco transversim striatis; cauda cinerascendi-fusca, transversim lineis angustis et frequentibus intense fuscis notata; rostro obscure corneo; pedibus olivaceo-flavis. Long. tot. 20 unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, $14\frac{1}{2}$; caudae, 9; tarsi, $3\frac{1}{4}$.

Fem. jun. Capite et corpore intense stramineis fuscoque variegatis; illo in pectore et abdomine praevalente; primariis fusco-nigris; caudae rectricum pogoniis externis cinerascendi-fuscis, internis pallide-roseis; utrisque lineis angustis et frequentibus fuscis transversim striatis, apicibus sordide albis, rostro nigrescenti-fusco; pedibus olivaceo-flavis. Long. tot. 22 unc.; rostri, $1\frac{1}{3}$; alae, 17; caudae, $10\frac{1}{2}$; tarsi, $3\frac{1}{4}$.

P. (*Phalcobaenus*) *albo-gularis*. P. fuscescenti-niger, marginibus plumarum inter scapulos fulvis; primariis secundariisque albo ad apicem notatis; gula, pectore, corporeque subtus albis; lateribus fusco sparsis; rostro livido, cera flava; tarsi olivaceis. Long. tot. 20 unc.; rostri, $1\frac{3}{8}$; alae, $18\frac{1}{2}$; caudae, 9; tarsi, 3. Santa Cruz.

Falco brunneus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 139). F. capite corporeque superiore intense fuscis; primariis intus notis albis triangularibus ornatis; cauda lineis fuscescentibus septem obscure et anguste fasciatis; gula notaque ante oculos cervinis; pectore pallide cervino, plumis linea fusca centrali notatis; corpore subtus albo fuscoque commixtis ornato; iridibus flavis; rostro nigro; pedibus plumbaceis. Long. tot. 16 unc.; rostri, $1\frac{1}{8}$; alae, 10; caudae, $7\frac{1}{2}$; tarsi, $2\frac{1}{2}$. Hab. in Nova Zeelandia.

Falco melanogenys Gould. Mas. (Pr. Z. S. V. p. 139.) F. capite toto fuscescenti-nigro, corpore supra, alis, caudaque cinereo fuscoque alternatim fasciatis, primariis extus intense fuscis, intus cervino fasciatis; gula pectoreque cervinis; abdomine rufescenti-cinereo, guttis ovalibus intense fuscis ornato; lateribus crissoque rufescenti-cinereis, fasciis intense fuscis contortim notatis; rostro ad apicem plumbaceo, ad basin flavo; cera pedibusque flavis.

Fem. A mare differt statura majore, necnon colore gulae, pectoris, abdominisque intensiore. Mas. Long. tot. 15 unc.; rostri, $1\frac{1}{8}$; alae, $11\frac{1}{2}$; caudae, $5\frac{3}{4}$; tarsi, $1\frac{1}{2}$. Fem. Long. tot. 17 unc.; rostri, $1\frac{3}{8}$; alae, $13\frac{1}{2}$; caudae, $6\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{3}{4}$. Hab. per totam Australiam.

Falco frontatus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 139). F. fronte

cinerescenti; vertice, genis, plumis auricularibus, corporeque supra cinerescenti-plumbaceis; primariis intus maculis ovalibus cervinis ornatis; rectricibus caudae duabus intermediis cinereis, nigro obscure fasciatis, reliquis cinereo et rufescente alternatim fasciatis; gula, pectoreque pallide cervinis, hujus plumis in medio linea fusca notatis; corpore subtus obscure rufescenti-aurantiaco; rostro plumbaceo, cera pedibusque flavis. Long. tot. 12 unc.; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, $9\frac{1}{2}$; caudae, $5\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{1}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Buteo varius Gould. (Pr. Z. S. 10). B. vertice corporeque supra intense fuscis, plumis fulvo marginatis vel guttatis; primariis secundariisque cinereis, lineis fuscis frequentibus transversim striatis, cauda cinerea, lineis angustis et frequentibus fuscis transversim notata; singulis plumis flavescenti albo ad apicem notatis; gula fuliginosa; pectore fulvo linea interrupta nigrescente circumdata a gula tendente; abdomine imo lateribusque stramineo et rufescenti-fusco variegatis; femoribus crissoque stramineis lineis transversalibus anfractis rufescenti-fusco ornatis; rostro nigro; cera tarsisque olivaceis. Long. tot. $21\frac{1}{2}$ unc.; alae, $16\frac{1}{2}$. Santa Cruz.

Buteo ventralis Gould. B. vertice corporeque intense et nitide-fuscis, plumis dorsalibus purpurescentibus; primariis nigris; cauda fusca lineis frequentibus obscurioribus, cancellata ad apicem sordide alba; gula, abdomine medio crissoque stramineo-albis; lateribus pectoris corporisque fasciaque abdominali necnon femoribus flavescenti-albis fusco notatis, notis in femoribus rufescentibus; tarsis per mediam partem antice plumosis, rostro nigro; cera tarsisque flavis. Long. tot. $21\frac{1}{2}$ unc.; alae, $15\frac{1}{2}$; rostri, $9\frac{1}{2}$; tarsi, $3\frac{1}{2}$. Santa Cruz.

Milvus affinis Gould. (Pr. Z. S. V. p. 140). M. plumis capitis, nuchae, collique laterum rufescenti-cervinis, striga centrali fusca notatis; corpore supra brunneo, tectricibus alarum rufescentibus, singulis plumis nigra linea centrali notatis et ad apicem pallide brunneis; primariis nigris, secundariis nigrescentibus; cauda fusca, nigrescenti-fasciata, et ad apicem cinerea; gula fusciscenti-cervina, singulis plumis linea centrali nigra; corpore subtus rufescenti-fusco, singulis plumis linea centrali fusca apud pectorales maxime conspicua ornatis; rostro nigro; pedibus flavescentibus. Long. tot. 21 unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, $15\frac{3}{4}$; caudae, $10\frac{1}{2}$; tarsi, 2. Hab. in Australia.

M. Isurus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 140). M. fronte, lineaque supraoculari cervinis; singulis plumis, apice lineaque centrali nigris notatis; vertice, dorso, lateribus colli, gutture, humeris supra et subtus, corporeque subtus rufescenti-aurantiaco; plumis singulis verticis, occipitis, et praecipue pectoris notam longitudinalem apicalemque nigram habentibus; dorso superiore, plumisque scapularibus intense fuscis; primariis ad apicem fuscis, nigro obscure fasciatis, ad basin intus cerineis; secundariis intense fuscis, nigro fasciatis; uropygio crissoque albis, nigro cervinoque fasciatis; cauda fere quadrata, et cerineo-fusca; rectricibus, duabis externis utrinque exceptis, obscure fasciis quatuor angustis nigris ornatis; omnibus ad apicem nigris; rostro fusco;

cera, tarsisque flavis. Long. tot. 20 unc.; rostri, $1\frac{3}{8}$; alae, $81\frac{1}{2}$; caudae, $8\frac{1}{4}$; tarsi, $1\frac{3}{4}$. Hab. in Australia.

Elanus notatus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 141). E. oculis nigro anguste circumdatis; fronte, lateribus faciei corporeque subtus albis; nucha dorso, scapularibus, tectricibusque caudae majoribus delicate cinereis; alis maximis ex partibus nigris, humeris subtus albis; primariis supra nigrescenti-cinereis, subtus fusco-nigris; cauda cinerescenti-alba; rostro nigro; cera pedibusque aurantiaco-flavis. Long. tot. unc. 14, alae, $41\frac{3}{4}$; caudae, $6\frac{1}{4}$; tarsi, $1\frac{3}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Circus megaspilus Gould. (Pr. Z. S. p. 10). C. vertice corporeque supra intense fuscis, linea straminea a naribus supra oculos ad occiput tendente; hoc rufescenti-fusco, primariis intense fuscis ad basin cinereis, lineis nigris cancellatis; tectricibus caudae albis; rectricibus intermediis cinereis, externis cinereo-stramineis; omnibus lineis latis fuscis transversim notatis; linea ultima latissima apice sordide stramineo; gula et pectore stramineis, fusco sparsis; corpore subtus stramineo; plumis pectoris et laterum stria centrali fusco notatis; rostro nigro; cera tarsisque flavis. Long. tot. 21 unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, 17; caudae, $10\frac{1}{2}$; tarsi, $3\frac{1}{2}$. America.

Circus Jardinei Gould. Mas. C. vertice, genis, plumisque auricularibus intense castaneis, fusco longitudinaliter notatis; disco fasciali, nucha, dorso superiore, pectore necnon dorso imo, scapularibusque intense cinereis, his albo leviter notatis; humeris, alis subtus, abdomine, femoribus crissoque castaneis, albo perpulchre notatis, tectricibus alarum fusco-cineraceis, irregulariter albo notatis, fasciaeque lata terminali: primariis ad basin cervinis, per reliquas partes nigris; tectricibus caudae superioribus fuscis, fascias albas apicemque album ostendentibus; cauda cinereo fuscoque alternatim fasciata; rostro nigro; pedibus flavis. Long. tot. 19 unc. alae, 16; caudae, 10; tarsi, $3\frac{5}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi. *Circus assimilis* Jard. et Selb. Ill. Ornith. Vol. 1, tab. 51 fem.?

Athene erythroptera Gould. (Pr. Z. S. 136). A. disco faciali, capite corporeque lineis fuscis et fulvescenti-albis alternatim fasciatis; lateribus gulae, femoribus crissoque cinerescenti-albis; primariis secundariisque rufis et fuscis fasciis distinctis, latioribus quam corporis; cauda caryophyllacea fasciis angustis albis crebre notata, rostro pedibusque flavescenti-olivaceis. Long. tot. $9\frac{1}{2}$ unc.; alae, $4\frac{1}{2}$; caudae, 3; tarsi, $1\frac{1}{4}$. Himalaya.

Athene? fortis Gould. (Pr. Z. S. V. p. 141). A. facie gulaque cinerescenti-albis; vertice, corporeque supra fuscis, purpureo tinctis; scapularibus, secundariis tectricibusque alae majoribus albo guttatis; primariis alternatim fusco griseoque fasciatis; fasciis pallidis ad marginem externum albescentibus; cauda fusca lineis sex vel septem cinerescens transversim fasciatis, apice cinerescente; corpore subtus brunneo alboque marmorato, hoc colore marginem plumarum ornante; tarsis ad digitos vestitis, fusco cervinoque marmoratis; rostro flavescenti-corneo; digitis longis, flavis, pilisque tectis. Long. tot. $15\frac{1}{4}$ unc.; alae, $11\frac{1}{2}$; caudae, $7\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Athene? strenua Gould. (Pr. Z. S. V. p. 142). A. vertice, corpore supra, alis, caudaque intense fuscis, fasciis purpureo-brunneis transversim ornatis; his majoribus pallidioribusque ad imum dorsum; secundariis, rectricibusque caudae ad marginem internum, facie, gula, pectoreque superiore badiis, plumis partium harum nota brunnea centrali ornatis; corpore subtus albo, leviter badio lavato, et fusco fasciato; rostro corneo ad basin, ad apicem nigro; pedibus flavis. Long. tot. 24 unc.; rostri, 2; alae, 15; caudae, $10\frac{1}{2}$; tarsi, $2\frac{1}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Otus (Brachyotus) galapagoensis Gould. (Pr. Z. S. p. 10). O. fascia circa oculos fuliginosa; striga superciliari plumis nares tangentibus et circa angulum oris, gula et disci fascialis margine albis; vertice corporeque supra intense stramineo fuscoque variegatis; primariis intense fuscis ad apicem, stramineo fasciatis ad basin; corpore subtus stramineo notis irregularibus fasciisque fuscis ornato; femoribus tarsisque plumosis rufescenti-stramineis; rostro et ungulibus nigris. Long. tot. $13\frac{1}{2}$; rostri, 1; alae, 11; caudae, 6; tarsi, 2. Ins. Galapagos.

II. *Insessores.*

1. *Canori v. Passerini.*

Thamnophilus fuliginosus Gould. (Pr. Z. S. 80). T. Nas. Capite, crista, genis, gutture et pectore nigerrimis. Dorsum, alis, corpore subtus, caudaque cinerescenti-fuliginosis, hujus pogoniis internis lineis angustis transversis albis fasciatis; rostro pedibusque nigris.

Fem. Summo capite, dorso alisque castaneo-fuscis; loro, linea super oculos, plumis auricularibus, colli lateribus, gutture, corpore subtus et cauda intense cineraceo-coeruleis; plumis singulis lineis cinerescenti-albis fasciatis; pogoniis internis rectricum albis lineis fasciatis; rostro pedibusque nigro-brunneis. Long. tot. $7\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $1\frac{1}{8}$; alae, $3\frac{1}{2}$; caudae, 3; tarsi, $1\frac{1}{4}$. Hab. Demerara.

Falcunculus leucogaster Gould. (Pr. Z. S. 144). F. fronte alba, crista occipitali nigra; genis albis linea nigra notatis ad nucham extendente; dorso, humeris, tectricibusque caudae et uropygio olivaceo-flavis; primariis secundariisque brunneis, olivaceo marginatis; rectricibus caudae duabus externis albis, duabus intermediis olivaceis, reliquis brunneis, olivaceo-marginatis; gula olivaceo-viridi; pectore tectricibusque caudae inferioribus nitide sulphureo-flavis; abdomine femoribusque albis; rostro nigro; pedibus plumbaceis. Long. tot. unc. 6; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, $3\frac{3}{8}$; caudae, $2\frac{7}{8}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Australia.

F. flavigulus Gould. ib. F. loro albo; vertice et striga ab oculo usque ad latus colli nigrescenti-brunneis, supra infraque strigis albis; dorso, tectricibusque superioribus caudae viridescenti-albis, gula olivaceo-viridi; alis fuscis, pallide brunneo marginatis; cauda fusca, rectricibus tribus utrinque plus minusve albonotatis; mento macula alba; gula, pectore, abdomine, tectricibusque inferioribus caudae nitide flavis; rostro pedibusque cyaneo-

nigris. Long. tot. unc. $5\frac{3}{4}$; alae, $3\frac{3}{8}$; caudae, $2\frac{2}{5}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Australia.

Oreoica Gould. Gen. nov. incert. sed. (Pr. Z. S. 151).
 Rostrum capite brevius, robustum, lateribus compressis, ad apicem emarginatum; maxilla inferior, superiorem in robore fere aequans; nares basales, rotundatae, tenuibus, brevibus, capillaribus plumis (paucis elongatis intermixtis) fere tectae; alae subelongatae, remige 1mo brevi, 3tio longissimo; tertiarii perlongis, primarias fere aequantibus; cauda brevis et subrotundata; tarsi sublongi et robusti, postice integri, antice scutellis duris muniti; pedes ambulatorii; digiti perbreves, posticus brevissimus, externo subbrevior internus; ungues breves et fere recti. Typ. *Falcunculus gutturalis* Vig. Horsf.

Ceblepyris humeralis Gould. (Pr. Z. S. V. p. 143). Mas. C. fronte, vertice, nucha dorsoque nitide viridescenti-nigris; humeris, tectricibusque superioribus caudae; alis nigris secundariis albo marginatis; dorso inferiore et uropygio cinereis; cauda obscure nigra, plumis duabus externis utrinque apicibus albis; gula, pectore, corporeque subtus, rostro pedibusque nigris.

Fem. vertice, nucha dorsoque superiore brunneis; dorso inferiore, uropygio caudae ut in mare; tectricibus majoribus minoribusque caudae badio marginatis; secundariis mare latioribus albo marginatis; gula corporeque subtus fusco-albis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. unc. $6\frac{1}{2}$; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, 4; caudae, $6\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{7}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi. affinis *Ceblep. leucomelaenae* (Campephaga leucom. Vig. Horsf., *Lanius Karu* Less.), sed minor, macula scapular. maiori.

Graucalus parvirostris Gould. (Pr. Z. S. 143). G. fronte, facie, lateribus colli, gulaque nigris; vertice supra, alisque in medio cinereis; primariis secundariisque intus nigrescentibus, griseo marginatis; cauda nigrescente, ad basin cinerea, ad apicem large alba, rectricibus intermediis exceptis; pectore cinereo; abdomine imo, ala interna, crissoque albis; lateribus, femoribusque pallide cinereis; rostro pedibusque nigrescenti-fuscis. Long. tot. 12 unc.; rostri, $1\frac{1}{8}$; alae, $7\frac{1}{2}$; caudae, 6; tarsi, 1. Hab. in Nova Cambria australi.

G. *melanotis* Gould. (Pr. Z. S. V. p. 143). G. loro, linea infraoculari, plumisque auricularibus nigris; vertice, nucha, collique lateribus, dorso, uropygio, caudae tectricibus, humerisque pallide cinereis; primariis, secundariisque intus nigrescenti-fuscis, cinereo marginatis; rectricibus caudae nigrescenti-fuscis, ad basin cinereis, ad apicem large albis; gula, pectore, lateribusque cinereis, fusco fasciatis; abdomine imo, femoribus crissoque albis; rostro nigrescente ad apicem, ad basin rufescente; pedibus fuscis. Long. tot. 13 unc.; rostri, $1\frac{3}{8}$; alae, $7\frac{3}{4}$; caudae, $6\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{1}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Tyrannula divaricata, Bonap. (Pr. Z. S. 112). T. cristata, cinereo-olivacea, mento orbitisque albicantibus; dorso alisque olivaceo-rufescentibus; alis acuminatis; remigibus 1mo et 5to subaequalibus; 2do, 3tio, et 4to omnium longissimis; cauda divaricata, corpore longiore; rectricibus quatuor mediis dorso conco-

loribus; duabus hinc inde nigricantibus, extimis duabus utrinque dimidiato-cinereis. Rostro brevissimo nigerrimo. Long. 8"; rostri 8"; al. 6"; caud. 4"; tars. 1". Riuisito Mexic. — Mexico.

Myiagra nitida Gould. (Pr. Z. S. V. p. 142). M. nigrescenti-viridi, fulgore metallico; abdomine tectricibusque caudae inferioribus albis; rostro ad apicem nigro, hoc colore versus basin in coeruleum transeunte; pedibus fusco-nigris. Long. tot. unc. 6½; rostri, ⅝; alae, 3⅛; caudae, 3¼; tarsi, ⅝. Hab. in Nova Cambria australi et terra Van Diemen.

Turdus Grayi Bonap. T. olivaceo-fuscus, subtus flavo-cinnamomeus, gula tantum vix fusciscenti striata; tectricibus alarum inferioribus remigumque margine interno aurantio-cinnamomeis, remigum primo sextam aequante, 4to et 5to omnium longissimis, tertiam et sextam vix superantibus; cauda aequali, duo pollices ultra alas praetensa; rectricibus submucronatis. Long. tot. 8"; rostr. 1"; al. 4" 3"; caud. 3" 3"; tars. 1" 1". Guatimala.

Turdus unicolor Gould. T. cinereus; abdomine medio crissoque albis; humeris subtus rufis, rostro pedibusque livido-fuscis. Long. tot. 9¼ unc.; rostri, 1; alae, 3¼; caudae, 3½; tarsi, 1½. Himalaya.

Orpheus trifasciatus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 27). O. vertice, nucha, et dorso nigrescentibus; uropygio rufo, pallide lavato; alis nigrescentibus; tectricibus nota albescente terminali, fascias tres transversas facientibus; rectricibus caudae duabus intermediis nigrescentibus, reliquis ad apicem pallidioribus; plumis auricularibus striga superciliari, gula, et corpore subtus albis, lateribus notis guttisque fuscis ornatis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. 10⅓ unc.; rostri, 1⅔; alae, 5; caudae, 5½; tarsi, 1¾. Galapagos.

O. melanotus Gould. O. vertice, nucha, dorsoque pallide fuscis; plumis capitis et dorsi ad medium colore saturatiore; alis intense fuscis, singulis plumis ad marginem pallidioribus, secundariis, tectricibusque majoribus nota alba terminali, fascias duas transversas facientibus; caudae rectricibus nigrescenti-fuscis; laterum plumis nota fusca centrali, abdomine albo; rostro pedibusque nigris. Long. tot. 9¼ unc.; rostri, 1¼; alae, 4½; caudae, 4½; tarsi, 1¾. Galapagos.

O. parvulus Gould. ibid. O. vertice, nucha, caudaque intense fuscis, hujus rectricibus ad apicem albo notatis; alis fuscis; secundariis tectricibusque nota alba apicali fascias duas transversas facientibus; loro plumisque auricularibus nigrescentibus, gula, colli lateribus, pectore, et abdomine albescentibus; plumis laterum notis fuscis per medium longitudinaliter excurrentibus. Long. tot. 8½ unc.; rostri, 1; alae, 3⅔; caudae, 3¾; tarsi, 1¼. — Galapagos.

Oreocincla Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. p. 145). Rostrum capitis longitudinem aequans vel superans, subincurvatum, lateraliter compressum, mandibula superiore apice prominente, denticula ab apice longe amota, gonide acuto; rictus setis paucis brevibus instructus; alae mediocres, rigidae, remige 1mo brevissimo, 4to et 5to fere aequalibus et longissimis, cauda subbrevis, quadrata, plumis rigidis; tarsi mediocres, squamis integris;

digiti graciles, posticus praecipue, digitis lateralibus fere aequalibus, interno brevior; plumae sericeae. Typi sunt, *Oreocincl* Novae Hollandiae et *Turdus varius*, Horsf.

O. macrorhyncha Gould. *O.* summo capite, corpore supra olivaceo-brunneis, singulis plumis nigro ad apicem leviter marginatis; cauda alisque olivaceo-brunneis; secundariis badio leviter marginatis; rectricibus duabus externis utrinque ad apicem albis; gula corporeque subtus cervino-albis, singulis plumis, maculis nigris lanceolatis ad apicem notatis; rostro alaeque spuriosa ad apicem nigrescenti-brunneis; pedibus pallide brunneis. Long. tot. unc. $10\frac{1}{2}$; rostri, $1\frac{5}{8}$; alae, $5\frac{1}{2}$; caudae $4\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{1}{4}$. Hab. in Nova Zealandia.

O. parvirostris Gould. *O.* capite, nucha, pectore, lateribus corporeque supra olivaceo-fuscis; singulis plumis versus apicem nitide cervino lavatis, et nigro-fusco late marginatis; primariis obscure fuscis, pogoniis externis nitide cervino marginatis, pogoniis internis ad bases cervino-albis; tectricibus majoribus alarum obscure cervinis; ala spuriosa eodem colore externe marginata; cauda fusca margine subfusco, apiceque cinerescenti-albo; gula, abdomine medio, uropygio, crissoque albis; rostro pedibusque corneo-fuscis. Long. tot. 10 unc.; rostri, 1; alae, $5\frac{1}{2}$; caudae, 4; tarsi, $1\frac{1}{8}$. Himalaya. — Affinis *O. varia* et *O. Whitei*, differt statura minore rostroque perparvo.

Eopsaltria parvula Gould. (Pr. Z. S. V. p. 144). E. vertice auricularibus, nucha dorsoque cinereis; gula pectoreque inferiore griseis; uropygio olivaceo; alis brunneis; cauda brunnea, rectricibus apicibus griseis; pectore corporeque subtus nitide flavis; rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot. unc. $5\frac{1}{2}$; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, 3; caudae, $2\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

E. griseo-gularis Gould. ib. Vertice, auricularibus, nucha dorsoque griseis; gula pectoreque cinerescenti-albis; abdomine, uropygio, tectricibusque superioribus et inferioribus caudae nitide flavis; alis caudaque fuscis; cauda ad extremum apicem alba; rostro pedibusque nigrescenti-brunneis. Long. tot. unc. 6; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $3\frac{1}{4}$; caudae, $2\frac{5}{8}$; tarsi, $\frac{7}{8}$. Hab. in Australia apud flumen Cygnorum.

Sericulus magnirostris Gould. (Pr. Z. S. 145). S. fronte, gula, lateribus, corporeque subtus griseis, singulis plumis brunneo marginatis; macula occipitali nigra et quadrata; linea nigra irregulari in gutture centrali; nucha, dorso, scapulisque cinerescenti-albis, margine brunneo circumdatis; alis, uropygio, caudaque olivaceo-brunneis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. unc. $11\frac{1}{2}$; rostri, $1\frac{1}{4}$; alae, $5\frac{1}{2}$; caudae, $4\frac{3}{4}$; tarsi, $1\frac{1}{2}$. Hab. in terra Van Diemen?

Petroica modesta Gould. (Pr. Z. S. V. p. 147). P. summo capite, corpore supra, alis caudaque rufo-brunneis; gula alba, brunneo lavata; pectore et abdomine centrali coccineo lavatis; abdomine inferiori, crissoque albis; lateribus brunneis; rostro nigrescenti-brunneo; pedibus flavescendo-brunneis. Long. tot. 5 unc.; rostri, $\frac{5}{8}$; al. $2\frac{5}{8}$; caud. 2; tars. $\frac{7}{8}$. Hab. in Nova Hollandia apud oram orientalem.

Sylvicola decurtata Bonap. (Pr. Z. S. 118). S. laete

viridis, subtus, cum tectricibus alarum, albo-virescens; capite colloque supra plumbeis, subtus albis; alis majusculis; remigibus subfuscis, supra externe viridi-marginatis, subtus interne albo-limbatis. Primo dimidium, secundo aequalis duodecimi, 3, 4, 5, 6toque omnium longissimis. Cauda parva, angusta, aequali, rectricibus virescentibus. Long. 4"; rostri, 7"; alae, 2"; caudae, 1" 3"; tarsi, 7". Guatemala.

Dasyornis? brunneus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 150). D. summo capite, corpore supra, alis, lateribus caudaque flavo-brunneis; gutture, lateribus faciei et abdomine medio fusco-albis; rostro ad apicem obscure fusco, ad basin pallidiore; pedibus brunneis. Long. tot. unc. 5 $\frac{3}{4}$; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, 2 $\frac{1}{8}$; caudae, 3; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Australia.

Cysticola ruficeps Gould. (Pr. Z. S. V. p. 150). C. summo capite, nucha, pectore, lateribus, femoribus uropygioque delicate cervinis, hoc colore in fronte et uropygio praevalente; dorso superiore, secundariis caudaque obscure fusco-nigris, singulis plumis marginibus badii circumdatis; gutture et abdomine centrali albis; rostro brunneo; pedibus flavo-brunneis. Long. tot. unc. 4; rostri, $\frac{1}{2}$; alae, 1 $\frac{7}{8}$; caudae, 1 $\frac{3}{8}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Cinclidia Gould. Genus novum. (Pr. Z. S. 137). Rostrum caput longitudine aequans, leviter arcuatum, ad apicem emarginatum, ad latera compressum; nares basales, laterales, in fossa tribus vel quatuor setis ad basem instructa; alae brevissimae, concavae, rotundatae: remigibus 6to et 7mo longioribus; cauda mediocris, rotundata; tarsi majusculi; pedes elongati; digito postico, medio longiore; digitis lateralibus aequalibus et fere usque ad articulum primum conjunctis.

C. punctata. C. summo capite et nucha rufis, singulis plumis stemmatibus albicantibus; loro, plumis super-ocularibus cervino-albis ad apices nigris; auricularibus, lateribus colli, corpore supra, alis caudaque rufo-fuscis; pectore corporeque subtus cervinis, singulis plumis macula fusca apicem versus longitudinaliter notatis; rostro pedibusque pallide fuscis. Long. tot. 6 $\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, 2 $\frac{5}{8}$; caudae, 3; tarsi, 1. — Himalaya.

Psilopus. Gen. nov. Sylviadarum. Rostrum capite brevius, tumidum ad apicem dentatum, tomis rectis; nares basales, laterales, ovaes; rictus setis paucis gracilibus obsitus; alae mediocres, remige primo fere spurio, secundo elongato, tertio, quarto, quintoque longissimis et inter se aequalibus; cauda brevis et aequalis; tarsi laeves, graciles, mediocres; digiti perbreves et debiles, externi utrinque aequales et intermedio adjuncti fere ad articulum primum; ungues incurvi. Typus: *Psilopus albugularis*.

Ps. brevirostris Gould. (Pr. Z. S. 147). P. rostro perbrevis, pallide fusco; striga superciliari flavescente; vertice fusciscenti-cinereo; nucha olivacea; dorso, uropygio tectricibusque caudae olivaceis; plumis auricularibus genisque pallide rufo-brunneis; gula pectoreque albis, olivaceo lavatis, strigisque fuscis longitudinalibus leviter ornatis; abdomine pallide citrino;

rectricibus caudae intermediis duabus fuscis; reliquis ad basin fuscis dein nigrescenti-fasciatis, et interne albo notatis, apicibus pallide fuscis; pedibus nigrescentibus. Long. tot. $3\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $\frac{3}{8}$; alae, 2; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. in Nova Cambria australi.

P. fuscus Gould. ib. *P.* vertice corporeque toto superne saturate fuscis, leviter olivaceo tinctis; rectricibus caudae duabus intermediis fuscis; reliquis ad basin albis, dein nigrescenti-fusco late fasciatis, exinde albo notatis, apicibus pallide fuscis; gula, pectoreque cinereis; abdomine crissoque albis; rostro pedibusque intense fuscis. Long. tot. $3\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{1}{2}$; alae, $2\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Australia.

P. olivaceus Gould. ib. *P.* striga superciliari a basi mandibulae flava; vertice corporeque supra olivaceis; alis fuscis, plumis extus olivaceo-marginatis; rectricibus caudae duabus intermediis fuscis; reliquis ad basin fuscis, dein albo, nigrescenti-fusco, iterumque albo fasciatis, apicibus fuscis; rostro pedibusque fuscis. Long. tot. $4\frac{1}{4}$ unc.; rostri, $\frac{1}{2}$; alae, $2\frac{1}{8}$; caudae, $1\frac{5}{8}$; tarsi, $\frac{5}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi.

P. albogularis Gould. ib. *P.* vertice, plumis auricularibus corporeque supra olivaceo-fuscis; gula alba; pectore corporeque subtus laete citrinis; rectricibus caudae duabus intermediis fuscis, reliquis ad basin fuscis, albo, dein late nigrescenti-fusco fasciatis, et interne ad apicem cervinis; rostro pedibusque intense fuscis. Long. tot. $4\frac{1}{4}$ unc.; rostri, $\frac{1}{2}$; alae, $2\frac{3}{8}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{5}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Calamanthus Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. V. p. 150). Rostrum capite brevius, ad basin tumidum versus apicem laterally compressum, culmine prominente et acuto; nares laterales, magnae, ovales et operculo tectae; rictus sine setis; alae breves, rotundatae, remige 4to longissimo, 3to, 5to, 6to et 7mo inter se aequalibus; cauda perbrevis et rotunda; tarsi mediocres, scutellis indistinctis antice instructi; hallux subelongatus, ungue elongato munitus; digiti laterales inaequales, externus brevior. Typ. *Anthus fuliginosus* Vig. Horsf.

Cincloramphus Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. V. p. 150). Rostrum capite subbrevius; culmen leviter arcuatum, apice emarginato; commissura ad basin subangulata, incurvata per reliquam totam longitudinem; nares laterales, ovales, alae mediocres, rigidae; remige 1mo longo, 2do et 3tio longissimis; cauda subparva, cuneiformis; tarsi robusti antice scutellati; digiti elongati, robusti, praecipue posticus, qui ad basin tarsi est articulatus. Typus: *Megalurus cruralis* Vig. Horsf.

Origma Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. 148). Rostrum, caput quoad longitudinem fere aequans, incurvatum, carinatum, ad apicem denticulatum; nares ovales, laterales, basales operculoque fere tectae; alae mediocres, remige 1mo brevissimo, 4to, 5to, 6to 7moque longissimis et inter se fere aequalibus; cauda mediocris et subrotundata; tarsi mediocres, digiti breves, interno longior externis. Typus: *Saxicola solitaria* Horsf. Vig. Bock-Warbler Lewin tab. XVI.

Pomatorhinus leucogaster Gould. (Pr. Z. S. V. p. 137). P. striga alba super oculari, a rostro per collum excurrente; loro, linea infra oculari auricularibusque nigris; summo capite, corpore supra, alis crissoque olivaceo-fuscis; cauda fusca; lateribus colli, pectoris, corporisque nitide rufis; gula, pectore, abdomineque medio albis; rostro flavo; pedibus plumbaseis. Long. tot. 9 unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, $3\frac{3}{4}$; caudae, 4; tarsi, $1\frac{1}{4}$. — Himalaya.

Malurus longicaudus Gould. Mas. M. summo capite, striga infra aures, dorsoque anteriore obscure cyaneis; nucha, scapulis, dorso uropygioque obscure nigris; gutture pectoreque azureo-nigris; corpore infra cinerescenti-albo, lateribus brunnescentibus; rectricibus caudae obscure cyaneis, pallidioribus apicibus; rostro nigro; tarsis brunneis.

Fem. Corpore supra, alis caudaque rufo leviter tinctis; linea in fronte et super oculos, rostro pedibusque rufescenti-fuscis. Long. tot. unc. 5; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, 2; caudae, $2\frac{7}{8}$; tarsi, 1. Hab. in terra Van Diemen.

Pachycephala xanthoprocta Gould. (Pr. Z. S. V. p. 149). P. vertice, corporeque supra olivaceis, hoc colore ad crissum, et ad marginem remigum alae, rectricumque caudae laetiore; abdomine pallide fusco; crisso flavo; rostro ad apicem nigro, ad basin brunneo; pedibus fuscis. Long. tot. 6 unc.; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, $3\frac{1}{2}$; caudae, 3; tarsi, $\frac{7}{8}$. Hab. in Novae Cambriae australis ora orientali.

P. longirostris Gould. ib. P. vertice, corpore superiore alisque olivaceis, primariis, secundariis, tectricibus rectricibusque caudae ad marginem nitide olivaceo-aureis; gula pectoreque pallide cinerescenti-fuscis; crisso flavo; rostro nigrescenti fusco; pedibus brunneis. Long. tot. 7 unc.; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, 4; caudae, $3\frac{1}{4}$; tarsi, 1. Hab. in Novae Cambriae australis ora orientali.

Scolopacinus Bonap. Acontistes Sundev. (Pr. Z. S. 119). Rostrum longissimum, basi trigonum, gracile, rectissimum; mandibulis aequalibus, superiore apice extimo subcurvato, subhiantibus: nares fossa majuscula, membranula fere omnino clausae. Pedes elongati; tarso digito medio sesquolongiore: digiti omnes a basi fissi, valde inaequales, postico validiore, ungue robusto valde arcuato. Alae maxime rotundatae; remigibus 1mo, 2do, 3tio sensum longioribus; 4to caeteris vix longiore, omnibus latis. Cauda breviuscula, valde gradata.

S. rufiventris B. Sc. brunneo-olivaceus; genis et subtus aurantio-cinnamomeis; gula alba inferne striis nigris; remigibus fuscis; cauda nigra, rectrice extima macula transversali, 2nda macula interna apicali, tertia apice tantum albis. Rostrum fuscum subtus basi album. Long. $4\frac{1}{2}$ 6''; alae, 2''; caudae, $1\frac{1}{2}$ 6''; tarsi, 10'''. Guatimala.

Acanthiza magnirostra Gould. (Pr. Z. S. 146). A. vertice, corpore superiore, alis caudaque olivaceo-fuscis; hac, fronteque rufescentibus; gula pectoreque cinereis; lateribus olivaceis; rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot. $4\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $2\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{7}{8}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

A. uropygialis Gould. ib. A. capite, corpore supra alisque fuscis, leviter olivaceo lavatis; uropygio tectricibusque caudae

laete castaneis; cauda nigrescenti-fusca, late ad apicem albo-notata; gula, pectore abdomineque medio griseis; lateribus crissoque pallide cervinis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. $3\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, 2; caudae, $1\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

A. diemenensis Gould. ib. *A. fronte* rufo-brunneo, notis semilunaribus cervinis, fuscoque adpersis, corpore superiore alisque intense olivaceo-fuscis; tectricibus caudae fuscis, castaneo lavatis; rectricibus olivaceis, nigrescenti-fusco fasciatis; genis, gula, pectoreque cinereis, irregulariter fusco adpersis; abdomine, crissoque cinerescenti-albis rufo tinctis, hoc colore in crisso lateribusque praevalente; rostro pedibusque pallide brunneis. Long. tot. 4 unc.; rostri, $\frac{9}{16}$; alae, $2\frac{1}{4}$; caudae, 2; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in terra Van Diemen.

A. lineata Gould. ib. *A. vertice* fusco-olivaceo, albo delicate striato; dorso, alis caudaque olivaceis; hac apicem versus nigrescente fasciata, ad apicem cinerescens-fusca; gula, pectoreque cinereis, olivaceo lavatis et irregulariter fusco guttatis; rostro pedibusque fuscis. Long. tot. $3\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{3}{8}$; alae, 2; caudae, $1\frac{5}{8}$; tarsi, $\frac{5}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Sericornis Gould. (Pr. Z. S. 133). Rostrum robustum, rectum, caputque quoad longitudinem fere aequans, apice compressum, indentatum. Nares basales, laterales, ovales, et operculo tectae. Alae mediocres, rotundatae; remige primo perbrevis, quarto, quinto sextoque longissimis et inter se fere aequalibus. Cauda mediocris et aequalis. Tarsi elongati, digitus posticus cum ungue validus, digitum intermedium fere aequans; digitis externis aequalibus. Plumae molles et sericeae. Typus: *Acanthiza frontalis* Vig. et Horsf.

S. humilis Gould. *S. loro* nigrescenti-fusco, et super hoc striga indistincta alba; vertice, corpore supra, alis caudaque olivaceis, rubro lavatis; ala spuria nigrescente; plumis singulis albo marginatis; gula cinerea fusco guttata; pectore abdomineque medio, fuscescenti-flavis, illo fusco indistincte guttato; lateribus castaneis; rostro nigrescente; pedibus fuscis. Long. tot. 5 unc.; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, $2\frac{1}{2}$; caudae, $2\frac{1}{8}$; tarsi, 1. Hab. Terra Van Diemen.

S. citreogularis Gould. Mas. *S. loro*, annulo circumoculari plumisque auricularibus intense nigrescenti-fuscis; linea flavescens a naribus super oculos excurrente; vertice, corporeque supra, rectricibus secundariisque alarum, caudaque rufo-brunneis; primariis ad marginem externum olivaceis; ala spuria nigrescente; gula citrina; pectore lateribusque olivaceo-fuscis; abdomine medio albo; rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot. $5\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $2\frac{3}{4}$; caudae, $2\frac{3}{8}$; tarsi, $1\frac{1}{2}$. Hab. Nova Cambria australi.

S. parvulus Gould. (Pr. Z. S. 134). *S. loro* pallide fusco, et super hoc striga cinerea; vertice, corpore supra, alis caudaque olivaceo-fuscis, rubro lavatis; ala spuria nigrescente, plumis singulis albo marginatis; pectore abdomineque medio citrinis, lateribus olivaceo-fuscis; rostro nigrescente; pedibus luteis. Long.

tot. 4 unc.; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, $1\frac{7}{8}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab in ora orientali Novae Hollandiae.

Ephthianura Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. 148). Rostrum capite brevius, fere rectum, lateraliter compressum, ad apicem indentatum; nares basales, lineares, membrana tectae; alae elongatae, remige 1mo spurioso, 2do longo, 3to et 4to longissimis et inter se aequalibus; tertiariis longis; cauda brevis et truncata; tarsi integri, mediocres, graciles; digiti graciles, posticus cum ungue medio brevior; digitus internus externo brevior. Typus: *Acanthiza albifrons* Jard. et Selb.

E. aurifrons. *E.* capite, tectricibus superioribus caudae, lateribus nuchae, pectore corporeque nitide aurantiacis, hoc colore in fronte et centrali abdomine praevalente; dorso olivaceo; alis brunneis olivaceo marginatis; cauda obscure fusca, singulis rectricibus, duabus intermediis exceptis, ad apicem interne albo maculatis; mento et gula centrali nigris; rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot. unc. 4; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, $2\frac{1}{2}$; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Acanthorhynchus Gould. (Pr. Z. S. 24). Rostrum elongatum, gracile et acutum, ad latera compressum; tomis incurvatis; culmine acuto et elevato. Nares basales elongatae et operculo tectae. Lingua ut in Gen. *Meliphaga*. Alae mediocres et sub-rotundatae, remigibus primis et quintis fere aequalibus; tertiis et quartis intense aequalibus et longissimis. Cauda mediocris, et paululum furcata. Tarsi elongati, fortes, halluce digito medio longiore et robustiore; digito externo medium superante. Ungues curvati. Typus: *Certhia tenuirostris* auct.

A. superciliosus. *A.* summo capite, corpore superiore, alis caudaeque rectricibus sex intermediis cinerascenti-fuscis, rectricibus reliquis nigris albo ample terminatis; loro plumisque auricularibus nigrescenti-fuscis; gutture summo, genis lineaque superciliari albis; gutture colloque nitide et pallide castaneis; illius colore vitta alba infra circumdato, cui vitta nigra accedit; abdomine crissoque pallide cinerascenti-fuscis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. $5\frac{1}{4}$ unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, $2\frac{1}{2}$; caudae, $2\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in terra Van Diemen.

A. dubius. *A.* summo capite intense cinerascenti-viridi; loro, plumis auricularibus, lunula in utroque pectoris latere, rectricibusque caudae sex intermediis nigrescenti-fuscis, rectricibus reliquis nigris ad apicem albis; nucha obscure rufa; secundariis, tectricibus alae majoribus et uropygio cinereis; gula pectoreque cinerascenti-albis, illa rufo tincta; abdomine crissoque nitide at pallide castaneis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. $5\frac{1}{2}$ unc.; rostri, 1; alae, $2\frac{3}{8}$; caudae, $2\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$.

Acanthogenys Gould. Genus novum. Rostrum caput aequans, compressum, leviter arcuatum, ad apicem acutum naribus subbasalibus, mandibulae superioris tomis ad apicem indentatis, et delicate serratis; plaga nuda a basi mandibulae infra oculos excurrente; genis infra plagam spinis subrigidis tectis; alae mediocres; remige primo brevissimo, tertio, quarto et quinto aequalibus ceterosque excellentibus; cauda mediocris subaequalis;

pedes validi; digito postico forti, digitumque intermedium excel-lente; externo ad intermedium basaliter adjuncto; unguibus incur-vatis. Anthochaerae generi proximum, differt cauda aequali, plaga faciali nuda genisque spinosis.

A. rufogularis (Pr. Z. S. 153). A. capite superiore dorso alisque fuscis, plumis ad marginem pallidioribus; uropygio, tectricibusque caudae albis, in medio fusco tinctis; striga post oculos, et ad latera colli nigrescente; super strigam lateralem colli, linea albescente, fusco adspersa; setis genarum albis, et infra ad basin mandibulae inferioris linea plumarum, albo nigroque fasciatarum; gula pectoreque summo pallide rufis; corpore sub-tus sordide albo, plumis fusco notatis; cauda nigrescenti-fusca, apice albo; plaga fasciali nuda, rostroque basi aurantiacis; rostri apice pedibusque nigris. Long. tot. $9\frac{1}{4}$ unc.; rostri, $1\frac{1}{8}$; alae, $4\frac{1}{2}$; caudae, $4\frac{1}{2}$; tarsi, 1. Hab. in Nova Cambria australi.

Anthochaera lunulata Gould. (Pr. Z. S. V. p. 153). A. summo capite, nucha dorsoque anteriore olivaceo-brunneis; dorso inferiore uropygioque olivaceo-brunneis, singulis plumis, stemmatibus albis; tectricibus superioribus caudae olivaceo-brun-neis, ad apices albis; primariis brunneis; secundariis tertiariisque brunneis, cinereo marginatis; rectricibus caudae intermediis dua-bus, cinereo-fuscis; reliquis obscure fuscis, apicibus albis; plumis nuchae lateralibus, elongatis, acutis, cinereis; gula et nucha an-teriore, pectore corporeque infra cinereo-brunneis; macula obli-qua nivea ad latera; rostro nigrescenti-fusco; pedibus rufo-brun-neis. Long. tot. unc. 12; rostri, $1\frac{3}{8}$; caudae, $6\frac{1}{2}$; alae, $5\frac{1}{4}$; tarsi, $1\frac{1}{2}$. Hab. in Australia, apud Flumen Cygnorum.

Glyciphila? ocularis Gould. G. summo capite, corpore supra, alis caudaque obscure olivaceo-brunneis, hoc colore ad uropygium et rectrices caudales in luteum transeunte; pone oculos plumis paucis parvis nitide brunneo-flavis; gula pectoreque cine-reo-fuscis; abdomine crissoque olivaceo-cinereis; rostro pedibus-que nigro-brunneis. Long. tot. unc. $5\frac{1}{4}$; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, $2\frac{3}{4}$; cau-dae, $2\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in terra Van Diemen.

Meliphaga sericeola Gould. (Pr. Z. S. V. p. 152). M. summo capite, loro, orbitis guttureque nigris; fascia indi-structa super oculos et in fronte alba; genis, plumis capillaribus albis; nucha, dorso, uropygio, nigro-fuscis, singulis plumis brun-nescenti-albo marginatis; hoc colore ad nucham praevalente; alis caudaque nigro-fuscis; primariis, secundariis flavis; rectricibus ad partes basales flavo-marginatis et ad apices cinereo-albis, dua-bus intermediis exceptis; pectore corporeque subtus albis, singu-lis plumis, lineis centralibus fusco-nigris; rostro nigro; pedibus obscure brunneis. Long. tot. unc. $5\frac{1}{4}$; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, $2\frac{1}{2}$; cau-dae, $2\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Australia. M. sericeae affinis at minor.

M. inornata Gould. ib. M. summo capite, corpore supra, alis caudaque obscure olivaceo-brunneis; primariis, secundariis et rectricibus caudae, duabus intermediis exceptis, ad bases flavo marginatis; gutture pectoreque superiore brunneis; abdomine centrali brunnescenti-albo; lateribus brunneis; rostro pedibusque

brunneo-nigris. Long. tot. unc. $5\frac{1}{2}$; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $2\frac{1}{2}$; caudae, $2\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{2}{3}$. Hab. in terra Van Diemen.

Symmorphus Gould. (Pr. Z. S. 145.) incertae sedis. Rostrum subbreve, tumidum; mandibula superiore ad apicem leviter emarginata; culmine commissuraque subarcuatis; nares basales, ovaes et plumis frontalibus fere occultatae; alae mediores, remige 1mo brevior, 2do per dimidium; 3tio, 4to et 5to longissimis et inter se fere aequalibus; cauda mediocris, rectrice externa utrinque per partem quartam caeteris brevior; tarsi et pedes mediocres, illi antice scutellati; digito postico cum ungue, medio brevior; digitis lateralibus inaequalibus, interno brevissimo.

S. leucopygus Gould. *S. loro* nigrescenti-brunneo; linea supra-oculari cervino-alba; summo capite, nucha dorsoque intense rufo-fuscis; humeris, tectricibus majoribus alarum ad apices, uropygio, gula corporeque subtus albis, badio pallide lavatis; primariis secundariisque nigrescenti-brunneis, badio obscure marginatis; rectricibus caudae quatuor mediis brunneis, ad apices cinerescenti-albis, tribus externis utrinque ad basin per dimidiam partem brunneis, per reliquam partem albis; rostro pedibusque nigris. Long. tot. unc. $7\frac{3}{4}$; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, $3\frac{1}{2}$; caudae, $3\frac{1}{2}$; tarsi, 1. Hab. in Nova Cambria australi.

Spiza versicolor Bonap. *S. violaceo-cyanea* purpureoque varia: uropygio cyaneo: capistro nigro: alis caudaque fuscis. Temascaltepec.

Icterus Parisorum Bonap. (Pr. Z. S. 110). *I. niger*, tergo, abdomine, tectricibus minoribus alarum, rectricibusque lateralibus a basi ad medium flavo-olivaceis; tectricibus alarum majoribus remigibusque secundariis apice albis. Calandria Mexic. Mexico.

Dendrocitta rufigaster Gould. (Pr. Z. S. V. p. 80). *D. facie*, summo capite, plumis auricularibus, gutture pectoreque brunneis, hoc colore gradatim in rufo-brunneum transeunte apud abdomen; lateribus crissoque nitide castaneis; occipite et nucha cinerescenti-albis, dorso rufo-brunneo; uropygio tectricibusque caudae superioribus cinerescens; rectricibus caudae duabus intermediis nigrescenti-griseis, ad apicem nigris, utrisque proximis nigris, ad basin nigrescenti-griseis; rectricibus caeteris nigris; alis nigerrimis, primariis omnibus ad basin (externis exceptis) albis, qui color notam conspicuam in alis mediis efficit; femoribus griseis; rostro nigro; pedibus brunneis. Long. tot. $16\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, $7\frac{1}{2}$; caudae, $11\frac{1}{2}$; tarsi, $1\frac{1}{3}$. Hab. India.

Corvus nobilis Gould. (Pr. Z. S. 79). *C. corpore* toto nitide nigro, non sine fulgore purpureo ac viridi praecipue ad alas ac scapulas, necnon ad gulam pectusque, ubi plumae sunt elongatae et lanceolatae; cauda lata et gradata; rostro pedibusque nigris. Long. tot. 25 unc.; rostri, $3\frac{1}{4}$; alae, 18; caudae, 11; tarsi, 3. Hab. Mexico.

Entomophila Gould. (Pr. Z. S. 154). Rostrum fere capitis longitudinem aequans, ad basin latiusculum, dein compressum, et ad apicem acutum; mandibulae superioris tomis arcuatis, et apicem versus leviter indentatis; nares basales, ovaes, in membrana positae, et operculo tectae; alae longiusculae; remige

primo spurio, secundo tertium fere aequante, hoc longissimo; cauda brevis, subquadrata; tarsi breves, et subdebiles; digito posteriore brevi, forti; digitis externis haud aequalibus, interno paululum brevioribus.

E. picta Mas. *E.* capite, genis corporeque supra nigris; plumis auricularibus postice albo fimbriatis; alis nigris, primariis secundariisque extus nitide flavis; caudae rectricibus nigris, extus flavo marginatis, omnibusque (duabus internis exceptis) plus minusve extus albo ad apicem notatis; gula corporeque subtus albis, hoc ad latera notis subfuscis longitudinalibus sparse ornato; rostro flavescente; pedibus nigrescentibus.

Fem. vel mas junior? Differt partibus fuscis, quae in mare adulto nigrae; in caeteris mari simillima, flavo colore minus nitido, rostroque ad apicem fusco. Long. tot. $5\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $3\frac{5}{8}$; caudae, $2\frac{3}{8}$; tarsi, $\frac{5}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Plectorhyncha Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. 153). Rostrum capite brevius, leviter arcuatum, fere conicum et acutum, naribus basalibus, operculo tectis; mandibula superiore obsolete ad apicem indentata; alae mediocres, remige primo brevissimo, tertio quartoque longissimis; cauda mediocris et aequalis: tarsi validi; digito postico cum ungue forti, et digitum intermedium anticum eccellente; digitis lateralibus inaequalibus, externo longiore, et intermedio basaliter conjuncto.

P. lanceolata. *P.* vertice, plumis auricularibus nuchaeque albo fuscoque variegatis; gula corporeque subtus cinerescens; albis; plumis pectoralibus sublanceolatis et albis; corpore toto, caudaeque superne pallide fuscis; rostro fusciscenti-corneo; pedibus nigris. Long. tot. 9 unc.; rostri, 1; alae, $4\frac{1}{2}$; caudae, $4\frac{1}{4}$; tarsi, 1. Hab. in Nova Cambria australi.

Geospiza Gould. (Pr. Z. S. 5). Corporis figura brevissima, robusta. Rostrum magnum, robustum, validum, altitudine longitudinem praestante; culmine arcuato, capitis verticem superante; apice sine denticulo, lateribus tumidis. Naribus basalibus, semitectis plumis frontalibus. Mandibulae superioris tomis medium versus sinum exhibentibus, ad mandibulae inferioris processum recipiendum. Mandibula inferior basi lata, hoc infra oculos tendente. Alae mediocres remige primo paulo brevior secundo, hoc longissimo. Cauda brevissima, aequalis. Tarsi magni, validi, digito postico cum ungue robusto et digito intermedio brevioribus. Digitis externis inter se aequalibus, digito postico brevioribus. Color in maribus niger, in fem. fuscus. Insularum Galapagos incolae.

G. magnirostris. (Spec. typ.) *G.* fuliginosa, crisso cinerascens-albo; rostro nigro brunnescente lavato; pedibus nigris. Long. tot. 6 unc.; alae, $3\frac{1}{2}$; caudae, 2; tarsi, 1; rostri, $\frac{7}{8}$; alt. rostr. 1.

Fem. vel Mas. jun.; corpore intense fusco, singulis plumis olivaceo cinctis; abdomine pallidiore; crisso cinerascens-albo; pedibus et rostro, ut in mare adulto.

G. strenua. *G.* fuliginosa, crisso albo, rostro fusco et nigro tincto; pedibus nigris. Long. tot. $5\frac{1}{2}$ unc.; alae, 3; caudae, $1\frac{3}{8}$; tarsi, $\frac{3}{4}$; rostri, $\frac{3}{8}$; alt. rostr. $\frac{3}{8}$.

Fem. Summo corpore fusco, singulis plumis nec non illis alarum caudaeque pallide cinerascanti-olivaceo cinctis; gula et pectore fuscis; abdomine lateribus et crisso pallide cinerascanti-fuscis; rostro brunnescenti.

G. fortis. *G. intense fuliginosa*, crisso albo; rostro rufescenti-brunneo, tincto nigro; pedibus nigris.

Fem. (vel Mas. jun.) Corpore supra, pectore et gutture intense fuscis, singulis plumis cinerascanti-olivaceo marginatis; abdomine crissoque pallide cinerascanti-brunneis; rostro rufescenti-fusco, apice flavescente; pedibus ut in mare.

G. nebulosa. *G. summo capite et corpore nigrescenti-fuscis*; singulis plumis cinerascanti-olivaceo marginatis; corpore subtus pallidiore, abdomine imo crissoque cinerascantibus; rostro et pedibus intense fuscis. Long. tot. 5 unc.; alae, $2\frac{3}{4}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$; rostri, $\frac{5}{8}$; alt. rostr. $\frac{1}{2}$.

G. fuliginosa. *G. intense fuliginosa*, crisso albo, rostro fusco; pedibus nigrescenti-fuscis. Long. tot. $4\frac{1}{2}$ unc.; alae, $2\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$; caudae, $1\frac{5}{8}$; rostri, $1\frac{1}{2}$; alt. rostri, $\frac{3}{8}$.

Fem. Summo corpore, alis caudaeque intense fuscis; singulis plumis cinerascanti-ferrugineo marginatis; corpore infra cinereo, singulis plumis medium versus obscurioribus; rostro brunneo; pedibus nigrescenti-brunneis.

G. denti-rostris. (Fem. Mas. ignotus.) (Pr. Z. S. 6). Mandibulae superioris margine in dentem producto; vertice corporeque supra fuscis; singulis plumis medium versus obscurioribus; secundariis tectricibusque alarum ad marginem stramineis; gutture et pectore pallide brunneis, singulis plumis medium versus obscurioribus, imo abdomine crissoque cinerascanti-albis; rostro rufo-fusco; pedibus obscure plumbeis. Long. tot. $4\frac{3}{4}$; alae, $2\frac{3}{8}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; rostri, $\frac{1}{2}$; alt. rostr. $\frac{3}{8}$.

G. parvula (Mas.). *G. capite, gutture et dorso fuliginosis*; uropygio cinerascanti-olivaceo; cauda et alis nigrescenti-brunneis; singulis plumis caudae et alarum cinereo-marginatis; lateribus olivaceis fusco guttatis; abdomine et crisso albis, rostro et pedibus nigrescenti-brunneis. Long. tot. 4 unc.; alae, $2\frac{3}{8}$; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$; rostri, $\frac{3}{8}$; alt. rostr. $\frac{5}{8}$.

Fem. Summo capite et dorso cinerascanti-brunneis, gutture, pectore, abdomine crissoque pallide cinereis, stramineo tinctis.

G. dubia (Fem. Mas. ignot.). *G. summo capite et corpore supra fuscis*, singulis plumis cinerascanti-olivaceo marginatis; striga superciliari, genis, gutture corporeque infra cinerascanti-olivaceis, singulis plumis nota centrali fusca; alis caudaeque brunneis, singulis plumis olivaceo-cinereo marginatis; rostro sordide albo, pedibus obscure fuscis. Long. tot. $3\frac{3}{8}$ unc., alae, $2\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{5}{8}$; tarsi, $\frac{7}{8}$; rostri, $\frac{5}{8}$; altitud. rostri, $\frac{3}{8}$.

Camarhynchus (subgenus). *Camarhynchus* differt a genere *Geospiza* rostro debiliore, margine mandibulae superioris minus indentato; culmine minus elevato in frontem et plus arcuato; lateribus tumidioribus; mandibula inferiore minus in genas tendente. Insularum Galapagos incolae.

C. p sittacula (Spec. typ.). *C. summo capite corporeque*

superiore fuscis; alis caudaque obscurioribus; gutture corporeque inferiore cinerascanti-albis, stramineo tinctis; rostro pallide flavescenti-fusco; pedibus fuscis. Long. tot. $4\frac{3}{4}$ unc.; alae, $2\frac{3}{4}$; caudae, $1\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{7}{8}$; rostri, $\frac{1}{2}$; alt. rostri, $\frac{1}{2}$.

C. crassirostris Fem. *C.* corpore superiore intense brunneo, singulis plumis cinerascanti-olivaceo marginatis; gutture pectoreque cinerascanti-olivaceis, singulis in medio plumis obscurioribus; abdomine, lateribus crissoque cinereis tinctis stramineo. Long. tot. $5\frac{1}{2}$ unc.; alae, $3\frac{3}{4}$; caudae, 2; tarsi, $1\frac{1}{8}$; rostri, $\frac{1}{2}$; alt. rostri, $\frac{1}{2}$.

Cactornis (subgenus) (Pr. Z. S. 6). *Cactornis* differt a genere *Geospiza* rostro elongato, acuto, compresso, longitudine altitudinem eccellente; mandibulae superioris margine vix indentato; naribus basalibus et vix tectis; tarsis brevioribus, unguibus majoribus et plus curvatis.

C. scandens. (Spec. typ.) *C.* intense fuliginosa, crisso albo; rostro et pedibus nigrescenti-brunneis. Long. tot. 5 unc.; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $2\frac{5}{8}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$.

Fem. vel Mas. jun. Corpore superiore, gutture pectoreque intense brunneis, singulis plumis pallidius marginatis; abdomine crissoque cinereis, stramineo tinctis; rostro pallide fusco; pedibus nigrescenti-fuscis.

C. assimilis (Mas. jun?) *C.* corpore supra fuliginoso, nec non gutture abdomineque, illorum plumis cinereo marginatis; rostro pallide rufescenti-brunneo; pedibus nigrescenti-brunneis. Long. tot. $5\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $2\frac{3}{4}$; caudae, $1\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$.

Certhidea (subgenus). *C.* differt a genere *Geospiza* rostro graciliore et acutiore; naribus basalibus et non tectis; mandibulae superioris margine recto; tarsis longioribus et gracilioribus.

C. olivacea. *C.* summo capite, corpore superiore, alis caudaque olivaceo-brunneis; gutture et corpore infra cinereis; rostro pedibusque pallide brunneis. Long. tot. 4 unc.; rostri, $\frac{1}{2}$; alae, 2; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Insulae Galapagos.

Sphenostoma Gould. Gen. nov. (Pr. Z. S. V. p. 149). Rostrum breve, durum, lateraliter compressum et cuneiforme; nares basales, rotundatae, operatae; rictus rectus; mandibula superiore haud dentata; setis delicatis ad basin sparsis; alae perbreves et rotundatae, remigibus quarto, quinto et sexto fere aequalibus et longissimis; cauda elongata et gradata; tarsi mediocres, robusti, antice squamis tecti, postice laeves; pedes breves; digito postico valido, digitis externis inaequalibus, interno brevissimo. *Struthideae* proximum.

S. cristatum. *S.* capite plumis angustis acutis, antice curvatis cristato; corpore supra et subtus omnino fusco; abdomine medio cinerescanti-albo; cauda fusca; rectricibus tribus utrinque ad apicem albis; rostro nigrescente; pedibus plumbeis. Long. tot. 8 unc.; rostri, $\frac{1}{2}$; alae, $3\frac{1}{8}$; caudae, $4\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{7}{8}$. Hab. in Nova Cambria australi, apud oram orientalem.

Guiraca magnirostris, Bonap. (Pr. Z. S. 120). *G.* griseo-flavida, nigro maculata; subtus cum superciliis flavis: crisso albo; remigibus rectricibusque fuscis: tectricibus alarum majoribus scapularibusque apice albo notatis. Brasilia. Ignotae speciei femina.

Cardinalis Virginianus Bonap. (Pr. Z. S. 111). C. ruber; gula et capistro nigris; cauda valde rotundata; rostro conico, subdentato. Hab. per totam Americ. septemtr.

C. phoeniceus Gould. *C. ruberrimus*; capistro tenuissimo nigricante; cauda rotundata; rostro robustissimo conico-turgescenti sinuato-dentato. — Hondurasbay.

C. sinuatus Bonap. C. rubro cinereoque varius; gula et capistro coccineis; cauda vix rotundata; rostro compresso turgido sinuato. Im Westen Mexiko's.

Carduelis Burtoni Gould. (Pr. Z. S. 90). C. fronte et regione circum-oculari pulchre roseis; vertice genisque nigris; corpore obscure fuscescenti-roseo, alis externe nigris, singulis plumis plus minusve albo ad apicem notatis; ala spuria alba; rectricibus caudae nigris; duabus intermediis ad apicem albis, duabus proximis longius ad apicem albis, reliquis alba nota interne ad basin excurrente ornatis; rostro pedibusque pallide fuscis. Long. tot. 6 $\frac{1}{4}$ unc.; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, 3 $\frac{7}{8}$; caudae, 2 $\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. Himalaya.

Fringilla sanguinea Gould. (Pr. Z. S. 127). F. brunnea, summo capite nigro; remigum pogoniis externis sanguineo lavatis; primariis nigris, secundariis nigris, ad apices albis; tectricibus caudae et regione circum-oculari sanguineo lavatis; rectricibus caudae duabus intermediis nigris, reliquis plus minusve albo notatis, externa utrinque fere alba; rostro flavo; pedibus fuscis. Long. tot. 6 $\frac{3}{4}$ unc.; alae, 4; caudae, 2 $\frac{1}{2}$; rostri, $\frac{2}{3}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. Erzerum.

Alauda penicillata Gould. (Pr. Z. S. 126). A. fronte, mento, auricularibus, abdomine, pectore alisque subtus albis; fascia super frontem, penicillis capitis lateralibus et linea super nares late per genas excurrente, colloque anteriori nigris; summo capite et nucha vinaceo-cinereis; corpore supra cinereo; remigibus alarum cinereo-fuscis, remige primo externe albo; rectricibus caudae duabus intermediis fuscis, ad marginem pallidioribus; reliquis nigrescentibus, externa utrinque albo marginata, rostro pedibusque nigris. Long. tot. unc. 8; alae, 4 $\frac{1}{2}$; caudae, 3; rostri, $\frac{4}{5}$; tarsi, 1. Hab. Erzerum.

Aegialitis? canus Gould. A. fronte, linea supra-oculari, genis, gula corporeque subtus albis; summo capite corporeque supra cinereo-fuscis; primariis obscure brunneis, stematicibus albis; cauda brunnea, singulis plumis marginibus albis; rostro pedibusque nigris, olivaceo tinctis. Long. tot. unc. 7 $\frac{1}{4}$; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, 3 $\frac{7}{8}$; caudae, 2 $\frac{1}{4}$; tarsi, 1 $\frac{1}{2}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Sittella pileata Gould. (Pr. Z. S. V. p. 151). S. fronte, striga superciliari, gula, pectore abdomineque medio albis; vertice nigro; plumis auricularibus, nucha dorsoque cinerescenti-fuscis; hujus linea saturatiore per medias plumas excurrente; uropygio albo; tectricibus caudae crissoque cinerescenti-fuscis, fusco alboque variegatis; cauda nigra ad apicem alba; alis nigrescenti-fuscis, nota rufa centrali; lateribus et ventre cinerescenti-fuscis; rostro ad basin flavo, ad apicem nigro; pedibus flavis. Long. tot. 4 $\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{7}{8}$; alae, 3 $\frac{1}{2}$; caudae, 1 $\frac{5}{8}$; tarsi, $\frac{5}{8}$. Hab. in Australia, apud Flumen Cygnorum.

S. melanocephala Gould. (Pr. Z. S. 152). *S. vertice*, occipite plumisque auricularibus nigris; dorso plumisque scapularibus cinerescenti-fuscis; alis nigris, primariis secundariisque plus minusve rufo notatis; uropygio tectricibusque caudae albis; cauda nigra, ad apicem albo notata; crisso albo, fusco fasciato; palpebris aurantiacis; rostro ad basin carneo, ad apicem nigro; pedibus flavis. Long. tot. $4\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{3}{4}$; alae, $3\frac{1}{2}$; caudae, $1\frac{5}{8}$; tarsi, $\frac{5}{8}$. Hab. in Australia, apud Flumen Cygnorum.

S. leucocephala Gould. ib. *S. capite*, gula corporeque subtus albescentibus, hoc lineis cinereo-fuscis longitudinalibus notato; corpore supra cinerescenti-fusco; uropygio albo; cauda fusca, albo terminata; alis fuscis; primariis secundariisque late rufo fasciatis; crisso fusco, albo variegato; rostro aurantiaco, ad apicem fusco; pedibus flavis. Long. tot. $4\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, $2\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. in Australia.

Pardalotus quadragintus Gould. (Pr. Z. S. p. 148). *P. vertice* corporeque supra olivaceis, plumis fusco leviter marginatis; alis nigrescentibus, remigibus (primo et secundo exceptis), ad apicem albis; genis crissoque flavescenti-olivaceis; corpore subtus cinerescenti-albo; rostro intense fusco; pedibus fuscis. Long. tot. $3\frac{3}{4}$ unc.; rostri, $\frac{3}{8}$; alae, $2\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in terra Van Diemen. „Forty-spot a Colonis propter macularum albarum multitudinem dictus.

P. melanocephalus Gould. (Pr. Z. S. 149). *P. vertice*, loro, plumisque auricularibus nigris; striga superciliari aurantiaca oriente, alba desinente, genis collique lateribus albis; nucha dorsoque cinerescenti-olivaceis; rectricibus caudae fuscescenti-cervinis; cauda nigra, ad apicem alba; alis nigrescenti-fuscis; remigibus tertio, quarto, quinto, sexto, septimoque albis; secundariis albo marginatis atque terminatis; linea alba oblique per humeros abducta; ala spuria coccineo terminata; linea gutturali, pectore abdomineque medio laete flavis; crisso cervino; rostro nigro; pedibus fuscis. Long. tot. 4 unc.; rostri, $\frac{3}{8}$; alae, $2\frac{1}{2}$; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi, apud oram orientalem.

P. rubricatus Gould. ib. *P. fascia* frontali angusta sordide alba; vertice et occipite nigris, albo guttatis; nucha, dorso, uropygio tectricibusque alarum cinereis; alis intense fuscis; ala spuria, primariis ad basin, secundariisque ad marginem externum laete aurantiacis; nota flammea ante oculos; striga super-oculari cervina; tectricibus caudae olivaceis; cauda intense fusca, ad apicem alba; gula abdomineque cinereis; pectore flavo; mandibula superiore fusca, inferiore cinerea; pedibus fuscis. Long. tot. 4 unc.; rostri, $\frac{5}{8}$; alae, $2\frac{1}{2}$; caudae, $1\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Australia.

P. affinis Gould. (Pr. Z. S. p. 25). *P. fronte* nigra; vertice nigro, singulis plumis linea centrali alba; linea superciliari flava ad basin rostri oriente, cum linea alba conjuncta occiput versus tendente; nucha dorsoque sordide olivaceo-fuscis; uropygio tectricibusque caudae flavide olivaceo-fuscis; alis nigris, primariis nota alba apicali ornatis, pluma tertia albescente ad marginem externum; secundariis albo rufoque marginatis; ala spuria ad apicem flava; caudae rectricibus nigrescenti-fuscis transversim

albo ad apicem notatis; auriculis genisque cinerescentibus; gula flava, pectore abdomineque mediis pallide flavis; albo internixtis; lateribus flavide olivaceo-fuscis; rostro nigro; pedibus fuscis. Long. tot. $3\frac{1}{4}$ "; rostri, $\frac{3}{8}$ "; alae, $2\frac{3}{8}$ "; caudae, $1\frac{1}{4}$ "; tarsi, $\frac{13}{16}$. Hab. in terra Van Diemen.

Pipra striolata Bonap. (Pr. Z. S. 122). P. olivacea, subtus rufa, albo striata; pileo cristato coccineo. Brasilia. (P. strigilatae Pr. Max. proxima.)

P. elegantissima Bonap. (Pr. Z. S. p. 112). P. purpureo-nigra; fronte castaneo-fusca; vertice, nucha et cervice pulchre cyaneis; pectore abdomineque fulvo-aeruginosis. Mexico.

P. linearis Bonap. ib. P. capite, alis caudaque nigris; vertice cristato coccineo; rectricibus duabus intermediis lineari-acuminatis, nigris, caeteris triplo longioribus.

Mas. Niger; dorso coeruleo. Fem. Olivacea. Mexico.

Tanagra Darwinii Bonap. (Pr. Z. S. 121). T. olivacea, capite, collo alarumque tectricibus coeruleis; subtus ex toto cum uropygio flavis, femoribus cinereis. Chili.

Aglaiia nigro-cincta Bonap. (Pr. Z. S. 121). A. viridicyanea, dorso, pectore remigibus caudaque nigris, abdomine albo. Brasilia.

Euphonia hirundinacea Bonap. (Pr. Z. S. 117). E. olivaceo-flava, fronte et subtus flava, vertice genisque nigro-chalybeis, remigibus rectricibusque nigris, margine externo olivaceis; rostro nigro, valde uncinato, subhirundineo. Guatemala.

Arremon giganteus Bonap. (Pr. Z. S. p. 117). A. laete olivaceus; rostro robustissimo, nigerrimo, capite nigro; gula media alba (unde nigro-cincta); pectore abdomineque plumbeo, crisso flavo, aeruginoso; remigibus nigris, cauda olivacea, valde rotundata. Long. tot. $9'' 6'''$; rostr. $1''$; al. $4'' 6'''$; caud. $4'' 6'''$; tars. $1''$. Guatemala.

Icteria Velasquezi Bonap. (Pr. Z. S. 117). I. viridis; pectore flavo-aurantiaco; rostro nigricante, mandibula albicante. Guatemala.

I. viridis Bonap. (*Pipra polyglotta* Wils. *Icteria dumicola* Vieil.) I. viridis, pectore flavo; rostro ex toto nigro.

2. Hiantes.

Brachypus plumifera Gould. (Pr. Z. S. V. p. 137). B. capite, pectore, lateribus colli gulaque nitide viridescenti-nigris; corpore alisque olivaceo-flavis; primariis fuscis, olivaceo-flavo marginatis; secundariis, pogoniis internis fuscis; cauda fusca; rostro pedibusque nigris. Long. tot. $7\frac{1}{2}$ unc.; rostri, $\frac{3}{4}$ "; alae, $3\frac{1}{2}$ "; caudae, $3\frac{1}{2}$ "; tarsi, $\frac{1}{2}$. — Himalaya.

Caprimulgus monticolus Franklin*) (Burton in Pr. Z. S. V. p. 89). Femina? C. pallidior mari: remigibus macula notatis rufa, ubi mas gaudet alba; jugulo rufo tincto; cauda rufa, nigro fasciata et inspersa, rufo rectrices apud exteriores domi-

*) Proceedings of the Committee of Science and Correspondence (Zool. Soc.) 1830—1831.

nante, caudaque externa maris albo omnino carente. Forma et statura mari simillima. Hab. in India septentrionali. In Museo Medico-militari, Chatham.

Amblypterus anomalus Gould. (vgl. d. Archiv. Jahrgang IV. S. 380). A. summo capite, corpore supra et alis cinereo-fuscis, singulis plumis nigro irregulariter sparsis et maculatis; primariis nigris, basi rubrescenti-cervinis, apice albis; secundariis cervinis, nigrescenti-fusco irregulariter fasciatis; rectricibus caudae cervinis, nigrescenti-fusco irregulariter fasciatis et maculatis; duabus centralibus cinereo-fuscis; gutture, pectore et abdomine ad partem superiorem nigrescenti-fuscis, singulis plumis cervino maculatis; abdomine imo pallide cervino, singulis plumis nigrescenti-fusco transversim fasciatis; rostro fusco; pedibus pallide fuscis. Long. tot. $6\frac{3}{4}$; rostri, 1; alae, $5\frac{3}{4}$; caudae, 3; tarsi, $\frac{7}{8}$. Demerara.

Podargus stellatus Gould. (Pr. Z. S. 43). P. corporis plumis, alis caudaque crebre guttulis notisque irregulariter interruptis, his pallide brunneis, illis fuscis, ornatis, colli plumis linea angusta nigra fasciatis ad apicem latis, et albescentibus lunulam facientibus; post oculos plumis pilosis elongatis orientibus, et postice directis tectricibus alarum ad apicem marginis interioris nota albescente, nigro postice cincta, ornatis scapularibus inferioribus pallidioribus; pectoris plumis nonnullis flavescenti-albo guttatis; rostro pedibusque pallide fuscis. Long. tot. 8 unc.; rostri, $1\frac{1}{2}$; alae, 4; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. Java.

3. Syndactyli.

Halcyon incinctus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 142). H. fronte média et vertice nigrescenti-fuscis, leviter coeruleo tinctis; fronte in lateribus strigis badiis notata; occipite et nucha cyaneis; loro, linea infra-oculari auricularibusque nigris; plumis in fronte leviter badio marginatis; dorso medio lilacino viridi nitente; humeris, caudae tectricibus majoribus et minoribus viridescenti-coeruleis; alis spuriosis secundariisque cyaneis; primariis brunneis ad bases niveis, et coeruleo-viride externe marginatis; tectricibus superioribus caudae viridi-coeruleis, fulgore metallico; cauda cyanea; gula alba; pectore corporeque subtus pallide badiis; mandibula superiore nigra; mandibula inferiore ad marginem apicemque nigra, ad basin carnea; pedibus carnis. Long. tot. unc. 8; rostri, $1\frac{3}{4}$; alae, $3\frac{5}{8}$; caudae, $2\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. in Nova Cambria australi. Affinis Halc. Mac Leayii Jard. Selb.

Ceryle torquata Bonap. (Pr. Z. S. 108). C. subcristata, cano-coerulescens, torque albo; subtus castanea; alis caudaque albo maculatis.

Mas. Pectore cano-coerulescente, crisso ferrugineo. Fem. Pectore castaneo, crisso albo. Buff. Pl. Enl. 284. Alcedo cinerea Vieill. — Mexico.

Ceyx microsoma Burton (Pr. Z. S. V. p. 89). C. subcristata, capite caudaque supra, nucha et humeris rufis; striga ab oculis ad nucham (pone oculos leviter, apud nucham intense) dorso et uropygio hyalino splendentibus; alis brunneis, pogoniis

remigum internis rufo marginatis, tectricibus punctis hyalinis ornatis: infra pallide rufa hoc colore apud ventrem dilutior; mento, gula et striga auriculari albidis; rostro praegrandi, aurantiaco. Pedibus rubris. Long. corp. $4\frac{1}{2}$ unc.; capitis, 2, rostri ab apice ad rectum $1\frac{1}{2}$; caudae 1. Hab. in India Maderaspatana.

4. *Zygodaetyli* s. *Scansores*.

Cuculus micropterus Gould. (Proc. Z. S. V. p. 137). E. summo capite, corpore supra alisque obscure plumibaceis; cauda nigrescenti-plumbacea, plus minusve albo notata; primariis interne ad bases maculis oblongis albisque notatis; gutture pectoreque cinereis; corpore subtus albo, nigro crebre fasciato; rostro ad apicem nigro, ad basin carneo. Long. tot. 12 unc.; rostri, 1; alae, $7\frac{1}{2}$; caudae, $6\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. — Himalaya.

Pteroglossus Gouldii Natterer. (Pr. Z. S. 44). S. summo capite, nucha, gutture, pectore abdomineque nigris; plumis auricularibus aurantiaco-flavis ad apicem stramineis; fascia semilunari nuchali flava; dorso, alis caudaque olivaceo-fuscis; hujus rectricibus sex intermediis apice castaneo; lateribus aurantiaco-flavis; femoribus castaneis, crisso coccineo, cute circa oculos viridi; rostri mandibula superiore nigra, apicem versus livide cornea, apice albo, fasciaque angusta alba ad basin; mandibula inferiore alba, fascia nigra apiceque livide corneo, pedibus plumbeis.

Femina differt partibus, quae in mare nigrae, in illa castaneis, et lateribus plumisque auricularibus pallidioribus. Long. tot. 11 unc.; rostri, $2\frac{1}{8}$; alae, 5; caudae, $4\frac{3}{4}$; tarsi, $1\frac{1}{8}$.

Platycercus haematonotus Gould. (Pr. Z. S. 88 u. 151). P. summo capite, fronte, genis, nucha pectoreque smaragdino-viridibus; dorso fusciscenti-viridi; uropygio coccineo; articulo humerali, ala spuria et pogoniis externis primariorum ad partem basalem nitide coeruleo-nigris; nota sulphurea humerali. Remigibus majoribus et minoribus, rectricibusque caudae duabus intermediis viridibus, hoc colore in coeruleum transeunte ad apicem, apicibus ipsis nigro-fuscis; rectricibus reliquis ad bases viridibus, ad apices et ad pogonia externa cineraceo-albis; abdomine medio flavo; femoribus obscure coeruleo-viridibus; crisso cineraceo-albo; rostro corneo; pedibus fuscis. Long. tot. 11 unc.; alae, 5; caudae, $6\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{5}{8}$.

Pullus intra annum primum ab ave adulta differt partibus, quae in hac smaragdino-viridibus, in illo cineriscenti-viridibus; necnon crisso haud coccineo, abdomine haud flavo; at primariis nonnullis secundariisque ad bases albis. Hab. in Nova Cambria australi.

P. haematogaster Gould. (Pr. Z. S. 89). P. fronte facieque coeruleis; summo capite, nucha plumisque auricularibus flavescenti-cinereis; pectore cinereo tincto brunneo; plumis auricularibus ad partem superiorem stramineis; uropygio tectricibusque superioribus caudae cerinis articulo humerali pallide coeruleo; primariis intense fuscis; secundariis tectricibusque majoribus violaceo-coeruleis; tectricibus minoribus alisque ad partem superiorem intense coccineis; lateribus tectricibusque inferioribus

pallide flavis; abdomine medio nitide coccineo, plumis duabus intermediis caudae ad bases pallide olivaceo-viridibus, ad apices in coeruleum transeuntibus. Reliquis plumis ad bases intense coeruleis, ad apices in album transeuntibus; rostro corneo; pedibus fuscis. Long. tot. 12 unc.; alae, $5\frac{3}{8}$; caudae, 7; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

P. flaveolus. *P.* fronte coccineo; buccis pallide coeruleis; summo capite, nucha et dorsó, uropygio, tectricibus caudae superioribus corporeque inferne pallide flavidis, plumis dorsi parterque inferiori tectricum alae majorum centris nigris, externe flavescens; alis mediis cyaneis; ala spuria primariisque externe ad basin saturate violaceis; reliquis primariorum saturate brunneis; rectricibus duabus intermediis caudae ad basin viridescentibus, ad apicem coeruleis; reliquis rectricum ad basin exteriorum saturate coeruleis, apicibus pallidioribus, plumis interne fere per totam longitudinem brunneis, apicibus extremis albis; rostro livido; pedibus fuscis. Long. tot. $13\frac{1}{4}$ unc.; alae, 7; caudae, $7\frac{1}{2}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. in Nova Cambria australi.

P. ignitus Leadb. *P.* capite summo, auriculis, uropygio pectore corporeque subtus coccineis, buccis albis; plumis singulis dorsi ad medium nigris, marginibus coccineo et flavo intermixtis; ala media coerulea, primariis quintis ad basin albis, apicibus brunneis; rectricibus quatuor intermediis albis coccineo pallide tinctis; rectricibus reliquis coeruleis ad basin albis, ad apicem albescentibus; rostro livido; pedibus saturate fuscis. Long. tot. 12 unc.; alae, 6; caudae, $6\frac{3}{4}$; tarsi, $\frac{3}{4}$. Hab. Australia.

Calyptorhynchus xanthonotus Gould. (Pr. Z. S. V. p. 151). *C.* summo capite, genis, gutture corporeque supra et infra fusco-nigris; plumis pectoralibus, apicibus olivaceis; auricularibus flavis; rectricibus caudae duabus intermediis nigro-fuscis; reliquis ad bases et apices nigris, in mediis pallide flavis, interdum plus minusve brunneo notatis; rostro albo vel nigrescenti-brunneo; pedibus obscure fuscis. Long. tot. unc. 24; alae, $14\frac{1}{2}$; caudae, 12; tarsi, 1. Hab. in terra Van Diemen.

Nanodes elegans. Mas. (Pr. Z. S. 26). *N.* vitta frontali purpurea, supra linea metallice coerulea marginata ad auriculas tendente; loro splendide flavo; capite, genis, dorso, tectricibusque caudae olivaceo-viridibus, aureo lavatis; humeris coeruleis; primariis nigris, primis quatuor ad marginem viridescentibus; secundariis alaeque spuria nigris; gula pectoreque viridescenti-flavis; hoc colore abdomine crissoque in flavum transeunte; abdomine centrali pallide aurantiaco; rectricibus caudae duabus intermediis viridescenti-coeruleis, reliquis ad basin coeruleis, ample flavo terminatis; rostro pedibusque intense fuscis.

Fem. vel Mas junior vitta frontali caret, et colorem habet indistinctiorem. Long. tot. 9 unc.; alae, $4\frac{3}{8}$; caudae, $5\frac{1}{4}$; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. in terra Van Diemen?

Centurus (Picus) subelegans Bonap. (Pr. Z. S. 109). *C.* albo nigroque fasciatus; subtus cum capite dilute cinerescens; vertice rubro, fronte et cervice subauratis. Mexico.

C. Santa Cruzei. Bonap. ibid. p. 116. *C.* albo nigroque

striatus capite et corpore subtus griseo-olivaceis; vertice cervice-que rubris; fronte et abdomine aureis; uropygio albo; remigibus reatricibusque nigris. Guatemala.

Asthenurus rufiventris Bonap. (Pr. Z. S. 120). A. fuscus, subtus cum genis rufis, pileo nigro, rubro maculato. Brasilia.

Erythrogonys Gould.

Neue Gattung der Wadvögel.

(Pr. Z. S. V. 1837. 155.)

Rostrum capite longius, rectum, paulo depressum; nares basales, lineares; alae elongatae, remige primo longissimo; tertialibus fere ad apicem remigum tendentibus; cauda brevis, et fere aequalis; tarsi elongati; digiti quatuor, postico parvulo; anticeis inter se conjunctis, usque ad articulum primum; tibiae ex parte nudaе.

E. cinctus. E. capite, plumis auricularibus, nucha, pectoreque nigris; gula, abdomine medio, crissoque albis; hoc fusco adperso; dorso, alis mediis, scapularibusque olivaceis, brunneo metallice lavatis; uropygio, reatricibus caudae duabus intermediis fuscis, reatricibus reliquis albis; lateribus castaneis; tibia parte nuda, cum articulo, coccinea; tarsis olivaceo-fuscis; rostro ad basin rubro, ad apicem nigro. Long. tot. 7 unc.; rostri, 1; alae, $4\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{7}{8}$; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Berichtigung.

Aegialitis? canus Gould., zu Charadrius gehörig, ist beim Ordnen der Diagnosen aus Versehen unter die Singvögel (s. oben S. 391) gerathen, und an seinem Orte (Jahrg. IV. Band 2. p. 672) ausgelassen, was ich gütigst zu entschuldigen bitte.

Herausgeber.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1839

Band/Volume: [5-1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Übersicht der im Jalhe 1837 neu aufgestellten Genera und Arten der Raubvögel, Singvögel und Klettervögel, welche im Jahresberichte des vorigen Jahrganges unerwähnt bleiben mussten. 373-397](#)