

Griechische Mollusken

gesammelt von

Eberh. von Örtzen,

bearbeitet von **E. von Martens.**

Nachtrag zu Jahrg. 1889 Bd. I S. 169—240.

Vor Kurzem erhielt ich von Herrn von Örtzen wieder eine Anzahl von ihm in Griechenland gesammelter Schneckenarten, deren Aufführung als Nachtrag zu der früheren Arbeit von Interesse sein dürfte. Die Bestimmung der Hyalinien und der kleinen Pupen verdanke ich meinem Freunde Prof. O. Reinhardt.

Die im Folgenden mit Kursivschrift gedruckten Arten oder Fundorte sind neu im Vergleich zur früheren Zusammenstellung.

Daudebardia vermutlich *rufa* Drap. *Kumani* in *Elis*.

Hyalinia *Moussoni* Kobelt beim Dorf Elos in Kreta.

— *hydatina* Rossm. *Kumani*.

— *Botterii* Parr. Kephissos. *Olympia*. Insel *Karpathos*.

Zonites *Naxius* n.



Testa anguste umbilicata, sat convexa, superne distincte striatula et lineis spiralibus subtilibus numerosis decussata, fulva, nitidula, inferne laevis, pallidior; anfr. 5—5 $\frac{1}{2}$, convexiusculi, sutura

impressa, ultimus inflatus, obtuse subangulatus, ad aperturam rotundatus, vix descendens; apertura lunato-rotundata, remote albolabiata, margine supero leviter descendente, infero valde arcuato, columellari oblique ascendente, latiuscule triangulatum reflexo.

Diam. maj. 33, alt. 20, aperturæ diam. 16, alt. obliqua, 15 mm, Insel *Naxos*, v. Örtzen.

Die von mir in der früheren Arbeit S. 181 als *Zonites* sp. angeführte Art von *Naxos* ist vermuthlich der Jugendzustand dieser neuen Art; sie ist bei nicht viel über 4 Windungen, nur noch ganz undeutlich gekantet, verhältnissmässig etwas weiter genabelt, ebenfalls ohne Spiralstreifung an der Unterseite und zeigt auffälligere hellgelbe Wachstumsabsätze als die erwachsene Schale.

Diese Art unterscheidet sich von *Z. pergranulatus* Godet bei Kobelt in der Fortsetzung von Kobelt's Iconographie Bd. VII S. 2 fig. 1809 (aus *Amorgos*) auf den ersten Anblick durch weniger niedergedrückte Gestalt, nur spurweise Andeutung einer Kante und etwas engeren Nabel, während sie in der Skulptur mit derselben übereinstimmt. Allerdings finden sich auch merklich höhere Exemplare von *pergranulatus* als das von Kobelt abgebildete, angeblich auch von *Amorgos*, im Berliner Museum, aber bei diesen ist doch die Kante immer noch schärfer und die Unterseite flacher. *Z. Naxius* steht in der Gesamtgestalt in der Mitte zwischen *Z. pergranulatus* und *Z. Polycrates* oder *verticillus*.

- Helix* (*Cartusiana*) *Cartusiana* Müll. Corfu.
 — — Freytagi Maltz. Dorf Elos in Kreta, ein dunkelbraunes, fast einfarbiges Exemplar.
 — (*Macularia*) *Codringtoni* Gray Kobelt-Rossm. VII fig. 1808, *Livadia* in *Euboea*.
 — (*Pomatia*) *ambigua* Parr., Mousson coquilles terr. et fluv. d. Schläfti p. 5. (*H. cyrtolena* Bourg.), sehr kugelig, mit dunkel kastanienbraunem Mundsaum, das eine der Figur 936 bei Kobelt-Rossmässler sehr ähnlich, das andere etwas höher, diam. maj. 38, alt. $40\frac{1}{2}$, apert. alt. $27\frac{1}{2}$ mm, *Ossa* von Herrn Leonis erhalten.
 — (*Xerophila*) *cauta* West. Piræeus an *Thymelaea hirsuta*.
 — — *Cretica* Fer. Insel Syra, die grösste $15\frac{1}{2}$ mm im grossen Durchmesser, Höhe 12, Mündung $6\frac{1}{2}$ breit und 7 hoch.
 — — *arcuata* Kob. Rossm. VI fig. 1553. *Olympia*.
 — — *profuga* A. Schmidt, Corfu.
 — — *pyramidata* Drap. Vom Kephissos angeschwemmt, Attika.
 — — *trochoides* Poir. *Olympia*.

Buliminus (*Chondrula*) *Thiesseanus* Mouss. *Lamia* in *Phthiotis*.

Caecilianella wahrscheinlich *tumulorum* Bourg. vom Kephissos angeschwemmt, Attika, und bei *Olympia*, Elis.

- Balea sp. Herr von Örtzen glaubt diese Gattung auf dem höchsten Berge der Insel *Tinos* gefunden zu haben, an Schiefergestein, wo Wasser aus dem Felsen quoll; die Exemplare gingen ihm aber leider verloren.
- Pupa (Torquilla) *granum* Drap. in den Anschwemmungen des Kephissos, ferner auf der kleinen Insel *Angistri* bei Aegina und bei *Olympia*.
- (Oracula) *scyphus* Pfr. *Olympia*.
- — *truncatella* Pfr. Diese im südöstlichen Europa ziemlich verbreitete Art war bis jetzt noch nicht von Griechenland bekannt. *Olympia*.
- (Pagodina) *pagodula* Desmoul. *Olympia*.
- (Vertigo) *antivertigo* Drap. in den Anschwemmungen des Kephissos, Attika.
- Carychium minimum* Müll. Ebenda. Bis jetzt nur aus Kreta, aber noch nicht vom eigentlichen Griechenland nachgewiesen.
- Limnaea truncatula* Müll. Ebenda.
- Physa Achajae* West. Ebenda.
- Planorbis subangulatus* Phil. Ebenda.
- Valvata* ähnlich *depressa* Pfr. Ebenda.
- Hydrobia* (*Pseudamnicola*) *macrostoma* Küst. Ebenda.
- Pisidium* sp. Ebenda.

Neben dem neuen *Zonites* ist namentlich das Vorkommen der kleinen Puppen von Interesse; auch wird das Vorhandensein in Morea für eine Anzahl von Arten nachgewiesen, die bis jetzt noch nicht von da bekannt waren.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [69-1](#)

Autor(en)/Author(s): Martens E. von

Artikel/Article: [Griechische Mollusken gesammelt von Eberh. von Örtzen 372-374](#)