

Euplecoptera (=Dermaptera = Dermatoptera = Forficulidae) für 1903.

Bearbeitet von

Dr. Robert Lucas

in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren alphabetisch).

Borelli, A. Di alcune Forficole di Costa. Boll. Mus. Torino T. XVIII. No. 449. 5 pp.

de Bormans, Auguste (Verstorben). Siehe **Burr**.

Burr, Malcolm (1). Synopsis of the Orthoptera of W. Europe. Entom. Record vol. 15. p. 314—315 (noch unvollständig).

— (2). Notes on the Forficularia. VII. Some hitherto unpublished Descriptions of new Species, by the late M. August de Bormans. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11. p. 231—241, 265—270. 18 neue Arten.

— (3). Notes on the Forficularia. VIII. Five new Species from the de Borman's Collection. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11. p. 270—276.

5 neue Arten.

Weiteres über die Publ. sub No. 2 u. 3 siehe in einem der folgenden Berichte.

Gadeau de Kerville, Henri. L'accouplement des Forficulides. Bull. Soc. Entom. France, 1903, p. 85—87, 1 fig.

Jacobson, G. G. u. W. L. Bianchi. Titel p. 948 des Berichts f. 1902. 5. Lief. 1903. 4^o. (p. 353—432, Taf. XVIII—XXI).

Kirby, W. F. Notes on Forficulidae, with Descriptions of New Species in the Natural History Museum, South Kensington. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11. p. 60—68.

6 neue Arten.

Nomina nova: *Anisolabis dubronii* pro *A. laeta* de Borm. non Gerst. — *Sparatta dohrni* pro *Sp. plana* Dohrn et De Borm. non Burm. — *Ancistrogaster burri* pro *A. luctuosa* De Borm. non Stål.

Krauss, H. A. Erwiderung. Zool. Anz. 26. Bd. No. 686. p. 55—56. Gegen **Poche**, über Hemimeriden.

- Faehler, Franz.** Die Begattung des Ohrwurms. Naturw. Wochenschrift. 18. Bd. p. 345, 1 Fig.
- Poche, Frz.** Entgegnung. Zool. Anz. 26. Bd. No. 692 p. 229—230. Gegen Krauss, Hemimeriden.
- Rehn, J. A. G. (1).** A contribution to the knowledge of the Orthoptera of Mexico and Central America. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXIX p. 1—34.
- (2). Notes on West Indian Orthoptera, with a list of the Species known from the island of Porto Rico. t. c. p. 129—136.
- (3). Studies in American Forficulidae. Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphia vol. 55. p. 299—312.
- 6 neue Arten u. zwar: *Echinopsalis* (1), *Psalis* (1), *Labia* (1), *Sparatta* (1), *Opisthocosmia* (1 [1 n. subg.]), *Forficula* (1).
- Weiteres siehe in einem der folgenden Berichte.
- (4). On Two Earwigs of the Genus *Labia* from Costa Rica. Entom. News vol. 14. p. 292—293.
- L. auricoma* n. sp.
- Semenow, A. P. (1).** *Dermatoptera p̄ivezennuiya*. H. M. Zarudny iz' puteshestviya 1900—1901 i egho vidui. (*Dermatoptera* rapportés du voyage fait par N. A. Zarudny en 1900—1901 dans la Perse orientale). Horae Soc. Entom. Ross. T. 36. p. 192—198.
- (2). *Dermatoptera nova aut minus cognita*. I. Rev. Russ. d'Entom. T. 3. p. 19—21.
- 2 neue *Forficula*-Arten.
- Verhoeff, K. W. (1).** Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Thorax der Insekten mit Berücksichtigung der Chilopoden. Acta Acad. German. Bd. LXXXI p. 63—124, Taf. VII—XIII.
- (2). Über Tracheaten-Beine. Vierter und fünfter Aufsatz: Chilopoda und Hexapoda. Acta Acad. Germ. Bd. LXXXI. No. 4. p. 211—249, Taf. XIV—XVII.
- (3). Über die Endsegmente des Körpers der Chilopoden, Dermapteren u. Japygiden und zur Systematik von *Japyx*. t. c. No. 5. p. 259—297, Taf. XVIII—XIX.
- (4). Über Dermapteren. 5. Aufsatz. Zwei neue Gruppen. Arch. f. Naturg. Jahrg. 70 Bd. I p. 115—121.
- 4 neue Arten: *Allosthetus* n. g. (3 [1 nov. fam.]), *Parisolabris* n. g. (1 [1 nov. subfam.]).
- Xamheu.** Instinct de la maternité chez le *Chelidura dilatata* Lafrenaye, Orthoptère du groupe des Forficuliens. Le Naturaliste 1903 p. 143—144.

B. Übersicht nach dem Stoff.

Erwiderungen: Krauss, Poche (*Hemimerus*).

Synopsis: Burr (westeuropäische Arten).

Morphologie: Anhängel: Verhoeff¹⁾ 2) 3).

Begattung: Gadeau de Kerville, Paehler.

Forceps: Anwendung: Burr (Entom. Record vol. 15 p. 262).

Instinkt, mütterlicher: Xamheu.

Brutpflege siehe unter *Forficula*.

Fauna. Verbreitung.

Inselwelt: Neu Caledonien: de Bormans (*Labia*), Burr (*Labia*). — Neu-Seeland: Verhoeff¹⁾ (*Parisolabris*). — Samoa: de Bormans (*Labia*), Burr.

Europa: Westeuropa: Burr. — Rußland: Jacobson u. Bianchi.

Kaukasus: Semenow (*Forficula*).

Novorossia: Semenow (*Forficula*).

Asien: Persien: Semenow.

Japan: de Bormans (*Spongiphora*).

Malakka: Singapur: Kirby (*Diplatys*).

Malayischer Archipel: Lombok: de Bormans (*Forficula*). —

Java: de Bormans (*Ancistrogaster*), Verhoeff⁴⁾ (*Allosthetidae*).

— Celebes: de Bormans (*Ophistocosmia*, *Pygidicrana*, *Sparatta*).

Amerika: Oberer Amazonas: de Bormans (*Sphingolabis*).

Mexico: Rehn²⁾ (*Forficula*, *Labia*, *Echinopsalis*, *Sparatta*).

Südamerika: de Bormans (*Carcinophora*). — Costa Rica: Borelli (*Sparatta*), Rehn (*Labia*, *Opisthocosmia*, *Psalis*). — Porto Rico:

Rehn²⁾ (*Apterygida*). — Ecuador: de Bormans (*Anisolabis*?, *Labia*).

Peru: Burr (*Gonolabis*).

Afrika: Westafrika: Burr³⁾ (*Chelisoches*). — Kamerun: Kirby (*Pygidicrana*).

Britisch-Ostafrika: Kirby (*Pygidicrana*).

Kap der guten Hoffnung: Burr³⁾ (*Chelidura*). — Madagaskar: de Bormans (*Chelisoches*).

Australien: Kirby. — Nordaustralien: de Bormans (*Labia*).

C. Systematischer Teil.

Siehe im Bericht für 1904.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [70-2_2](#)

Autor(en)/Author(s): Lucas Robert

Artikel/Article: [Euplecoptera \(=Dermaptera = Dermatoptera = Forficulidae\) für 1903. 1196-1198](#)