

Thysanoptera für 1904.

Bearbeitet von

Dr. Robert Lucas

in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren alphabetisch).

- Börner, C.** Zur Systematik der Hexapoden. Zool. Anz. Bd. 27. p. 511—533.
- Boyd, D. A.** (Collembola u. Thysanoptera des Clyde-Gebietes). Titel siehe p. 891 des Berichts f. 1902 [Trichoptera f. 1902 unter Handbook].
- Daniel, S. M.** New California Thysanoptera. Entom. News, vol. 15. p. 293—297. — 4 neue Arten: Criptothrips, Euthrips, Sericothrips (1), Caliothrips n. g. (1).
- Froggatt, Walter W.** Studies on Australian Thysanoptera: the Genus *Idolothrips* Haliday. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales vol. 29. p. 54—57, 1 pl.
- Del Guercio, Giacomo. 1899.** Contribuzione allo studio delle forme e della biologia della Fleotripide dell' olivo (*Phloeothrips oleae* [Costa] Targioni) e sopra alcune nuova soluzinoi di solfuro di carbonio e nicotina come insetticidi. Atti Accad. econ.-agrar. Georgofili Firenze vol. 77 p. 50—76, 6 figg.
- Goggia, P. 1900.** Un danger pour l'agriculture. Le „*Phloeothrips oleae*“. Le Cosmos N. S. T. 42. p. 9—12, 1 fig.
- Handlirsch, A.** Siehe unter Trichoptera.
- Hollrung, [M.] 1903.** *Physopus tenuicornis* am Hafer. Nat. Zeitschr. Land-Forstwirtschaft Jahrg. 1. p. 200—201.
- Klapálek, Fr.** Siehe unter Trichoptera.
- Lindt, Ludwig.** Die Kultur des Kakaobaumes und seine Schädlinge. Hamburg, C. Boysen 1904 [1903]. 8°. XV 157 pp. 58 figg. M. 4,50. — Tierische Schädlinge p. 105—136, darunter auch Motten, *Physopus* u. der Einsiedlerkrebs.
- Lindroth, J. Yvar.** Die Blasenfüße. Prakt. Blätter Pflanzenbau u. Pflanzenschutz, Jahrg. 2. p. 131—135, 1 fig.
- Reuter, O. M.** Ein neues Warmhaus-Thysanopteron. Meddel. Soc. Fauna Flora fennica Häft 30. p. 106—109. — *Leucothrips* n. g. *nigripennis* n. sp.
- Shipley, A. E.** Siehe unter Trichoptera.

B. Übersicht nach dem Stoff.

Trophi: Börner.

Systematik: Börner, Handlirsch, Klapálek, Shipley.

Biologie: Del Guercio (*Phloeothrips*). — Warmhaus-Thysanopteron: Reuter.

Schaden: Goggia (*Phloeothrips oleae*), Hollrung (am Hafer. — *Physopus*), Lindt (an Kakao).

Fauna. Verbreitung:

Großbritannien: Clyde-Distrikt: Boyd

Californien: Daniel (4 neue Arten). — **Australien:** Froggatt.

C. Systematischer Teil.

Trophie. Beziehungen zu den *Hemiptera*. Börner.

Acanthothrips nodicornis. Mundteile. Börner, p. 516 Abb.

Caliothrips n. g. Daniel, Entom. News Philad. vol. 15. p. 296. — *woodworthi n. sp.* p. 297 (California).

Criptothrips californicus n. sp. Daniel, t. c. p. 293 (S. Calif.).

Euthrips pyri n. sp. Daniel, t. c. p. 294 (San Leandro).

Idolothrips Haliday. Lebensweise, Lebensgeschichte. Froggatt, Proc. Linn.

Soc. N. S. Wales vol. XXIX p. 54—57 pl. III. — *spectrum* ♀ (*marginata* Hal.).

— *spectrum* ♂ var. = (*lacertina* Hal. — *spectrum* Haliday ♂ (*I. marginata*

Haliday (♀) u. *I. lacertina* Haliday (♂). Ei, Larve in Stadium I—IV. Puppe.

Imago (♂) hierzu Taf. III (Sutherland, Kenthurst, Sydney, N. S. W. —

Gatton, Queensland. — Melbourne Viet.).

Sericothrips apteris n. sp. Daniel, Entom. News Philad. vol. XV p. 295 (Berkeley).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [71-2_2](#)

Autor(en)/Author(s): Lucas Robert

Artikel/Article: [Thysanoptera für 1904. 845-846](#)