

Euplecoptera (= Dermaptera = Dermatoptera = Forficulidae) für 1904.

Bearbeitet von

Dr. Robert Lucas

in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren, alphabetisch).

- Barber, Herbert S.** The Occurrence of the Earwig-Fly, *Merope tuber*. Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 6. p. 50—51.
- Bennett, Charles Barrows.** Earwigs (*Anisolabia maritima* Bon.) Psyche vol. 11 p. 47—53, 2 figg.
- Аделунгъ, Н. von Adelung, N. 1902.** Новый для Фауны Россійской Имперіи видъ уховерткоу. — *Forficula aetolica* Br. v. W. [Sur une espèce de Dermaptères. — *Forficula aetolica* Br. v. W. — Nouvelle pour la faune russe]. Ann. Mus. zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg. Ежегодн. зооп. Муз. Акад. Наукр. T. 7 p. XII—XIII.
- Baer, G. A.** Note sa piqûre d'un Forficulide de la République Argentine. *Apterygida linearis* Eschsch., taeniata Dohrn. Bull. Soc. Entom. France 1904 p. 163—164.
- Borelli, Alfredo (1).** Viaggio del Dr. Enrico Festa nella Repubblica dell'Ecuador e regioni vicine. Forficole. Boll. Mus. Torino vol. XIX No. 475. 6 pp. — 3 neue Arten: *Carcinophora* (1), *Anisolabis* (1), *Neolobophora* (1).
- (2). Viaggio del Dr. Alfredo Borelli nella Republica Argentina e nel Paraguay. t. c. No. 479, 8 pp. — 3 neue Arten: *Pyragra* (1), *Demogorgon* (1), *Spongiphora* (1).
- (3). 1903. Di alcune Forficole di Costa Rica. Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino T. 18. No. 449, 4 (5) pp. — 10 Arten; neu: *Sparatta biolleyi*.
- Borg, Hjalmar.** Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. No. 25. Forficuliden aus Kamerun. Arkiv Zool. Bd. 1 p. 563—580, 1 Taf. (XXVI). — 9 neue Arten: *Labidura* (2), *Brachylabris* (1), *Spongiphora* (1), *Platylabia* (2), *Sparatta* (1), *Chelisoches* (1), *Ancistrogaster* (1).
- Burr, Malcolm 1902. (1).** The Earwigs of Ceylon. Journ. Bombay nat. Hist. Soc. vol. 14 p. 59—78, 316—336, 2 pls. — 4 neue Arten: *Neolobophora* (1), *Anisolabris* (1), *Brachylabis* (1), *Opisthocosmia* (1).
- (2). Observations on the Dermatoptera, including Revisions of Several Genera and Descriptions of New Genera and Species. Trans. Entom. Soc. London 1904 p. 277—322. — Revision der Gatt. *Diplatys* Serv. Übersicht über die Arten severa *Burm.*, *jansoni* Kirby, *aethiops* n. sp., *occidentalis* n. sp.,

conradti n. sp., riator n. sp., macrocephala Beauv., raffrayi Borm., gerstaeckeri Dohrn (= longiseta Westw.), var. calidasa, rufescens Kirby, siva n. sp., ridleyi Kirby, nigriceps Kirby, croixi n. sp., greeni n. sp. — *Challia* n. g. — Bemerkung über die Gatt. *Bormansia* Verhoeff. — *Tomopygia* (Typus: *Cylindrogaster abnormis* Borm.) 2 Arten. — *Forcipula* Bol. Übersicht über die Arten (1 n. sp.), *Labidurodes* (1 n. sp.), *Carcinophora* (1 n. sp.), *Anisolabia* (2 n. sp.), *Brachylabis* (1 n. sp.). — Bemerk. zu den *Gonolabidae*. *Spongiphora* (1 n. sp. + 1), *Labia* (1 + 5 n.), *Platylabia* (1). — *Chaetospania*. Übersicht über die Arten (1 n. sp.), *Sparatta* (1 n. sp.), *Mecomera* (1 n. sp.). — Revision der Gatt. *Opisthocosmia* Dohrn. Übersicht über die (31) Arten (8 n. sp. nebst Bem. zu 1 bek.), *Anechura* (1 n. sp.), *Odontopsalis* n. g. (2 n. sp. + 1), *Apterygida* (1 n. sp.), *Forficula* (3 n. sp. + 2).

Caudell, A. N. A New Forficulid from the Philippines. Journ. New York Entom. Soc. vol. 12. p. 108—109. — *Auchenomus minor* n. sp.

— (2). On a collection of non-saltatorial Orthoptera from Paraguay. t. c. p. 179—188.

Distant, W. L. *Insecta transvaaliensia*. Parts V, VI p. 97—158, pls. IX—XV. — Burr beschreibt darin eine neue Forficulide.

Kirby, W. F. A synonymic Catalogue of Orthoptera. vol. I. Orthoptera. Euplecoptera, Cursoria, et Gressoria. London 1904. 8°. X + 501 pp.

Mjöberg, E. Eine neue Forficulide. Entom. Tidskr. Årg. 25. p. 131. — *Anisolabis peregrina*.

Rehn, J. A. G. Studies in Old world Forficulids or earwigs, and Blattids or Cockroaches. Proc. U. S. nat. Mus. vol. XXVII No. 1363 p. 539—560.

von Schmidt, Carl und R. Oppihofer. Die Feinde der Biene. Ascona, Carl von Schmidt, 12^o, 24 pp. 50 Cts.

Xambeu siehe im syst. Teil unter *Chelidura*.

B. Übersicht nach dem Stoff.

Katalog: synonymischer: Kirby.

Revisionen: Burr²) (*Diplatys*).

Biss: Baer (von *Apterygida linearis*).

Parasiten: Feinde: Barber (*Merope tuber*).

Feinde der Bienen: von Schmidt u. Oppikofer.

Fauna. Verbreitung: *Anisolabis* von Matto Grosso in Schweden:

Mjöberg. — *Diplatys aethiops* siehe im syst. Teil. — **Alte Welt:** Rehn.

— **Inselwelt:** Philippinen: Caudell¹) (*Auchenomus* n. sp.).

Europa: Christchurch: Chitty (Proc. ent. Soc. Washington 1904 p. LIV

— *Labidura*).

Asien: Ost-Persien: Semenow. — Borneo: Burr. — Ceylon: Burr¹).

— Indien, Japan, China, Tibet etc.: Burr.

- Afrika:** Kamerun: Borg (9 neue Arten). — Transvaal: Burr in Distant (*Bormansia* n. sp.). — Madagascar: Burr (neue Arten).
Amerika: Argentinien: Borelli²) (n. sp.). — Costa Rica: Borelli³), Rehn. — Darien: Burr²) (*Carcinophora*, *Spongiphora*). — Ecuador: Borelli¹) (n. sp.), Burr (*Labia*). — Guiana: Burr (*Forcipula*). — Paraguay: Borelli²) (n. sp.), Caudell²) (neue Arten). — Tropisch u. Südafrika: Burr (neue Arten). — Mexico: Burr²) (*Sparatta* n. sp.).
Mittel-Amerika: —
Antillen: Granada: Burr (*Diplatys* n. sp.). — Martinique: Burr (*Carcinophora* n. sp.).

C. Systematischer Teil.

Forficulidae für 1903.

- Morphologieder *Dermaptera*. Verhoeff, Acta Ac. German. Bd. LXXX p. 82—96.
 Endsegmente u. Cerci. Morphologie. Verhoeff, t. c. p. 259—297.
Forficulidae von West Europa. Burr, Entom. Record vol. XV p. 314—318.
Forficulidae von Rußland. Bemerk. Semenow, Rev. Russe Entom. T. III p. 196—199.
 Gebrauch des Forceps. Burr, t. c. p. 262 (bei *Labidura*).
 Kopulation bei *Forficula auricularia*. Gadeau de Kerville, Bull. Soc. Entom. France 1903 p. 85—87 nebst Abb.
Allosthetidae nov. fam. Verhoeff, Arch. f. Naturg. Jahrg. 70. Bd. 1 p. 115.
Allosthetus n. g. für einen Teil von *Psalis*. Verhoeff, t. c. p. 115. — *lombokianus* n. sp., *setiger* n. sp., *martensi* n. sp. p. 115—117 (sämtlich von Java).
Ancistrogaster burri nom. nov. für *luctuosa* Borm. Kirby, Ann. Nat. Hist. (7) 11 p. 68. — *javanus* n. sp. Verhoeff, t. c. p. 266 (Java).
Anechura asiatica nom. nov. für *Forficula biguttata* Kitt. Semenow, Horae Soc. Entom. Ross. T. XXXVI p. 194. — *jedtschenkoi* in Sokotra. Burr, Nat. Hist. Sokotra p. 414.
Anisolabis dubronii nom. nov. für *laeta* De Borm. nec Gerst. Kirby, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 68. — *dubronyi* Beschreib. Burr, t. c. p. 270. — ? *incerta* n. sp. de Bormans, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 234 (Ecuador).
Apterygida buscki n. sp. Rehn, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXIX p. 129 (Porto Rico).
Carcinophora boliviana n. sp. de Borman, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 233 (S. America).
Chelidura dilatata. Lebensweise. Mütterlicher Instinkt. Xamheu, Naturaliste 1903. p. 143. — *peringueyi* n. sp. Burr, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 275 (Cape Good Hope).
Chelisoches vittatus n. sp. Burr, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 274 (W. Africa). — *varicornis* n. sp. de Bormans, t. c. p. 265 (Madagascar).
Demogorgon. Bemerk. Kirby, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 98.
Diplatys ridleyi n. sp. Kirby, t. c. p. 61 (Singapore).
Echinopsalis brevibractea n. sp. Rehn, Proc. Acad. Philad. vol. LV p. 300 (Mexico).
Forficula lucasi u. *barroisi*. Geschlechtscharaktere. Semenow, Horae Soc. Entom.

- Ross. T. XXXVI p. 195, 196. — *smyrnensis*. **Burr**, Nat. Hist. Sokotra p. 413 pl. XXV fig. 5. — Neue Arten: *caucasica* n. sp. **Semenow**, Rev. Russe Entom. III p. 19 (Caucasus). — *pomerantzevi* n. sp. p. 20 (Novorossia). — *miranda* n. sp. de **Bormans**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 269. — *metrica* n. sp. **Rehn**, Proc. Acad. Philad. vol. LV p. 311 (Mexico).
- Gonolabis inca* n. sp. **Burr**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 272 (Peru).
- Labia*. de **Bormans** beschreibt in d. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 folg. neue Arten: *flavicollis* n. sp. p. 235 (Samoa). — *pulchripes* n. sp. p. 236 (N. Australien). — *rogenhoferi* n. sp. p. 238 (Ecuador). — *tristis* n. sp. p. 240 (New Caledonia). — *canaca* n. sp. **Burr**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 273 (New Caledonien). — *flaviscuta* n. sp. **Rehn**, P. Acad. Philad. vol. 55 p. 305 (Mexico). — *auricomma* n. sp. **Rehn**, Entom. News Philad. vol. 14 p. 292 (Costa Rica).
- Labidura bidens* u. *erythrocephala*. Bemerk. **Kirby**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 415. — *riparia*. Varietäten. **Kirby**, t. c. p. 64—66. — *truncata* n. sp. **Kirby**, t. c. p. 67 (Australien).
- Opisthocosmia burri* n. sp. de **Bormans**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 267. — *O. (Sarcinatrix subg. n.) anomalia* n. sp. **Rehn**, Proc. Acad. Phil. vol. 55 p. 308 (Costa Rica).
- Parisolabis* n. g. **Verhoeff**, t. c. p. 120. — *novaezeelandiae* n. sp. p. 120 (Neu Seeland).
- Psalis pulchra* n. sp. **Rehn**, Proc. Acad. Philad. vol. 55. p. 303 (Costa Rica).
- Pygidicrana*. **Kirby** beschreibt in d. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 folg. neue Arten: *frontalis* n. sp. p. 61 (Kamerun). — *bettoni* n. sp. p. 62 (Brit. Ost-Afrika). — *guttata* n. sp. p. 62 (Celebes). — *atriceps* n. sp. p. 63 (Queensland). de **Bormans** beschreibt t. c.: *papua* n. sp. p. 232 (Neu Guinea). — *biaffra* n. sp. p. 232 (Kamerun). — *quadriguttata* n. sp. p. 232 (Celebes). — *celebensis* n. sp. p. 233 (Celebes).
- Sarcinatrix* subg. nov. von *Opisthocosmia*.
- Sparatta dohrni* nom. nov. für *Sp. plana* Dohrn nec Burm. **Kirby**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 68. — *aculeata* n. sp. de **Bormans**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 265. — *flavipennis* n. sp. **Rehn**, Proc. Ac. Philad. vol. 55 p. 306 (Mexico). — *biolleyi* n. sp. **Borelli**, Boll. Mus. Torino XVIII No. 449 p. 2 (Costa Rica).
- Sphingolabis brunneri* n. sp. de **Bormans**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 11 p. 268 (Upp. Amazonas).
- Sphongiphora lewisi* n. sp. de **Bormans**, t. c. p. 234 (Japan).

Forficulidae für 1904.

Katalog: **Kirby**.

Naturgeschichte von *Anisobas maritima*. **Bennett**.

Ancistogaster poecilocera n. sp. **Borg**, Arkiv Zool. Bd. I p. 576 pl. XXVI fig. 8 (Kamerun).

Anechura schlagintweiti n. sp. **Burr**, Trans. Entom. Soc. London, 1904 p. 313 ♂ ♀ (Tibet, Lahol, India borealis, Dardjiling).

Anisolabis azteca = (*bormansi* Scudd. **Caudell**, Journ. New York Entom. Soc. vol. XII p. 180. — *stali* (Dohrn). Fundorte u. Verbr. **Rehn** (1) p. 540. —

athymia nom. nov. für *japonica* de Borm. von de Haan 1842. **Rehn** (1) p. 540. — *gaudens* n. sp. (nähert sich *laeta* Gerst. u. *dubronyi* Kirb.) **Burr**, p. 291 ♂

- (India, Bhoutan, Pedong). — *vittata* n. sp. (ameisenähnlich) p. 291—292 ♂ (Madagaskar, „Région du sud-est, Vallée du Fanjahira, Isaka, [forêt].“). — *peregrina* n. sp. **Mjöberg**, Entom. Tidskr. Årg. 25 p. 131 (nach Schweden importiert von Matto Grosso). — *festae* n. sp. **Borelli**, Boll. Mus. Torino XIX No. 475 p. 3 (Ecuador).
- Apterygida athymia* nom. nov. für *Forficula japonica* De B. **Rehn**, Proc. U. S. Nat. Mus. vol. XXVII p. 540. — *huseinae* gehört zu *Labidura*. **Rehn**, t. c. p. 539. — *linearis* Gebrauch des Forceps. **Baer**, Bull. Soc. Entom. France 1904 p. 163.
- Apterygida lonchampsii* n. sp. (*erythrocephala* Oliv. sehr nahe) **Burr** p. 318—319 ♂ ♀ (Abyssinien). — *vishnu* n. sp. (verw. mit *sansibarica* Karsch u. *A. mackinderi* Burr) p. 318—319 ♂ (India borealis, Dardjiling).
- Auchenomus minor* n. sp. **Caudell**, Journ. N. York etc. vol. XII p. 108 (Philippinen).
- Bormansia impressicollis* ♂. **Burr**, Trans. etc. 1904 p. 287. — *meridionalis* n. sp. **Burr** in *Distant*, Ins. Transv. I p. 97 (Transvaal).
- Bormansia* Verhoeff. Bemerk. **Burr**, p. 286—287. — *impressicollis* ♂ p. 286—287.
- Brachylabis malgacha* n. sp. (*nigra* nahest.) **Burr** p. 292—293 ♂ ♀ (Madagascar, „centre de l'île“; Diego-Suarez). — *sjostedti* n. sp. **Borg**, Arkiv Zool. Bd. I p. 568 (Kamerun).
- Carcinophora fusca* n. sp. **Borelli**, Boll. Mus. Torino vol. XIX No. 475 p. 1 (Santiago). — *waddyi* n. sp. (Untersch. von *robusta* Scudd. u. *boliviana* Borm.) **Burr**, p. 290 ♀ (Martinique).
- Chaetospania* Karsch. Übersichtstab. der Arten: *parvula* Burr, *semifulva* Borm., *stella* Burr, *juppiter* Burr, *volcana* n. sp., *faea* Borm., *inornata* Karsch (p. 300—301). — *volcana* n. sp. (einzige Sp. mit Pygid. „shaped like a blunt cone“) p. 301 ♂ ♀ (Diego, Suarez).
- Challia* n. g. (nahe verw., vielleicht identisch mit *Anataelia* Bol.) **Burr** p. 285—286. — *fletcheri* n. sp. p. 286 ♂ ♀ (China: Wei-hai-wei, Len-kung-tan, Da-laen-suen, Tung-yun; Tamaon Isl.).
- Chelidura dilatata*. Kopula u. Ei. **Xambeu**, Ann. Soc. Linn. Lyon T. I p. 120—121.
- Chelisoches beelzebub* gehört zu *Forficula*. Verbess. Beschri. **Burr**, Trans. Entom. etc. 1904 p. 322. — *limbatus* n. sp. **Borg**, Arkiv Zool. Bd. I p. 575 pl. XXVI fig. 7 (Kamerun).
- Cosmiella* Verhoeff ist nur als Subgenus zu betrachten. **Burr** p. 303.
- Demogorgon longipennis* n. sp. **Borelli**, Boll. Mus. Torino, No. 479. p. 4 (Tucuman).
- Diplatys* Serv. Bemerk. Übersicht über die 15 Arten: *severa* Burm., *jansoni* Kirby, *aethiops* n. sp., *occidentalis* n. sp., *conradi* n. sp., *viator* n. sp., *macrocephala* Beauv., *raffrayi* Borm., *gerstaeckeri* Dohrn (= *longisetosa* Westw.), *var. calidasa*, *rufescens* Kirby, *siva* n. sp., *ridleyi* Kirby, *nigriceps* Kirby, *croixi* n. sp., *greeni* n. sp. (p. 277—280). — *severa* Borm. u. *D. jansoni* Kirby. **Burr** p. 280. — *aethiops* n. sp. p. 280 ♂ Fundort? — *occidentalis* n. sp. p. 280—281 ♂ (West Indies, Granada, 250'). — *conradi* n. sp. p. 281 (North Cameroons, Joh. Albrechtshöhe). Ohne zweifelh. in den Samml. verwechselt mit *D. raffrayi* u. vielleicht auch mit *D. macrocephala* p. 281. — *viator* n. sp. p. 281 ♀ (Madagascar, Ankazoabo, Fernando Po). — *macrocephala* Pal. Beauv. u. *D. raffrayi* Borm. p. 282. — *gerstaeckeri* Dohrn p. 282—283. — *siva* n. sp. (ähnelt *D. greeni*) p. 283 ♂ ♀ (India, Dardjiling). — *ridleyi* Kirby p. 284. — *nigriceps* Kirby u. v. *greeni* n. post. p. 284. — *croixi* n. sp. (nähert sich

D. nigriceps in d. Färbung, aber *D. greeni* morphologisch näher) p. 284—285 ♀ (Malacca Peninsula). — *greeni* n. sp. p. 285 ♂ ♀ (Ceylon, Punduluoya). — *nigriceps* Burr p. 285.

Forcipula Bolivar. Unterscheidungsstab. der Arten. Burr p. 288—289 u. zwar: *walkeri* Kirby, *americana* Borm., *decolyi* Borm., *congo* Burr, *gariazzi* Borelli, *quelchi* n. sp., *tarsata* Westw., *trispinosa* Dohrn, *pugnax* Kirby, *quadrispinosa* Dohrn. — *quelchi* n. sp. p. 289 ♂ (British Guiana).

Forficula micado n. sp. (dimorph, *macrolabia* u. *microlabia*. Vielleicht eine Zwischenform zw. *F. lurida*, *F. auricularia* u. *F. smyrnensis*) Burr p. 319—320 ♂ (Central-Japan). — *planicollis* Kirby ♂ p. 320—321 (Nord des Indes orientales Dardjiling, Montagnes). — *ambigua* (zwischen *planicollis* u. *ambigua*) p. 321 ♂ ♀ (Dardjiling). — *mogul* n. sp. (ähnelt *ruficollis* von Spanien) p. 321—322 ♂ ♀ (Dardjiling). — *beelzebub* Burr Bemerk. p. 322.

Gonolabidae. Bemerk. zur Fam. Burr p. 293—295.

Labia paraguayensis n. sp. Candell, Journ. New York etc. XII p. 180 (Sapucay).

Labia ochropus Stal. Bemerk. Burr p. 296. — *alluaudi* n. sp. (verw. mit *mucronata*) p. 297 ♂ ♀ (Madagascar, Région du sud-est, Fort Dauphin; Nossi-Bé, Diego Suarez). — *triangulata* n. sp. (*pigidiata* u. *ridens* nahest.) p. 297—298 (Diego-Suarez). — *insularis* n. sp. p. 298 (Madagascar, Région du sud-est, pays Androy, Imanombo; Diego-Suarez). — *forceps* n. sp. (steht vielleicht *L. ridens* Borm. sehr nahe) p. 299 ♂ (Madagascar, Région du sud-est, Vallée d'Ambolo, Col de Sakavalana). — *paradoxa* n. sp. (aberrante Form, erinnert mehr an *Anechura* u. *Chelidura*) p. 299—300 ♂ (Ecuador, Mirador, Santa Inez 4101').

Gonolabis u. *Gonolabidae*. Beschreib. Burr, t. c. p. 293—295.

Labidura huseinae (Rehn) Rehn (1) p. 539. — Nominelle Arten von Südafrika. p. 540.

Labidura dubroni n. sp. Borg, Arkiv Zool. Bd. 1 p. 565. — *karschi* n. sp. p. 566 pl. XXVI fig. 1 (beide aus Kamerun).

Labidurodes nitidus n. sp. Burr, Trans. Entom. etc. 1904 p. 290 ♀ (Madagascar, Région du sud-est, Vallée d'Ambolo, Forêt de Fitana).

Mecamera weissii n. sp. (ähnelt mehr einer *Sparatta*). Burr p. 302 ♂ (Tonkin, Central, Environs de Tuyen-Quan).

Neobolophora bicolor n. sp. Borelli, Boll. Mus. Torino XIX No. 475 p. 5 (Ecuador).

Odontopsalis n. g. (Unterschiede von *Anechura*, *Apterygida*, *Chelidura* u. *Forficula*) Burr, Trans. Entom. etc. 1904 p. 315. — Typus: *harmandi* Burr nebst Bemerk. — Übersicht über die 3 Arten *japonica* Borm., *harmandi* n. sp. u. *lewisi* n. sp. p. 316. — *harmandi* n. sp. p. 316—317 ♂ ♀ (Central Japan). — *lewisi* n. sp. p. 317 (Japan).

Pentharthron brasiliensis n. sp. Ashmead, Mem. Carnegie Mus. vol. I p. 521 (Bahia).

Pestasmicra n. g. (Type: *P. brasiliensis* Ashm.) Ashmead, Mem. Carnegie Mus. vol. I p. 252.

Perilampus japonicus n. sp. Ashmead, Journ. New York Entom. Soc. vol. 12 p. 151 (Sapporo). — *brasiliensis* n. sp. Ashmead, Mem. Carnegie Mus. vol. I p. 467 pl. XXXIV fig. 4 (Chapada).

Pheidoloxenus n. g. (Type: *P. wheeleri* Ashm.) Ashmead, Mem. Carnegie Mus. vol. I p. 328.

- Opisthocosmia* Dohrn. Bemerk. zur Gatt. **Burr** p. 303. — Übersicht über die Arten
rebus Burr, *neolobophoroides* Burr, *dubia* Borm., *aptera* Verhoeff, *miceli*
n. sp. p. 303, *minuscule* Borm., *hora* Borm., *armata* Haan, *humeralis*
 Kirb., *beccarii* Borm., *forcipata* Haan, *erroris* **n. sp.**, *burri* Borm.,
vicina **n. sp.** p. 304, *lugens* Borm., *nevilli* **n. sp.**, *ceylonica* Motsch,
insignis Haan, *dux* Borm., *insignis* Haan, *tenella* Haan p. 305, *forcipata* Haan,
centurio Haan, *oannes* Burr, *cervipyga* Kirb., *longipes* Haan, *biroi* Burr,
simplex Borm. p. 306, *brahma* **n. sp.**, *annandalei* **n. sp.**, *shelfordi* **n. sp.**, *americana*
 Borm., *amazonensis* Borm., *temora* **n. sp.**, *komarovi* Sem., *oannes* Burr S. 307.
 — *miceli* **n. sp.** (verw. mit *hora* Borm.) p. 307—308 (Abyssinien). — *erroris*
n. sp. p. 308 ♂ ♀ (Sarawak, Penrisson; Malayische Halbinsel). — *lugens* Burr
 p. 309. — *vicina* **n. sp.** (nahe verw. mit *O. lugens* Borm.) p. 309. — *nevilli*
n. sp. p. 309—310 ♂ ♀ (India; India Bhoutan, Maria-Basti). — *brahma*
n. sp. (mit keiner rechte Verwandtschaftsbeziehungen) p. 310—311 ♂ (India
 borealis, Dardjiling u. Bhoutan, Maria Basti). — *annandalei* **n. sp.** p. 311
 — 312 ♂ (Siamesische malayische Provinzen, Nawnchik, Bukit, Bear). —
shelfordi **n. sp.** (verw. mit *americana*) p. 312 ♂ ♀ (Sarawak, Kuching). —
temora **n. sp.** (keiner nahe verw., am nächsten steht wohl *O. lugens* Borm.)
 p. 312—313 ♂ (India borealis, Dardjiling).
- Platylabia gestroi* Beschr. d. ♀. **Burr**, t. c. p. 300. — *camerunensis* **n. sp.** **Borg**,
 Arkiv Zool. Bd. I p. 570 pl. XXVI fig. 4. — *bihastata* **n. sp.** p. 571 tab. cit.
 fig. 5 (beide aus Kamerun).
- Pyragra paraguayensis* **n. sp.** **Borelli**, Boll. Mus. Torino XIX No. 479 p. 1 (Assuncion).
- Sparatta bongiana* **n. sp.** **Borg**, Arkiv Zool. Bd. I pl. XXVI fig. 3 (Kamerun). —
w-signata **n. sp.** **Burr**, Trans. Entom. Soc. London 1904 p. 302 ♂ (Mexico).
- Spongiphora geayi* **n. sp.** **Burr**, p. 295 ♂ (Darien). — *assiniensis* Borm. p. 295
 — 296 ♂ (West-Afr., Assini; Fernando Po). Nähert sich *S. parvicollis* u.
S. similis. — *ochracea* **n. sp.** **Borg**, Arkiv Zool. vol. I p. 569 pl. XXVI fig. 6
 (Kamerun). — *vicina* **n. sp.** **Borelli**, Boll. Mus. Torino XIX No. 479 p. 6
 (Paraguay).
- Tomopygia* **n. g.** Typus *Cylindrogaster abnormis* Borm.) **Burr** p. 287—288. —
 Übersichtstab. über die Arten: *abnormis* Borm. u. *sinensis* **n. sp.** p. 288
 (China, Peking, Mountains).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [71-2_2](#)

Autor(en)/Author(s): Lucas Robert

Artikel/Article: [Euplccoptera \(= Derinaptera = Dermatoptera = Forficulidae\) für 1904. 890-896](#)