

**Chalicodoma manicata** var. **fumata** n. var. ♀.

Wie *Ch. manicata*, aber überhall schwarzbraun behaart, nur die Scopa mitten auf der Scheibe noch rotbraun.

1 ♀ von Lesina (Dalmatien).

---

## Namensänderungen für einige Apiden (Hym.).

Von

**Dr. H. Friese.**

---

Für *Anthophora aethiopica* Friese 1911 in: Zoolog. Jahrb. Syst. v. 30 p. 659 (nec *A. aethiopica* Cameron 1905 vom Kapland) ist zu setzen: **Anthophora abessinica!**

Für *Centris bakeri* Friese 1912 in: Archiv f. Naturg. Heft 6 p. 199 (nec *C. bakeri* Cockerell 1912) ist zu setzen: **Centris bakerella!**

Für *Melissa imperialis* Friese 1912 in: Archiv f. Naturg. Heft 6 p. 199 (nec *M. imperialis* Ashmead 1900) ist zu setzen: **M. imperatrix!**

Für *Crocisa albomaculata* Smith 1868 und Friese 1905 von Australien (in Smith, Tr. Ent. Soc. London 1868 p. 258 ♀ und Friese Z. f. Hym. Dipt. 1905 v. 5 p. 2) (nec *Cr. albomaculata* Degeer 1778 vom Kapland) ist zu setzen: **Crocisa albovittata!**

---

## Lepidoptera aus dem belgischen Kongo.

Von

**Embrik Strand.**

---

Aus dem belgischen Kongomuseum in Tervueren wurde mir durch Herrn Dr. H. Schouteden eine schöne Sammlung Lepidopteren, vorwiegend Heterocera, zur Bearbeitung gefälligst anvertraut. Einige der Ergebnisse meiner Bearbeitung dieses Materials sind schon veröffentlicht<sup>1)</sup>, im folgenden gebe ich ein Verzeichnis einer Anzahl der schon bekannten Arten und weitere einschlägige Publikationen, vor allem auch Beschreibungen von Novitäten aus dieser Sammlung hoffe ich demnächst geben zu können.

---

<sup>1)</sup> Strand: Insectes recueillis au Congo au cours du voyage de S. A. R. le Prince Albert de Belgique. Lepidoptera Heterocera. In: Revue Zoologique Africaine II. p. 87 sq. (1912).

Strand: Exotisch-Lepidopterologisches. In: Archiv f. Naturgesch. 1911 A. 9. p. 143 sq.

Fam. *Syntomididae*.*Euchromia lethe* F.

5 Exemplare: Kitobola 1911 (Rovere), Lukombe, 20. X. 08 (A. Koller), Equateur (Dr. Bourgoignie), Stanleyville (H. M. Vermeulen), Coquilhatville, 20. V. 09.

*Syntomis tomasina* Butl.

Unikum von Kitobola 1911 (Rovere).

*Pompostola hypparchus* Cr.

Unikum von: Dina, 24. IX. 08 (A. Koller).

*Pompostola semiaurata* Wlk.

Unikum von Isangi, X. 05. Lomami-Gebiet, Regenzeit (H. Wilmin).

*Metarctia rufescens* Wlk.

Unikum, bei Nacht gefangen, 345 km von Kindu (Russo).

*Metarctia flavivena* Hamps.

3 Exemplare, ebenda.

*Metarctia lateritia* H.-Sch.

2 Exemplare, ebenda.

*Metarctia invaria* Wlk.

Ein ♂ von Isangi, X. 05, Lomami-Gebiet, Regenzeit (H. Wilmin).  
Ein ♀ von: 345 km von Kindu (Russo)

*Pseudapiconoma pulchra* Auriv.

Unikum von Thysville, 17. XI. 06 (Frl. Duhem).

Fam. *Arctiidae*.*Alytarchia leonina* Wlk.

Unikum von Semliki.

*Diacrisia simulans* Butl.

Unikum von Matadi, 17. XII. 06 (Frl. Duhem).

*Diacrisia maculosa* Cr.

3 Exemplare, Sassagebiet (Colmant) und Kinshassa.

*Utetheisa pulchella* L.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Rhodogastria subvitrea* Bartel.

Unikum, nachts gefangen, 345 km von Kindu (Russo).

*Rhodogastria vidua* Cr.

Unikum ebenda.

*Amphicallia tigris* Butl.

Unikum von Uganda, 5. XI., eins von Kyabalenge, Uganda.

*Deilemera apicalis* Wlk.

Je ein Exemplar vom Sassagebiet (Colmant) und Stanleyville (H. M. Vermeulen) sowie eins, von Prinz Albert gesammelt, von „dans le chenal, à terre, 12. VIII. 09.“

*Deilemera perspicua* Wlk.

2 Exemplare: Equateur-Tschwapa (H. Wilmin) und Kilo.

*Deilemera (Xylecata) druma* Swh.

Ein ♀ vom Sassagebiet (Colmant) stelle ich unter Zweifel zu dieser Art, denn die Originalbeschreibung läßt keine unbedingt sichere Be-

stimmung zu. Von meinen Bemerkungen über die Art in meiner *Deilemra*-Arbeit in: Ann. Soc. entom. Belgique 53 (1909) p. 26, weicht dies Exemplar durch breitere schwarze Vorderflügelbinde ab, indem diese die ganze Spitze der Zelle bedeckt, bezw. ihr Innenrand geht durch die Basis der Rippe 3; die Binde der Hinterflügel ist in der Mitte unverkennbar schmaler als dahinter und noch mehr als weiter vorn.

Fam. *Noctuidae*.

*Xanthopiloptyx signata* Bart. [*Agaristinae*].

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Xanthopiloptyx poggei* Dew. [do.].

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Aegocera menete* Cr. [do.]

Unikum, bei Nacht gefangen, 345 km von Kindu (Russo).

*Aegocera fervida* Wlk. [do.].

Unikum von Kinshassa.

*Mazuca strigicincta* Wlk. (= *Mila hebraica* Auriv.) [do.]

Unikum, 345 km von Kindu (Russo).

*Ophiusa allardi* Obthr.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Ophiusa ezea* Cr.

Unikum, Kelemba-Mondjo, 15. I. 06 (Waelbroeck).

*Ophiusa algira* L.

3 Exemplare, Kitobola (Rovere), Givi, IV. 82 und: bei Nacht gefangen, 345 km von Kindu (Russo).

*Ophiusa catocaloides* Gn.

20 Exemplare, 345 km von Kindu (Russo). Ferner zwei von Prinz Albert gesammelte Exemplare (cf. Strand in Rev. Zool. afric. II. p. 88 [1912]).

*Ophiusa finita* Gn.

6 Exemplare, Ukaturaka, 7. XI. 05 (Waelbroeck), Kelemba-Mosambi, 14. X. 05 (do.), Lisala, 22. X. 05 (do.), Stanleyfalls, 1. XI. 05 (do.), Bassoko-Bandu, 25. X. 05 (do.).

*Ophiusa mormoides* Wlk.

4 Exemplare, Kasai (Schwindel), Stanleyville (H. M. Vermeulen), Busira, 7. XI. 05, Bangolo, 20. X. 05.

*Ophiusa croceipennis* Wlk.

Unikum, nachts gefangen, 345 km von Kindu (Russo).

*Ophiusa lienardi* Bsd.

4 Exemplare, Léo-Stanleyville (Weyns), Mayumbe (Cabra).

*Hypopyra capensis* H.-Sch.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Grammodes benitensis* Holl.

21 Exemplare, Gambuge, 5. XI. 05 (Waelbroeck), Bangola, 20. X. 05 (do.), Kasai-Eiolo, 16. I. 06 (do.), Stanleyville (Vermeulen), Mayumbe (Cabra), Semliki und 345 km von Kindu.

Die Art ähnelt außer wie von Holland angegeben *euclidicola* Wlk. auch *deltifera* Feld. Rog. und *ditrigona* Hamps. 1910. — Liegt mir auch von der typischen Lokalität Benito vor.

„*Dysgonia*“ *plutonia* Holl. 1896.

Unikum von Kasai-Dima, 24. VII. 06 (Waelbroeck).

*Arcte maurus* Holl.

10 Exemplare, Bumputu, 6. X. 05, 11. X. 05; Busira, 15. X. 05; Coquilhatville, 16. X. 05; Ronéc, 27. X. 05, Kelembo-Montejo, 12. XI. 05, alles von Waelbroeck gesammelt. Ferner: Api, 26. X. 08 (Laplume), Sassagebiet (Colmant).

*Miniodes discolor* Gn.

Je 1 Exemplar von Lofoi (Lemaire) und 345 km von Kindu (Russo).

*Cyligramma fluctuosa* Dr.

10 Exemplare, Kasai-Dima, 15. I. 06 (Waelbroeck), Sassagebiet (Colmant) und 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo). — 1 Exemplar von Nyangwe.

*Cyligramma acutior* Gn.

2 Exemplare vom Sassagebiet (Colmant), eins von 345 km von Kindu, Nachts gefangen (Russo).

*Cyligramma latona* Cr.

4 Exemplare, Sassagebiet (Colmant), Busira, 10. III. 06 (Waelbroeck) und 345 km von Kindu (Russo).

*Cyligramma limacina* Gn.

2 Exemplare, Sassagebiet (Colmant) und 345 km von Kindu (Russo).

*Aburina electa* Karsch.

Unikum, Mayumbe (Cabra).

*Acantholipes acephala* Strand.

Unikum von „Poste bois No. 7, 13. VI. 09.“

*Sphingomorpha pudens* Holl.

Je ein Exemplar von Barumba, Basoko, 4. VII. 09 und zwischen Lisala und Nlle Anvers, 5. VII. 09.

*Sphingomorpha chlorea* Cr.

17 Exemplare, 345 km von Kindu (Russo); Semliki, 10. V. 11; Mayumbe (Cabra); Kimbimi, Katanga (Lemaire).

*Ophideres materna* L.

3 Exemplare, 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Ophideres princeps* Bsd.

3 Exemplare, Sassagebiet (Colmant), Ht. Itimbiri (Wilmin), Kasai (Schwinde).

*Ophideres fullonica* L.

3 Exemplare von Mayumbe (Cabra).

*Nyctipao macrops* L.

3 Exemplare, Matadi, 18. X. 07 (Frl. Duhem), Mayumbe (Cabra), Kasai (Schwinde). Ferner je 1 Exemplar von Kinshassa und Busira, 6. V. 06 (Waelbroeck).

*Polydesma inangulata* Gn.

Je ein Exemplar von Mayumbe<sup>3</sup> (Cabra) und Nieder-Kongo (Weyns).

*Lagoptera rubricata* Holl.

3 Exemplare, Bangala-Bombili, 9. XI. 05 (Waelbroeck), Busira, 15. V. 06 (do.), 345 km von Kindu (Russo).

*Lagoptera parallelepipedata* Gn.

Unikum, etikettiert: Cabra, Mayumbe.

*Timora lanceolata* Wlk.

2 Exemplare, 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Parastichtis nigricostata* Hamps.

Ein ♂ von Bussenge, 14. X. 05 (Waelbroeck). — Im Berliner Museum liegt die Art mir von Mhonda in Ost-Afrika, Kamerun und Togo vor. Alle mir bekannten Exemplare weichen von Hampsons Abbildung dadurch ab, daß der Rücken des Hinterleibes hell gefärbt ist. Sonst variiert eigentlich nur die Färbung der Hflg., indem diese in der Endhälfte bald ziemlich dunkel, bald so hell wie in der Basalhälfte sein können; die Fransen der Hflg. bleiben jedoch immer hell. Das von Hampson abgebildete dunkelrückige Exemplar von Mauritius, das natürlich als der *f. princ.* angehörend betrachtet werden muß, weicht durch dies Merkmal, nach der Abbildung zu urteilen, so erheblich von der westafrikanischen Form ab, daß diese einen eigenen Namen verdiente (eventuell var. *clarinota* m.). Dabei bleibt die Sache jedoch insofern fraglich, als Hampson von Mauritius nur ein Stück zur Verfügung hatte.

„*Xanthodes*“ *canela* (Druce) Holl.

Ein Ex. von Bumputu, 6. X. 05 (Waelbroeck) stimmt so ganz mit Hollands Abbildung von *Xanthodes canela* Druce in Psyche VII, t. 1. f. 27, daß ich an der Zugehörigkeit nicht zweifeln möchte, wenn auch das Exemplar etwas groß ist: Flügelspannung 36, Flügellänge 16 mm.

*Chalciope geometrica* F.

Unikum von Kasai-Lodima, 10. VIII. 06 (Waelbroeck).

*Chalciope repanda* F.

Unikum von Leo-Stanleyville (Wenys), eins von 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Hypocala moorei* Butl.

12 Exemplare, Busira, 17. XI. 05 (Waelbroeck), Lomela-Baringa, 4. X. 05 (do.), Kelemba-Mosambi, 4. I. 06 (do.), Mayumbe (Cabra), und 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Ogovia tavetensis* Holl.

Unikum von letzterer Lokalität.

*Eutelia angasi* Wing.

3 Exemplare, Kasai, Lukenge (Fontainas), Ukatwra, 7. XI. 05 (Waelbroeck), 345 km von Kindu, nachts (Russo). — 1 Ex. von Barumba.

*Euheterospila antennalis* Strand.

Unikum, in: Rev. Zool. Afric. II. p. 89 (1912) beschrieben.

*Tarache perta* Schaus.

3 Exemplare, 345 km von Kindu, bei Nacht gefangen (Russo).

*Hyblaea occidentalis* Holl.

Unikum von Bololo, 12. I. 06.

Fam. *Lymantriidae*,

*Nyctemera occidentis* Wlk.

Unikum von Bomona (Etienne).

*Stilpnolia* sp.

Unikum, von Prinz Albert gesammelt, von „Poste de bois No. 7, à bord, à 19 heures, 13. VI. 09“.

*Aroa discalis* Wlk.

3 Exemplare, eins von Thysville, 17. XI. 06 (Frl. Duhem), zwei von 345 km von Kindu (Dr. Russo).

*Dasychira stegmanni* Grbg.

Ein ♀: „D. R.“

*Numenes libyra* Druce.

Unikum von 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Lacipa quadripunctata* Dew.

Unikum von ebenda.

*Cropera testacea* Wlk.

Je ein Stück von Toro-Semliki, 1.—10. IV. 11 (Dr. Bayer) und 345 km von Kindu (Russo).

*Porthesia producta* Wlk.

Ein Pärchen: „D. T.“

Fam. *Hypsiidae*.

*Geodena quadrigutta* Wlk.

Je ein Exemplar vom Sassagebiet (Colmant) und Api, 18. X. 08 (Laplume).

*Soloe bigutta* Holl.

Unikum, Bilinyama-Tale, 12. —20. VI. 11 (Dr. Bayer).

„*Soloe*“ *trigutta* Wlk.

Unikum von Bumputu, 7. X. 05 (Waelbroeck).

*Phaegorista similis* Wlk.

Unikum von Kasai (Schwinde).

Fam. *Sphingidae*.

*Macroglossum trochilus* Hb. *trochiloides* Btl.

Unikum von Katanga (Weyns).

*Euchloron megaera* L.

Unikum von Stanleyville, 30. VI. 09.

*Herse convolvuli* L.

Unikum von Equateur-Tschwapa (H. Wilmin).

*Nephele bipartita* Butl.

Unikum von Equateur-Tschwapa (H. Wilmin).

*Hippotion osiris* Dalm.

Unikum von Kitobola (Rovere).

*Hippotion eson* Cr.

Unikum von Haut Ituri, Regenzeit (H. Wilmin), zwei von Kitobola (Rovere) und eins von 345 km von Kindu (Russo).

*Leucophlebia xanthopis* Hamps. (= ? *afra* Karsch).

Zwei Exemplare von Kitobola (Rovere).

Fam. *Janidae*.

*Phiala nigrolineata* Aur. v. *ochrascens* Grbg.

3 Exemplare, 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Janomima mariana* White.

Ein ♂ von Kinshassa, ein ♀ von Equateur-Tschwapa (H. Wilmin).

*Jana eurymas* H.-Sch.

Unikum von Brazzaville, 4. XI. 06 (Frl. Duhem).

*Jana gracilis* Wlk.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

Fam. *Notodontidae*.

*Rigema ornata* Wlk.

3 Exemplare von 345 km von Kindu (Russo).

*Rigema woerdeni* Smell.

Unikum von Thysville, 7. III. 07 (Frl. Duhem).

*Anticyra atrata* Grbg.

3 Exemplare, 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Ramesa strigata* Auriv.

12 Exemplare, ebenda.

*Ramesa citana* Schaus-Clements.

4 Exemplare, ebenda. — Als „*Utidava?*“ beschrieben.

*Zana spurcata* Wlk. (*Nunua gallans* Karsch).

Un. ebenda.

Fam. *Geometridae*.

*Pisoraca leonaria* Wlk.

2 Exemplare, Bololo, 12. I. 06 (Waelbroeck), Ikelemba-Mosambi, 4. I. 06 (do.).

*Aletis helcita* Cl.

Unikum von Kasai, also anscheinend zusammen mit der sehr ähnlichen, aber einer anderen Familie angehörenden *Phaegorista similis* Wlk. fliegend.

Unikum von Banana, 5. IV. 10 (Dr. Etienne).

*Ludia orinoptena* Karsch.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Gonimbrasia osiris* Druce.

Unikum (♂) von Matadi, 10. XI. 06 (Frl. Duhem).

*Lobobunaea acetes* Westw.

Ein ♀ von 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Orthogonioptilum prox* Karsch.

Unikum von Stanleyville (H. M. Vermeulen).

*Goodia nodulifera* Karsch v. *nebulata* Holl.  
Unikum von Thysville, 17. XI. 06 (Fr. Duhem).

Fam. *Bombycidae*.

*Ocinara metallescens* Möschl.

Ein nicht gut erhaltenes ♀ vom Sassagebiet (Colmant) möchte ich als dieser Art angehörig betrachten. Es weicht von der mir vorliegenden männlichen Type durch kürzer gezähnte Antennen ab, und die dunkle postmediane Querlinie der Unterseite der Vorderflügel ist im Costalfelde stärker gekrümmt. Jedenfalls die Vorderflügel erscheinen ein wenig schmaler, ihr Vorderrand noch ein wenig deutlicher konkav. Flügelspannung 33, Flügelänge 17 mm. [Ob die Kammzähne des Exemplars nicht zum Teil abgenutzt sind und dadurch kürzer erscheinen als sie in der Tat sein sollten, ist mir etwas fraglich.]

Fam. *Cossidae*.

*Macrocoossus rudis* Auriv.

Zwei Exemplare vom Sassagebiet (Colmant), das eine trägt die nähere Bezeichnung Bomet.

Fam. *Lasiocampidae*.

*Phasicnecus roseus* Druce.

Unikum, 345 km von Kindu (Russo).

Fam. *Limacodidae*.

*Delorhachis viridiplaga* Karsch.

Unikum von Kelemba-Bryengi, 7. I. 06.

*Brachia argyrogramma* Karsch.

2 Exemplare, Thysville, 17. XI. 06 (Fr. Duhem) und 345 km von Kindu (Russo).

Fam. *Nymphalididae*.

*Acraea terpsichore* L. ab. *janiscella* Strand.

Unikum, gesammelt von Prinz (jetzt König) Albert.

*Harmilla elegans* Auriv.

Unikum, wie vorige Art.

*Ergolis alphaea* Dr.

Unikum vom „Congo Belge“.

*Euptera sirene* Stgr.

Unikum von Api, X. 08.

Fam. *Lycaenidae*.

*Cupido telicanus* Lang v. *plinius* F.

Unikum, 345 km von Kindu (Russo).

*Liptena libyssa* Hew.

Unikum von Mangwe (H'Couqo).

*Lycaenesthes larydas* Cr.

Unikum von Busira, 30. V. 06 (Waelbroeck); eins von „Poste bois No. 11. 15. VI. 09“.

*Cupido togara* Pl.

Unikum von Busnaga, 14. X. 05 (Waelbroeck).

*Cupido cyura* Hew.

Unikum von Watsi Kengo, 9. X. 05 (Waelbroeck).

*Lycaenesthes sylvanus* Drury.

Ein wohl dieser Art angehöriges ♀ von Busira, 30. V. 06 (Waelboreck).

*Deudoryx antalus* Hopff. v. *kitobolensis* Strand.

Ein ♀ von Kitobola.

Fam. *Hesperiidae*.

*Eagris jamesoni* Sharpe.

2 Exemplare von Katanga (Lemaire).

*Ploetzia weiglei* Möschl.

Unikum von Banana (Dr. Etienne).

*Parnara borbonica* Bsd. v. *continentale* Strand.

Zwei Exemplare vom Sassagebiet (Colmant).

*Artitropa comus* Cr.

Unikum von Ganda (Body).

*Caenides maracanda* Hew.

Ein ♀ vom Sassagebiet (Colmant).

*Andronymus ligora* Hew.

Unikum von Kindu-Kabombo, 16. VI. 09.

*Rhabdomantis galatia* Hew.

Unikum von Kasai-Lodima, 28. I. 06 (Waelbroeck).

*Rhopalocampta unicolor* Mab.

2 Exemplare von Kwamouth, 13. I. 06 (Waelbroeck) sowie 3, von Prinz Albert gesammelt.

*Rhopalocampta iphis* Drury.

2 Exemplare, Nyangwe (H'Couqo) und Kinshassa.

*Rhopalocampta forestan* Cr.

7 Exemplare, Sassagebiet (Colmant), Ganda (Body), Kilo, Stanleyville (Vermeulen), Kwamouth-Bokabo, 13. I. 06 (Waelbroeck).

*Rhopalocampta chalybe* Dbl. Hew.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Tagiades flesus* L.

2 Exemplare vom Sassagebiet (Colmant).

*Celaenorrhinus galenus* L.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Osmodes distincta* Holl.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Pardaleodes reichenowi* Pl.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Tegenes hottentota* Latr.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Carcharodes elma* Trim.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Acleros ploetzi* Mab. und *olaus* Pl.

Ebenda.

*Gegenes obumbrata* Trim.

2 Exemplare vom Sassagebiet (Colmant).

*Chapra mathias* F.

Je 1 Exemplar vom Sassagebiet (Colmant) und von Kitobola (Rovere).

*Semalea pulvina* Pl.

Unikum vom Sassagebiet (Colmant).

*Pardaleodes incerta* Snell.

2 Exemplare vom Sassagebiet (Colmant).

*Hesperia dromus* Pl.

2 Exemplare vom Sassagebiet (Colmant).

Fam. *Euschemonidae*.

*Micronia tenella* Wlk.

Unikum von Thysville, 17. XI. 06 (Frl. Duhem).

*Micronia albaria* Pl.

Je 1 Exemplar von Basoko, 23. X. 05 (Waelbroeck) und 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Micronia erycinaria* Gn.

Unikum vom Sassagebiet (Colmat).

Fam. *Zygaenidae*.

*Saliunca styx* Fabr.

Zwei Exemplare von Katanga.

Fam. *Pyralididae*.

*Glyphodes sericea* Dru.

Je 1 Exemplar von Kitobola (Rovere) und 345 km von Kindu (Russo).

*Glyphodes sinuata* F.

4 Exemplare, Stanleyville (H. M. Vermeulen), Kelemba - Bombemba, 13. XI. 05 (Waelbroeck) und 345 km von Kindu (Russo). Ferner ein von Prinz Albert gesammeltes Exemplar.

*Glyphodes ocellata* Hamps.

Unikum von „F. D.“

*Glyphodes arachnealis* Wlk.

4 Exemplare von Bololo, 12. I. 06 (Waelbroeck).

*Glyphodes bipindalis* Strand.

4 Exemplare, Busira, 17. IX. 05 (Waelbroeck), Bussanga, 14. X. 05 (do.), Bololo, 12. I. 06 (do.), Léo-Stanleyville (Weyns).

*Glyphodes indica* Saund.

Bumputu, 11. X. 05 (Waelbroeck).

*Nacoleia poeonalis* Wlk.

4 Exemplare, 345 km von Kindu (Russo).

„*Sylepta*“ *nyasana* Grbg.

4 Exemplare, 345 km von Kindu (Russo). Das Tier wird wohl eine *Nacoleia* sein.

*Nacoleia indicata* F.

2 Exemplare.

*Glyphodes bonjongalis* Ploetz.

6 Exemplare, Ht. Congo, Bumba, 21. X. 05 (Waelbroeck); Kasai, Lukenge (Fontainas); 345 km von Kindu (Russo).

*Glyphodes squamitibialis* Strand 1912.

Ein ♂ von Kasai, Lukenge (Fontainas).

Die Angabe in meiner Beschreibung (in: Arch. f. Natg. 1912 A. 2. p. 67—68), daß der Haarbüschel an der Oberseite der Tibia II nicht bis zur Spitze der Glieder sich erstreckt, ist nicht zutreffend, sondern vielmehr darauf, daß der betreffende Büschel meiner Typen teils teilweise abgerieben und teils eine der Untersuchung ungünstige Lage hatte, zurückzuführen; der Endpinsel des Gliedes bildet in der Tat die direkte Fortsetzung des Büschels.

*Glyphodes triangularis* Strand v. (?) *bololalis* Strd. n. var.

Ein ♂ von Bololo, 12. I. 06 (Waelbroeck) erinnert sehr an eine *Glyphodes triangularis* Strd., ist aber noch ein wenig größer und robuster (Flügelspannung 41 mm, Flügellänge 18,5 mm, Körperlänge 18 mm), die Palpen sind außen grün, an der Spitze braun, unten weißlich, der Haarbüschel am Ende des Abdomen ist verhältnismäßig noch ein wenig kleiner. Im Vorderflügel ist ein schwarzer Punkt in der Mitte der Zelle vorhanden, der Discozellulärfleck ist ebenfalls fast punktförmig, der Discozellulärfleck der Hinterflügel erscheint dagegen als ein 1,5 mm langer Querstrich. Der Saum der Hinterflügel erscheint ziemlich stark gewölbt, dieselben sind infolgedessen fast halbkreisförmig, bei *triangularis* dagegen dreieckig erscheinend; dabei ist aber zu bemerken, daß die Hinterflügel beider Seiten ein wenig beschädigt und nicht ganz tadellos gespannt sind. Unter diesen Umständen möchte ich vorläufig diese Form als eine Varietät meiner *triangularis* aufführen, indem ich bemerke, daß wenigstens bei einem Exemplar meiner 2 Typen der Hauptform Andeutung eines schwarzen Diskalpunkts im Vorderflügel sich erkennen läßt.

*Botyodes asialis* Gn.

Je 1 Exemplar von Bumba, 3. X. 05 (Waelbroeck) und Busira, 15. VI. 06 (do.).

*Pachyzancla bipunctalis* F.

Unikum von Busira (Waelbroeck).

*Ulopeza conigeralis* Zell.

Unikum von Kasai-Dima, 15. I. 06 (Waelbroeck).

*Sylepta torsipea* Hamps.

Je 1 Exemplar von Eola, 14. II. 06 und (schlecht erhalten, aber dennoch wahrscheinlich richtig bestimmt!) von Kelemba-Monsambi, 8. I. 06 (Waelbroeck).

*Hyalobathra auralis* Sn.

7 Exemplare, Bololo, 12. I. 06; Ht. Congo, Bumba, 21. X. 05; Lomela, Gombe, 6. X. 05; Basoko, 23. X. 05; alles von Waelbroeck gesammelt.

*Glaucoda transparitalis* Karsch.

3 Exemplare von Stanleyfalls, 31. X. und 1. XI. 05 (Waelbroeck).

„*Filodes*“ *hesualis* Lederer.

Je 1 Exemplar von Kelemba-Mosambi, 4. I. 06 (Waelbroeck) und Bumba, 23. X. 05 (do.).

*Maruca testulalis* Geyer.

6 Exemplare von Bololo, 12. I. 06; Kitobolo und 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Sylepta purpurascens* Hamps.

Unikum von Lomela, Gombe, 6. X. 05 (Waelbroeck).

*Crocidophora simisalis* Wlk.

4 Exemplare, Kasai-Eiolo, 16. I. 06 (Waelbroeck), 375 km von Kindu (Russo).

*Marasmia rectistrigosa* Sn.

Unikum, 345 km von Kindu, nachts gefangen (Russo).

*Zebronia phenice* Cr.

4 Exemplare, Kitobolo (Rovere) und 345 km von Kindu (Russo).

Fam. *Tineidae*.*Tineola vastella* L.

Unikum, 345 km von Kindu (Russo).

*Tiquadra goochii* Walsh.

Ein Exemplar von 345 km von Kindu möchte ich zu dieser Art stellen, jedenfalls ist es mit dem Exemplar von den Comoren, das von Pagenstecher in seiner Bearbeitung der von Voeltzkow gesammelten Heterocera unter diesem Namen aufgeführt wird, identisch. Daß die Färbung dieser beiden Exemplare mehr ockergelblich ist, als man nach der Originalbeschreibung vermuten könnte, erklärt sich vielleicht daher, daß die Type Walsinghams nicht gut erhalten war, was schon seine Angabe „Abdomen missing“ vermuten läßt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [78A\\_12](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Lepidoptera aus dem belgischen Kongo. 89-100](#)