

Im Gennargentuberge auf Sardinien gesammelte Coleopteren.

Von

Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen.

Wie gerade die Käfer zu zoogeographischen Studien besonders geeignet sind, hat Hauptmann Jean Sainte-Claire Deville in einer interessanten Abhandlung auseinandergesetzt („De l'utilisation des Insects et particulièrement des Coléoptères dans les questions de zoogéographie“, I. Congrès International d'Entomologie, Bruxelles 1911). Ich halte es deshalb nicht für überflüssig, eine Liste der hier im Gennargentu auf Sardinien gefundenen Coleopteren zu publizieren, da es sich um eine noch wenig durchsuchte Lokalität handelt. Zudem haben die allermeisten der hier erwähnten Käfer den Herren Reitter, Deville, Formánek, Fiori vorgelegen, wodurch die Liste besonders wertvoll sein dürfte. Die größte Anzahl der angeführten Spezies stammt aus der Umgegend von Sorgono (etwa 700 m ü. d. M.), einige wenige, die von anderen Gegenden stammen, sind mit besonderer Fundortsangabe versehen. Die mit einem Stern bezeichneten Arten sind neu oder für die Insel neu oder sonst besonders bemerkenswert. — Im kommenden Herbst hoffe ich eine weitere Liste publizieren zu können, da ich bis zum Oktober hier in den einsamen Bergen zu bleiben gedenke. — Über Coleopteren anderer Gegenden Sardiniens habe ich mehrfach an anderer Stelle berichtet („Entomologische Rundschau“, „Entomologische Blätter“, „Rivista Coleotterologica Italiana“).

Cicindelidae.

Cicindela campestris corsicana Roesch.

Bei Sorgono in etwa 800 m Höhe schon Mitte Februar. (Über sardische Varietäten dieser Subspezies habe ich an anderer Stelle — Entomologische Rundschau, 1911,— berichtet und folgende aufgezählt: *saphyrina* Gene, *connata* m., *apicalis* m., *reducta* m., *neglecta* m., *viridis* m.)

Carabidae.

Calosoma sycophanta L. (Det. Born).

Carabus morbillulosus Arborensis m.

Carabus Genei G.

(Die Var. *Kraussei* Born fand ich nicht im Gebirge, sie ist besonders in der Gegend von Oristano am Meere zu finden.)

**Notiophilus quadripunctatus* Dej., *N. rufipes* Curt.

Reicheia Usslaubi var. *sardoa* Aritzo.

Bembidion Dahli Dej., *B. elongatum* Dej., *B. laterale* Dej., *B. Genei specularare* Küst., *B. Lafertei* Duv., *B. Andreae* F., *B. Andreae* var. *Bualei* Duv.

Tachys bisulcatus Nic., *T. bistratiatus* Duft., **T. vittatus atratus* Costa.

Scotodiphus strictus Baudi. Aritzo,

Im Gennargentuberge auf Sardinien gesammelte Coleopteren. 143

Sorgono, * <i>S. strictus gigas</i> m.	Xantholinus linearis Ol., X. angustatus Steph.
Aritz.	
Trechus rufulus Dej.	Philonthus badius Kiesw., P. nigritulus Grav.
Ophonus maculicornis Duft.	Bolitobius trimaculatus Payk., B. trinotatus Er., B. trinotatus discophorus Rey.
*Harpalus oblitus Dej.	Tachyporus hypnorum F., T. nitidulus F., T. pusillus Grav.
Stenolophus teutonus Schrnk.	Hypocyptus longicornis Payk., H. seminulum Er.
Acupalpus dorsalis F., A. d. notatus M. u. R., A. d. discus	*Habrocerus capillaricornis Grav. var.
Reitter, A. d. sardous Fiori.	*Atheta triangulum Kr., *A. orphana Er., *A. sordidula Er., A. analis Grav.
Anisodactylus binotatus F.	Zyras Haworthi Steph.
Diachromus germanus L.	Oxypoda alternans Grav., O. luiridea Woll., *O. fusina Rey.
Amara lucida Duft.	Cratarea suturalis Mannh.
Percus cylindricus Chd.	Conurus pubescens Grav.
Pterostichus niger Schall, P. versicolor Panz.	*Agaricochara laevicollis Kr.
Calathus melanocephalus L.	Acrotona pulchra Kr.
Agonum ruficornis Goeze, * <i>A. nudicicum</i> Luc., * <i>A. angustatum</i> Dej. ? (Det. Reitter).	<i>P se l a p h i d a e.</i>
*Metabletus impressus Dej., M. truncatellus L., M. foveatus Geoffr.	*Trimium microphthalmum Doderi i. l.
*Microlestes laevipennis Luc., M. minutulus Goeze.	Euplectus narentinus Reitter?
Demetrias atricapillus L.	Amaurops sardoa Sauley.
Drypta dentata Rossi.	*Brachygluta corsica Sauley.
Brachynus sclopeta F.	Reichenbachia nigriventris Schaum.
Asaphidion flavipes L., * <i>A. fl. var.</i>	Bythinus difficilis Reitt., *B. italicus n. v. sanguinipennis Reitt. i. l., B. italicus Baudi, B. Aestivaliae Reitter (det. Melichar).
<i>D y t i s c i d a e.</i>	<i>S c y d m a e n i d a e.</i>
*Hydroporus obsoletus Aubé., H. lepidus Ol., H. flavipes Ol., *H. striola Gyllh.	Euthia formicetorum Reitter.
Agabus chalconotus Panz., A. paludosus F.	Stenichnus Kunzei Gené., * <i>S. K.</i> var. nov. Kraussei Reitter i. l.
<i>S t a p h y l i n i d a e.</i>	*Euconnus cornutus Saulcy.
Micropelus fulvus Er.	Seydmaenus tarsatus Müll., S. cerastes Baudi.
Metopsia clypeata Müll.	
Proteinus ovalis Steph.	<i>S i l p h i d a e.</i>
*Phyllodrepa vilis Er.	Bathyscia Damryi Abeille, * <i>B. Kraussei</i> Melichar.
Oxytelus sculpturatus Grav.	Catops nigrita Er., C. fuscus Panz.
Platystethus alutaceus Thoms.	
Stenus ater Mannh., S. impressus Germ.	
*Astenus uniformis Duv., A. tristis Er.	
Medon melanocephalus Duv.	

Clambidae.

Clambus minutus Strm., **C. pallidulus* Reitter nov. spec.

Corylophidae.

Sericoderus lateralis Gyll., **S. lateralis* var. (det. Reitter).
**Orthoperus coriaceus* Rey.

Trichopterygidae.

**Ptenidium laevigatum* Er.
Ptinella aptera angustula Matth.,
P. tenella Er.

Scaphidiidae.

**Scaphosoma subalpinum* Reitt.,
S. agaricinum L.

Histeridae.

Carcinops minima Aub.
**Paromalus filum* Reitt. (det.
Reitter), *P. flavicornis* H. (det.
Bickhardt).
**Hetaerius ferrugineus* Ol.
Abraeus globosus Hoffm.
**Acritus atomarius* Aub.
Plegaderus pusillus Rossi.

Hydrophilidae.

Sphaeridium bipustulatum F.

Cantharidae.

**Malachius aeneus* L.

Ostomidae.

**Tenebroides maroccanus* Reitt.

Nitidulidae.

Carpophilus sexpustulatus F.,
C. bipustulatus Heer.
**Epuraea longula* var.
Meligethes tristis Sturm.
Rhizophagus punctiventris Baudi.

Cucujidae.

**Airaphilus talpa* Kr.
Silvanus unidentatus F.
Uleiota planata L.

Cryptophagidae.

Cryptophagus scanicus L., *C. pilosus* Gyll.
Atomaria pusilla Payk.

Lathridiidae.

**Lathridius angusticollis* pro-
ductus R.
**Corticaria corsica* Bris., *C. ful-
vipes*, *C. gibbosa* Hbst.
**Cartodere separanda* Reitt.
Melanophthalma distinguenda Co-
moli.

Cisidae.

Cis boleti Scop., *C. comptus* Gyll.
Rhopalodontus fronticornis Panz.
Octotemnus glabriculus Gyll.

Colydiidae.

Colydium filiforme F.
Ditoma crenata F.
Endophloeus Markovichianus Pill.
Teredus cylindricus Ol.
Cerylon histeroides F.
Oxylaemus cylindricus Panz.

Heleodidae.

Helodes Genei Guér.

Dermestidae.

Attagenus piceus Ol., **A. fallax*
Gené.
Globicornis variegata Küst.

Elateriidae.

Adelocera punctata Hbst.
Agriotes sordidus var. Schwarzi
Buyss.
Cardiophorus ulcerosus Gené., *C.
Eleonorae* Gené., *C. ebeninus*
Germ.
Drasterius bimaculatus Rossi.
Hypnoidus meridionalis Lap.

Eucnemidae.

**Throscus corsicus* Reitt.

Buprestidae.

Aphanisticus elongatus Villa.

Ptinidae.

**Ptinus subpilosus* Strm., *P. sex-
punctatus* Panz.

Anobiidae.

Anobium striatum Oliv.

Im Gennargentugebirge auf Sardinien gesammelte Coleopteren. 145

*P y t h i d a e.**Mycterus umbellatarum* F.*H y l o p h i l i d a e.***Hylophilus pruinosus* var.*A n t h i c i d a e.**Formicomus pedestris* Rossi.*Ochthenomus tenuicollis* Rossi.*M e l o i d a e.**T e n e b r i o n i d a e.***Asida barbaricina* Leoni, **A. rustica* var., *A. Combæ* Gené.*Scaurus striatus* F.*Blaps gigas occulta* Seidl., *B. lethifera* Marsh.*Hypophloeus fasciatus* F.*Caenocorse depressa* F.*C e r a m b y c i d a e.**Leptura maculata* Poda.*Cerambyx Scopolii* Füssl.*Hylotrupes bajulus* L. Aritzo.

Sehr variabel.

*C h r y s o m e l i d a e.**Timarcha sardoa* Villa.*Gastrophysa polygoni* L.**Longitarsus membranaceus* Foud., *L. jacobaeae* Waterh., *L. lupidus* Scop., **L. viduus* All.*Propylaea 14-punctata* L.**Prasocuris vicina* Luc.*Rhizobius chrysomeloides* Hbst.*L a r i i d a e.**Bruchidius foveolatus* Gyll., *B. murinus* Boh.*C u r c u l i o n i d a e.**Rhynchites auratus* Scop.*Auletes pubescens* Kiesw.*Apion seniculus* Kirb.*Tychius pusillus* Germ.**Acalles variegatus* Boh., *A. var. fuscus* Chevr.*Limobius borealis* Payk.*Lixus mucronatus* Ol., **L. Ascanii* L.*Cleonus coenobita*.**Sitones Kraussei* Formánek, *S. flavescens* Marsh., *S. lineatus* L., *S. humeralis* Steph.**Brachyderes pubescens* Boh.*I p i d a e.**Hypoborus ficus* Er.*Dryocoetus villosus* F., **D. Devillei* Eggers i. l. nov. spec.*Xyleborus Saxeseni* R., *X. dryographus* R., *X. monographus* F.*Platypus cylindrus* F. (det. H. Wichmann), *P. cylindriformis* Reitt. (det. Reitter).*L u c a n i d a e.**Dorcus musimon* Gené.*S c a r a b a e i d a e.**Pleurophorus caesus* Panz.**Aphodius affinis* Panz.*Thorectes intermedius* Costa.*Scarabaeus laticollis* L.*Copris hispanus* L.**Triodontula alni* Blanch. Im August gegen Abend in Massen an den Kastanienblüten fliegend.*Hoplia publicollis* Küst.*Oxythyrea funesta* Poda.*Cetonia carthami* Gory.*Sisyphus Schäfferi* L.

*

* *

N.B. Nach Herrn Major Prof. Dr. v. Heyden ist *Bythinus italicus* als Varietät des sehr weit verbreiteten und variablen *bulbifer* aufzufassen (v. Heyden i. l. 1911).

Sorgono, Sardinien, März 1912.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [78A_2](#)

Autor(en)/Author(s): Krausse Anton Hermann

Artikel/Article: [Im Gennargentugebirge auf Sardinien gesammelte Coleopteren. 142-145](#)