

110 Embrik Strand: Eine ostafrikanische Form von *Temnora albilinea*.

läßt sich nur zur Not als von der Radialzelle entspringend bezeichnen, indem der dieser Zelle am nächsten gelegene Abschnitt sehr schwach und bisweilen wahrscheinlich nicht erkennbar ist. Daß der Kopf länger als breit wäre, läßt sich eigentlich nur behaupten, wenn man, denselben von vorn betrachtend, von den Augen absieht. Die Färbung des Kopfes variiert von blassgelb bis schwarz, die des Thorax bis braunschwarz. Die Krallen sind nicht, wie von André angegeben, „simples“, sondern unverkennbar, wenn auch fein, gezähnt.

Eine ostafrikanische Form von *Temnora albilinea* Rothsch. (Sphingidae).

Von
Embrik Strand.

Temnora albilinea Rothsch. v. *obscurascens* Strand n. v.
Ein ♂: Deutsch Ost-Afrika, Uha (Bez. Udjidji) (Wintgens).

Mit *Temnora albilinea* Rothsch. von Angola jedenfalls nahe verwandt, weicht aber, nach der Abbildung (in: Genera Insectorum, 57. fasc. t. 6 f. 3) und Beschreibung (in: Novitates Zoologicae XI., p. 436) durch folgendes ab: Die Grundfarbe der Oberseite ist dunkler, die Hinterflügel ohne dunklere Rippen (die Figur von *albilinea*, ist in diesem Punkte vielleicht ungenau), auch im dunklen Felde der Vorderflügel sind keine Zeichnungen vorhanden, wohl aber längs des Vorderrandes etwas ockergelbliche Bestäubung, das Apikalfeld der Vorderflügel ist ebenfalls dunkler als bei *albilinea*, etwa graubraun, die innere Begrenzungslinie jedoch ziemlich scharf markiert bläulichweiß, die an der Figur von *albilinea* dargestellten Linien im Apikalfelde sind hier nur ganz schwach angedeutet. Die Oberseite des Körpers ist wie die Grundfarbe der Flügel und also ebenfalls dunkler als bei *albilinea*. Unterseite und Palpen stimmen ziemlich gut mit der Beschreibung. Augen grüngelblich schimmernd, mit kleinen, tiefschwarzen, scharf markierten Flecken.

Flügelspannung 54,5 mm, Flügellänge 25, Körperlänge 36 mm.
Die Hauptform stammt, wie gesagt, von Angola.

Ein neuer Nysson von Ceylon

gesammelt von Dr. W. Horn.

(Fam. Crabronidae).

Von
Embrik Strand.

Nysson Horni Strand n. sp.

Ein ♀ von Matale.

Ist mit dem europäischen *N. variabilis* Chevr. nahe verwandt. Die am nächsten verwandte indische Art dürfte *N. rugosus* Cam.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [79A_6](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Eine ostafrikanische Form von *Temnora albilinea* Rothsch. \(Sphingidae\). 110](#)