

dritten Tergit findet sich bei dem Individuum mit der zuerst beschriebenen Zeichnung jederseits ein sehr undeutlicher kleiner Fleck etwas hinter der Mitte, bei dem anderen Tiere steht an der gleichen Stelle jederseits ein deutlicher Quersfleck, der den Außenrand erreicht und auch auf dem vierten finden sich zwei kleine seitliche Flecken. Die Sternite sind an ihrem Hinterrand breit gelbesäumt.

Länge 10—12 mm.

Sardische Coleopteren.

Von

Dr. Anton Krausse.

Auch 1913 hatte ich Gelegenheit bei Sorgono auf Sardinien zu sammeln, sodaß ich von dieser Localität dem „Archiv für Naturgeschichte“ eine dritte Liste liefern kann:

Bembidion octomaculatum Goetz.

Tachys micros Fisch.

Acupalpis luteatus Duft.

Parnus luridus Er.

Oxytoda annulata Man.

Sipalia n. sp.?

Tachyporus solutus caucasicus Kol.

Trogophloeus corticinus Grav.

Bythinus bulbifer R.

Catopomorphus Bougeti Saul.

Stilbus testaceus P.

Melanophthalma fuscipennis M.

Soronia oblonga Bris.

Camptorrhinus simplex S.

Acalles variegatus Boh.

Acalles teter Boh.

Bruchidius perparvulus Boh.

Chaetocnema hortensis G.

*

Bembidion iricolor B.

Agonum marginatum L.

Acupalpus dorsalis notatus M.

Corylophus sublaevipennis Duv.

Eubrachium pusillum R.

Cryptopleurum atomarium Ol.

Opilo domesticus St.

Phalacrus fimetarius Fab.

Globicornis bifasciata Perr.

Athous brevicornis Desb.

Dorcatoma Dommeri Ros.

Gonodera murina maura Fab.

*

Deleaster dichrous Grav.

Ptinus brunneus testaceus B.

Drasterius bimaculatus variegatus
Küst.

Sitodrepa panicea L.

Tenebrio obscurus Fab.

Cordiophorus argiolus Gené.

Agriotes corsicus C.?

Bruchidius albolineatus Bl.

Trachys pygmaea ab. nov. *nigrescens* Fiori.

Trichius zonatus G.

Baris subferruginea ab. nov.

Phymatodes variabilis similis
Küst.

*

Aleochara moesta Grav.

Ocalea badia puncticollis Rey.

Atheta longicornis Grav.

Atheta parva Sahlb.

Atheta scrobicollis Krtz. (det. Bernhauer). Aus Ostindien beschrieben!

Atheta angusticollis Thoms.

Atheta zosteræ Thoms.

Leptacinus batychrus Gyll.

Oxytropa opaca Grav.

Falagria sulcata Grav.

Xantholinus glabratus Grav.

Quedius cruentus Oliv.

Quedius scintillans Grav.

Philonthus concinnus Grav.

Philonthus sordidus Grav.

Philonthus cephalotes Grav.

Myrmecopora fugax Er.

Paederus fuscipes Curtis.

Paederus meridionalis Fauvel.

Anthicus instabilis Schmidt.

Anthicus quisquilius Thomson.

Anthicus quadriguttatus Rossi.

Anthicus bifasciatus Rossi.

*

Stenus ater Mnnh.

„ *intricatus* Er.

„ *latus* Benick nov. spec.

„ *Kraussei* Benick nov. spec.

„ *coarctatus* Benick nov. spec.

„ *similis* Hbst.

„ *ossium* Steph.

„ *ossium* var. *insularis* Joy.

„ *picipennis* Er.

„ *nanus* var.

„ *cribratus* Kiesw.

„ *laevigatus* Rey.

„ *elegans* Rost.

„ *subaeneus* Er.

*

Stenopterus rufus L.

Stenopterus ater L.

Cerambyx velutinus Brullé.

Leptura cordigera Füssl.

Calamobius gracilis Creutz.

Agapanthia irrorata F.

Agapanthia cardui L.

Phytoecia coerulescens Scop.

*

*

*

Die folgenden Arten stammen von anderen Localitäten der Insel:

Stenichnus Kunzei var. *Baudii* Reitt. Asuni.

Stenichnus Kunzei var. *Kraussei* Reitt. Asuni.

Tychus Asuniensis Reitter n. sp. i. l. Asuni.

Neuraphes Ottonis Reitter. Asuni.

Neuraphes Uzaci Reitter = *Uzaci* Doderò i. l. = *Sardiniensis* Reitter i. l. Aritzo.

Stenichnus Sardous Reitter = *Sardous* Doderò i. l.

Den Herren Fiori, Bernhauer, Reitter, v. Heyden, Benick und M. Wegener für die mir immer gütigst gewährte Unterstützung bei der Determination auch an dieser Stelle meinen Dank.

Sorgono, Sardinien, August 1913.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [79A_7](#)

Autor(en)/Author(s): Krausse Anton Hermann

Artikel/Article: [Sardische Coleopteren. 184-185](#)