

Eine neue *Caenophanomyia*-Art vom Kap.

Von

Dr. med. **H. Brauns**, Willowmore.

Caenophanomyia Kröberi n. sp.

Körperlänge 9, Fühler 2, Flügellänge 8, Flügelbreite 2,4 mm.

Gleicht der einzigen bekannten Art, *C. insignis* Lw., ist aber vollkommener schwarz gefärbt. — Stirn und Scheitel glänzend schwarz, die Seiten fein silberweiß eingefasst. An einer Stelle im unteren Drittel berührt das Schwarze den Augenrand, hier den Silbersaum unterbrechend. Untergesicht silberweiß, minder glänzend. Fühler wie bei *C. insignis* tiefschwarz; das 1. Glied außerordentlich dicht und ziemlich lang stark schwarz beborstet, besonders an der Unterseite, wo die Borsten fast von der Länge des Gliedes sind. Taster keulig, tiefschwarz, ziemlich lang schwarz beborstet. Hinterkopf schwarz glänzend, im unteren Teil silbergrau, schwarz behaart. Thorax glänzend schwarz mit drei mäßig breiten grauen Längsstriemen. Brustseiten silberschimmernd. Vor der Flügelbasis stehen drei lange schwarze Seten. Schildchen und Hinterleib schwarz. 2. und 3. Tergit und Sternit mit breitem mattgrauweißen Hinterrandsaum; 1. mit ganz zart angedeutetem. Letzte Segmente seitlich stark kompreß. Schwinger schwarz, Knöpfchenspitze mit etwas weißlichem Schimmer. Beine schwarz, Hüften silbergrau bestäubt. Behaarung äußerst zart und kurz schwarz, nur am Hinter- und Mittelschenkel weißlich. Hinterschenkel beiderseits mit tiefer Längsfurche. Flügel grauhyalin mit zarten schwarzen Adern, die so breit intensiv braun gesäumt sind, daß die graue Grundfarbe nur hie und da in Form von Zellkernen erhalten bleibt. — Ich nenne die Art Herrn Kröber, Hamburg, zu Ehren.

Kapland, Willowmore, Januar 1914. Zwei Weibchen.

Type ♀: In meiner Sammlung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [90A_1](#)

Autor(en)/Author(s): Brauns Hans

Artikel/Article: [Eine neue Caenophanomyia-Art vom Kap 28](#)