

IX.

Additamentum

ad

Floram Pedemontanam.

Auctore

Joh. Baptista Balbis,

Botanices Professore, et Musei Naturalium Taurinensis Directore.

*Asteriscus* indicat Plantas jam in ALLIONII Flora, aut ejus Auctario, vel BELLARDI Appendix descriptas.

TRIANDRIA Monogynia.

*Crocus medius*, stigmate fimbriato vix corollam aequante, foliis planiusculis brevibus. Nob.

Locus saxosis Tendae reperitur.

*Observatio.* Medium locum tenet inter *sativum* et *vernus*; differt a priori ob folia breviora, et latiora, et ab altero ob folia longiora et angustiora. Stigmata insuper in nostra specie tota fimbriata; stylus longus colorem habet *sativi* aemulum, similiterque tingentein. In Horto Taurinensi ab octo annis exultus habitum suum nunquam mutavit.

2. *Ixia Bulbocodium* L.

I. scapo unifloro, foliis linearibus canaliculatis, angulatis. *Willd.* Sp. pl. p. 196.  
*Sisyrinchium asprenum*, angusto folio, alterum. *Column.* ephr. 2. p. 5.  
t. 7. f. 1.

In rupibus circa Monaco legit, mihiique praestisit amicissimus *Georgius Dumarché à Pont de Vaux*, eximius botanices cultor, cum quo maximus Nicaeensis agri partem non sine emolumento perlustravi. Ex agro Nicaeensi abunde quoque misit diligentissimus Botanophilus *Risso*.

3. *Scir-*

3. *Scirpus ovatus* Roth.

S. culmo subcompresso, nudo, filiformi, spica ovata terminali nuda, floribus diandris. *Roth Catalecta bot.* I. p. 5.

*Juncus clavatus minor* capitulis rotundioribus. *Morif. Hist.* III. p. 233.  
*Sect. 8. t. 10. f. 34.*

Locus subhumidis prope Roccaforte; similibusque locis abunde inter Saluzzola et Biella.

4. *Scirpus supinus* Willd.

Sc. culmo tereti nudo, spicis sessilibus, in medio culmo glomeratis. *Dalib. Paris.* p. 16. *Roth. Fl. Germ.* II. 1. p. 55.

*Scirpus supinus minimus* capitulis conglobatis, foliis rotundo-teretibus. *Tourn. Infl.* p. 528.

In aquosis et arenosis prope Duriam, inter Susa et Buffolino.

*D i g y n i a.*

5. *PANICUM capillare* L.

P. panicula capillari erecta patente, foliorum vaginis hirtis. *L. Synt. nat.* ed. 13. Vol. III. p. 88.

In agro Nicaeensi, versus flumen *le Var.*

6. *AGROSTIS intermed.* Nob.

In pratis humidis *della Mandria*, ac circa lacum *di Caffette*. Annua.

*Observatio.* Ludit inter *pumilam* ac *alpiam*. Differt a priori ob *aristae praesentiam*; et ab altera, quum nostra *majorem* habeat *altitudinem*, et *aristam breviorem*, tum quod haec *humilioribus*, *humidisque locis reperiatur*, altera in *alpinis luxuriet*.

7. *AGROSTIS interrupta* L.

A. petalo exteriore aristato, panicula attenuata, coarctata, *interrupta*. *Linn.* Sp. pl. I. p. 92.

*Gramen arvense* paniculatum spica *interrupta*. *Schenchz. gram.* p. 146.

*Gramen capillatum* capitulis *interrupto angustioribus*. *Vaill.* p. 88. t. 7. f. 4.

Ad Padi ripam ante *Valentinum*, ac locis arenosis prope *Padum* versus  
*S. Mauro.* Floret Junio. Annua.

8. *POA Molinerii* panicula compacta, glumis 7 floris cordatis. Nob.

Locus saxosis et siccis prope *Tenda* reperta est, ac in hortum Taurinensem adlata ab eximio *Ignatio Molineri*, a quo nomen triviale desumsi, utpote ejus stirpis inventore. Biennis.

*Descriptio.*

*Descriptio.* *Culinus spithameus*, procumbens, *folia angustiora quam in alpina, panicula densa, spiculae septemflorae cordatae.*

9. *CYNOSURUS cylindricus*, bracteis integerrimis, corollis aristatis, spica cylindrica unciali Nob.

Loci calidis ad summitatem montium *Tendae et Ormeae*, aliisque similibus locis montium maritimorum; abunde legi in rupibus *Villafranchae Nicaeensis* soli, expositis.

Valde proximus *coeruleo* Willd. a quo tamen differt, quum magis crassus ac robustus sit, tum ob spicam, quae valdopere longior, ac cylindrica est, aristae quoque longiores; caeterum caeruleus in herbidis alpium, hic vero locis montanis calidioribus nascitur.

10. \* *FESTUCA pumila* Bell. app. p. 10.

Loci declivibus et faxosis ad grand *S. Bernard* reperta fuit ab *Ignatio Molinieri*. Ego in alpinis vinadiensisibus legi.

11. \* *FESTUCA altissima* All. auct. p. 43.

Loci umbrosis et pinguisibus versus summitatem collis di *Cafelette* dicti il *Musinè*.

12. *AVENA fragilis* L.

A. spicata calycibus quadrifloris, flosculo longioribus. *Mant. 326. Schreb. gram. t. 24. f. 3.*

In littore maritimo prope Nicaeam. Annua.

PENTANDRIA Digynia.

13. *CAUCALIS daucoides* L.

C. umbellis trifidis aphyllis, umbellulis tripermis, triphyllis *Hort. Cliff. p. 91. Caucalis arvensis* echinato parvo flore. *Morif. Hist. III. f. 9. t. 14. f. 6.*

In arvis *Augustae Praetoriae*. Annua.

HEXANDRIA Monoecia.

14. \* *BULBOCODIUM vernum* L. Bell. app. p. 19.

Attuli anno 1789 ex pratis vallis *Queiras*, atque cum celeberrimo *Bellardi* communicavi. Frequentem vidit in valle *Augustae Praetoriae* prope *Cogue*, atque florentem legit mensie Aprili naturalium rerum scrutator solertissimus, cl. *Miot*, paucis abhinc annis Reip. Gallicae Taurini legatus.

15. *JUNCUS acuminatus*, culmo nudo acuminato, ad basin squamato, panicula laterali exigua, floribus breviter pedunculatis. Nob.

R

Secus

Secus rivulos locis frigidis circa summitatem minoris montis S. Bernardi.  
Pereanis.

*Descriptio.* Teres, basi squamosus, ut *conglomeratus*, a quo differt pani-  
cula minori et culmo magis firmo ac inani.

*OCTANDRIA Monogynia.*

16. *ERICA multiflora L.*

- E. antheris meticis exsertis, corollis cylindricis, stylo exerto, foliis quinis,  
floribus sparsis. *Linn. Syst. Veg.* ed. XIV. p. 370.  
E. Corios folio II. *Clus. Hist.* I. p. 42.  
E. Juniperifolia dense fruticosa carbonensis. *Lob. Hist.* 620. *Garid. prov.* p.  
160. t. 32. *Miquel. Monspel.* p. 90.

Florentem legi Niceae ad valleculae ejusdam ingressum versus finem  
Novemboris. Fruticosa.

*Observatio.* Caulis haud humanam attingit altitudinem, ut *Richard*, *Vit-*  
*man*, aliqui posuerunt, sed bipedalis, aut ad summum tripedalis est, ac Corollae  
potius ovatae. *Clusi* synynom ad *mediterraneum* relatum hoc transtuli,  
*Garidelii* ductoritati fretus, et quia revera *Clusi* figura optime speciem nostram  
repraesentat.

*Trigynia.*

17. *POLYGONUM dumetorum L.*

- P. foliis cordatis, caule volubili, laevi, floribus carinato-alatis. *Fl. dan.* t. 756.  
*Fagopyrum scandens* altissimum dumetorum, seminibus tribos alis pellucidis.  
*Rupp* jen. p. 99.

In hortis et arvis prope Augustam praetorianum legit *Bernardus Tillier*  
*Botanicus* perspicacissimus, qui Augustanae vallis stirpes indefesso  
labore, summaque solertia perquisivit, nobisque aliquas humanissime  
communicavit, alias autem possidet, quas maturius examen requiren-  
tes Additamento altero reservamus.

*DECANDRIA digynia.*

18. *DIANTHUS alpestris*, floribus solitariis, squamis calycinis duabus cor-  
datis, corollis brevissimis, emarginatis, caule erecto. *Nob.* *Mém. de l'Acad.*  
*de Turin.* Vol. I. t. 1.

In pascuis maritimorum alpium, nominatum in illis *la Madonna d' le*  
*fenestre* dictis. Perennis.

19. *DIAN-*

19. *DIANTHUS furcatus*, caule bifloro, squamis calycinis oppositis faepius binis, tubo admodum brevioribus. *Nob.* — l. c. tab. 2.

20. *DIANTHUS tener*, corollis fimbriatis, squamis calycinis duabus vix calyce brevioribus, foliis linearibus subulatis. *Nob.* — l. c. tab. 3.

Utraeque haec species ad agrorum margins prope Tendam repertae sunt, ac in hortum Taurinensem translatae.

*Pentagynia.*

21. *SILENE Mustipula L.*

S. pedalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus, sessilibus, foliis glabris.  
*Mill. Dict. n. I.*

*Lychnis sylvestris rubra altera.* *C. Bauh. Pin. p. 205.*

Inter segetes prope Antibes. Annua.

*Icosandria polygynia.*

22. *POTENTILLA intermedia L.*

P. foliis radicibus quinatis, caulinis ternatis, caule erectiusculo ramosissimo.  
*L. Munt. p. 76.*

Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum. *C. Bauh. Pin. p. 325.*  
*Prodr. 139. n. 3.*

Potentilla foliis quinatis septenatis, crenato-incisis, oblongo-hirsutis, caule ramofo erectiusculo. *Vill. Delph. III. p. 568.* cum descriptione satis bona.

Legi elapso anno Cunei ad Gessii ripam prope locum dictum il Rondeau; exemplaria misit laudatus Bruno, a quo Cuneensis agri florulam proxime evulgandam anxii expectamus. Perennis.

*Polyandria monogynia.*

23. \* *CISTUS canus L.* *Allion. II. n. 1664. t. 45. f. 3.*

In glareosis calidioribus prope Giambava in valle Augustae prætoriae reperit eximius civis Tillier.

*Polygynia.*

24. *RANUNCULUS pyrenaicus Gouan.*

R. fol. radicalibus orbiculato-reniformibus, 3-5 lobis: caulinio palmato sessili.  
*Illust. t. 17. f. 1. et 2.*

Reperit civis Tillier in aridis inter Pollein et Briffugne in valle Augustae prætoriae.

*Observatio.* Grumosa hujus Ranunculi exsiccati ac in herbario proprio ultra duos menses servati radix terrae commissa, radicalia folia prorsus inox elapsa autumno, obscuris maculis hinc inde signata, unde vivam nunc plantam in horto habeo. *Gouani* figura plantae nostrae exacte respondet, sola radice excepta, quae in nostra minime diffunditur et cum R. asiatico maximam affinitatem habet.

DIDYMANIA *gymnospermia*.

25. *GALEOPSIS grandiflora* Roth.

G. internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis omnibus remotis, calycinis dentibus lanceolatis mucronatis erectis, caule pubescente, pilis glandulosis. *Willd.* Sp. pl. III. t. p. 91.

G. foliis rhomboideis serratis sericeis, verticillis diffinis. *Hall. helv.* n. 267.  
*Galeopsis dubia* *Leers* *Herb.* p. 135. n. 453-

Inter taxa ad agrorum limites prope Cuneum et oppidum Pignolo abunde obseruavi mense Junio anni 1799. Sicca specimina misit hoc anno ibidem lecta peritissimes Bruno.

*Observatio.* Ramosa admodum, ac Ladano altior, corollis majoribus praedita, jure auctoribus distincta species est.

26. *STACHYS maritima* L.

S. foliis cordatis obtusis tomentosis crenatis, bracteis oblongis integerrimis. *Betonica maritima* flore ex luteo pallente. *Dill. Elth.* 50. t. 42. f. 50.  
*Betonica heraclea latifolia* *Dioscoridis*. *Donat. Ven.* 84. *Bocc. Mus. a. p.* 16. t. 127.

In maritimo littore prope Antibes legi anno 1800. sub finem mensis Maji.

27. *SCUTELLARIA hastifolia* L.

S. foliis integerimis, inferioribus hastatis, superioribus sagittatis.  
Scutellaria folio non ferrato. *Riv. mon.* 77.

Lecta fuit a diligentissimo Botanices cultore, cive *Buffolino*, in pratis locisque humidis prope ejus castrum.

*Observatio.* Valde similis *galeruculatae*, cuius varietas forsitan est.

*Angiospermia.*

28. \* *BARTSIA viscosa* L. *All. I. n. 218.*

Abonde fecus flumen le Paillon circa S. Pons in agro Nicaeensi; copiosius in pratis supra Antibes.

29. \* *Rum*

29. \* *RHINANTHUS Trixago L.* *BELLARDIA Trixago Allion L.* n. 61.

Frequens occurrit circa Antibes, ubi ramosus quandoque est; in pratis humidis potissimum luxuriat.

*LINNAEA. Gen. pl. 1037.*

*Calyx duplex: fructus diphyllos, floris quinquepartitus superus. Corolla campanulata, calyce duplo major. Baccä siccä, ovata, trilocularis.*

30. *LINNAEA borealis L.*

*L.* floribus geminatis. *Fl. Lapp.* p. 250. t. 12. f. 4.

*Campanulata serpillifolia.* *Bauh.* p. 93. *Prodr.* 35.

*Nummularia norvegica, flore purpureo.* *Kill. Act. Dan.* II. p. 346. f. c.

Elegantem, raramque indigenam hanc stirpem primus indicavit cl. *Sauvage* (*Poy. dans les alpes, in 4to I. p. 218.*), qui eam observavit in alpibus Sabaudiae dictis *les Voirons*. Inde fessus noster *Molinieri* reperit dein in valle *Soana* locis faxosis et muscosis; superius laudatus *Miot* similibus locis invenit secus viam, quae ab admodum excelsa ponte dicit ad oppidum *Cogne*, ac non procul ab eo distat. Floret Junio, ac Augusto.

*TETRADYNAMEA siliculosa.*

31. \* *DRABA muralis Willd.*

*D.* caule ramoso, foliis ovatis amplexicaulibus dentatis, siliculis patentibus glabris. *Willd. Sp. pl. III. 1. p. 429.*

*Draba nemorosa All. Ped. I. n. 897.*

In agrô niceensi legi prope *S. Pons.* Circâ *Cuncum* invenit misitque civis *Bruno*.

*Observatio.* Caulis in hac specie nonnunquam simplex. Flores albi. Siliculae laeves.

32. *DRABA nemoralis*, caule ramoso foliis ovatis amplexicaulibus, dentatis, siliculis patentibus, pubescibus. *Willd. Sp. pl. III. 1. p. 429.*

*Alysson folio Veronicæ, floribus luteis.* *Buxb. Act. Petrop.* III. p. 273.

Legi in arvo quodam secus viam prope *Lanslebourg*, mense Junio.

*Observatio.* Recte a *murali* distinguenda planta; ob caulem magis diffusum, ramosorem, corollam luteam, siliculas pubescentes.

33. *BUNIAS Cakile L.*

*B.* siliculis ovatis laevibus ancipitibus.

*Eruca maritima Italica* silique hastae cuspidi simili. *Bauh. Pin.* p. 99.

Legi in littore maritimo Uneliae, ac Nicaeae. Annua.

Siliqua.

34. *SINAPIS erucoides L.*

S. filiis laevisibus aequalibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule scabro.  
Mant. 429.

*Eruca sylvestris* flore albo italica. *Barrel. Ic.* 132.

In olivetis Nicaeensibus primo vere frequens. Annua.

35. *SISYMBRIUM Loefelii L.*

S. foliis runcinatis acutis hirtis, caule retrorium hispido. *Amoen. Acad.* IV.  
p. 322.

In Liguria circa Loano legi.

DIADELPHIA Decandria.

36. \* *VICIA bithynica L.* *Allion. Fl.* I. n. 1199. t. 26. f. 2.

Abunde legit circa Cuneum in arvis prope flumen Sturae circa molendinum Chiesa eruditissimus Bruno.

37. \* *VICIA narbonensis L.* *Allion. I.* n. 1207.

In agro Cuneensi fecus fossam ante la tour de Bonada copiosam observavi.

38. *ASTRAGALUS exscapus L.*

A. acaulis exscapus, leguminibus lanatis, foliis viscosis. *Mant.* 275.

*Glaux montana* acaulon. *Bauh. Pin.* 347. *Prodr.* 147.

In sylvaticis inter Aiuville et Cogne legit *Tillier.* Perennis.

39. *MEDICAGO glomerata* leguminibus contortis villosis; caule erectiusculo. *Nob.*

Circa Berra in agro Nicaeensi legit *Ign. Molineri.*

*Observatio.* Valde proxima quoad folia et flores *M. falcatae*, sed caulis in hac erectiusculus, legumina in fasciculum veluti congesta, glomerata, villosa, panicula magis densa. Corolla lutea.

SYNGENESIA *Polygamia aequalis.*

40. *LACTUCA Segusiana.* *Nob.*

Locus ad meridiem positis in vinearum jugis non procul a Segusio nascitur.

Valde similis *L. perenni*, a qua tamen differt, quam undequaque magis exigua ea sit, florem habeat purpureum, ac annua.

41. *LEONTODON crispum.* *Vill.*

*L. paporum* radiis stipitatis plumosis, foliis erectis sinuato-lanceolatis, radice fusiformi, pilis trifurcatis. *Fl. Delph.* III. p. 84. t. 25.

Dens

Dens leonis foliis hirsutis et asperis, faxatilis. *Tourn.* instit. 468. *Morif.* Hist. III. c. 7. t. 12.

In collibus aridis et soli expositis occurrit prope Augustam praetoriam, observante C. *Tillier*. Perennis.

42. \* *HIERACIUM saxatile*. *Bell. app.* p. 36.

Inter rupium fissuras, quae meridiem spectant in summa valle Locanae super *Ceresole* lecta est, ac in hortum translata eundem habitum semper servavit.

43. \* *HIERACIUM hybridum*. *Bell. app.* p. 36.

Cl. *Villarsius* sub nomine *HIERACII Halleri* designavit in *Fl. Delphinat.* III. p. 104. ac sub nomine *hybridum* repraesentavit *Tab. 26.*, non 24. ut in *Bell. l. c.*

Loci faxosis, praefertim fecus alpium torrentes raro invenitur; copiosior est in alpestribus Javenni prope il *Col dello Roffa*.

44. \* *CACALIA albifrons*. *Bell. app.* p. 37.

In frigidis convallibus ad nivem deliquescentem, in alpibus Tendae, tum ad summiteatem loci dicti la *Combe d'Aubin*, in valle, quae ultra parvum montem Cenisium reperitur.

#### ATHANASIA.

*Receptaculum paleaceum. Pappus paleaceus, brevissimus. Calyx imbricatus.*

45. *ATHANASIA maritima L.*

A. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis crenatis obtusis tomentosis. *Mill.* *Dict. n. 6.*

*Chrysanthemum perenne gnaphalooides maritimum. Morif.* III. p. 81. S. 6. t. 4. f. 47.

Florentem legi anno 1792. versus finem Augusti in littore maritimo prope *Loano*. Perennis.

*Polygania superflua.*

46. *TUSSILAGO frigida L.*

T. thyrs fastigato, floribus radiatis. *Sp. pl. p. 1214. Oed. Fl. Dan. tab. 61.*

In alpibus vallis Augustae praetoriae admodum rara in hanc stirpem inventit *Tillier*.

47. *INULA crithmifolia L.*

I. foliis linearibus carnosis tricuspidatis. *Gouan. Monsp.* 445.

*Crithmum maritimum colore Asteris attici. C. Bauh. Pin.* 288.

Inter flumen Le Var, et Antibes ad maris littora observavi. Perennis.

GYNAN-

## GYNANDRIA Diandria.

48. *Ophrys aestiva* bulbis aggregatis oblongis, caule folioso, foliis linear-i-lanceolatis. Nob.

*Epipactis* foliis plerisque ex linear-i-lanceolatis. Gmel. Sib. p. 13. t. III. f. 1.

*Orchistrum aestivum* palustre album odoratum. Mich. Gen. 30. t. 26.

Locis humidis circa *Caselle*, et lacum di *Casellette*. Ego in thermis Valde-rianis reperi.

*Descriptio.* Scapus e medio foliorum emergit, haec vero angustiora ac longiora sequenti, flores viridescentes, spica minus densa, ac flores numero minores.

49. *Ophrys autumnalis* bulbis aggregatis crassis, scapo laterali, foliis ova-tis brevibus. Nob.

*Ophrys spiralis.* Ocd. Fl. Dan. t. 387.

*Triorchis*, vel tetroorchis alba odorata major. C. B. P. 84. Moris. Hist. III. p. 496. Sect. 12. t. 14. f. 1.

Locis saxosis, siccis, calidisque *Condove* et *Casellette*.

*Descriptio.* Radix crassior, quam in praecedenti, at *scapus* lateralis; folia ovata, lucida, brevia, flores albissimi. Haec autumno floret, altera con-stanter aestate.

*Observatio.* Binae hae Ophrydis species ad spiralem redactae fuerant ab auctoribus. Videntur tamen ob mox allatos sat distinctos characteres a se invi-cem sejangendae.

50. *Ophrys insectifera* L.

O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio quinquelobo. Reich. Synt. IV. p. 16.

*Ophrys fucum* referens major foliolis superioribus candidis et purpurascensibus. C. B. I. 83. Moris. Hist. III. p. 494.

Ex sylvis prope vineam reginae retulit cl. Botta. In pratis circa oppi-dum *Marcorengo* legit civis Miot; in valle *Segusii* reperta est ab *Igna-tio Moiñeri*.

*Observatio.* Haec a *muscaria* et *Arachnites* All. distinguenda, cum major priori sit, folia proferat pauciora, laevia, latiuscula; caulem pedalem, flores tribus ex-pansis alis purpurascensibus e foliolis explicatos, unum superiore, duos late-rales; labellum dependet nigro, aut fuliginoso colore, luteis quibusdam lineis variegatum, ut fucum potius quam vespain repreäsentet. Moris. l. c.

MONOE-

MONOECIA triandria.

51. CAREX cenisia spicis tribus pedunculatis androgynis inferne masculis. Nob.

Locis frigidis secus rivulos in monte Ceniso admodum rara.

*Observatio.* In hortum translata ab Ignatio Molineri naturalem habitum nunquam mutavit, ac diligentí examini subiecta nullam unquam ostendit spicam masculam, sed spicas tantum androgynas aliquibus masculis inferne instructas. Semen obtusum est, coloris viridi-grisei, ac extra glumam exporrigitur. Legi versus medium elapsi Augusti in monte Ceniso, ubi promiscue cum *capillari* et *juncifolia* reperi, sed rariorem. Unicam interdum, quandoque duas, saepius tres gerit spiculas, quarum ima constanter caeteris longius pedunculata est.

52. CAREX sempervirens Villars.

C. foliis duris, perennantibus; dense caespitosis, spica mascula oblonga, foemineis binis laxis, omnibus atro-fuscis. *Vill. Delph.* II. p. 214,

C. spicis foeminiinis binis longe petiolatis distitis, capsulis longe rostratis bifidis.

*Hall. helv.* n. 1389.

Nihil vulgatus prope lacum montis Cenisi.

DIOECIA diandria.

53. SALIX helvetica Vill.

S. foliis lanceolatis, superne atro-viridibus reticulatis, inferne niveis, julis oblongis, basi foliosis, capsulis sericeis. *Vill. Delph.* III. p. 783. add. *Syn. Hall. helv.* n. 1642.

Legit *Tillier* in pratis vallis *Combales*.

POLYGAMIA monoecia.

54. AEGILOPS squarrosa. Linn. | S. Veg. ed. XIV. p. 907. Schreb. gram. tab. XXVII. f. 2.

In vineis circa urbem Augustae praetoriae invenit *Tillier*.

CRYPTOGAMIA. Filices.

55. ACROSTICHUM ilvense L.

A. frondibus sub-bipinnatis: pinnis opposito-coadunatis obtusis, subtus hirsutis; basi integerrimis. - *Fl. Dan.* t. 391.

Filicula alpina teretior, alis latiusculis brevioribus, integris, profunde dentatis. *Morison Hist.* III. p. 576. f. 14. t. III. f. 23.

In rupibus prope lacum de Valtournanee apud Augustanos legit meritissimus *Tillier*.

56. *Pteris acrosticha* frondibus duplicato-pinnatis; pinnis ovatis sublobatis obtusis margine reflexis, punctis vix distinctis.

In muris subhumidis vineas *di Monpantero* circumneuntibus secus viam in medio sitam, haud procul a Segusio.

*Descriptio.* Frons bi-pollicaris atro-purpurea, pinnae duplicato-pinnatae obtusae; fructificatio recentis plantae consistit in punctis marginalibus membrana fere obiectis, per aetatem magis conspicuis, neque sejunctis. Margo foliorum reflexus est, totam pene fructificationem tegens.

*Observatio.* Dubius haesi, an ad *POLYPODIUM pteridioides* Reich. vel ad ejusdem *ACROSTICHUM ilvense* referenda esset. Sed a priori differt ob fructificationis puncta et staturam, quae longe minor in nostra planta; et ab altero, quem folia magis profunde incisa habeat, et stipitem atro-purpureum.

### 57. *ASPLENIUM alternifolium* Murr.

A. frondibus simpliciter pinnatis, foliolis alternis cuneiformibus, superne incisis. *Jacq. Misc. austr. II. p. 51. t. V. f. 2.*

*Asplenium caule* pionato, pinnis iinis trifoliatis, superioribus simplicibus dentatis. *Hall. Hist. n. 1690.*

Novam hanc Pedemontii civem sagaci indagini insignis mulieris *Aloysiae Scarrone* debemus, quae in itinere cum egregio nostro Molineri anno 1796. ad Javenenses alpes suscepit stirpem hanc inter saxonum soli expositorum rinas, descendens jugum *della Rossa* dictum, inventit, ut in epistola ad strenuum virum Lavilla apergit. Similibus locis in valle Lancei prope *Cantoira*, *Quazzolo*, ac *Monaferio* reperta est.

### M u f e i.

### 58. *SPHAGNUM alpinum* Murr.

S. subramosum erectum. *Reich. IV. p. 449.*

S. tubulatum viridissimum capsulis ovatis. *Dill. Musc. 245. t. 32. f. 3.*

In scopulis locis humidis ac septentrionalibus supra *Giaveno*, aliisque alpestribus locis.

### A l g a e.

### 59. *LICHEN pulmonarioides* foliaceus, laciniatus obtusus, villosus, supra lacunosus, verrucosus.

*Lichenoides pulmoneum* villosum, superficie scrobiculata et peltata. *Dill. Musc. 216. t. 29. f. 114.*

Locis valde umbrosis super rupes vallis Lancei, eundo ad sanctuarium *di Maraglian* dictum, supra *Quazzuolo* legit *Ignatius Molineri*, qui in valle *Locana* minus frequenter esse observavit.

De-

*Descriptio.* Aënis pulmonario, superficie tamen villosa, ac laciniis subrotundis ab eo differt. Ejus fructificatio consistit in verrucis exiguis, parum concavis, per aetatem nigrescentibus, quae nec scutellae verae, nec peltae sunt, sed aliam prorsus figuram praese ferunt, ut recte *Dillenius* adnotavit.

60. *CONFERVA tremelloides.*

C. vesiculis coadunatis.

Locus aquosus stagnantibus ad flumen le *Var* prope Nicaeam aquae supernatantem reperit *Ign. Molineri*.

*Descriptio.* Ambigit inter Confervam et Tremellam. Substantia est gelatinosa, turgida, ex viridi albescens, totidem vesiculis conflata inter se coacer-tatis. Sicca crista admodum evadit.

*Fungus.*

*AURICULARIA Bull.*

Fungus sessilis, plerumque membranaceus, arborum truncis, aut humo tota pagina inferiore adnascens: adultior magisque evolutus laxatus, et sensim resupinatus, semina e pagina superiore jamjam infera facta emittens, sed lento, longoque temporis lapsu.

61. *AURICULARIA ferruginea* Bull.

A. perennis, coriacea, tenuis, glabra, zonata, subfuscoc-ferruginea. *Hist. des champign. de la France* Tom. I. p. 281. t. 378.

Super arborum emarginatarum trunneos, ac supra cortices vetustos ulmorum, eundo ad Valentimum.

*Descriptio.* Coriacea tenuis, zonata, glabra, colorem ferrugineum, ad obscurum vergentem referens; ejus Zonae minus apparent in superficie inferiori, quam in superiori, quae villosa est.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für die Botanik](#)

Jahr/Year: 1801

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Balbis Joh. Baptista

Artikel/Article: [Additamentum ad Floram Pedemontanam. 127-139](#)