

Zur Gastropoden-Fauna Anatoliens.

Von

KLAUS-JÜRGEN GÖTTING,
I. Zoologisches Institut Gießen.

Mit 1 Kartenskizze.

Über die Gastropoden-Fauna Anatoliens liegen bisher nur wenige Arbeiten vor (BRANDT 1961, CROCKEWIT 1953, FORCART 1953, 1961, 1963, GÖTTING 1961, 1963, RIEDEL 1959), alles in allem ist die malakozoologische Kenntnis dieses Gebietes noch unzureichend. Das gilt speziell für unser Wissen über die Lebensweise der terrestrischen Mollusken. Daher ist Material mit ökologischen Angaben besonders wertvoll.

In den vergangenen Jahren hat Herr Prof. Dr. H. SCHWEIGER, Niederösterreichisches Landesmuseum, Wien, auf mehreren Reisen in der Türkei gesammelt. Während er selbst verschiedene Insektengruppen bearbeitet hat, übergab er mir das Schnecken-Material mit den zugehörigen ökologischen Daten. Eine Reihe von Arten wurde von Herrn Dr. L. FORCART, Basel, bestimmt, einige Arten von Herrn Dr. A. RIEDEL, Warschau. Herr Dr. A. ZILCH, Frankfurt, stand mir bei Vergleichsstudien in der Sammlung des Senckenberg-Museums bereitwillig mit seinem Rat zur Seite. Allen Genannten gilt mein herzlicher Dank.

Im folgenden sind die Arten nach Fundorten aufgeführt. Die Lage der Fundorte ist der Kartenskizze zu entnehmen.

1. Kastamonu

Gesammelt wurde am 10. 5. 63 in den Gärten der Stadt.

Deroceras thersites (SIMROTH)

Limax flavus L.

Euxina pontica (RETOWSKI)

Oxychilus (Longiphallus) deilus rumelicus (HESSE)

2. Flußauen des Daday

nördlich von Kastamonu. 24. 5. 63.

Oxychilus (Longiphallus) deilus rumelicus (HESSE)

Helicella (Xeropicta) derbentina (KRYNICKI)

Cochlicopa lubrica (MÜLLER)

Chondrus tournefortianus (FÉRUSAC)

Chondrus diodon (RETOWSKI)

Chondrus zebra tantalus (PFEIFFER)

Zebrina kindermanni kindermanni (PFEIFFER)



Abb. 1. Kartenskizze mit eingetragenen Fundorten. Die Numerierung stimmt mit der im Text überein. (Kartenskizze: A. BLEICHNER).

3. Tal des Karasu

am Nordhang des Ilgazdağ. Zone der *Fagus orientalis*-Buschregion. Höhe etwa 1100 m ü. M. Unter Steinen und Holz. 16. 5. 63.

Chondrus diodon (RETOWSKI), zahnlose Form.

Chondrus zebra tantalus (PFEIFFER).

4. Ilgazdağ

südlich Kastamonu. Regenreiche Zone oberhalb der *Abies bornmülleriana*-Wälder. *Juniperus nanus*-Heide mit sekundärem Kulturland. Höhe 1800-2000 m ü. M. 16.-22. 5. 63.

Carpathica amisena (FORCART)

Deroceras subagrestis (SIMROTH)

Oxychilus (Longiphallus) deilus rumelicus (HESSE)

Chondrus diodon (RETOWSKI)

Chondrus zebra tantalus (PFEIFFER)

Zebrina detrita (MÜLLER)

Euxina circumdata (PFEIFFER)

5. Hochfläche

etwa 15 km südlich von Kastamonu. In *Pinus*-Wäldern mit eingesprengten *Juniperus*-Heiden. Sehr feuchter Boden. 14. 5. 63.

Zebrina detrita (MÜLLER)

Jaminia (Multidentula) ovularis (OLIVIER)

Chondrus zebra tantalus (PFEIFFER)

6. Baltati

etwa 14 km östlich von Bolu. Mit Schneerosen bestandene Almwiese am Rande von Kiefernwäldern. 10. 5. 63.

Chondrus tournefortianus (FÉRUSSAC)

Chondrus diodon (RETOWSKI)

Jaminia (Multidentula) ovularis (OLIVIER)

Monacha muscicola (BOURGUIGNAT)

7. Abant-Gebirge

In der oberen *Fagus orientalis*-Zone. April 1961.

Oxychilus (Morlina) urbanskii RIEDEL

8. Höhle von Inhisar (Mara Inhisar)

am W-Ufer des Sakarya etwa 50 km nordwestlich von Eskishehir in einer Kalkstufe. Die Höhle ist ziemlich tief und relativ trocken. Das Material stammt von einer der wenigen feuchten Stellen in etwa 200 m Tiefe. Als Begleitfauna treten wenige typische Höhlenkäfer auf (*Bathyscinae*, *Laemostenus*). 26. 4. 61.

Pupilla triplicata (STUDER)

9. Mudanya

Auf Disteln in Strandnähe. 10. 5. 62.

Helicella (Xeropicta) derbentina (KRYNICKI)

Eobania vermiculata (MÜLLER)

Cochlicella acuta (MÜLLER)

10. Uludağ

In der Eichenzone. 5. 5. 62 und 26. 5. 63.

Pomatias elegans (STUDER)

Chondrus zebra zebra (OLIVIER)

Chondrula (Mastus) carneola carneola (MOUSSON)

Chondrula microtraga tricuspidata (KÜSTER)

Ena frivaldskeyi frivaldskeyi (PFEIFFER)

Eubrepophulus orientalis (PFEIFFER)

Helicella (Xeropicta) derbentina (KRYNICKI)

Cryptomphalus aspersus (MÜLLER)

Metatheba samsunensis WESTERLUND

Circassina (Circassina) schuberti (ROTH), juvenil

Euxina (Strumosa) strumosa (PFEIFFER)

11. Uludağ

Zone der oberen *Abies bornmülleriana-Fagus orientalis*-Wälder. Unter Steinen.
31. 5. 63.

Euxina circumdata (PFEIFFER)

12. Incaya

am Uludağ. Zone der *Quercus-Corylus*-Büsche. An Kalkfelsen und unter Steinen.
1. 6. 59, 30. 5. 63.

Helicella (Xeropicta) derbentina (KRYNICKI)

Chondrus tournefortianus (FÉRUSAC)

Ena frivaldskyi frivaldskyi (PFEIFFER)

In der Höhle in der Nähe des Dorfes (Mara Incaya). Es handelt sich um eine etwa 120 m tiefe Spalthöhle mit Höhlenbach und artenreicher Fauna, vor allem blinden Diplopoden, Spinnen und einigen neuen Höhlenkäfern (*Euconnus*, Bathyscinae). Höhe etwa 900 m ü. M.

Vitrea sp. (sp. n. ?)

Oxychilus (Longiphallus) deilus rumelicus (HESSE)

Oxychilus (Longiphallus) cyprius (PFEIFFER)

13. Antalya

30. 4. 62.

Trochoidea (Xerocrassa) seetzeni (KOCH)

Albinaria bigibbosa (CHARP.)

14. Perge

bei Antalya, Taurus-S-Hang. 29. 4. 62.

Petraeus carneus glabratus (MOUSSON)

Rumina decollata L.

Cryptomphalus aspersus (MÜLLER)

Schriften.

BRANDT, R. A. (1961): Diagnosen neuer Clausiliiden. — Arch. Moll., 90 (1/3): 1-20, Taf. 1-2. Frankfurt a. M.

CROOCKEWIT, H. W. E. (1953): Malakologische Resultate einer Reise nach der asiatischen Türkei. 1. Einführung. — Basteria, 17: 17-18.

FORCART, L. (1953): Malakologische Resultate einer Reise nach der asiatischen Türkei. 2. Verzeichnis der von Herrn CROOCKEWIT in der Türkei gesammelten Land- und Süßwassermollusken. — Basteria, 17: 19-28.

— — — (1961): Systematisches Verzeichnis der von Herrn KLAUS-JÜRGEN GÖTTING 1960 in der Türkei gesammelten Mollusken und Neubeschreibung einer *Paramastus*-Art. — Arch. Moll., 90 (4/6): 175-180. Frankfurt.

— — — (1963): Die systematische Stellung der westanatolischen *Helicella (Xerocrassa) cretica* var. *smyrnoretica* GERMAIN, 1933. — Arch. Moll., 92 (1/2): 78. Frankfurt.

- GÖTTING, K. J. (1961): Malakologische Ergebnisse einer Studienreise in die Türkei. — Arch. Moll., 90 (4/6): 171-174. Frankfurt.
- — — (1963): *Leiostyla schweigeri* n. sp. und *Pseudamnicola lindbergi* BOETTGER — zwei interessante Gastropoden aus Anatolien. — Arch. Moll., 92 (1/2): 31-33. Frankfurt.
- RIEDEL, A. (1959): Über drei Zonitiden-Arten aus den Höhlen der Türkei. — An. Zool. Warszawa, 18 (9): 141-160. Warschau.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [100](#)

Autor(en)/Author(s): Götting [Gotting] Klaus-Jürgen

Artikel/Article: [Zur Gastropoden-Fauna Anatoliens. 103-107](#)