

## Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 48<sup>1)</sup>:

Mollusca: Bulimulidae (1).

Von

ADOLF ZILCH,

Forschungs-Institut Senckenberg, Frankfurt a. M.

***Placostylus*** BECK 1837.

***Placostylus (Maoristylus)*** F. HAAS 1935.

— — ***bivaricosus*** (GASKOIN 1854).

1891 *Placostylus bivaricosus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 53, T. 13 F. 4-5.

Lord Howe Island. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. fig. SMF 9432].

— — ***shongii*** (LESSON 1831).

1891 *Placostylus bovinus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 36, T. 9 F. 1.

1935 *Placostylus (Maoristylus) shongii*, — HAAS, Zool. Anz., 109 (7/8): 190, Abb. 3.

1960 *Placostylus (Maoristylus) shongii*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 497, Abb. 1749.

Neuseeland, im nördlichsten Theile. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. 1891 T. 9 F. 1 = 1960 Abb. 1749 = SMF 9399].

Kap Maria Van Diemen. Slg. HAAS ex H. SUTER [Orig. 1935 Abb. 3 = SMF 26168a].

***Placostylus (Basileostylus)*** F. HAAS 1935.

— — ***bollonsi*** SUTER 1908.

1908 *Placostylus bollonsi* SUTER, Trans. New Zealand Inst., 40: 341.

1935 *Placostylus (Basileostylus) bollonsi*, — HAAS, Zool. Anz., 109 (7/8): 190, Abb. 4.

1960 *Placostylus (Basileostylus) bollonsi*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 497-498, Abb. 1750.

Three Kings Island: Big King. J. BOLLONS leg., H. SUTER ded. [Paratypus Orig. fig. SMF 9374].

---

<sup>1)</sup> 47: Mollusca-Euthyneura von A. DÖRING aus Argentinien. — Arch. Moll., 101 (1/4): 195-213, Taf. 11-13. Frankfurt am Main 1971.

**Placostylus (Santacharis)** IREDALE 1927.

— — **fuligineus** (PFEIFFER 1852).

1891 *Placostylus fuligineus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 44, T. 10 F. 5-6.

1900 *Placostylus fuligineus*, — PILSBRY, M. C., (2) 13 (50): 71, T. 14 F. 11-12 [Kopie].

1960 *Placostylus (Santacharis) fuligineus*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 498, Abb. 1751.

Neue Hebriden. Slg. KOBELT [Orig. 1891 T. 10 F. 5-6 = SMF 26162].

Neue Hebriden. Slg. C. BOETTGER [Orig. 1960 Abb. 1751 = SMF 80589/2].

**Placostylus (Placostylus)** s. str.

— — **alexander** (CROSSE 1855).

1891 *Placostylus Alexander*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 27, T. 8 F. 1.

Neukaledonien. Slg. KOBELT [Orig. T. 8 F. 1 = SMF 9384].

(*crassa* CROSSE 1870).

1891 *Placostylus Alexander* [var. *crassa*], — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 27, T. 7 F. 1.

1900 *Placostylus alexander* var. *crassa*, — PILSBRY, M. C., (2) 13 (49): 36, T. 14 F. 7 [Kopie].

Neukaledonien. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. fig. SMF 9383].

(*procerula* CROSSE 1864).

1891 *Placostylus Alexander* var., — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 53, T. 13 F. 1.

Neukaledonien. Slg. KOBELT ex ROUAST 1890 (non H. ROLLE) [Orig. fig. SMF 25968].

— — **bavayi** (CROSSE & MARIE 1868).

1891 *Placostylus Bavayi*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 42, T. 10 F. 1.

1900 *Placostylus bavayi*, — PILSBRY, M. C., (2) 13 (49): 31, T. 7 F. 14 [Kopie].

Neukaledonien: [auf dem Gipfel des Berges Mou]. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 9381].

(*bavayi dupuyi* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus Dupuyi* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 43, T. 10 F. 3-4.

1900 *Placostylus bavayi* var. *dupuyi*, — PILSBRY, M. C., (2) 13 (49): 31, T. 7 F. 15 [Kopie].

Neukaledonien. Slg. KOBELT ex DUPUY [Holotypus Orig. fig. SMF 9380].

— — **bondeensis** (CROSSE & SOUVERBIE 1869).

1891 *Placostylus Bondeensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 111, T. 27 F. 3-4.

1900 *Placostylus bondeensis*, — PILSBRY, M. C., (2) 13 (49): 32, T. 8 F. 20 [Kopie=F.3].

Neukaledonien. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 9382].

— — **boulariensis** (SOUVERBIE 1869).

1891 *Placostylus Boulariensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 83, T. 20 F. 1.

Neukaledonien: [in den Wäldern um die Boulari-Bay]. Slg. KOBELT ex DEBEAUX ex ROSSITER [Orig. T. 20 F. 1 = SMF 9407].

Bemerkung: Das von KOBELT (1891: T. 20 F. 2) abgebildete Gehäuse [Ile des Pines, LAYARD ded.] fehlt. Das von KOBELT als Orig. zu T. 20 F. 2 bezeichnete Gehäuse (SMF 9409) ist nicht zur Abbildung gelangt.

— — **caledonicus** (PETIT 1845).

1891 *Placostylus caledonicus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 24, T. 6 F. 1-2.

1900 *Placostylus caledonicus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 60, T. 29 F. 38, 40 [Kopie].

Neukaledonien [Orig. fig. SMF 26053].

— — **eddytonensis** (PFEIFFER 1855).

1891 *Placostylus Hienguenensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 113, T. 27 F. 5-6.

1900 *Placostylus eddytonensis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 30, T. 6 F. 2-3 [Kopie].

Neukaledonien: Hienguen. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 9379].

— — **fibratus** (MARTYN 1789).

1891 *Placostylus fibratus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 47, T. 11 F. 2-6.

1891 *Placostylus fibratus* var., — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 138, T. 5 F. 3.

1900 *Placostylus fibratus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 39, T. 15 F. 16; 42, T. 15 F. 18 (cf. *bairdi*) [Kopien].

Neukaledonien. Slg. KOBELT [Orig. T. 5 F. 3 = SMF 9393; Orig. T. 11 F. 4 = SMF 9390; Orig. T. 11 F. 6 = M. C. T. 15 F. 18 = SMF 9391].

Neukaledonien: Ile des Pines. Slg. KOBELT [Orig. T. 11 F. 2 = SMF 80555; Orig. T. 11 F. 3 = M. C. T. 15 F. 16 = SMF 9389].

Neukaledonien: Ouvéa. Slg. KOBELT [Orig. T. 11 F. 5 = SMF 25926].

(*bovinus* BRUGUIÈRE 1792).

1960 *Placostylus (Placostylus) fibratus bovinus*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 498, Abb. 1752.

Neukaledonien. Slg. MOELLENDORFF ex LAYARD [Orig. fig. SMF 25944].

(*crassus* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus fibratus* var. *crassus* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 85, T. 20 F. 3.

1900 *Placostylus fibratus* var. *crassus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 45, T. 18 F. 30 [Kopie].

Neukaledonien: Fichten Insel. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 9397].

(*edwardsianus* GASSIES 1863).

1935 *Placostylus (Placostylus) fibratus* var. *edwardsianus*, — HAAS, Zool. Anz., 109 (7/8): 190, Abb. 2.

Neukaledonien. Slg. KOBELT ex DUPUY 1883 [Orig. fig. SMF 25939a].

(*insignis* PETIT 1850).

1891 *Placostylus insignis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 46, T. 11 F. 1.

1900 *Placostylus fibratus* var. *insignis*, — PILSBRY, M. C., (2) 13 (49): 43, T. 25 F. 18 [Kopie].

„Loyalty Inseln“ Slg. KOBELT ex DUPUY 1883 [Orig. fig. SMF 9398].

(*knoblauchii* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus fibratus* var. ? *Knoblauchii* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 15, T. 3 F. 1.  
1900 *Placostylus fibratus* var. *knoblauchii*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 43, T. 18 F. 34.

Neukaledonien. KNOBLAUCH leg. [Holotypus Orig. fig. SMF 9395].

(*ovalis* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus fibratus* var. *ovalis* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 88, T. 21 F. 2.

1900 *Placostylus fibratus* var. *ovalis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 45, T. 18 F. 33  
[Kopie].

Neukaledonien: Fichteninsel. Slg. KOBELT ex DEBEAUX ex ROSSITER [Holotypus Orig. fig. SMF 9392].

(*pinicola* GASSIES 1870).

1891 *Placostylus fibratus* var. *pinicola*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 89, T. 21 F. 3.

Neukaledonien: Fichten Insel. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 9408].

(*ventricosus* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus fibratus* var. *ventricosa* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 88, T. 21 F. 1.

1900 *Placostylus fibratus* var. *ventricosus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 45, T. 17 F. 25  
[Kopie].

Neukaledonien: Fichten Insel. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 25943].

— — *questieri* (GASSIES 1869).

1891 *Placostylus Guestieri*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 69, T. 17 F. 1.

1900 *Placostylus questieri*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 51, T. 24 F. 9 [Kopie].

Neukaledonien [auf der Insel Ouvea im Loyalitätsarchipel]. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. fig. SMF 9403].

(*confusus* PILSBRY 1900).

1891 *Placostylus cicatricosus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 90, T. 22 F. 3.

1900 *Placostylus questieri* ? var. *confusus* PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 52, T. 21 F. 48  
[Kopie].

Neukaledonien: Moindou an der Westküste. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 9405].

(*orientalis* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus cicatricosus* var. *orientalis* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 90, T. 22 F. 1-2.

1900 *Placostylus questieri* ? var. *orientalis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 52, T. 21  
F. 49-50 [Kopie].

Neukaledonien: Houailou auf der Ostküste. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 9404].

(*rhinocheti* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus (Bavayi* var. ? *rhinocheti* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 75, T. 18 F. 1.

1900 *Placostylus questieri* ? var. *rhinocheti*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 52, T. 21  
F. 46 [Kopie].

Neukaledonien: bei Kanala. Slg. KOBELT ex ROSSITER [Holotypus Orig. fig. SMF 9429].

— — **kanalensis** (CROSSE 1869).

1891 *Placostylus Kanalensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 99, T. 24 F. 1-3.

1900 *Placostylus kanalensis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 38, T. 23 F. 3 [Kopie].

Neukaledonien: bei Kanak. Slg. KOBELT ex DEBEAUX ex ROSSITER [Orig. 1891 T. 24 F. 1 (= 1900 T. 23 F. 3), 2, 3 = SMF 9385-7/3].

(*tchioensis* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus kanalensis* var. *tchioensis* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 100, T. 24 F. 4-5.

1894 *Placostylus Kanalensis* var. *Thioensis* CROSSE, J. de Conch., 42: 264 [nom. emend.].

1900 *Placostylus kanalensis* var. *tchioensis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 38, T. 22 F. 1-2 [Kopie].

Neukaledonien: Ostküste bei Tchio [= Thio]. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 9388].

— — **leoni** HAAS 1935.

1935 *Placostylus (Placostylus) leoni* HAAS, Zool. Anz., 109 (7/8): 189, Abb. 5.

Neukaledonien: Pointe d'Artillerie bei Nouméa [Holotypus SMF 9358].

— — **mariei** (CROSSE & FISCHER 1867).

1891 *Placostylus Submariei*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 17, T. 3 F. 2.

1891 *Placostylus Mariei*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 19, T. 3 F. 3-5, T. 6 F. 5.

1900 *Placostylus mariei*, — PILSBRY M.C., (2) 13 (49): 56.

Neukaledonien: [in loco „Gatope“]. Slg. KOBELT ex CROSSE [Orig. T. 3 F. 2 = SMF 9415]. Bemerkung: PILSBRY hat richtig erkannt, daß das von KOBELT als *submariei* abgebildete Gehäuse zu *mariei* gehört. Auf dem Beizettel schreibt KOBELT „*submariei* CROSSE“, was auf einen Irrtum schließen läßt. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Syntypus von *mariei*.

Neukaledonien: Koné. [Orig. T. 3 F. 3-5 = SMF 9412/2, Orig. T. 6 F. 5 = SMF 9413].

(*submariei* SOUVERBIE 1869).

1891 *Placostylus Submariei*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 115, T. 28 F. 2-4.

1900 *Placostylus submariei*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 55, T. 26 F. 20-21 [Kopie].

Neukaledonien: [Gomen]. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 9414].

— — **monackensis** (CROSSE 1887).

1891 *Placostylus Monackensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 104, T. 25 F. 3-5.

Neukaledonien: Insel Monack. Slg. KOBELT [Orig. T. 25 F. 3-4 = SMF 8418, 25301 ex DEBEAUX ex ROSSITER; Orig. T. 25 F. 5 = SMF 9417 ex LAYARD].

— — **ouveanus** (MOUSSON 1869).

1891 *Placostylus ouveanus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 11, T. 1 F. 4.

Loyalty-Archipel: Insel Ouvea. Slg. KOBELT 1879 [Orig. fig. SMF 9394].

— — **porphyrostomus** (PFEIFFER 1851).

1891 *Placostylus porphyrostomus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 50, T. 12 F. 2-5, T. 13 F. 2-3.

1900 *Placostylus porphyrostomus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 57, T. 28 F. 31 [Kopie = T. 13 F. 2].

Neukaledonien. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 25296, 9416a-d/4].

(*debeauxi* GASSIES 1871).

1891 *Placostylus porphyrostomus* var. *Debeauxi*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 117, T. 29 F. 1.

Neukaledonien: bei Nouméa. Slg. KOBELT ex DEBEAUX [Orig. fig. SMF 9428].

(*umbilicatus* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus porphyrostomus* var. *umbilicatus* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 119, T. 29 F. 5-6.

Neukaledonien: bei Govuro an der Westküste. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 25294].

— — **poyensis** KOBELT 1891.

1891 *Placostylus (pseudocaledonicus* var. ?) *poyensis* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 107, T. 26 F. 3-4.

1900 *Placostylus poyensis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 61, T. 30 F. 43-44 [Kopie].

Neukaledonien: bei Poya an der Westküste. Slg. KOBELT ex LAYARD [Holotypus Orig. fig. SMF 9421].

— — **pseudocaledonicus** (CROSSE 1859).

1891 *Placostylus pseudocaledonicus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 22, T. 4 F. 2, 3, 4-5.

Neukaledonien. Slg. KOBELT 1875 [Orig. fig. SMF 9423/2, 26051].

(*chrysochila* CROSSE 1870).

1891 *Placostylus Gaudryanus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 95, T. 23 F. 4 [non 3 = Kopie!].

1900 *Placostylus pseudocaledonicus* var. *chrysochila*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 64.

Neukaledonien: Koumac. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 26052].

(*hybridus* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus pseudocaledonicus* var. *hybrida* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 93, T. 22 F. 6.

1900 *Placostylus pseudocaledonicus* var. *hybridus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 63, T. 31 F. 13.

Neukaledonien: auf der Halbinsel Pouen [= Poumen] an der Westküste. Slg. KOBELT ex DEBEAUX (Holotypus Orig. fig. SMF 9424].

(*incertus* CROSSE 1894).

1891 *Placostylus pseudocaledonicus* var. ?, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 26, T. 6 F. 3-4.

1894 *Placostylus pseudo-caledonicus* var. *Incerta* CROSSE, J. de Conch., 281 [gegründet auf 1891 T. 6 F. 3-4!].

1900 *Placostylus pseudocaledonicus* var. *incertus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 63, T. 10 F. 28-29 [Kopie].

Neukaledonien. Slg. KOBELT 1879 [Holotypus Orig. fig. SMF 9420].

(*pouenanus* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus* (*pseudocaledonicus* var.) *pouenanus* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 92, T. 22 F. 4.

1894 *Placostylus pseudo-caledonicus* var. *Poumeana* CROSSE, J. de Conch., 42: 281 [nom. emend.].

1900 *Placostylus pseudocaledonicus* var. *pouenanus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 63, T. 31 F. 12 [Kopie].

Neukaledonien: auf der Halbinsel Pouen [= Poumen] an der Westküste. Slg. KOBELT ex DEBEAUX [Holotypus Orig. fig. SMF 9431].

(*saxtoni* KOBELT 1891).

1891 *Placostylus Saxtoni* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 97, T. 23 F. 5-6.

1900 *Placostylus pseudocaledonicus* var. *saxtoni*, — PILSBRY, M.C., (2) 31 (50): 65, T. 33 F. 8-9 [Kopie].

Neukaledonien: bei Koumac. Slg. KOBELT ex LAYARD [Lectotypus Orig. F. 5 = SMF 9425; Parotypus Orig. F. 6 = SMF 9426].

— — ***rossiteri*** (BRAZIER 1881).

1891 *Placostylus Rossiteri*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 39, T. 9 F. 4-5.

1900 *Placostylus rossiteri*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 34, T. 24 F. 12 [Kopie].

Neukaledonien: bei Kanala [Orig. fig. SMF 9378].

— — ***scarabus*** (ALBERS 1854).

1891 *Placostylus scarabus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 10, T. 1 F. 2-3.

Neukaledonien: auf der Insel Art. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 9422].

— — ***senilis*** (GASSIES 1869).

1891 *Placostylus senilis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 20, T. 4 F. 1, T. 5 F. 1-2.

1900 *Placostylus senilis*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 53, T. 20 F. 42 [Kopie].

Neukaledonien. Slg. KOBELT [Orig. T. 4 F. 1 = SMF 9406a; Orig. T. 5 F. 1-2 = M. C. T. 20 F. 42 = SMF 9406b].

— — ***souvillei*** (MORELET 1857).

1891 *Placostylus Souvillei*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 8, T. 1 F. 1, T. 2 F. 1.

1900 *Placostylus souvillei*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (49): 48, T. 22 F. 4 [Kopie].

Neukaledonien. Slg. KOBELT ex KNOBLAUCH [Orig. T. 1 F. 1 = SMF 9410; Orig. T. 2 F. 1 = M. C. T. 22 F. 4 = SMF 9411].

### ***Placostylus (Placocharis)* PILSBRY 1900.**

— — ***founaki*** (HOMBRON & JACQUINOT 1854).

1891 *Placostylus Macfarlandi*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 33, T. 8 F. 2-3.

1891 *Placostylus Founaki*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 76, T. 18 F. 2-3, 4.

1900 *Placostylus* [*Placocharis*] *founaki*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 79, T. 34 F. 10 [Kopie = T. 18 F. 2-3].

Salomons-Inseln. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. T. 18 F. 2-3 = ? T. 8 F. 2-3 = M. C. T. 34 F. 10 = SMF 26300; Orig. T. 18 F. 4 = SMF 9462].

— ? — ***kreftii*** (COX 1872).

1891 *Placostylus Kreftii*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 132, T. 32 F. 4.

Salomonen. Slg. KOBELT ex DOHRN [Orig. fig. SMF 9459].

— — ***macgillivrayi*** (PFEIFFER 1855).

1960 *Placostylus* (*Placocharis*) *macgillivrayi*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 499, Abb. 1753.

Salomonen [Orig. fig. SMF 26307].

— — ***palmarum*** (MOUSSON 1869).

1891 *Placostylus palmarum* [var. *minor*] KOBELT, M. CH., 1 (13a): 42, T. 9 F. 6-7, 8, 9.

1900 *Placostylus palmarum* var. *minor*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 86, T. 36 F. 34 [Kopie = T. 9 F. 9].

Salomonen [bei Makite auf San Cristobal]. Slg. KOBELT [Orig. F. 6-7 = Holotypus var. *minor* KOBELT = SMF 26308; Orig. F. 8, 9 (= M. C. T. 9 F. 9) = SMF 26311/2].

— — ***strangei*** (PFEIFFER 1855).

1891 *Placostylus Strangei*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 23, T. 5 F. 4-6.

1900 *Placostylus strangei*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 87, T. 34 F. 17 [Kopie = T. 5 F. 6].

Salomonen: Eddystone-Island. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 9463/3].

— — ***stutchburyi mendanae*** KOBELT 1891.

1891 *Placostylus* (*Scottii* var.) *Mendanae* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 133, T. 32 F. 7.

1900 *Placostylus stutchburyi* var. *mendanae*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 89, T. 37 F. 41 [Kopie].

Salomonen. Slg. KOBELT ex DOHRN [Syntypus Orig. F. 7 = SMF 9453].

### ***Placostylus* (*Eumecostylus*) ALBERS 1860.**

— — ***cleryi*** (PETIT 1850).

1891 *Placostylus Cleryi*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 57, T. 14 F. 1, T. 15 F. 1.

1960 *Placostylus* (*Eumecostylus*) *cleryi*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 499, Abb. 1755.

Salomonen: San Cristobal. Slg. KOBELT [Orig. T. 14 F. 1 = 1960 Abb. 1755 = SMF 9437].

Salomonen. Slg. KOBELT 1875 [Orig. T. 15 F. 1 = SMF 9438].

### ***Placostylus* (*Proaspastus*) CLENCH 1941.**

— — ***hargravesi*** (COX 1871).

1891 *Placostylus* (*Charis*) *Hargravesi*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 38, T. 9 F. 3.

Salomonen: Treasury Island. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 9464].

— — **sanchristovalensis** (Cox 1870).

1891 *Placostylus Sanchristovalensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 34, T. 8 F. 4-5.

1960 *Placostylus (Proaspastus) sanchristovalensis*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 500, Abb. 1756.

Salomons-Archipel: San Christoval. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. fig. SMF 9439].

### ***Placostylus (Euplacostylus)* CROSSE 1875.**

— — **koroensis** (GARRETT 1872).

1891 *Placostylus Koroënsis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 26, T. 6 F. 6-7.

Viti-Archipel: Insel Koro. Slg. KOBELT 1882 [Orig. fig. SMF 9441].

— — **seemanni** (DOHRN 1861).

1891 *Placostylus Seemanni*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 14, T. 2 F. 3, 4-5.

1900 *Placostylus seemanni*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 100, T. 39 F. 60 [Kopie = F. 4].

1960 *Placostylus (Euplacostylus) seemanni*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 500, Abb. 1757.

Viti-Archipel: Kantavu. Slg. KOBELT ex Mus. Godeffroy [Orig. T. 2 F. 3 = SMF 9440]; Slg. KOBELT ex H. DOHRN [Orig. T. 2 F. 4-5 = SMF 26153].

Fidschi-Inseln. Slg. MOELLENDORFF [Orig. 1960 Abb. 1757 = SMF 26152a].

### ***Aspastus* ALBERS 1850.**

#### ***Aspastus (Aspastus)* s. str.**

— — **mittocheilus** (REEVE 1848).

1891 *Placostylus (Aspastus) mittocheilus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 63, T. 15 F. 2-3, 4-5.

1960 *Aspastus (Aspastus) mittocheilus*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 500-501, Abb. 1758.

Salomonen. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. T. 15 F. 2-3 = 1960 Abb. 1758 = SMF 9435; ?Orig. T. 15 F. 4-5 = SMF 9436].

(*manugiensis* B. RENSCH 1934).

1934 *Placostylus mittocheilus manugiensis* B. RENSCH, S.B. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1934: 453.

Manugia, San Cristobal. Mus. Berlin m. 1935 [Paratypen SMF 9590/2].

(*paravicinii* B. RENSCH 1934).

1934 *Placostylus mittocheilus paravicinii* B. RENSCH, S.B. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1934: 453.

Wae Beroni, San Cristobal. Mus. Berlin m. 1935 [Paratypus SMF 9591].

— — **sellersi** (Cox 1871).

1891 *Placostylus Sellersi*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 55, T. 13 F. 7.

Salomonen: Guadalcanar. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. fig. SMF 10083].

***Aspastus (Callistocharis)* PILSBRY 1900.**

— — ***elobatus*** (GOULD 1846).

1891 *Placostylus (Charis) elobatus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 59, T. 14 F. 2-3.

Auf Viti-Levu in der Viti-Gruppe. Slg. KOBELT ex H. ROLLE [Orig. fig. SMF 9442].

— — ***gracilis*** (BRODERIP 1840).

1891 *Placostylus (Charis) fulguratus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 60, T. 14 F. 4-5, 6.

Viti-Inseln. Slg. KOBELT [Orig. F. 4-5 = SMF 9455; Orig. F. 6 = SMF 9452].

(*crassilabrum* GARRETT 1872).

1891 *Placostylus (Charis) crassilabrum*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 61, T. 14 F. 7-8.

Auf Vanua Levu in der Viti-Gruppe. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 9451].

— — ***guanensis*** (GARRETT 1872).

1891 *Placostylus (Charis) Guanensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 64, T. 15 F. 6, 7.

Insel Guan im Viti-Archipel. Slg. KOBELT [Orig. T. 15 F. 7 = SMF 9443; Orig. T. 15 F. 6 = ?].

— — ***malleatus*** (JAY 1842).

1891 *Placostylus (Charis) malleatus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 29, T. 7 F. 2-3.

1900 *Placostylus malleatus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 112, T. 41 F. 75-76 [Kopie].

1960 *Aspastus (Callistocharis) malleolatus* (sic! err.), — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 501, Abb. 1759.

Viti-Inseln. Slg. KNOBBE [Orig. 1891 T. 7 F. 2-3 = SMF 9460a]; — Slg. EHRMANN ex FULTON [Orig. 1960 Abb. 1759 = SMF 45621].

— — ***morosus*** (GOULD 1846).

1875 *Bulinus (Placostylus) morosus*, — KOBELT, Jb. dtsh. malak. Ges., 2: 225, T. 7 F. 7-8.

= 1891 *Placostylus (Charis) morosus*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 30, T. 7 F. 4-5.

1900 *Placostylus morosus*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (51): 113, T. 41 F. 79 [Kopie = F. 5].

Viti-Inseln. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 9461].

— — ***ochrostoma*** (GARRETT 1872).

1891 *Placostylus (Charis) ochrostoma*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 56, T. 13 F. 8-9

[Auf Taviuni und Gomera in der] Viti-Gruppe. Slg. KOBELT 1875 [Orig. fig. SMF 9444].

— — ***pfeifferi*** KOBELT 1891.

1868 *Bulinus elobatus*, — PFEIFFER, Novit. Conch., (1) 3: 418, T. 95 F. 7-8.

= 1891 *Placostylus Pfeifferi* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 130, T. 32 F. 2-3.

1900 *Placostylus pfeifferi*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 109, T. 37 F. 42-43 [Kopie].

Im Innern von Viti-Levu im Viti-Archipel. Slg. KOBELT ex H. DOHRN ex L. PFEIFFER [Holotypus Orig. fig. SMF 9445].

***Aspastus (Leucocharis)* PILSBRY 1900.**

— — ***loyaltyensis*** (SOVERBIE 1879).

1891 *Placostylus (Charis) loyaltyensis*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 32, T. 7 F. 6-7  
Loyalitätsinseln: Maré. Slg. KOBELT ex DUPUY 1883 [Orig. fig. SMF 9466/2].

— — ***pancheri*** (CROSSE 1870).

1872 *Bulimus Pancheri* var. *β candida* CROSSE, J. de Conch., 20: 226; [1874, 22: 102, T. 2 F. 5].

1891 *Placostylus (Charis) Pancheri* [var. *candida*]. — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 12, T. 1 F. 6-7

1960 *Aspastus (Leucocharis) pancheri candida*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 501, Abb. 1760.

Nova Caledonia. Slg. KOBELT ex CROSSE [Syntypen Orig. T. 1 F. 6-7 = 1960 Abb. 1760 = SMF 9465/2].

Bemerkung: KOBELT hat in T. 1 F. 8-9 die typische *pancheri* nach CROSSE (1870: T. 13 F. 7) kopiert. Das Original zu KOBELT T. 1 F. 6-7 ist var. *candida* mit weißer Spindel. Der Zeichner hat beim kolorieren der Fig. 6 irrtümlich die orangefarbene Spindel gegeben, die nur der in Fig. 8-9 kopierten typischen Form zukommt, wie KOBELT ausdrücklich erwähnt. Durch diesen Irrtum in der Kolorierung sind die Zitate für KOBELT 1891 bei CROSSE (1894: 295) und PILSBRY (1900: 68) verwechselt.

***Aspastus (Poecilocharis)* KOBELT 1891.**

— — ***bicolor*** (HARTMAN 1889).

1891 *Placostylus (Charis) bicolor*, — KOBELT, M. CH., 1 (13a): 81, T. 19 F. 5-6.

1900 *Placostylus [Poecilocharis] bicolor*, — PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 74, Frontispiece F. 4 [Kopie = F. 5].

Neue Hebriden: Aura Island. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 9456].

— — ***rossiteri*** (HARTMAN 1889).

1891 *Placostylus (Charis) Hartmanni* KOBELT, M. CH., 1 (13a): 78, T. 18 F. 7-9 [n. nom. pro *Charis rossiteri* HARTMAN 1889 non *Bulimus rossiteri* BRAZIER 1881].

1900 *Placostylus [Poecilocharis] hartmani* PILSBRY, M.C., (2) 13 (50): 73, T. 45 F. 11-12 [nom. emend., Kopie].

1960 *Aspastus (Poecilocharis) rossiteri*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 501, Abb. 1761.

Neue Hebriden: Aura Island. Slg. KOBELT ex LAYARD [Orig. fig. SMF 9457].

Schriften.

CROSSE, H. (1872): Diagnoses molluscorum Novae Caledoniae incolarum. — J. de Conch., 20: 225-227

— — — (1874): Description de mollusques inédits provenant de la Nouvelle-Calédonie. — J. de Conch., 22: 97-103.

— — — (1894): Faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. — J. de Conch., 42: 161-473, Taf. 7-10.

- HAAS, F. (1935): Beschreibung neuer Untergattungen und Arten von Mollusken. — Zool. Anz., 109 (7/8): 188-195.
- KOBELT, W. (1875): Conchologische Miscellen. — Jb. dtsch. malak. Ges., 2: 222-228.  
— — — (1891): Die Gattung *Placostylus* BECK. (*Bulimus*. Neue Folge). — in MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch.-Cab., 1 (13a): 1-142, Taf. 1-32.
- PILSBRY, H. A. (1900): Manual of Conchology, (2) 13 (49): 1-64, T. 1-15; (50) 65-112, T. 16-34; (51): 113-176, T. 35-48.
- RENSCH, B. (1934): in I. & B. RENSCH, Diagnosen neuer Landschnecken von den Salomonen. — S.-B. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1934: 451-453.
- SUTER, H. (1908): A new *Placostylus* from New Zealand. — Trans. New Zealand Inst., 40: 340-343, Taf. 25.
- ZILCH, A. (1960): Gastropoda, Euthyneura. In W. WENZ, Gastropoda, Handb. Paläozoöl., 6 (2, 3): 401-600. Berlin (Gebr. BORNTRAEGER).

# Namenverzeichnis der erwähnten Taxa.

|                                      |          |                                       |     |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----|
| <i>alexander</i> CROSSE              | 134      | <i>fibratus</i> MARTYN                | 135 |
| <i>Aspastus</i>                      | 141      | <i>founaki</i> HOMBRON & JACQUINOT    | 139 |
|                                      |          | <i>fulguratus</i> JAY                 | 142 |
| <i>bairdi</i> GASSIES                | 135      | <i>fuliginus</i> PFEIFFER             | 134 |
| <i>Basileostylus</i>                 | 133      |                                       |     |
| <i>bavayi</i> CROSSE & MARIE         | 134      | <i>gaudryanus</i> GASSIES             | 138 |
| <i>bicolor</i> HARTMAN               | 143      | <i>gracilis</i> BRODERIP              | 142 |
| <i>bivarcosus</i> GASKOIN            | 133      | <i>guanensis</i> GARRETT              | 142 |
| <i>bollonsi</i> SUTER                | 133      | <i>guestieri</i> GASSIES              | 136 |
| <i>bondeensis</i> CROSSE & SOUVERBIE | 134      |                                       |     |
| <i>boulariensis</i> SOUVERBIE        | 134      | <i>hargravesi</i> COX                 | 140 |
| <i>bovinus</i> BRUGUIÈRE             | 133, 135 | <i>hartmani</i> PILSBRY               | 143 |
|                                      |          | <i>hartmanni</i> KOBELT               | 143 |
| <i>caledonicus</i> PETIT             | 135      | <i>hienguenensis</i> CROSSE           | 135 |
| <i>Callistocharis</i>                | 142      | <i>hybrida(us)</i> KOBELT             | 138 |
| <i>candida</i> CROSSE                | 143      |                                       |     |
| <i>chrysochila</i> CROSSE            | 138      | <i>incerta(us)</i> CROSSE             | 138 |
| <i>cicatricosus</i> GASSIES          | 136      | <i>insignis</i> PETIT                 | 135 |
| <i>cleryi</i> PETIT                  | 140      |                                       |     |
| <i>confusus</i> PILSBRY              | 136      | <i>kanalensis</i> CROSSE              | 137 |
| <i>crassa</i> CROSSE                 | 134      | <i>knoblauchii</i> KOBELT             | 136 |
| <i>crassilabrum</i> GARRETT          | 142      | <i>koroensis</i> GARRETT              | 141 |
| <i>crassus</i> KOBELT                | 135      | <i>kreftii</i> COX                    | 140 |
|                                      |          |                                       |     |
| <i>debeauxii</i> GASSIES             | 138      | <i>leoni</i> HAAS                     | 137 |
| <i>dupuyi</i> KOBELT                 | 134      | <i>Leucocharis</i>                    | 143 |
|                                      |          | <i>loyaltyensis</i> SOUVERBIE         | 143 |
| <i>eddystonensis</i> PFEIFFER        | 135      |                                       |     |
| <i>edwardsianus</i> GASSIES          | 135      | <i>macfarlandi</i> COX                | 139 |
| <i>elobatus</i> GOULD                | 142      | <i>macgillivrayi</i> PFEIFFER         | 140 |
| <i>Eumecostylus</i>                  | 140      | <i>malleatus</i> JAY                  | 142 |
| <i>Euplacostylus</i>                 | 141      | <i>malleolatus</i> = <i>malleatus</i> | 142 |

|                                        |          |                                 |     |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------|-----|
| <i>manugiensis</i> B. RENSCH           | 141      | <i>Proaspastus</i>              | 140 |
| <i>Maoristylus</i>                     | 133      | <i>procerula</i> CROSSE         | 134 |
| <i>mariei</i> CROSSE & FISCHER         | 137      | <i>pseudocaledonicus</i> CROSSE | 138 |
| <i>mendanae</i> KOBELT                 | 140      |                                 |     |
| <i>militocheilus</i> REEVE             | 141      | <i>rhinocheti</i> KOBELT        | 136 |
| <i>minor</i> KOBELT, <i>palmarum</i> — | 140      | <i>rossiteri</i> BRAZIER        | 139 |
| <i>monackensis</i> CROSSE              | 137      | <i>rossiteri</i> HARTMAN        | 143 |
| <i>morosus</i> GOULD                   | 142      |                                 |     |
|                                        |          | <i>sanchristovalensis</i> COX   | 141 |
| <i>ochrostoma</i> GARRETT              | 142      | <i>Santacharis</i>              | 134 |
| <i>orientalis</i> KOBELT               | 136      | <i>saxtoni</i> KOBELT           | 139 |
| <i>ouveanus</i> MOUSSON                | 137      | <i>scarabus</i> ALBERS          | 139 |
| <i>ovalis</i> KOBELT                   | 136      | <i>seemanni</i> DOHRN           | 141 |
|                                        |          | <i>sellersi</i> COX             | 141 |
| <i>palmarum</i> MOUSSON                | 140      | <i>senilis</i> GASSIES          | 139 |
| <i>pancheri</i> CROSSE                 | 143      | <i>shongii</i> LESSON           | 133 |
| <i>paravicinii</i> B. RENSCH           | 141      | <i>souvillei</i> MORELET        | 139 |
| <i>pfeifferi</i> KOBELT                | 142      | <i>strangei</i> PFEIFFER        | 140 |
| <i>pinicola</i> GASSIES                | 136      | <i>submariei</i> SOUVERBIE      | 137 |
| <i>Placocharis</i>                     | 139      |                                 |     |
| <i>Placostylus</i>                     | 133, 134 | <i>tchioensis</i> KOBELT        | 137 |
| <i>Poecilocharis</i>                   | 143      | <i>thioensis</i> CROSSE         | 137 |
| <i>porphyrostomus</i> PFEIFFER         | 138      |                                 |     |
| <i>pouenanus</i> KOBELT                | 139      | <i>umbilicatus</i> KOBELT       | 138 |
| <i>poumeana</i> CROSSE                 | 139      |                                 |     |
| <i>poyensis</i> KOBELT                 | 138      | <i>ventricosus</i> KOBELT       | 136 |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [102](#)

Autor(en)/Author(s): Zilch Adolf Michael

Artikel/Article: [Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 48a\): Mollusca: Bulimulidae \(1\). 133-145](#)