

Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 57¹⁾: Mollusca: Clausiliidae (4): Alopinae (2): Alopini (1).

Von

ADOLF ZILCH,
Forschungs-Institut Senckenberg, Frankfurt a. M.

Mit Tafel 25-28.

Die Veröffentlichung der vorliegenden Folge der „Typen und Typoide“, die, wie für alle Clausiliidae, schon vor mehreren Jahren erarbeitet worden ist, wurde zurückgehalten, bis die Revision der Gattung *Albinaria* durch H. NORDSIECK zu einem gewissen umfassenden Ergebnis geführt hat. Bezüglich der Zu- und Anordnung der Taxa verweise ich auf die Arbeiten von H. NORDSIECK (1974, 1977).

Neben der Überprüfung des für die Grundlagenforschung bedeutsamen Materials ist es auch Zweck dieser Reihe, bisher noch nicht bildlich dargestellte Typen abzubilden. Bei der großen Zahl solcher Taxa, besonders in der Gattung *Albinaria*, wurde die Zahl der Abbildungen aus Einsparungsgründen beschränkt.

Albinaria VEST 1867.

1) Gruppe der *scopulosa*.

— ***scopulosa scopulosa*** (CHARPENTIER 1852).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *scopulosa*, — O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 122.

1960 *Albinaria* (*Scopulosa*) *scopulosa*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 427, Abb. 1519.

1974 *Albinaria scopulosa scopulosa*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 135, T. 4 F. 14-16.

Ionische Inseln: Insel Zante, Berg Alto Skop. Slg. O. BOETTGER ex NEUMAYR 1876 [Orig. 1960 Abb. 1519 = 1974 F. 14 = SMF 68756].

W-M. Griechenland: Insel Petala. Slg. KRÜPER [Orig. 1974 F. 15 = SMF 93851a].

W-M. Griechenland: Astakos. Slg. H. NORDSIECK 1972 [Orig. 1974 F. 16 = SMF 227669/5].

¹⁾ 56: Mollusca: Aciculidae. — Arch. Moll., 107 (1/3): 123-136, Taf. 11-12, 12a. Frankfurt am Main 1976.

— **scopulosa glabricollis** (L. PFEIFFER 1866).

1974 *Albinaria scopulosa glabricollis*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 136, T. 4 F. 17.

W-M. Griechenland: „Akarnanien“ Slg. O. BOETTGER ex PARREYSS [Orig. 1974 F. 17 = SMF 68759].

— **scopulosa epirotes** H. NORDSIECK 1974.

1974 *Albinaria scopulosa epirotes* H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 136, T. 4 F. 18-20.

Epirus: Plakoti bei Paramithia. Slg. H. NORDSIECK 1972 [Holotypus Orig. F. 18 = SMF 227670, Paratypen SMF 227671/4]. — Louros-Schlucht bei Klissoura. Slg. H. NORDSIECK 1972 [Paratypen SMF 227672/5, dabei Orig. F. 19].

S-Albanien: Tepelenë (Burg). Slg. H. NORDSIECK ex A. FUCHS 1936 [Paratypen SMF 227673/2, dabei Orig. F. 20].

— **scopulosa winneguthi** (A. J. WAGNER 1914).

1914 *Alopi* (*Albinaria*) *winneguthi* A. J. WAGNER in STURANY & WAGNER, Denkschr. math. nat. Kl. Akad. Wiss. Wien, 91: 70.

1974 *Albinaria scopulosa winneguthi*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 137, T. 5 F. 21.

S-Albanien: Dukati bei Valona [Vlorë]. ex WINNEGUTH 1908 [Syntypen: SMF 32503/3 Slg. EHRMANN ex STURANY-Mus. Wien, dabei Orig. 1974 F. 21; 93866/1 Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL 1931; 199277/2 Slg. JAECKEL ex KÄUFEL].

— **hians hians** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *hians* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 125, T. 147 F. 5a-e.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *hians*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 82, T. 205 F. 1282 [Kopie].

Akarnanien [„angeblich aus dem unteren Dalmatien“]. Slg. O. BOETTGER ex SCHAUFUSS [Lectotypus SMF 68764, Paratypus SMF 68765].

(*sublactea* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *hians* var. *sublactea* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 337.

Aetolia. Slg. O. BOETTGER ex CONÉMÉNOS 1882 [Lectotypus SMF 68766, Paratypen SMF 68767/2].

— **hians perlactea** H. NORDSIECK 1974.

1974 *Albinaria hians perlactea* H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 139, T. 5 F. 22.

W-M. Griechenland: Riza bei Antirrhion. H. NORDSIECK 1972 [Holotypus Orig. fig. SMF 234378; Paratypen SMF 234379/5].

— **hians conemenosi** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *conemenosi* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 337, T. 34 F. 14.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *conemenosi*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 82, T. 205 F. 1283 [Kopie].

Morea: Perivola bei Patras. Slg. O. BOETTGER ex CONÉMÉNOS [Lectotypus SMF 68776, Paratypen SMF 68777/2]. — Bezaïti bei Patras. Slg. O. BOETTGER

ex CONÉMÉNOS [Paratypen SMF 68778/3]. — Berg von Amblo bei Patras. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE + CONÉMÉNOS [Paratypen SMF 68779/5, 93873/2 Slg. JETSCHIN 1881].

— ***hians achaica*** (O. BOETTGER 1885). (Taf. 25 Fig. 1).

1885 *Clausilia (Albinaria) achaica* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 17: 122.

Achaia: Santameri. Slg. O. BOETTGER ex CONÉMÉNOS 1885 [Lectotypus SMF 68943; Paratypen: SMF 68944, 68946 Slg. MOELLENDORFF].

Achaia: Psari. Slg. O. BOETTGER ex CONÉMÉNOS 1885 [Paratypus SMF 66945].

— ***hians macrodera*** (O. BOETTGER 1885). (Taf. 25 Fig. 2).

1885 *Clausilia (Albinaria) conemenosi* var. *macrodera* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 17: 122.

Achaia: Brostovitsa. Slg. O. BOETTGER ex CONÉMÉNOS 1885 [Lectotypus SMF 68783, Paratypen SMF 68784/2].

Elis: Divri. Slg. O. BOETTGER ex CONÉMÉNOS 1885 [Paratypen SMF 68785/12].

— ***hians violascens*** (WESTERLUND 1894).

1894 *Clausilia (Albinaria) violascens* WESTERLUND, Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 26: 191.

Veluchi, Carpenisi. Slg. TH. KRÜPER [Orig. Serie SMF 93845/71].

— ***jonica*** (L. PFEIFFER 1866).

1977 *Albinaria jonica*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 107 (4/6): 290, Abb. 1.

Ionische Inseln: Cefalonia. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [Orig. fig. SMF 68761/2].

— ***broemmei*** (O. BOETTGER 1892).

1892 *Clausilia (Albinaria) broemmei* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 24: 64.

1896 *Clausilia (Albinaria) broemmei*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 93, T. 207 F. 1300.

1960 *Albinaria (Pistillum) broemmei*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 428, Abb. 1523.

N-Morea: auf dem Berge Chelmos bei Kalavryta, an der Grenze von Achaia und Arkadien. CHR. BRÖMME 1891 [Lectotypus Orig. 1960 Abb. 1523 = SMF 68947; Paratypen: SMF 68948/2 Slg. O. BOETTGER, 68949/2 Slg. KOBELT = Orig. Ic. 1300, 68950/5 Slg. MOELLENDORFF].

2) Gruppe der *voithii*.

— ***voithii*** (ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia voithii* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 11, T. 18 F. 246.

1960 *Albinaria (Laconica) voithi*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 428-9, Abb. 1524.

„Auf den griechischen Inseln“. [Beizettel: Griechenland]. Slg. ROSSMÄSSLER ex VOITH [Holotypus Orig. Ic. 246 = 1960 Abb. 1524 = SMF 68822].

— **voithii agesilaos** (MARTENS 1873).

1873 *Clausilia agesilaus* MARTENS, Malak. Bl., 20: 42.

Morea: Kloster Gola am Taygetos. Slg. KOBELT ex RAYMOND [Orig. Serie SMF 69196-7/10+3].

(*agamemnon* O. BOETTGER 1878). (Taf. 25 Fig. 3).

1878 *Clausilia agesilaos* var. *agamemnon* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 129.

Taygetosgebirge, Sparta. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex HELDREICH [Lectotypus SMF 69202, Paratypus SMF 69203].

— **voithii semicostulata** (O. BOETTGER 1878). (Taf. 25 Fig. 4).

1878 *Clausilia menelaos* subsp. *semicostulata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 128, T. 148 F. 8.

Taygetosgebirge. Slg. O. BOETTGER ex Tauschverein der DMG [Lectotypus SMF 69180a].

— **voithii menelaos** (MARTENS 1873).

1873 *Clausilia menelaus* MARTENS, Malak. Bl., 20: 41.

Morea: St. Elias auf dem Taygetosgebirge. Slg. REINHARDT ex RAYMOND [Orig. Serie SMF 69171/5].

„Sparta“. Slg. KOBELT ex RAYMOND [Orig. Serie SMF 69167/22].

(*minor* MARTENS 1873).

1873 *Clausilia menelaus* f. *minor* MARTENS, Malak. Bl., 20: 41.

Morea: Taygetos, Albanos. Slg. REINHARDT ex RAYMOND [Orig. Serie SMF 69170/1].

— **voithii gerolimena** H. NORDSIECK 1974.

1974 *Albinaria voithii gerolimena* H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 139, T. 5 F. 23.

Peloponnes: Yerolimín bei Areopolis. Slg. H. NORDSIECK ex W. FAUER 1973 [Holotypus Orig. fig. SMF 233903].

3) Gruppe der *grisea*.

— **senilis senilis** (ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia senilis* ZIEGLER, ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 11 (part.), T. 18 F. 249.

1878 *Clausilia [Albinaria] naevosa* subsp. *senilis*, — O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 150.

„Corfu“ [Cefalonia]. Slg. ROSSMÄSSLER ex ZIEGLER [Lectotypus Orig. Ic. 249 = SMF 68908a; Paratypen SMF 68908b/2].

(*flavescens* O. BOETTGER 1878).

1878 *senilis* var. *flavescens* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 150, 151.

Cefalonia. Slg. O. BOETTGER ex STOSSICH [Lectotypus SMF 68930, Paratypus SMF 68931].

(*flavescens transiens* O. BOETTGER 1878).

1878 *senilis* var. *flavescens* f. *transiens* O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 151.

Cefalonia. Slg. ROSSMÄSSLER ex PARREYSS [Lectotypus SMF 68928, Paratypus SMF 68929].

(*interpicta* O. BOETTGER 1878).

1878 *senilis* f. *interpicta* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 150.

Cefalonia. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex THIESSE [Lectotypus SMF 68932a, Paratypen SMF 68932b/2].

(*modesta* ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia senilis* (*Cl. modesta* ZIEGLER) ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 11-12 (part.), T. 18 F. 248.

(1852 [*Clausilia*] *modesta* CHARPENTIER, J. de Conch., 3: 376 Nr. 106 [auf PARREYSS-Stücke gegründet].)

„Corfu“ [Cefalonia]. Slg. ROSSMÄSSLER ex ZIEGLER [Lectotypus Orig. Ic. 248 = SMF 4749].

Cephalonia. Slg. STURM ex PARREYSS 1837 [SMF 230238/2]; Slg. KNOBBE ex PARREYSS [SMF 230178].

(*naevosa* — ROTH 1855 non L. PFEIFFER 1841).

1855 *Clausilia naevosa*, — ROTH, Malak. Bl., 2: 41.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *naevosa*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 149.

1960 *Albinaria* (*Naevosa*) *naevosa*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 428, Abb. 1522.

Insel Zante. ex ROTH [SMF 69216-7/1+3 Slg. O. BOETTGER, Orig. 1960 Abb. 1522; 69218/1 Slg. ROSSMÄSSLER 1856, 230167/4 Slg. STURM 1853].

— ***senilis leucadia*** (WESTERLUND 1901).

1901 *Clausilia naevosa* var. *leucadia*, O. BOETTGER, WESTERLUND, Mém. Acad. imp. Sci. St. Pétersb., (8) 11 (11): 124.

Die Originalserien in Slg. O. BOETTGER (leg. CONÉMÉNOΣ 1889 sind alle von Fundorten auf Sta. Maura [Insel Leukas]: Kari (SMF 230206/12), Karyá (230207/19), Sfakiotes (230208/14), St. Nicéas (230209/19), Dragano (230210/12), Englouvi (230211/8), Weg Komilið-Kalamitsi (230212/12), Kalamitsi (230213/20), Alexandros (230214/6) und Tsukalades (230215/9).

— ***senilis epirotica*** (MOUSSON 1859).

1859 *Clausilia senilis* var. *epirotica* MOUSSON, Vj. Schr. naturf. Ges. Zürich, 4: 261.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *naevosa* subsp. *epirotica*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 150, 152, T. 147 F. 10a-e.

Epirus: Mt. Alitschea, Beschpunar (Penta pigadia). Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex SCHLÄFLI [Syntypen SMF 69065/2]. — Geostrizza. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex SCHLÄFLI [Syntypen SMF 69064/3; 69066/2 f. minor].

— ***senilis inconstans*** (MOUSSON 1859).

1859 *Clausilia inconstans* MOUSSON, Vj. Schr. naturf. Ges. Zürich, 4: 261.

1878 *Clausilia [Albinaria] inconstans*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 154.

Epirus: Sayades. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex SCHLÄFLI [Syntypen: SMF 68940/2, 68939/3].

— ***senilis corcyrensis*** (MOUSSON 1859).

1852 *Clausilia senilis*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 80 Nr. 70 (part.).

1859 *Clausilia corcyrensis* MOUSSON, Vj. Schr. naturf. Ges. Zürich, 4: 24.

1878 *Clausilia [Albinaria] naevosa* subsp. *corcyrensis*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 150, 153.

Corfu. Slg. KÜSTER [SMF 69233/3]. — Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [Syntypen SMF 69230/6].

(*corcyrensis major* O. BOETTGER 1878).

1878 *corcyrensis* f. *major* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 153.

Corfu: Mte. Pantokrator. Slg. O. BOETTGER ex A. ISSEL [Lectotypus SMF 69237, Paratypen SMF 69236/7].

(*corcyrensis media* O. BOETTGER 1878).

1878 *corcyrensis* f. *media* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 153.

Corfu: Santi Deka. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 69235, Paratypen SMF 69234/28].

(*corcyrensis minor* O. BOETTGER 1878).

1878 *corcyrensis* f. *minor* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 153.

Corfu: Gasturi. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [Lectotypus SMF 69232, Paratypen SMF 69231/22].

— ***senilis castrensis*** (MOUSSON 1859).

1859 *Clausilia castrensis* MOUSSON, Vj. Schr. naturf. Ges. Zürich, 4: 25.

1878 *Clausilia [Albinaria] naevosa* subsp. *castrensis*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 149, 153.

Korfu: Koropiskopus. ex MOUSSON [? Syntypen: SMF 69221/7 Slg. O. BOETTGER, 69222/5 Slg. KOBELT].

(*castrensis major* O. BOETTGER 1878).

1878 *castrensis* f. *major* O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 153.

Korfu: Signès. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 69219, Paratypen SMF 69220/2].

(*othona* WESTERLUND 1901).

1901 *Clausilia [Albinaria] naevosa* var. *othona* (BTTG.) WESTERLUND, Mém. Acad. imp. Sci. St. Pétersb., 11 (11): 124.

Insel Fano, N von Corfoù. Slg. O. BOETTGER [Orig. Serie SMF 230231/17].

— ***contaminata contaminata*** (ROSSMÄSSLER 1835).

1835 *Clausilia contaminata* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (2): 11, T. 7 F. 105.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata*, — O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 145.

„Insel Corfu“ Slg. ROSSMÄSSLER [Lectotypus Orig. Ic. 105 = SMF 5086; Paratypus SMF 5087].

Cefalonia: Mte. Nero. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [SMF 68903/12; 93943/2 Slg. JETSCHIN ex BOETTGER 1881].

(*fuscostrigata* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata* f. *fuscostrigata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 146, 147.

Cefalonia: San Gerasimo. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 68964; Paratypen SMF 68965/2].

(*major* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata* f. *major* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 146.

Cefalonia: Mte. Nero. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [Lectotypus SMF 68903a]. — „Zante“ Slg. KOBELT ex PARREYSS [Paratypen SMF 68900/3].

(*lactea* ROSSMÄSSLER 1839).

1839 *Clausilia lactea* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 2 (3/4): 15, T. 48 F. 616.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata* f. *lactea*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 147.

Die noch O. BOETTGER 1878 vorgelegenen Originalexemplare der Slg. ROSSMÄSSLER sind verschollen. —

„Corfu“. Slg. KOBELT ex PARREYSS [SMF 230439].

Inneres Cefalonien. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [SMF 68958/5].

Cefalonia: Argostoli. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [SMF 68959/3].

(*soluta* MOUSSON 1859).

1859 *Clausilia contaminata* var. *soluta* MOUSSON, Vj. Schr. naturf. Ges. Zürich, 4: 34.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata* var. *soluta*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 146.

Cefalonia: Mte. Nero. ex MOUSSON [SMF 68968/2 Slg. O. BOETTGER, 68967/2 Slg. KOBELT]. — Lixuri. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [SMF 68966/2].

— ***contaminata incommoda*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *incommoda* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 143, T. 147 F. 8a-c, 9.

Insel Zante. Die Originale der Slg. O. BOETTGER ex BLANC sind verschollen. — Slg. KOBELT ex O. BOETTGER [Syntypen SMF 230427/2].

— ***contaminata odysseus*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata* var. *odysseus* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 146, 147, T. 148 F. 11.

Insel Ithaka. Slg. O. BOETTGER ex LIEBETRUT [Lectotypus SMF 68960, Paratypen SMF 68961/2].

— ***contaminata muraria*** (A. SCHMIDT 1868).

(*artaensis* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *contaminata* var. *artaensis* ,MOUSSON' O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 146.

S-Albanien: Arta. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON 1878 ex SCHLÄFLI [Lectotypus SMF 68794, Paratypus SMF 68795].

(*interjecta* KÄUFEL 1930).

1930 *Albinaria schuchi interjecta* KÄUFEL, S.-B. Akad. Wiss. Wien, math. nat. Kl., (I) 139 (3/4): 173.

Insel Leukas: Enkluvi, 700 m. ex KÄUFEL ex BEIER 1929 [Paratypen: SMF 93963/6 Slg. K. L. PFEIFFER]. — Stavrotas, 1000 m. ex KÄUFEL ex BEIER 1929 [Paratypen: SMF 93962/3 Slg. K. L. PFEIFFER, 230444/1 Slg. KALTENBACH]. — Asgodikó bei Sivros, 400 m. ex KÄUFEL ex BEIER 1929 [Paratypen SMF 230443/2 Slg. KALTENBACH].

(*pumilio* KÄUFEL 1930).

1930 *Albinaria schuchi interjecta* morpha *pumilio* KÄUFEL, S.-B. Akad. Wiss. Wien, math. nat. Kl., (I) 139 (3/4): 174.

Insel Leukas: Sivros, 260 m. ex KÄUFEL ex BEIER 1929 [Paratypen SMF 93968/4 Slg. K. L. PFEIFFER].

— ***krueperi krueperi*** (L. PFEIFFER 1866).

(1866 *Clausilia krueperi* L. PFEIFFER, Malak. Bl., 13: 152.)

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *krueperi*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 137.)

„Nur auf dem Berge Clissa in Morea (leg. Dr. KRÜPER)“ Die beiden Syntypen der Slg. L. PFEIFFER wahrscheinlich in Stettin vernichtet.

Bemerkung: In Slg. KRÜPER liegen vor: Xylokastron [SMF 93730/33], Aegion [SMF 93729/19] und Klissura in Akarnanien [SMF 93728/4 Slg. JETTSCHIN ex KRÜPER].

— ***krueperi holostoma*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 25 Fig. 5).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *krueperi* var. *holostoma* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 338.

Morea: Kap Katakolo, Elis. ex THIESSE [Lectotypus SMF 68918; Paratypen SMF 68919/16 Slg. O. BOETTGER 1881, 68920-1/6 Slg. KOBELT, 93735/4 Slg. JETTSCHIN 1881].

— ***krueperi dissipata*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *dissipata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 137, T. 147 F. 6a-e.

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *krueperi* var. *dissipata*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 338.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *dissipata*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 89, T. 206 F. 1293 [Kopie].

1961 *Albinaria dissipata*, — JAECKEL & PLATE, Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden, 26 (1): 13, Abb. 9.

Lepanto in Rumelien. Slg. O. BOETTGER ex CLESSIN (ex THIESSE) [Lectotypus Orig. fig. SMF 68908, Paratypen SMF 68909/7].

Griechenland: Naupaktos (Lepanto). Slg. JAECKEL [Orig. 1961 Abb. 9 = SMF 199248/5].

(*aetolica* WESTERLUND 1890).

1890 *Clausilia* [*Delima*] *aetolica* WESTERLUND, Fauna, Suppl. I: 143 Nr. 116a.

Aetolia: Goritza-Felsen. ex KRÜPER [Originalserie: SMF 94823/4 Slg. JET-SCHIN, 230324/4 Slg. KRÜPER].

— ***grisea grisea*** (DESHAYES 1833).

1839 *Clausilia grisea*, — ROTH, Moll. spec. Orient. (Diss.): 21, T. 2 F. 6.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *grisea*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 135.

Morea [Peloponnes]. [SMF 68805/4 Slg. ROSSMÄSSLER ex ROTH ex BERGER 1856; 230298/13 Slg. STURM 1847].

Morea: Nauplia. Slg. KOBELT ex RAYMOND [SMF 68806/8, 230300/6].
Athen. Slg. ROSSMÄSSLER ex WALTL 1848 [SMF 230297/6, 68804/3].

— ***grisea heterochroa*** (WESTERLUND 1894).

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *heterochroa* WESTERLUND, Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 26: 176.

Arkadien: Stenmitza, Chrysovitsa. Slg. KRÜPER [Orig. Serie SMF 93999/34];
Apano Krepa. Slg. KRÜPER [Orig. Serie SMF 94001/27].

— ***grisea thiesseana*** (O. BOETTGER 1878). (Taf. 25 Fig. 6).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *maculosa* var. *thiesseana* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 139.

N-Morea: Patras. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE [Lectotypus SMF 68897; Paratypen SMF 68898/2].

(*maculosa* auct., non DESHAYES 1833 nom. oblit.).

1855 *Clausilia maculosa*, — ROTH, Malak. Bl., 2: 42.

1860 *Clausilia maculosa*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 237 Nr. 245.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *maculosa*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 138.

1960 *Albinaria* (*Graja*) *maculosa*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 428, Abb. 1521.

Attika. [Orig. 1960 Abb. 1521 = SMF 68867 Slg. O. BOETTGER „Original PFEIFFER's“ ex coll. DOHRN; 68865/4 Slg. ROSSMÄSSLER ex ROTH 1856; 230287/4 Slg. KÜSTER-Erlangen].

— ***grisea immensa*** (O. BOETTGER 1889). (Taf. 25 Fig. 7).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *maculosa* var. *immensa* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 52.

Morea: Parnon-Gebirge in S-Arkadien. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus „gutes Stück“ SMF 68899].

— ***schuchii schuchii*** (ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia schuchii* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 13, T. 18 F. 253.

1878 *Clausilia [Albinaria] schuchi*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 140.

Griechenland. Slg. ROSSMÄSSLER ex VOITH [Holotypus Orig. Ic. 253 = SMF 4557; Paratypen SMF 4558/2].

— ***schuchii olympica*** H. NORDSIECK 1974. (Taf. 25 Fig. 8).

1889 *Clausilia [Albinaria] schuchi* var. *oertzeni* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 52 [non O. BOETTGER 1889: 42].

1974 *Albinaria schuchii olympica* H. NORDSIECK, Arch. Moll., 104: 134 [n. nom.].

Zeustempel zu Olympia (Elis). Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1886 [Lectotypus SMF 68837; Paratypen SMF 68838/9].

— ***schuchii liebetruti*** (CHARPENTIER 1852).

1878 *Clausilia [Albinaria] liebetruti*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 142.

Das Exemplar der Slg. O. BOETTGER ex PARREYSS ist verschollen. — Insel Zante. Slg. ROSSMÄSSLER ex ASSMANN [SMF 68832/2].

— ***schuchii oscarii*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] schuchi* var. *oscarii* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 339, T. 34 F. 16.

1896 *Clausilia (Albinaria) schuchi* [var. *oscarii*], — KOBELT, Icon., (2) 7: 88, T. 206 F. 1291 [Kopie].

Lakonien: Vitylo auf Mani. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE 1881 [Lectotypus SMF 68843; Paratypen SMF 68844, 93949/2 Slg. JETSCHIN 1881].

Mt. Cylline, Sparta. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE 1881 [Paratypen SMF 68845/3].

— ***arcadica arcadica*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia [Albinaria] maculosa* subsp. *arcadica* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 139, T. 147 F. 7.

1883 *Clausilia [Albinaria] arcadica*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 339.

1896 *Clausilia (Albinaria) arcadica*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 87, T. 206 F. 1290 [Kopie].

1961 *Albinaria maculosa (arcadica)*, — JAECKEL & PLATE, Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden, 26 (1): 14, Abb. 10.

N-Arkadien: Vytina. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex HELDREICH [Lectotypus SMF 68849, Paratypus SMF 68850].

Griechenland: Kalkfelswand am Durchbruch des Flusses Mornos unmittelbar an der alten türkischen Bogenbrücke bei Lidorikion. Slg. JAECKEL [Orig. 1961 Abb. 10 = SMF 199237/2+4].

— ***arcadica hydriota*** (O. BOETTGER 1891). (Taf. 25 Fig. 9).

1891 *Clausilia (Albinaria) grisea* var. *hydriota* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 23: 92.

Peleponnes: Insel Hydra. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER 1891 ex LEONIS 1889 [Lectotypus SMF 69153; Paratypen SMF 69154/3, 93740/3, 93740/2 Slg. KRÜPER].

— **arcadica dorica** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia dorica* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 51, T. F. 6.

Griechenland: Lidoriki, Doris. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. fig. SMF 221213; Paratypen: SMF 221214/3, 221215/2 Slg. MOEL-LENDORFF].

— **messenica messenica** (MARTENS 1876).

(1876 *Clausilia messenica* MARTENS, Jb., 3: 343, T. 12 F. 7.)

1878 *Clausilia [Albinaria] messenica*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 134.

Morea: an den Mauern des alten Castells von Kalamata an der Südküste von Messenien [Das 1876 von KOBELT gezeichnete Original ist in Slg. KOBELT nicht nachzuweisen]; ex KINKELIN ex CAROL STUDER [SMF 68930/3 Slg. O. BOETTGER, 68931/3 Slg. KOBELT, 230310/186 Slg. KINKELIN].

(*brenskiei* O. BOETTGER 1883). (Taf. 25 Fig. 10).

1883 *Clausilia (Albinaria) messenica* var. *brenskiei* O. BOETTGER, Jb., 10: 337.

Messenien: Kloster Demiobas, an der W-Seite des Taygetos-Gebirges. Slg. O. BOETTGER ex BRENSKE 1883 [Lectotypus SMF 68947, Paratypen SMF 68948/2].

(*laconica* O. BOETTGER 1878). (Taf. 26 Fig. 11).

1878 *Clausilia [Albinaria] messenica* var. *laconica* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 135.

Lakonien: Kyparissias. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON [Lectotypus SMF 68941, Paratypen SMF 68942/3].

— **messenica cathara** (WESTERLUND 1894).

1894 *Clausilia (Albinaria) cathara* WESTERLUND, Nachr. Bl., 26: 190.

Morea: bei Langadi am Taygetos-Gebirge. Slg. TH. KRÜPER [Originalserie SMF 93971/29].

— **messenica goldfussi** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] goldfussi* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 338, T. 34 F. 15.

1896 *Clausilia (Albinaria) goldfussi*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 85, T. 205 F. 1287 [Kopie].

„Mountains of Taygetos, Sparta“ Slg. O. BOETTGER ex GOLDFUSS 1883 [Lectotypus Orig. fig. SMF 69256; Paratypen SMF 69257/2, 69258/1].

Bemerkung: In Slg. KRÜPER sind nur folgende Fundorte belegt: Astros, Peloponnes [93995/12]; Panagitzta, Taygetos [93994/15]; Taygetos [93992/30]; Langadi, Taygetos [93993/24].

— **messenica incrustata** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] incrustata* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 339, T. 34 F. 17.

1896 *Clausilia (Albinaria) incrustata*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 90, T. 206 F. 1295 [Kopie].

Insel [Servi oder] Elaphonisi. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Lectotypus Orig. fig. SMF 66981].

Sonderstellung

— **argynnis** (WESTERLUND 1898).

(1898 *Clausilia* [*Albinaria*] *argynnis* WESTERLUND, Annu. Mus. zool. Sci. St. Pétersb., 1898: 168.)

Peloponnes (Morea): Hagias Jani bei Astros. Slg. TH. KRÜPER [Originalserie SMF 93392/7, 66323/1 Slg. O. BOETTGER 1900].

4) Gruppe der *discolor*.

— **discolor discolor** (L. PFEIFFER 1846).

1846 *Clausilia discolor* L. PFEIFFER, Symb. hist. Hel., 3: 93 Nr. 414.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *discolor*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 130.

1960 *Albinaria* (*Cerigana*) *discolor*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 428, Abb. 1520.

Insel Cerigo. Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN ex FORBES [Syntypus Orig. 1960 Abb. 1520 = SMF 68973]; Slg. ROSSMÄSSLER ex CUMING [SMF 68972/2].

— **discolor flammulata** (L. PFEIFFER 1850).

1850 *Clausilia flammulata* L. PFEIFFER, Proc. zool. Soc. London, 1849: 138.

1855 *Clausilia flammulata*, — ROTH, Malak. Bl., 2: 43.

1860 *Clausilia flammulata*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 236 Nr. 244.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *discolor* var. *flammulata*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 130.

Insel Aegina. Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN [? Syntypen SMF 68988/9]; ex ROTH [SMF 68989/3 Slg. ROSSMÄSSLER 1856, 230450/2 Slg. KÜSTER-Erlangen].

(*costulata* O. BOETTGER 1878, non LAMARCK nec WESTERLUND).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *discolor* var. *flammulata* f. *costulata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 131.

Insel Aegina. Slg. ROSSMÄSSLER ex ROTH 1856 [Lectotypus SMF 68990].

„Aus dem Archipel“ Slg. KINKELIN ex PARREYSS [Paratypus SMF 225561].

— **discolor inaequata** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *discolor* var. *inaequata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 130.

Attika: bei Kiaradia, am Weg nach dem Laurium. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 68982, Paratypen SMF 68983/3].

— **cytherae cytherae** (O. BOETTGER 1894). (Taf. 26 Fig. 12).

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *cytherae* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 26: 4.

Insel Cerigo: bei Kapsali. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER 1891 [Lectotypus SMF 66927, Paratypen SMF 66928/5].

— **cytherae cerigottana** (O. BOETTGER 1894). (Taf. 26 Fig. 13).

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *cerigottana* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 26: 9.

Insel Cerigotto. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER ex LEONIS 1891 [Lectotypus SMF 68047; Paratypen SMF 68048/80]; weitere Paratypen in Slg. C. BOETTGER [SMF 93520/18], Slg. KRÜPER [SMF 93519/68], Slg. MOELLENDORFF [SMF 68049/9], Slg. NAEGELE [SMF 68050/3], Slg. KOBELT [SMF 230786/4].

— **grayana** (L. PFEIFFER 1846).

(*gracilior* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *grayana* f. *gracilior* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 337.

Insel Servi (Elaphonisi). Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Lectotypus SMF 69214].

— **compressa** (L. PFEIFFER 1850).

(*calcareae* O. BOETTGER 1880 non 1878). (Taf. 26 Fig. 14).

1880 *Clausilia* (*Albinaria*) *compressa* var. *calcareae* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 12: 49.

Insel Cerigo. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE [Lectotypus SMF 66937, Paratypus SMF 66938].

— **compressa subcompressa** (O. BOETTGER 1894). (Taf. 26 Fig. 15).

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *compressa* var. *subcompressa* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 26: 5.

Insel Cerigo. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER 1891 [Lectotypus SMF 66939, Paratypen SMF 66940/6].

5) Gruppe der *profuga*.

— **profuga** (CHARPENTIER 1852).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *profuga*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 77.

1960 *Albinaria* (*Graeca*) *profuga*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 425, Abb. 1511.

NO-Morea: Argos. Slg. O. BOETTGER ex HELDREICH [Orig. 1960 Abb. 1511 = SMF 66693a/8].

(*bourguignati minor* CHARPENTIER 1852).

1852 (VIII) *Clausilia bourguignati* var. B. CHARPENTIER in BOURGUIGNAT, Test. nov. SAULCY Orient.: 21.

1952 (XII) *Clausilia bourguignati* β *minor* CHARPENTIER, J. de Conch., 3: 401.

1853 *Clausilia bourguignati* var. B, — BOURGUIGNAT, Cat. rais. Moll. SAULCY: 49.

1883 [*Clausilia profuga*], — O. BOETTGER, Ber. offenbach. Ver. Naturk., 22/23: 194.

„Angeblich von Sparta“. Slg. O. BOETTGER ex BOURGUIGNAT 1882 ex SAULCY [Syntypus SMF 66696].

(*collaris* WESTERLUND 1894).

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *profuga* var. *collaris* WESTERLUND, Nachr. Bl., 26: 174.

Myli gegenüber Nauplia. Slg. TH. KRÜPER [Originalserie SMF 93366/43].

— **thiesseae** (O. BOETTGER 1880).

1880 *Clausilia* (*Albinaria*) *thiesseae* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 12: 48.

Acarnania [Aetoliko]. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER [Lectotypus SMF 66691a; Paratypen SMF 66691b/6]. Bemerkung: Der Beizettel ist von O. BOETTGER 1891 mit der erweiterten Fundortangabe „Aetolika“ neugeschrieben worden.

6) Gruppe der *coerulea*.

— **coerulea** (ROSSMÄSSLER 1835).

1835 *Clausilia coerulea* FÉRUSAC' ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (2): 8, T. 7 F. 99.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea*, — O. BOETTGER, Novit. condh., 5: 87.

1960 *Albinaria* (*Albinaria*) *coerulea*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 426, Abb. 1513.

Insel Chios. Slg. ROSSMÄSSLER ex ZIEGLER [Holotypus verschollen].

Insel Chios: Berghang bei Kastro. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1960 Abb. 1513 = SMF 93307a].

(*antiparia* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *coerulea* var. *antiparia* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 41.

Insel Antiparos. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Orig. Serie SMF 67014/4].

(*birugosa* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* subsp. *birugosa* O. BOETTGER, Novit. condh., 5: 88.

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* „Typus von Santorin“, — O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 38.

Insel Santorin. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Lectotypus + Paratypen SMF 66913/1 + 4, 66916/4 Slg. KOBELT].

Bemerkung: Nach 1878 hat O. BOETTGER Santorin als „Orig. Fundort OLIVIERI und FÉRUSAC's“ bezeichnet und die genannte Serie auf einem neugeschriebenen Beizettel als „*caerulea* FÉR. typ.“ bezeichnet.

(*chia* O. BOETTGER 1889 non 1878).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* f. *chia* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 39.

Insel Chios. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE [Lectotypus SMF 67002; Paratypen: SMF 67003/5, 230895/2 ex O. BOETTGER 1888 ex OERTZEN in Slg. BOSCH ex H. ROLLE, 93626/4 Slg. C. BOETTGER 1904].

(*cretensis* L. PFEIFFER 1848).

(1848 *Clausilia cretensis* MÜHLEFELDT' L. PFEIFFER, Mon. Hel. viv., 2: 415 [non ROSSMÄSSLER 1836].)

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* var. *cretensis*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 331

Kreta. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [SMF 68066].

(*euboeica* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* typus [Form von Euböa (*euboeica* Mousson)]
O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 90.

Euböa. Slg. O. BOETTGER ex HELDREICH [Holotypus SMF 68064].

(*myconia* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *coerulea* var. *myconia* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk.
zool. bot. Ges. Wien, 42: 41.

Insel Mykonos. Slg. O. BOETTGER ex J. THIESSE 1880 [Orig. Serie SMF
67173/5, 93280/6].

(*samia* O. BOETTGER 1889 non 1878).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* f. *samia* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges.,
16: 39.

Östliches Samos: an einzelnen aufragenden Felsen dicht am Meere westlich
von der Ortschaft Tigani. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus SMF
67004; Paratypen: SMF 67005/3, 67006/3 Slg. MOELLENDORFF].

(*syrensis* WESTERLUND 1901).

(1848 *Clausilia caerulea* var. β *minor* L. PFEIFFER, Mon. Hel. viv., 2: 415.)

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *caerulea* var. *minor*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 88,
90.

1901 *Clausilia* (*Albinaria*) *caerulea* var. *syrensis* „(BTTG.)“ WESTERLUND, Mém. Acad.
imp. Sci. St. Pétersb., (8) 11 (11): 107.

Insel Syra. Slg. O. BOETTGER ex ERBER [SMF 67033/8]; Slg. ROSSMÄSSLER
[SMF 66905/5 ex ZELEBOR, 68069/1 ex ROTH, 66908/6 ex BOISSIER].

— ***coerulea amorgia*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *amorgia* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 91, T. 146 F. 5a-e.

Insel Amorgos. Slg. O. BOETTGER ex CLESSIN ex THIESSE [Lectotypus + Para-
typus SMF 58312/2; 93350-1/2+4, 93349/2 Slg. JETSCHIN ex CLESSIN-
O. BOETTGER 1879, dabei Orig. 1978 T. 146 F. 5!].

— ***coerulea maculata*** (ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia maculata* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 12, T. 18 F. 251.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *maculata*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 93.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *maculata maculata*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 151,
T. 11 F. 35.

Smyrna. Slg. ROSSMÄSSLER ex ZIEGLER [Holotypus Orig. Ic. 251 = SMF
66950]; — Slg. K. L. PFEIFFER-JETSCHIN [Orig. 1955 F. 35 = SMF 153238].

Ephesus. Slg. O. BOETTGER ex NEUMAYR [SMF 66951/11].

Kleinasiat. Küste (? Smyrna oder Ephesus). Slg. KOBELT [SMF 174664/2].

(*calcarea* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *maculata* var. *calcarea* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 93.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *maculata maculata* (var. *calcarea*), — K. L. PFEIFFER, Arch.
Moll., 84: 151, T. 11 F. 36.

Ephesus. Slg. O. BOETTGER ex NEUMAYR [Originalserie verschollen]. — Slg. K. L. PFEIFFER-JETSCHIN ex BLISS [Orig. 1955 F. 36 = SMF 153239].

— ***coerulea milleri*** (L. PFEIFFER 1850).

1850 *Clausilia milleri* L. PFEIFFER, Proc. zool. Soc. London, 1849: 136.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *milleri*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 86.

Insel Paros. Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN [Syntypen SMF 66982/2].

(*delosina* WESTERLUND 1892).

1961 *Albinaria coerulea milleri*, — JAECKEL & PLATE, Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden, 26 (1): 4, 5, Abb. 2.

Cycladen: Mikrodelos. Slg. JAECKEL [Orig. fig. SMF 199172/27].

— ***coerulea kreglingeri*** (L. PFEIFFER 1866).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *kreglingeri*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 93 [coll. MOUSSON ex PARREYSS].)

„Maura“ teste KRÜPER.

In Slg. KRÜPER liegen die folgenden Serien:

Naxos: Paratrecha [SMF 93296/34]; Naxos: Hagios Tolmi [SMF 93297/29];

Naxos: Makariaes [SMF 93301-3/9+15+44].

(*theobaldi* WESTERLUND 1898).

1898 *Clausilia* (*Albinaria*) *theobaldi* WESTERLUND, Annu. Mus. zool. Acad. imp. Sci. St. Pétersb., 1898: 171. [non BLANFORD 1872].

Insel Makedaes [= Makariaes] bei Naxos. Slg. JETSCHIN ex KRÜPER 1899 [Orig. Serie SMF 93380/5].

— ***coerulea altecostata*** (L. PFEIFFER 1866).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *altecostata*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 94.)

Originalserie der Slg. KRÜPER: Insel Strongylo bei Naxos [SMF 93338/66].

— ***coerulea freytagi*** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *freytagi* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 39, T. F. 2.

W-Samos: Mt. Kerki. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus SMF 66987; Paratypen SMF 66988/3, 66991, 66989/2 Slg. MOELLENDORFF]. — Marathocampos. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [SMF 66992/4].

— ***turrita turrita*** (L. PFEIFFER 1850).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *turrita*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 113.

Insel Milo. Slg. O. BOETTGER ex BLANC + SCHLÜTER [SMF 67039/4]; Slg. ROSSMÄSSLER ex PARREYSS 1860 (*rotundata* PARREYSS) [SMF 67035].

Insel Amorgo. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [SMF 67044/2].

— **turrita syphnia** (O. BOETTGER 1878). (Taf. 26 Fig. 17).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *turrita* var. *syphnia* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 114.

Insel Siphnos. Slg. O. BOETTGER ex BLANC + MOUSSON ex THIESSE [Lectotypus SMF 67046; Paratypen SMF 67047/2, 67048/1 Slg. MOELLENDORFF].

— **turrita eumeces** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *eumeces* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 47, T. F. 4.

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *eumeces*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 55, T. 200 F. 1238 [Kopie].

Cykladen: Insel Makronision. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus SMF 66974; Paratypen: SMF 66975/3, 93671/4 Slg. C. BOETTGER].

Cykladen: Insel Keos. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Paratypen SMF 66977/5, 66978/1 Slg. NAEGELE].

Cykladen: angeblich Siphanto (Siphenos). Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Paratypus SMF 66976].

— **brevicollis brevicollis** (L. PFEIFFER 1850).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *brevicollis*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 84.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis brevicollis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 111, T. 8 F. 1-2.

Rhodos [SMF 58292/6 Slg. O. BOETTGER ex SCHLÜTER, 58291/5 Slg. KOBELT ex LÖBBECKE]. — „Antiochia“. Slg. ROSSMÄSSLER ex STENTZ [SMF 58297].

Stadt Rhodos: Wallgraben am Hochmeisterpalast. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. F. 1-1a = SMF 153209/2]. — Wallgraben bei der Porta Nuova. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. F. 2 = SMF 153210].

(*e r e m i t a* CHARPENTIER 1852).

(1852 *Clausilia eremita* PARREYSS' CHARPENTIER, J. de Conch., 3: 377.)

[Rhodos] Slg. KOBELT ex PARREYSS [SMF 230838].

(*r h o d i a* POLLONERA 1916).

1916 *Clausilia* (*Albinaria*) *rhodia* POLLONERA, Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino, 31 (716): 8.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis* f. *rhodia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 115, T. 8 F. 3-4.

Rhodos. R. BRANDT 1959 ex coll. POLLONERA ex FESTA 1913 [Syntypen SMF 162840/3]. — Kastell von Arcangelo. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 3 = SMF 153211]. — Mte. Profeta, Kammweg von Quote 661 zum Gipfel. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 4-4a = SMF 153212/2].

— **brevicollis anaphiensis** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *anaphiensis* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 85, T. 146 F. 4a-e.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *anaphiensis*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 66, T. 202 F. 1255 [Kopie].

Cycladen: Insel Anaphi. Slg. O. BOETTGER ex THIESSE [Lectotypus SMF 67007; Paratypen SMF 67008/2].

— ***brevicollis astropalia*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *astropalia* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 330, T. 33 F. 5.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *astropalia*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 74, T. 203 F. 1266 [Kopie].

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis astropalia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 128, T. 9 F. 17.

Insel Astropalia [Stampalia]. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Lectotypus SMF 58311a, Paratypus SMF 58311b]. — Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL ex WETTSTEIN [Orig. 1955 F. 17 = SMF 153225].

— ***brevicollis casia*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *brevicollis* var. *casia* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 330.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis casia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 129, T. 9 F. 18-20.

Insel Caso. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Holotypus Orig. 1955 F. 18 = SMF 58305].

Insel Tria Nisia, östlichste der drei Inseln, sö. der Insel Sirina. Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL ex WETTSTEIN [Orig. 1955 F. 19 = SMF 153226].

Insel Scarpanto: Felsen am Strand des Hafenortes Pigadia. Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL ex WETTSTEIN [Orig. 1955 F. 20 = SMF 153227].

— ***brevicollis castellensis*** K. L. PFEIFFER 1955.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis castellensis* K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 125, T. 9 F. 14, 14a-15.

Insel Rhodos: Ruine „Castello“ an der W-Küste der Insel südlich von Kap Copria, 130 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Holotypus Orig. F. 14 = SMF 153221; Paratypen: Orig. F. 14a = SMF 153222, 93446/55]. — Mte. Monopetra, Castello von Monolito, 237 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Paratypen: Orig. F. 15 = SMF 153223, 93447/93].

— ***brevicollis chalcidensis*** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *brevicollis* var. *chalcidensis* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 38.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis chalcidensis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 127, T. 9 F. 16.

Insel Calchi, w. Rhodos. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus SMF 58307; Paratypen: SMF 58308/4, 58309/4 Slg. MOELLENDORFF, 58310/6 Slg. NAEGELE, 93464/5 Slg. O. BOETTGER]. — Kalkfelsen am Weg von Scala nach Coriò, ca. 100 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 16 = SMF 153224].

— ***brevicollis contraria*** FUCHS & KÄUFEL 1936.

1936 *Albinaria* (*Albinaria*) *coerulea contraria* FUCHS & KÄUFEL, Arch. Naturgesch., 5 (4): 578.

Insel Anaphi: Gipfel des Berges Kalamos. ex KÄUFEL [Paratypen: SMF 93358/13 Slg. K. L. PFEIFFER, 199158/2 Slg. JAECKEL, 230923/5 Slg. KALTENBACH].

— **brevicollis heracleensis** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *heracleensis* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 332, T. 33 F. 8.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *heracleensis*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 75, T. 203 F. 1270 [Kopie].

Kreta: bei Kandia (Stadt). Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Lectotypus Orig. fig. SMF 66941; Paratypus SMF 66942].

— **brevicollis karavica** FUCHS & KÄUFEL 1936.

1936 *Albinaria* (*Albinaria*) *karavica karavica* FUCHS & KÄUFEL, Arch. Naturgesch., 5 (4): 593.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis karavica*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 136, T. 11 F. 29.

Karavi Nisia, nördliche große Insel. KÄUFEL ex WETTSTEIN [Paratypen: SMF 153233 (Orig. 1955 F. 29), 64127/2, 93518/3].

— **brevicollis kosensis** K. L. PFEIFFER 1955.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *maculata kosensis* K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 150, T. 11 F. 37-38.

Insel Kos: Castello der Stadt, N-Seite der Wälle. Slg. K. L. PFEIFFER [Holotypus Orig. F. 37 = SMF 153240; Paratypen SMF 93507/65]. — S-Seite der Wälle. Slg. K. L. PFEIFFER [Paratypen SMF 93508/34; Orig. F. 38 = SMF 153241].

Budrun [Halikarnassos] a. d. Karischen Küste: Castello. Slg. K. L. PFEIFFER [Paratypen SMF 93510/53].

(? *sublaevigata* O. BOETTGER 1878). (Taf. 26 Fig. 19).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *brevicollis* var. *sublaevigata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 84.

1955 [*brevicollis* var. *sublaevigata* = *amorgia*], — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 125 Fußnote 5.

„Kleinasien“ Slg. ROSSMÄSSLER ex BOISSIER [Holotypus SMF 47233].

— **brevicollis koskinensis** (POLLONERA 1916). (Taf. 26 Fig. 18).

1916 *Clausilia* (*Albinaria*) *koskinensis* POLLONERA, Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino, 31 (716): 8.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis koskinensis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 122, T. 9 F. 11-13.

Koskino (Rodi). R. BRANDT ex coll. POLLONERA ex FESTA 1913 [Syntypen (das kleinere Exemplar Lectotypus!) SMF 162890/2]. Bemerkung: Die Art ist nach 2 Exemplaren beschrieben; die vorliegenden mit POLLONERA's Beizettel entsprechen den angegebenen Maßen.

Insel Rhodos: Kalkfelsen des Mte. Pezzula am Meer bei Terme di Calitea, ca. 50 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 11 = SMF 153218]. — Castello von Lindo, 110 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 12 = SMF 153219]. — Mte. Aspropetra, 200 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 13 = SMF 153220].

— ***brevicollis rechingeri*** PAGET 1971.

1971 *Albinaria* (*Bigibbosa*) *rechingeri* PAGET, Ann. naturh. Mus. Wien, 75: 465, [T. 2 F. 1-4].

Insel Rhodos: Lindos. ex O. PAGET [Paratypen SMF 244666/2].

— ***brevicollis sculpticollis*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *sculpticollis* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. Lond., 1883: 331, T. 33 F. 6.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *sculpticollis*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 75, T. 203 F. 1268 [Kopie].

1955 *Albinaria* (*Albinaria* ?) *sculpticollis sculpticollis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 138.

Sofrana Islands, north of East Crete. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. fig. SMF 58345].

— ***brevicollis sica*** FUCHS & KÄUFEL 1936.

1936 *Albinaria* (*Albinaria*) *karavica sica* FUCHS & KÄUFEL, Arch. Naturgesch., 5 (4): 594.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis sica*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 136, T. 11 F. 30.

Zafrana Nisia: Megali Zafrano. KÄUFEL ex WETTSTEIN 1935 [Paratypen: SMF 93517/3 + 153234 (Orig. 1955 F. 3) Slg. K. L. PFEIFFER, 64128/2 Slg. ZILCH, 199148 Slg. JAECKEL, 230829 Slg. KALTENBACH].

— ***brevicollis simiensis*** K. L. PFEIFFER 1955.

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis simiensis* K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 140, T. 11 F. 33-34.

Insel Simi. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Holotypus Orig. 1955 F. 33 = SMF 58295a; Paratypen SMF 58295b/4, 58294/7 Slg. MOELLENDORFF, 32242/2 Slg. EHRLMANN, 93425/3 Slg. K. L. PFEIFFER].

Insel Nimo: Felsen an der Landestelle. Slg. K. L. PFEIFFER [Paratypen SMF 93424/20, Orig. 1955 F. 34 = SMF 153237].

— ***brevicollis superba*** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *brevicollis* var. *superba* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 37

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis superba*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 117, T. 8 F. 5-8.

Rhodos: Umgebung von Kastelo. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. 1955 F. 5-„5a“ (ohne Nr. rechts neben 5!) = SMF 58299; Paratypen: SMF 58300/3, 58301/2 Slg. MOELLENDORFF]. — Mte. Profeta, Cima del Canto. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 6 = SMF 153213]. — Zw. Dorf und Ruine Castello. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 7 = SMF 153214].

Insel Alinnia: Felsen hinter den Hafenhäusern, 70 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 7 = SMF 153214].

(*atavirensis* POLLONERA 1916).

1916 *Clausilia (Albinaria) atavirensis* POLLONERA, Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino, **31** (716): 7.

1955 *Albinaria (Albinaria) brevicollis* f. *atavirensis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., **84**: 121, T. 9 F. 10.

Insel Rhodos: Mte. Attairo. R. BRANDT 1959 ex coll. POLLONERA ex FESTA 1913 [Syntypen SMF 162891/2]. — Oberhalb Dorf San Isidoro, ca. 575 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 10 = SMF 153217].

— ***brevicollis telensis*** K. L. PFEIFFER 1955.

1955 *Albinaria (Albinaria) brevicollis telensis* K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., **84**: 139, T. 11 F. 31-32.

Insel Piscopi: Felsen am Weg von der Landestelle der Livadia-Bucht im S der Insel nach Mikro Coriò, 50-150 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Holotypus Orig. F. 31 = SMF 153235; Parotypen SMF 93419/91]. — Matten am Gipfel des Mte. Amali oberh. von Mikro Coriò, ca. 300 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Parotypen SMF 93420/34; Orig. F. 32 = SMF 153236].

— ***brevicollis theodori*** K. L. PFEIFFER 1955.

1955 *Albinaria (Albinaria) brevicollis theodori* K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., **84**: 120, T. 8 F. 9.

Insel San Theodoro, zw. Alinnia und Calchi. Slg. K. L. PFEIFFER [Holotypus Orig. F. 9 = SMF 153216; Parotypen SMF 93423/14].

— ***brevicollis unia*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] sculpticollis* var. *unia* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. Lond., 1883: 331, T. 33 F. 7.

1898 *Clausilia (Albinaria) sculpticollis* var. *unia*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 75, T. 203 F. 1269 [Kopie].

1955 *Albinaria (Albinaria ?) sculpticollis unia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., **84**: 138.

Unia Islands, north of East Crete. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Lectotypus Orig. fig. SMF 58346a, Paratypus SMF 58246b].

— ***wettsteini*** FUCHS & KÄUFEL 1936.

1936 *Albinaria (Diadoma) wettsteini* FUCHS & KÄUFEL, Arch. Naturgesch., (NF) 5 (4): 600.

Ägäis: Insel Ophidusa, w. Stampalia. KÄUFEL ex WETTSTEIN [Parotypen: SMF 94113/10 Slg. K. L. PFEIFFER, 230113/1 Slg. KALTENBACH, 201507/6 Slg. JAECKEL ex KLEMM].

— ***rebeli*** A. J. WAGNER 1924.

1924 *Albinaria (Albinaria) rebeli* A. J. WAGNER, Ann. zool. Mus. polon. Hist. nat., 2 (2): 16.

Kreta: Schlucht bei Kavusi, Mirabell-Bucht. ex KÄUFEL ex STURANY [Syntypen: SMF 93377, 93378/5 Slg. K. L. PFEIFFER, 199173 Slg. JAECKEL, 230826/2 Slg. C. BOSCH, 230827/2 Slg. KALTENBACH].

— **forbesiana forbesiana** (L. PFEIFFER 1846).

(1977 *Albinaria forbesiana*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 107 (4/6): 295, Abb. 4.)

— **forbesiana bigibbosa** (CHARPENTIER 1847).

1847 *Clausilia bigibbosa* CHARPENTIER, Z. Malak., 4: 142.

1856 *Clausilia bigibbosa*, — ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 3 (3/4): 48, T. 72 F. 861.

1878 *Clausilia [Albinaria] bigibbosa*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 80.

1960 *Albinaria (Bigibbosa) bigibbosa*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 425-6, Abb. 1512.

Kleinasien: Karaman. ex CHARPENTIER [Syntypen: Orig. 1960 Abb. 1512 = SMF 3908/4 Slg. C. TH. MENKE, 4564/2 Slg. ROSSMÄSSLER]. — „Asia minor“ ex BOISSIER [SMF 230986/1 Slg. ROSSMÄSSLER]. — „Graecia“ Slg. ROSSMÄSSLER ex BOISSIER 1858 [SMF 230987/6, 66710/1].

Bemerkung: Es lagen ROSSMÄSSLER 1856 nur 3 Exemplare vor, die er von CHARPENTIER erhalten hatte [SMF 4564/2; das 3. Expl. = Orig. Ic. 861 ist verschollen!]. O. BOETTGER (1878) erwähnt „11 Originalexemplare aus Coll. ROSSMÄSSLER“, dabei hat er die erst 1858 von BOISSIER erhaltenen mitgezählt.

(*major* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] bigibbosa f. major* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 329.

Lycien: Arsa, valley near Xanthus. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus SMF 59828].

(*evanida* O. BOETTGER 1883). (Taf. 26 Fig. 20).

1883 *Clausilia [Albinaria] bigibbosa var. evanida* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 330.

Kleinasien. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus SMF 59827a].

Bemerkung: O. BOETTGER hat 1884 von CONÉMÉNOs ein zweites Exemplar von *Adalia* [SMF 59827b] erhalten und beide unter einem neuen Beizettel vereinigt. Beide Gehäuse sind an den Maßen zu unterscheiden.

— **forbesiana inauris** (O. BOETTGER 1896). (Taf. 26 Fig. 21).

1896 *Clausilia (Albinaria) brevicollis var. inauris* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 28: 126.

1955 [*brevicollis* var. *inauris* = *bigibbosa*], — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 124 Fußnote 5.

Kleinasien: Alaja, sö. *Adalia*. Slg. O. BOETTGER ex H. ROLLE 1894 [Lectotypus SMF 58302a, Paratypen SMF 58302b/5].

Sonderstellung

— **torticollis** (OLIVIER 1801).

1960 *Diadoma torticollis*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 428-9, Abb. 1525.

1977 *Albinaria torticollis*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 107 (4/6): 295, Abb. 5-6.

Insel Standia bei Kreta. ex MALTZAN 1883 [Orig. 1960 Abb. 1525 = SMF 66689a; Orig. 1977 Abb. 5-6 = SMF 245380a-b Slg. C. BOSCH ex H. ROLLE].

7) Gruppe der *munda*.

— ***munda*** (ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia munda* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 11, T. 18 F. 247.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *munda*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 115.

1955 *Albinaria* (*Cathariella*) *munda munda*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: [152], T. 11a F. 39.

1960 *Albinaria* (*Cathariella*) *munda*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 427, Abb. 1518.

Smyrna. Slg. ROSSMÄSSLER ex ZIEGLER [Holotypus Orig. Ic. 247 = 1960 Abb. 1518 = SMF 68659; Paratypus SMF 68660]. — Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1955 F. 39 = SMF 153242].

(*c o a* O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *munda* var. *coa* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 48.

1955 *Albinaria* (*Cathariella*) *munda coa*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 152, T. 11a F. 40.

S-Sporaden: Insel Kos. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus SMF 68664; Paratypen: SMF 68665/8, 68666/1 Slg. MOELLENDORFF, 153243/1 Slg. C. BOETTGER = Orig. 1955 F. 40].

— ***puella*** (L. PFEIFFER 1850).

(*c h i a* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *chia* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 116, T. 147 F. 2.

Insel Chios, auf der kleinasiatischen Seite. Slg. O. BOETTGER ex M. NEUMAYR [Lectotypus Orig. fig. SMF 68683, Paratypen SMF 68684/5].

(*s a m i a* O. BOETTGER 1878). (Taf. 27 Fig. 23).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *chia* var. *samia* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 117.

Insel Samos. Slg. O. BOETTGER ex CLESSIN ex THIESSE [Lectotypus SMF 68701, Paratypus SMF 68702].

— ***puella eudilica*** (O. BOETTGER 1889). (Taf. 27 Fig. 22).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *chia* var. *eudilica* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 48.

Insel Nikaria: Umgebung des Dorfes Evidilos in der Mitte der Nordküste. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus SMF 68697; Paratypen SMF 68698/2, 68699/8, 68700/2 Slg. MOELLENDORFF].

— ***puella submarginata*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *chia* subsp. *submarginata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 117, T. 148 F. 5.

„Kleinasien“ [Karien]. Slg. O. BOETTGER ex FITZ-GERALD [Lectotypus Orig. fig. SMF 68696].

— **unicolor** (O. BOETTGER 1878).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *unicolor* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 118, T. 147 F. 3a-e [coll. MOUSSON].)

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *unicolor*, — O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 50.

(1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *unicolor*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 80, T. 204 F. 1279 [Kopie].)

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis unicolor*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 130, T. 10 F. 21, 24-26.

Insel Karpathos [Scarpanto]. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Orig. 1955 F. 21 = SMF 58336/3]. — Mte. Mellura hinter Oto, 650 m. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. F. 24-26 = SMF 153228-30].

— **unicolor proteus** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *proteus* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 49, T. F. 5.

1894 *Clausilia* (*Albinaria*) *proteus*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 56, T. 200 F. 1239 [Kopie].

1955 *Albinaria* (*Albinaria*) *brevicollis unicolor*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 84: 130, T. 10 F. 22-23, 27-28.

Insel Karpathos [Scarpanto]. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. 1889 F. 5 = 1955 F. 22 = SMF 58340]. — Mte. Kalolymnis. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Paratypen SMF 58338/2]. — Mte. Lasto, von Volada bis Gipfel Calolimni, 500-1200 m. Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL ex WETTSTEIN [Orig. 1955 F. 27-28 = SMF 153231-2].

Insel Saria, n. Karpathos. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Paratypen SMF 58339/2 = Orig. 1955 F. 23].

— **cratatella** (KÜSTER 1861).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *cratatella*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 121.

N-Sporaden: Insel Skyro. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 68711/8]; Slg. KOBELT ex HELDREICH [SMF 68712/2].

— **cratatella cristulifera** (O. BOETTGER 1892). (Taf. 27 Fig. 24).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *cratatella* var. *cristulifera* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 24: 61.

N-Sporaden: Insel Giura. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER 1891 [Lectotypus SMF 69266, Paratypen SMF 69717/5].

8) Gruppe der *anatolica*.

— **anatolica** (ROTH 1839).

1839 *Clausilia anatolica* ROTH, Moll. spec. Orient. (Diss.): 21, T. 2 F. 5.

1842 *Clausilia anatolica*, — ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 2 (5): 4, T. 52 F. 693.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *anatolica*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 54.

1956 *Albinaria* (*Bigibbosa*) *anatolica*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 113, T. 8a F. 83.

Cacamo in Carien. Slg. ROSSMÄSSLER ex ROTH [Syntypen: SMF 66471 = Orig. Ic. 693 = 1956 F. 83, 66472 Slg. KOBELT].

(*apicalis* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *anatolica* var. *apicalis* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 326.

1956 *Albinaria* (*Bigibbosa*) *anatolica*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 113, T. 8a F. 84.

Kleinasien: Arsa, valley of Xanthus. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. fig. SMF 66481].

— **klemmi** PAGET 1971.

1971 *Albinaria* (*Bigibbosa*) *klemmi* PAGET, Ann. naturh. Mus. Wien, 75: 462, [T. 1 F. 1-5].

Insel Rhodos: Lindos, Hügel 2 km n. des Ortes. ex BRANDT ex O. PAGET 1959 [Paratypus SMF 163969]; — Lindos, kleine Grabnischen am Plateau oberhalb des alten Grabmals, Stadtnähe. ex W. KLEMM (65289) ex O. PAGET 1971 [Paratypen SMF 244664/4]; ex PAGET [SMF 244665/5].

Insel Rhodos: Pefki. ex O. PAGET 1963 [Paratypen SMF 174958/11].

— **alajana** (O. BOETTGER 1896). (Taf. 27 Fig. 25).

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *alajana* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 28: 124.

Kleinasien: Alaja, sö. Adalia. Slg. O. BOETTGER ex H. ROLLE 1894 [Lectotypus SMF 66714, Paratypen SMF 66715/2].

9) Gruppe der *teres*.

— **spratti** (L. PFEIFFER 1846).

1846 *Clausilia spratti* L. PFEIFFER, Symb. hist. Hel., 3: 94 Nr. 420.

(1852 *Clausilia spratti*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 73 Nr. 62, T. 8 F. 1-4.)

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *spratti*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 102.

(1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *spratti*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 69, T. 202 F. 1259 [Kopie].)

Kreta [Melopotamo Candiae]. ex CUMING [Syntypus SMF 66516]. — Mylopotamos. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [SMF 66577]. — Berg Ida. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [SMF 66518/2].

— **idaea idaea** (L. PFEIFFER 1850).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *idaea*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 326.

Kreta: Mt. Ida, on the plain of Neetha, 4000'. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [SMF 66482].

— **idaea venosa** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 27 Fig. 26).

1883 *Clausilia* (*Albinaria*) *venosa* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 15: 110.

Z-Kreta: Asomato am Ida, 4000-5000'. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Lectotypus SMF 68743]; 2500' [Paratypen SMF 68744/2 Slg. O. BOETTGER, 4995/3 Slg. KOBELT]; 1500 m [Paratypen SMF 5090/2 Slg. KOBELT].

Z-Kreta: Psiloriti (Ida). Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Paratypen SMF 68745/2].

(*centralis amputata* O. BOETTGER i. l.).

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres drakakisi* („f. *amputata* BTGR.“), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 55.

Kreta: Apodoulo am Ida, 3000' Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 (Orig. fig. SMF 64157).

— ***inflata inflata*** (OLIVIER 1801).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *corrugata* subsp. *inflata*, — O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 98, 100.

Kreta. Slg. O. BOETTGER ex BLANC. — Türkischer Friedhof in Candia [SMF 67205/2]; Hagioi Pantes, Candia [SMF 67210/3]; Mirabello bei Candia [SMF 67179/2]; Spinalunga bei Candia [SMF 67204/3].

Kreta. Slg. KOBELT ex HELDREICH [SMF 230611/2, 230612/1]; Slg. O. BOETTGER ex Mus. München [SMF 67191].

(*epimenides* O. BOETTGER 1878). (Taf. 27 Fig. 27).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *corrugata* subsp. *inflata* var. *epimenides* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 99, 101.

Kreta: Spinalunga bei Candia. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 68043, Paratypen SMF 68044/2].

(*tumens* BECK 1837).

1836 *Clausilia inflata* (ZIEGLER) ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 12, T. 18 F. 250.

1837 *Clausilia tumens* BECK, Index Moll.: 91 Nr. 29 [Indikation: ROSSM. 250].

1848 *Clausilia inflata* var. *minor* L. PFEIFFER, Mon. Hel. viv., 2: 417 Nr. 53ß.

1852 *Clausilia corrugata* β. *minor* CHARPENTIER, J. de Conch., 3: 376 [part. ohne Synonymie].

„Sicilien“. Slg. ROSSMÄSSLER [ex ZIEGLER] [Holotypus Orig. Ic. 250 = SMF 67174]. Bemerkung: Der einzige erhaltene Beizettel ist von BECK geschrieben. Ein zweites Exemplar ist wesentlich mehr keulenförmig. Beide Stücke sind von O. BOETTGER (1878: 98) erwähnt.

Caramania. Slg. C. TH. MENKE ex CHARPENTIER ex BOISSIER [SMF 66954/3].

— ***inflata draparnaldi*** (BECK 1837).

(1805 *Clausilia corrugata* DRAPARNAUD, Hist. nat. Moll. Fr.: 70 [ohne Synonymie], T. 4 F. 11-12 [non BRUGIÈRE 1792].

(1837 *Clausilia draparnaldi* BECK, Index Moll.: 91 Nr. 34 [Indikation: *Cl. corrugata* DRAP. IV. 11, 12].)

1839 *Clausilia corrugata*, — ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 2 (3/4): 15, T. 48 F. 615.

1848 *Clausilia draparnaldi*, — L. PFEIFFER, Mon. Hel. viv., 2: 433 Nr. 93 (Coll. ROSSM.).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *corrugata* DRAP. ! typus, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 98, 99.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *corrugata* subsp. *draparnaldi*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 98, 99.

1960 *Albinaria* (*Corrugata*) *corrugata*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 426, Abb. 1515.

„Auf den griechischen Inseln“ Slg. ROSSMÄSSLER ex Mus. Berlin [Orig. Ic. 615 = SMF 66953/4].

Kreta. Slg. ROSSMÄSSLER [SMF 68020/2].

Kreta. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Orig. 1960 Abb. 1515 = SMF 66955/2].

(*almyrosana* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *corrugata* var. *almyrosana* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 98, 99.

Kreta: Delisso bei Candia. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Syntypen SMF 67356/3].

(*homalorhappe* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *corrugata* var. *homalorhappe* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 98, 100 [non *homalorhappe* L. PFEIFFER 1850].

Zentr. Kreta: Mt. Jouktas. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 67345, Paratypen SMF 67346/5].

Kreta. Slg. O. BOETTGER ex KOBELT [Paratypus SMF 67350].

— ***inilata doerfleri*** A. J. WAGNER 1924.

1924 *Albinaria* (*Albinaria*) *dörfleri* A. J. WAGNER, Ann. zool. Mus. polon. Hist. nat., 2 (2): 21.

Zentr. S-Kreta: Berg Kophina des Messara Gebirges (1250 m). Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL (DÖRFLER leg.) [Syntypen SMF 93515/6].

— ***moreletiana*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *moreletiana* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 96, T. 146 F. 6a-e.

1960 *Albinaria* (*Mirabellina*) *moreletiana*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 426, Abb. 1514.

NO-Kreta: Insel Spinalunga, Bai von Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Lectotypus Orig. fig. SMF 66943, Paratypen SMF 66944/2].

— ***terebra*** (L. PFEIFFER 1853).

(1853 *Clausilia terebra* L. PFEIFFER, Z. malak., 10 (10): 151.)

(1860 *Clausilia terebra*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 216 Nr. 217, T. 24 F. 5-7.)

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *terebra*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 104.)

1977 *Albinaria terebra*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 107 (4/6): 297, Abb. 9.

Kreta: Kalo Limniones [= Kali Limenes]. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Orig. 1977 Abb. 9 = SMF 68740/1].

Bemerkung: der Holotypus (Unikum) der Slg. L. PFEIFFER-DOHRN dürfte im Mus. Stettin vernichtet sein.

— ***retusa*** (OLIVIER 1801).

1848 *Clausilia retusa*, — L. PFEIFFER, Mon. Hel. viv., 2: 418 Nr. 56.

1860 *Clausilia retusa*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 219 Nr. 221, T. 24 F. 14-17.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *retusa*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 110.

1977 *Albinaria retusa*, — H. NORDSIECK, Arch. Moll., 107 (4/6): 297, Abb. 10.

Insel Dia bei Kreta. Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN [Orig. 1977 Abb. 10 = SMF 68742/1 + Spitze]. Das abgebildete Exemplar ist ohne Zweifel das gleiche, das KÜSTER 1860 aus PFEIFFER's Slg. gezeichnet hat.

— **teres teres** (OLIVIER 1801).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *teres*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 111.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres teres*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 88, T. 5 F. 41-42.

Kreta [Insel Standia]. Slg. ROSSMÄSSLER ex CUMING [SMF 60088/2]; Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN + SPRATT [SMF 60089/3]. — Insel Standia bei Kreta. Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL [Orig. 1956 F. 41-42 = SMF 155081/2].

— **teres phalanga** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *teres* f. *phalanga* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 335.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres extensa* (*phalanga*), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 89, T. 5 F. 44.

„The north-east of Crete (SPRATT), without distinct indication of locality“ [Original-Beizettel: Kap Sidero]. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Lectotypus Orig. 1956 F. 44 = SMF 60107a, Paratypen SMF 60107b/2].

— **teres nordsiecki** n. nom.

(*insularis* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *teres* var. *insularis* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 335 [non HEUDE 1882].

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres vermiculata* (*insularis*), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 51.

Insel Kophino, ö. Kreta. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Lectotypus Orig. 1956 F. 51 = SMF 60114].

(*hierapetrana* O. BOETTGER i. l.).

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres extensa* („var. *hierapetrana* BTTGR.“), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 89, T. 5 F. 48.

Kreta: Hierapetra. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. fig. SMF 60092/2].

(*orientalis* WESTERLUND 1884).

1884 *Clausilia* [*Albinaria*, *Teres*] *teres* var. *orientalis* BTTG., WESTERLUND, Fauna, IV: 131 [non O. BOETTGER 1883].

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres extensa* („var. *orientalis* BTTGR.“), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 89, T. 5 F. 46.

Kreta: As-tu-Vai, Kap Sidero. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [SMF 60096/2].

Kreta: Landzunge vor Kap Sidero. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1877 [„Typus“ Orig. 1956 F. 46 = SMF 60097a+b/2].

(*subcostata* WESTERLUND 1901).

1901 *Clausilia* [*Albinaria*, *Teres*] *teres* var. *subcostata* (BTG.), WESTERLUND, Mém. Acad. imp. Sci. St. Pétersb., (8) 11 (11): 114 [non O. BOETTGER 1879].

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres extensa* („var. *subcostata* BTG.“), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 89, T. 5 F. 47

Kreta: Hierapetra — Kalochorio. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. 1956 F. 47 = SMF 60099/2]; — Sitia—Tourloti. ibid. [SMF 60100/1]; — Tourloti—Hierapetra. ibid. [SMF 60101/2]; — Vor Kalochori. ibid. [SMF 60102/2].

— ***teres extensa*** (L. PFEIFFER 1864).

non 1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *extensa*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 103, T. 146 F. 7 [= *drakakisi* MALTZAN 1884].

(*vesti* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *vesti* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 334, T. 34 F. 11.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres extensa* (*vesti*), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 89, T. 5 F. 43.

NO-Kreta: Sitia-Bai. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. 1956 F. 43 = SMF 60115].

(*vesti suturalis* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *vesti* var. *suturalis* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 335 [non KÜSTER 1861].

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres extensa* (f. *suturalis*), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 89, T. 5 F. 45.

NO-Kreta: Halbinsel Sitia. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. 1956 F. 45 = SMF 60139].

— — ***teres vermiculata*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *vermiculata* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 333, T. 33 F. 10.

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *vermiculata*, — O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 45.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres vermiculata*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 5 F. 49.

O-Kreta: beim Dorfe Kato-Zakro. Slg. O. BOETTGER ex „SPRATT, v. OERTZEN 1887“ [Orig. 1956 F. 49 = SMF 60140a+b/5]. — Am Eingang einer Höhle bei Karouba. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [SMF 60141/5].

Bemerkung: Der von O. BOETTGER 1883 abgebildete Holotypus, ein dekolliertes Gehäuse, fehlt.

(*megalostoma* O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia* [*Albinaria*] *vermiculata* var. *megalostoma* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 45.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres vermiculata* (*megalostoma*), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 50.

NO-Kreta: am Dorf Mangasa, ö. Sitia. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. 1956 F. 50 = SMF 60145a; Paratypen: SMF 60145b/3 + 60146, 60147/4 Slg. NAEGELE].

O-Kreta: am Wege von Sitia nach Apano-Zakro. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Paratypen SMF 60143/6, 60148/2 Slg. NAEGELE].

— **teres distans** (L. PFEIFFER 1864).

(1864 *Clausilia distans* L. PFEIFFER, Proc. zool. Soc. London, 1864: 605.)

S-Kreta: Sudsuro Bay. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [aus der Originalserie SMF 69001/2].

— **teres manselli** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *manselli* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 332, T. 33 F. 9.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *manselli*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 76, T. 204 F. 1271 [Kopie].

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres manselli*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 93, T. 7 F. 60.

Kavallos Inseln, ö. Kreta. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Lectotypus Orig. fig. SMF 64310; Paratypus SMF 93571 Slg. C. BOETTGER].

— **teres** (?) **dragonarana** LOOSJES 1955.

1955 *Albinaria* [*Teres*] *vermiculata dragonarana* LOOSJES, S.-B. österr. Akad. Wiss., math. nat. Kl., (I) 164 (10): 875.

NO-Kreta (Dionysiades-Inseln): Insel Dragonara. LOOSJES 1963 ex WETTSTEIN 1942 [Paratypen SMF 168959/2].

— **teres** (?) **janisadana** LOOSJES 1955.

1955 *Albinaria* [*Teres*] *vermiculata janisadana* LOOSJES, S.-B. österr. Akad. Wiss., math. nat. Kl., (I) 164 (10): 875.

NO-Kreta (Dionysiades-Inseln): Insel Janisada. LOOSJES 1963 ex RECHINGER 1942 [Paratypen SMF 168960/2].

— **olivieri olivieri** (ROTH 1839).

1839 *Clausilia olivieri* ROTH, Moll. spec. Orient. (Diss.): 21.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *olivieri*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 112.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *olivieri*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 78, T. 204 F. 1276.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres olivieri*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 96, T. 7 F. 66-69.

1960 *Albinaria* (*Teres*) *olivieri*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 426-7, Abb. 1517.

Ephesus. Slg. ROSSMÄSSLER ex ERDL-ROTH [Syntypus SMF 66959]. — „Griechischer Archipel“ Slg. ROSSMÄSSLER ex ERDL-ROTH [Syntypen SMF 66962/2]. — Rhodos. Slg. ROSSMÄSSLER ex BOISSIER 1858 [SMF 66961/5]. — „Antiochia“ Slg. ROSSMÄSSLER ex STENTZ [SMF 66960/3].

Insel Rhodos: Wallgraben am Hochmeisterpalast, Stadt Rhodos. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1956 F. 66 (= 1960 Abb. 1517)-68 = SMF 155077/3]; Kasematten im großen Festungsgraben. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1956 F. 69 = SMF 155078].

— **olivieri carpathia** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] carpathia* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 335, T. 34 F. 12.

1896 *Clausilia (Albinaria) carpathia*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 77, T. 204 F. 1274 [Kopie].

1956 *Albinaria (Teres) teres carpathia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 100, T. 7 F. 70.

Insel Scarpanto. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Lectotypus Orig. 1956 F. 70 = SMF 58317].

— **olivieri famosa** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia [Albinaria] carpathia* var. *famosa* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 44.

1956 *Albinaria (Teres) teres famosa*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 102, T. 8 F. 71-74.

S-Sporaden: Insel Kasos. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. 1956 F. 71 = SMF 58323; Paratypen: SMF 58324/3, 58326/3 Slg. MOELLENDORFF, 58325/2 Slg. NAEGELE]. — Halden bei Ofri. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1956 F. 72 = SMF 155079]; Bergschlucht bei Ofri. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1956 F. 73 = SMF 155187].

Insel Scarpanto: Halden bei Finichi. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1956 F. 74 = SMF 155188].

(*armathia* O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia [Albinaria] carpathia* var. *armathia* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 44.

1956 *Albinaria (Teres) teres armathia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 108, T. 8 F. 76-79.

S-Sporaden: Insel Armathia. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. 1956 F. 76 = SMF 58379; Paratypen: SMF 58320/3, 58321/1 Slg. KOBELT, 58322/2 Slg. MOELLENDORFF]. — Strandhang. Slg. K. L. PFEIFFER [Orig. 1956 F. 77-79 = SMF 155080/3].

— **olivieri oertzeni** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia [Albinaria] oertzeni* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 42, T. F. 3.

1956 *Albinaria (Teres) teres oertzeni*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 107, T. 8 F. 75.

Insel Kasos. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. fig. SMF 58328a; Paratypen: SMF 58328b/2; 58329, 58330/3 Slg. NAEGELE, 93583/6 Slg. C. BOETTGER].

— **olivieri camura** (O. BOETTGER 1889).

1889 *Clausilia [Albinaria] oertzeni* var. *camura* O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 42.

1956 *Albinaria (Teres) teres armathia*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 108, T. 8 F. 80.

Insel Armathia. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [Lectotypus Orig. fig. SMF 58331; Paratypen: SMF 58332/3, 58333/2 Slg. KOBELT, 58334/4 Slg. MOELLENDORFF].

— ***olivieri privigna*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] privigna* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 336, T. 34 F. 13.

1896 *Clausilia (Albinaria) privigna*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 78, T. 204 F. 1275 [Kopie].

1956 *Albinaria privigna*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 110, T. 8 F. 81.

Zafrano-Inseln. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. fig. SMF 58344].

— ***praeclara praeclara*** (L. PFEIFFER 1853).

1853 *Clausilia praeclara* L. PFEIFFER, Z. Malak., 10: 150.

(1860 *Clausilia praeclara*, — KÜSTER, M. CH., I. 14: 211 Nr. 210, T. 23 F. 12-15.)

1878 *Clausilia [Albinaria] praeclara*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 109.

1896 *Clausilia (Albinaria) praeclara*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 71, T. 202 F. 1261.

1956 *Albinaria (Teres) teres praeclara*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 94, T. 7 F. 63.

Kreta: Hinter Phournés, Bai von Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN [Syntypus („eines der beiden Originalexemplare“) Orig. 1956 F. 63 = SMF 64129].

Kreta: Spinalonga. Slg. KOBELT ex MALTZAN 1883 [Orig. Ic. 1261 = SMF 64131/4].

(*major* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] praeclara* var. *major* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 333.

1956 *Albinaria (Teres) teres praeclara*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 94, T. 7 F. 64.

SO-Kreta. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. fig. SMF 64132].

— ***praeclara rudis*** (L. PFEIFFER 1864).

(*clara* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia [Albinaria] clara* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 108, T. 147 F. 1a-e.

1896 *Clausilia (Albinaria) clara*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 70, T. 202 F. 1260 [Kopie].

1956 *Albinaria (Teres) teres clara*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 93, T. 7 F. 61.

NO-Kreta: Baja de Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus Orig. fig. SMF 64300a; Paratypus SMF 64300b].

(*multicosta* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] clara* var. *multicosta* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 333.

1956 *Albinaria (Teres) teres rudis (multicosta)*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 91, T. 6 F. 58.

NO-Kreta: Bai von Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Orig. 1956 F. 58 = SMF 64304].

SO-Kreta: Hierapetra. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [SMF 64305/2].

Bemerkung: Die Originalserie [Mirabello, N. E. of Crete (SPRATT)] fehlt in Slg. O. BOETTGER.

(*paucicosta* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *clara* var. *paucicosta* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 333.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres clara*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 93, T. 7 F. 62.

Kreta: Insel St. Nikolo, Bai von Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. fig. SMF 64306].

— ***praeclara drakakisi*** (MALTZAN 1884).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *extensa*, — O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 103, T. 146 F. 7a-e [non L. PFEIFFER 1864].

1884 *Clausilia drakakisi* MALTZAN, Nachr. Bl., 16: 75 [auf O. BOETTGER 1878 gegründet!].

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *extensa*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 68, T. 202 F. 1258 [Kopie, non L. PFEIFFER 1846].

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres drakakisi*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 52.

Kreta: Bai von Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Holotypus Orig. fig. SMF 64141a, Paratypus SMF 64141b].

(*tenerrima* O. BOETTGER i. l.).

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres drakakisi* („var. *tenerrima* BTTR.“), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 56.

SO-Kreta: Hierapetra. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. fig. SMF 64149/2].

— ***praeclara parallelifera*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *extensa* var. *parallelifera* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 103.

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres drakakisi*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 53.

Kreta: Spinalonga. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Lectotypus Orig. 1956 F. 53 = SMF 64148a, Paratypus SMF 64148b].

(*centralis* O. BOETTGER i. l.).

1956 *Albinaria* (*Teres*) *teres drakakisi* („var. *centralis* BTTR.“), — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 90, T. 6 F. 54 [non *centralis* WESTERLUND 1892].

Kreta: Gortyna. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. fig. SMF 64153].

— ***maltzani*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* (*Albinaria*) *maltzani* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 15: 111.

1956 *Albinaria* (*Corrugata*) *maltzani*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 92 Fußnote 1, T. 6 F. 59.

O-Kreta: Phournés, Prov. Mirabella. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Lectotypus Orig. 1956 F. 59 = SMF 64135, Paratypen SMF 64136/2].

— **lerosiensis** (L. PFEIFFER 1841).

(1821 [*Helix* (*Cochlodina*)] *lerosiensis* FÉRUSAC, Prodr.: 62 Nr. 515 [nom. nud.].)

(1841 *Clausilia* (*Cochlodina*) *lerosiensis* L. PFEIFFER, Symb. hist. Hel., 1: 47 Nr. 65 [Mus. Paris].)

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *lerosiensis*, — O. BOETTGER, Novit. Conch., 5: 107.

1956 *Albinaria* (*Interstriata*) *lerosiensis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 111, T. 8a F. 82.

1960 *Albinaria* (*Interstriata*) *lerosiensis*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 426-7, Abb. 1516.

Insel Kos. Slg. O. BOETTGER ex L. PFEIFFER-DOHRN (PFEIFFER'sche Original-exemplare) [SMF 68720/8, a = Orig. 1956 F. 82 = 1960 Abb. 1516].

Halicarnassus. Slg. O. BOETTGER ex A. ISSEL ex TARNIER [SMF 68728/2].

— **fuchskaeufeli** H. NORDSIECK 1977.

1936 *Albinaria* (*Diadoma*) *weneri* FUCHS & KÄUFEL, Arch. Naturgesch., (NF) 5 (4): 599 [non STURANY 1902].

1977 *Albinaria fuchskaeufeli* H. NORDSIECK, Arch. Moll., 107 (4/6): 297 [n. nom.].

Insel Kinaros, nö. Amorgo. Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL ex WERNER [Paratypus SMF 94115].

10) Gruppe der *cretensis*.

— **cretensis cretensis** (ROSSMÄSSLER 1836).

1836 *Clausilia cretensis* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 1 (4): 11, T. 18 F. 245.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *cretensis*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 64, T. 145 F. 4a-e.

Kreta. Slg. ROSSMÄSSLER [Holotypus Orig. fig. SMF 4475].

— **cretensis byzantina** (CHARPENTIER 1852).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *byzantina*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 55, 57.

1960 *Albinaria* (*Cretica*) *byzantina*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 424-5, Abb. 1508.

Kreta. Slg. ROSSMÄSSLER ex PARREYSS [SMF 66435-6/2+1]. — Kalépa bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Orig. 1960 Abb. 1508 = SMF 66437a/4].

(*adspersa* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *byzantina* var. *adspersa* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 56, T. 145 F. 1a-b.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *byzantina* [var. *adspersa*], — KOBELT, Icon., (2) 7: 59, T. 201 F. 1245 [Kopie].

Kreta: Umgebung von Rettimo. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 66467, Paratypen SMF 66468/3].

(*convexior* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *byzantina* var. *adpersa* f. *convexior* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 56, 59.

Kreta. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Lectotypus SMF 66469 (von Rettimo), Paratypus SMF 66470 (ohne näheren Fundort)].

(*solidula* L. PFEIFFER 1856).

1856 *Clausilia solidula* L. PFEIFFER, Malak. Bl., 2: 182.

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *byzantina* var. *solidula*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 56, 58.

Kreta. Slg. ROSSMÄSSLER [Syntypen: SMF 66450/2 ex L. PFEIFFER 1856; SMF 66453/3 ex A. SCHMIDT 1856].

Kreta: Apokorona bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 66474/2].
— Paleokastron bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex MARTENS [SMF 66463/1].

— ***cretensis grabusana*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 27 Fig. 28).

1883 *Clausilia* (*Albinaria*) *grabusana* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 15: 107.

W-Kreta: Kap Grabusa. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Lectotypus SMF 66523; Paratypen SMF 66524, 66525/3 Slg. MOELLENDORFF, 66526/3 Slg. KOBELT, 93223 Slg. JETSCHIN].

(*humillima* O. BOETTGER 1883). (Taf. 27 Fig. 29).

1883 *Clausilia* (*Albinaria*) *grabusana* var. *humillima* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 15: 108.

W-Kreta: Kap Grabusa. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Lectotypus SMF 66527; Paratypen: SMF 66528, 66529/3 Slg. MOELLENDORFF].

— ***cretensis sphakiota*** (MALTZAN 1887).

1887 *Clausilia cretensis* var. *sphakiota* MALTZAN, Jb., 14: 119.

Kreta: Nipro-Schlucht, Sphakia. ex MALTZAN [Syntypen: SMF 66513/4 Slg. O. BOETTGER 1885, 66515/2, 66514/7 Slg. MOELLENDORFF].

(*porphyrostoma* A. J. WAGNER 1924).

1924 *Albinaria* (*Albinaria*) *cretensis porphyrostoma* A. J. WAGNER, Ann. zool. Mus. polon. Hist. nat., 2 (2): 15.

Zentr. Kreta: Schlucht Askiphu am O-Hang des Leuka Ore Gebirges. Slg. K. L. PFEIFFER ex KÄUFEL ex DÖRFLER [Syntypen: SMF 93237/3].

— ***cretensis omalica*** (WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *tenuicostata* var. *omalica* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 40.

Kreta: Omalo, 4000'. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. Serie SMF 66554/3].

— ***cretensis strigata*** (L. PFEIFFER 1850).

1878 *Clausilia [Albinaria] strigata*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 62.

1883 *Clausilia [Albinaria] strigata*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 326.

Kreta: Ampelousa bei Rettimo. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 66400/3].

— Tsikalaria bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 66401].

Kreta: Mylopotamo, n. des Ida. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [SMF 66407].

— Omalo-Ebene, 3500'. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [SMF 66406].

(*orientalis* O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] strigata* var. *orientalis* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 327 [non L. PFEIFFER 1842].

1956 *Albinaria (Cretica) strigata orientalis*, — K. L. PFEIFFER, Arch. Moll., 85: 95, T. 7 F. 65.

Insel Scarpanto. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Lectotypus Orig. 1956 F. 65 = SMF 60190a, Paratypen SMF 60190b/2].

(*acuticosta* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia (Albinaria) strigata* var. *acuticosta* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 40.

Kreta: Asomato am Ida, 12-1500'. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. Serie SMF 66414/3]; ibid., 2500' Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN [Orig. Serie SMF 66415/1] u. a.

(*centralis* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia (Albinaria) strigata* var. *centralis* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 39.

Kreta: Asomato am Ida, 4-5000'. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. Serie SMF 66430/2] u. a.

— ***cretensis subvirginea*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 27 Fig. 30).

1883 *Clausilia [Albinaria] subvirginea* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc., 1883: 327 [non T. 33 F. 1!].

Kreta [without exact indication of habitat]. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus SMF 66484].

Bemerkung: Das vorliegende Gehäuse stimmt genau mit den angegebenen Maßen überein. Der Beizettel von O. BOETTGER lautet „1. *subvirginea* n. sp. Crete *SPRATT“ [Die vorgesetzte „1“ entspricht, wie auf entsprechenden Beizetteln, der Fig. 1]. Der später mit feinerer Schrift hinzugefügte Fundort „Sphakia“ ist offenbar unter dem Eindruck der MALTZAN'schen Funde erfolgt, die O. BOETTGER als var. *farcimen* bezeichnet hat [Beschreibung durch WESTERLUND 1884]; ein solches Exemplar hat O. BOETTGER 1885 z. B. an seinen Tauschpartner JETSCHIN als „*subvirginea*“ abgegeben. Die Abbildung 1883 T. 33 F. 1 stellt ein wesentlich bauchigeres Gehäuse dar und beruht offenbar auf einer Verwechslung.

— ***cretensis tenuicostata*** (L. PFEIFFER 1864).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *tenuicostata*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 328.

SW-Kreta: Tripiti. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [SMF 66530/2].

(*mitis* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *tenuicostata* var. *mitis* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 40.

W-Kreta: Enneakhorion. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. Serie SMF 66558/3].

— ***cretensis strictecostata*** (O. BOETTGER 1878).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *strictecostata* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 66, T. 145 F. 6 [coll. FITZ-GERALD].)

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *tenuicostata* var. *strictecostata*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 329.

(1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *strictecostata*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 61, T. 201 F. 1249 [Kopie].)

Kreta: Sphakia. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [SMF 66538/2].

— ***cretensis troglodytes*** (A. SCHMIDT 1868).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *troglodytes*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 65, T. 145 F. 5.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *troglodytes*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 61, T. 201 F. 1248 [Kopie].

Kreta: Gortin bei Rettimo. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 66491/2, 66492/1 Slg. KOBELT].

— ***cretensis vexans*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 27 Fig. 31).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *troglodytes* var. *vexans* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 327.

S-Kreta: Roumili bei Tarrha. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Lectotypus SMF 66493].

(*interpres* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *troglodytes* var. *interpres* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 40.

Kreta: Anapolis, Sphakia, 1500-2000'. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. Serie SMF 66496/2].

— ***cretensis virginea*** (L. PFEIFFER 1846).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *virginea*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 63.

Kreta. Slg. ROSSMÄSSLER ex CUMING 1857 [SMF 231022/1]. Bemerkung: Das zweite erwähnte Exemplar ist verschollen. — Slg. O. BOETTGER ex H. DOHRN [SMF 231023/2].

(*leucoderma* WESTERLUND 1892).

1892 *Clausilia* (*Albinaria*) *virginea* var. *leucoderma* (BOETTGER) WESTERLUND, Verh. kk. zool. bot. Ges. Wien, 42: 40.

W-Zentr. Kreta: Preveli-Schlucht. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Orig. Serie SMF 231025/2].

— ***eburnea eburnea*** (L. PFEIFFER 1854).

(1854 *Clausilia eburnea* L. PFEIFFER, Proc. zool. Soc. London, 1854: 296.)

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *eburnea*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 336.

Kreta: White Mountains, 6000' Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [SMF 66949/2].

— ***eburnea glabella*** (L. PFEIFFER 1864).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *glabella*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 159.)

(1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *glabella*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 326.)

1889 *Clausilia* (*Albinaria*) *glabella*, — O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 34.

Kreta: 1/4 Stunde unterhalb der Omalo-Ebene am Weg nach Kanea. Slg. O. BOETTGER ex OERTZEN 1887 [SMF 66563/6, 66567/4 f. *minor*].

(*deglupta* O. BOETTGER 1878).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *deglupta* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 61, T. 145 F. 3 [coll. L. PFEIFFER].)

(*semialba* O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *deglupta* var. *semialba* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 61, T. 145 F. 2.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *deglupta*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 60, T. 201 F. 1247 [Kopie].

„angeblich von Creta“ Slg. O. BOETTGER [Holotypus Orig. fig. SMF 66573; ? Paratypen SMF 66574/2].

Bemerkung: Der Beizettel von O. BOETTGER lautet: „*glabella* P. var. *deglupta* BTG. = **deglupta* m. Candia“; er ist mit Sicherheit eine Zweitausfertigung, die seiner Auffassung von 1883 entspricht. Für die Herkunft der 3 Exemplare ist kein Anhaltspunkt gegeben.

(*pura* O. BOETTGER 1878).

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *pura* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 60, T. 148 F. 1 [coll. MOUSSON].)

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *glabella* var. *pura*, — O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 326.

(1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *pura*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 59, T. 201 F. 1246 [Kopie].)

Kreta: Apokorona, White Mountains. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [SMF 66568/4].

(*spratti* O. BOETTGER 1883). (Taf. 28 Fig. 32).

1883 *Clausilia [Albinaria] glabella* var. *spratti* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 326 [non L. PFEIFFER 1846].

Kreta [without exact indication of locality]. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT 1883 [Holotypus SMF 66575].

— ***sublamellosa sublamellosa*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia [Albinaria] sublamellosa* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 327, T. 33 F. 2.

1889 *Clausilia [Albinaria] sublamellosa*, — O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 35.

1896 *Clausilia (Albinaria) sublamellosa*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 73, T. 203 F. 1264 [Kopie].

W-Kreta: Sphakia. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Originalserie verschollen]. — Sphakia, bei Anapolis, 1500-2000'. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN [SMF 66501/2].

— ***sublamellosa obliterata*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 28 Fig. 33).

1883 *Clausilia sublamellosa* var. *obliterata* O. BOETTGER, Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 15: 107.

1889 *Clausilia [Albinaria] sublamellosa* var. *obliterata*, — O. BOETTGER, Abh. senckenb. naturf. Ges., 16: 35.

Kreta: Agia Roumili (Sphakia). Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Holotypus „Unicum“ SMF 66503].

— ***sublamellosa heteroptyx*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 28 Fig. 34).

1883 *Clausilia [Albinaria] tenuicostata* var. *heteroptyx* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 328.

1883 *Clausilia (Albinaria) heteroptyx*, — O. BOETTGER, Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 15: 106.

Kreta: Aghia Roumili bei Tarrha, Sphakia. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus SMF 66521]. — Gorge de Samaria (Sphakia). Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [SMF 66522].

11) Gruppe der *candida*.

— ***candida candida*** (L. PFEIFFER 1850).

1878 *Clausilia [Albinaria] candida*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 70.

Kreta: Tsikalaria. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 66307/3].

— ***candida homalorhapse*** (L. PFEIFFER 1850).

(*striata* L. PFEIFFER 1850 non SPIX 1827).

1878 *Clausilia [Albinaria] striata*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 71, T. 148 F. 3, 4.

1896 *Clausilia (Albinaria) striata*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 64, T. 201 F. 1552 [Kopie].

1960 *Albinaria (Striata) striata*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 425, Abb. 1509.

Kreta. Slg. KOBELT ex RAULIN 1845 [SMF 66258/3]. — Babali bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [SMF 66255/2]. — Sphakia bei Canea. Slg. KOBELT ex O. BOETTGER (BLANC) [SMF 66305]. — Palaeokastron bei Canea. ex MARTENS ex BLANC [SMF 66257/1 Slg. O. BOETTGER = Orig. 1960 Abb. 1509 = ? 1878 T. 148 F. 4; SMF 66256/1 Slg. KOBELT ex O. BOETTGER = ? Orig. 1878 T. 148 F. 3].

— ***amalthea amalthea*** (WESTERLUND 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *amalthea*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 67.

Kreta. Slg. O. BOETTGER ex PARREYSS [SMF 66315/2].

— ***amalthea bipalatalis*** (MARTENS 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *bipalatalis* MARTENS in O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 69, T. 145 F. 9, T. 148 F. 2.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *bipalatalis*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 63, T. 201 F. 1251 [Kopie].

Kreta: Monti di Suda bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Syntypen SMF 66266/2, 66267/2 Slg. KOBELT]. — Dorf Tsikalaria bei Canea. Slg. O. BOETTGER ex MARTENS (BLANC) [Syntypen SMF 66265/3]. — Mte. Ega. Slg. O. BOETTGER ex BLANC [Syntypus SMF 66268 = ? Orig. 1878 T. 148 F. 2].

— ***xanthostoma*** (O. BOETTGER 1883). (Taf. 28 Fig. 35).

1883 *Clausilia* (*Albinaria*) *xanthostoma* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 15: 108.

W-Kreta: bei Gonia, südl. von Cap Spada. Slg. O. BOETTGER ex MALTZAN 1883 [Lectotypus SMF 66705; Paratypen SMF 66706/2, 4682/3 Slg. KOBELT].

— ***hippolyti hippolyti*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *hippolyti* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 73, T. 146 F. 2.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *hippolyti*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 65, T. 202 F. 1253 [Kopie].

1960 *Albinaria* (*Egana*) *hippolyti*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 425, Abb. 1510.

Kreta: Monte Ega bei Kandia. Slg. O. BOETTGER ex BLANC 1878 [Lectotypus Orig. 1960 Abb. 1510 = SMF 66698; Paratypen: SMF 66699, 66700 Slg. KOBELT].

— ***hippolyti arthuriana*** (O. BOETTGER 1878).

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *arthuriana* O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 72, T. 146 F. 1.

1896 *Clausilia* (*Albinaria*) *arthuriana*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 65, T. 202 F. 1254 [Kopie].

No-Kreta: [Halb-] Insel Spinalunga in der Baia di Mirabello. Slg. O. BOETTGER ex BLANC (ISSEL) [Lectotypus SMF 66285, Paratypus SMF 66286].

— ***hippolyti aphrodite*** (O. BOETTGER 1883).

1883 *Clausilia* [*Albinaria*] *aphrodite* O. BOETTGER, Proc. zool. Soc. London, 1883: 329, T. 33 F. 3.

1896 *Clausilia (Albinaria) aphrodite*, — KOBELT, Icon., (2) 7: 73, T. 203 F. 1265 [Kopie].

Kreta: Pass over Tyliisso near Megalokastron. Slg. O. BOETTGER ex SPRATT [Holotypus Orig. fig. SMF 66293].

— **hippolyti holtzi** (STURANY 1904).

1904 *Clausilia (Albinaria) holtzi* STURANY, Anz. kais. Akad. Wiss. Wien, math. nat. Kl., 10: (4).

1904 *Clausilia (Albinaria) holtzi* STURANY, Nachr. Bl., 36: 110.

Kreta: Assitaes bei Candia. Slg. O. BOETTGER ex STURANY 1904 ex HOLTZ [Syntypus SMF 66314/1].

— **leonisorum** (O. BOETTGER 1901). (Taf. 28 Fig. 36).

1901 *Clausilia (Albinaria) leonisorum* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 33: 127.

Kreta: Russo Xylo beim Dorfe Mallaes. Slg. O. BOETTGER ex KRÜPER 1900 ex LEONIS [Lectotypus SMF 66708, Paratypen SMF 66709/3].

12) Gruppe der *virgo*.

— **ungeri** (ZELEBOR 1865).

1865 *Clausilia ungeri* ZELEBOR in ZELEBOR & KOTSCHY, Insel Cypern: 593.

1878 *Clausilia [Albinaria] ungeri*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 120.

Cypern. Slg. O. BOETTGER ex ZELEBOR [Syntypen SMF 68671/2].

— **virgo** (MOUSSON 1854).

1854 *Clausilia virgo* MOUSSON, Mitth. naturf. Ges. Zürich, 3: 387, T. 1 F. 10.

1878 *Clausilia [Albinaria] virgo*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 119, T. 148 F. 6.

Cypern. Slg. O. BOETTGER ex MOUSSON ex BELLARDI [Syntypus SMF 68676].

— **rollei** (O. BOETTGER 1896). (Taf. 28 Fig. 37).

1896 *Clausilia (Albinaria) rollei* O. BOETTGER, Nachr. Bl., 28: 126.

Cypern: Gebirge Pentadactylo. Slg. O. BOETTGER ex H. ROLLE 1894 [Holotypus SMF 68667, Paratypus SMF 68668].

13) Gruppe der *saxatilis*.

— **mavromoustakisi** BRANDT 1961.

1961 *Albinaria (Interstriata) mavromoustakisi* BRANDT, Arch. Moll., 90: 14, T. 1 F. 9.

Cypern: Isolierte Felsen südl. der Straße bei Basileios, vor den westlichsten Ausläufern des Pentadaktylos-Gebirges. R. BRANDT 1959 [Holotypus Orig. fig. SMF 163953, Paratypen SMF 163045/4].

— **saxatilis** (L. PFEIFFER 1846).

1856 *Clausilia saxatilis*, — ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 3 (3/4): 75, T. 80 F. 893.

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *saxatilis*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 106.)

Insel Cypern. Slg. ROSSMÄSSLER ex PARREYSS [Orig. Ic. 893 = SMF 68747/3].

— **avia** (CHARPENTIER 1852).

(1852 *Clausilia avia* CHARPENTIER, J. de Conch., 3: 376 Nr. 104.)

1856 *Clausilia avia* ROSSMÄSSLER, Icon., (1) 3 (3/4): 76, T. 80 F. 894 [als *avula* in Erklärung].

1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *avia*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 105.

Insel Cypern. Slg. ROSSMÄSSLER ex PARREYSS [Lectotypus von *Cl. avia* ROSSMÄSSLER, Orig. Ic. 894 = SMF 230512, Paratypen SMF 230513/2]. — Slg. O. BOETTGER ex PARREYSS [SMF 68741].

Bemerkung: Von ROSSMÄSSLER ohne Kenntnis der Arbeit CHARPENTIER 1852, die er nicht zitiert, nach den 3 vorliegenden Exemplaren beschrieben; von O. BOETTGER 1878 in Slg. ROSSMÄSSLER nicht gefunden.

14) Gruppe der *hedenborgi*.

— **hedenborgi** (L. PFEIFFER 1850).

(1849 *Clausilia hedenborgi* L. PFEIFFER, Proc. zool. Soc. London, 1849: 138.)

(1866 *Clausilia filumna* L. PFEIFFER, Malak. Bl., 13: 151.)

(1878 *Clausilia* [*Albinaria*] *filumna*, — O. BOETTGER, Novit. conch., 5: 52.)

1960 *Albinaria* (*Filumna*) *filumna*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 3): 424-5, Abb. 1507.

Libanon. Slg. ROSSMÄSSLER ex ? PARREYSS [SMF 66242-3/3+2].

Libanon: Bécharré. Slg. C. BOSCH 1931! [Orig. 1960 Abb. 1507 = SMF 67316a].

(*maronitica* WESTERLUND 1901). (Taf. 28 Fig. 38).

1901 *Clausilia* [*Albinaria*] *filumna* var. *maronitica*, NAEGELE^e WESTERLUND, Mém. Acad. imp. Sci. St. Pétersb., (8) 11 (11): 97.

Libanon: Tal Kozhaine, Maroniten-Kloster, 1500 m. Slg. NAEGELE ex P. DOUPOUX 1893 [Originalserie: SMF 66248, 66249/4, 66250/6 Slg. O. BOETTGER, 66251/6 Slg. MOELLENDORFF, 93251/4 Slg. KRÜPER, 93252/2 Slg. JETTSCHIN].

(*tanourinnensis* GERMAIN 1921).

(1921 *Clausilia* (*Albinaria*) *filumna* var. *tanourinnensis*, PALLARY^e GERMAIN, Moll. terr. fluv. Syrie, 1: 352, T. 15 F. 5-6.)

Libanon: Forêt de Cèdres à Tanourinne. Slg. O. BOETTGER ex PALLARY 1910 [SMF 66247/3].

Schriften


Auf ein ausführliches Schriftenverzeichnis wurde bei dieser Gruppe verzichtet, zumal alle erwähnten Taxa mit genauen Hinweisen versehen sind. Ich verweise auf die beiden Arbeiten von H. NORDSIECK (1974, 1977), die bereits die wichtigste Literatur nennen.

- NORDSIECK, H. (1974): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XV. Neue Clausilien der Balkan-Halbinsel. — Arch. Moll., 104: 123-170.
- — — (1977): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XVII. Taxonomische Revision des Genus *Albinaria* VEST. — Arch. Moll., 107 (4/6): 285-307.

Erklärungen zu Tafel 25.

Phot. Senckenberg-Museum (E. HAUPT); Vergr. Gehäuse 3/1, Nacken 5/1.

- Fig. 1. *Albinaria hians achaica* (O. BOETTGER).
Achaia: Santamari [Lectotypus SMF 68943].
- Fig. 2. *Albinaria hians macrodera* (O. BOETTGER).
Achaia: Brostovitsa [Lectotypus SMF 68783].
- Fig. 3. *Albinaria voithii agesilaos* (MARTENS).
Taygetosgebirge: Sparta [Lectotypus von *agamemnon* O. BOETTGER, SMF 69202].
- Fig. 4. *Albinaria voithii semicostulata* (O. BOETTGER).
Taygetosgebirge [Lectotypus SMF 69180a].
- Fig. 5. *Albinaria krueperi holostoma* (O. BOETTGER).
Morea: Kap Katakolo, Elis [Lectotypus SMF 68918].
- Fig. 6. *Albinaria grisea thiesseana* (O. BOETTGER).
N-Morea: Patras [Lectotypus SMF 68897].
- Fig. 7. *Albinaria grisea immensa* (O. BOETTGER).
Morea: Parnon-Gebirge in S-Arkadien [Lectotypus SMF 68899].
- Fig. 8. *Albinaria schuchii olympica* H. NORDSIECK.
Elis: Zeustempel zu Olympia [Lectotypus von *oertzeni* O. BOETTGER 1889: 52 non 42, SMF 68837].
- Fig. 9. *Albinaria arcadica hydriota* (O. BOETTGER).
Peloponnes: Insel Hydra [Lectotypus SMF 69153].
- Fig. 10. *Albinaria messenica messenica* (MARTENS).
Messenien: Kloster Demiobas [Lectotypus von *brenskei* O. BOETTGER, SMF 68947].




A. ZILCH: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 57:
Mollusca: Clausiliidae (4).

Erklärungen zu Tafel 26.

Phot. Senckenberg-Museum (E. HAUPT); Vergr. Gehäuse 3/1, Nacken 5/1.

- Fig. 11. *Albinaria messenica messenica* (MARTENS).
Lakonien: Kyparissias [Lectotypus von *laconica* O. BOETTGER, SMF 68941].
- Fig. 12. *Albinaria cytherae cytherae* (O. BOETTGER).
Insel Cerigo: bei Kapsali [Lectotypus SMF 66927].
- Fig. 13. *Albinaria cytherae cerigottana* (O. BOETTGER).
Insel Cerigotto [Lectotypus SMF 68047].
- Fig. 14. *Albinaria compressa compressa* (L. PFEIFFER).
Insel Cerigo [Lectotypus von *calcareo* O. BOETTGER 1880 non 1878, SMF 69937].
- Fig. 15. *Albinaria compressa subcompressa* (O. BOETTGER).
Insel Cerigo [Lectotypus SMF 66939].
- Fig. 16. *Albinaria thiesseae* (O. BOETTGER).
Acarnania [Lectotypus SMF 66691a].
- Fig. 17. *Albinaria turrita syphnia* (O. BOETTGER).
Insel Siphnos [Lectotypus SMF 67046].
- Fig. 18. *Albinaria brevicollis koskinensis* (POLLONERA).
Koskino (Rodi) [Lectotypus SMF 162890a].
- Fig. 19. *Albinaria brevicollis* ? *kosensis* K. L. PFEIFFER.
Kleinasien [Holotypus von *sublaevigata* O. BOETTGER, SMF 47233].
- Fig. 20. *Albinaria forbesiana bigibbosa* (CHARPENTIER).
Kleinasien [Holotypus von *evanida* O. BOETTGER, SMF 59827a].
- Fig. 21. *Albinaria forbesiana inauris* (O. BOETTGER).
Alaja, sö. Adalia [Lectotypus SMF 58302a].




A. ZILCH: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 57:
Mollusca: Clausiliidae (4).

Erklärungen zu Tafel 27.

Phot. Senckenberg-Museum (E. HAUPT); Vergr. Gehäuse 3/1, Nacken 5/1.

- Fig. 22. *Albinaria puella eudilica* (O. BOETTGER).
Insel Nikaria [Lectotypus SMF 68697].
- Fig. 23. *Albinaria puella puella* (L. PFEIFFER).
Insel Samos [Lectotypus von *samia* O. BOETTGER, SMF 68701].
- Fig. 24. *Albinaria cristatella cristulifera* (O. BOETTGER).
Insel Giura [Lectotypus SMF 69266].
- Fig. 25. *Albinaria alajana* (O. BOETTGER).
Alaja, sö. Adalia [Lectotypus SMF 66714].
- Fig. 26. *Albinaria idaea venosa* (O. BOETTGER).
Z-Kreta: Asomato am Ida [Lectotypus SMF 68743].
- Fig. 27. *Albinaria inflata* (OLIVIER).
Kreta: Spinalunga bei Candia [Lectotypus von *epimenides* O. BOETTGER, SMF 68043].
- Fig. 28-29. *Albinaria cretensis grabusana* (O. BOETTGER).
28) W-Kreta: Kap Grabusa [Lectotypus SMF 66523].
29) W-Kreta: Kap Grabusa [Lectotypus von *humillima* O. BOETTGER, SMF 66527].
- Fig. 30. *Albinaria cretensis subvirginea* (O. BOETTGER).
Kreta [Holotypus SMF 66484].
- Fig. 31. *Albinaria cretensis vexans* (O. BOETTGER).
S-Kreta: Roumili bei Tarrha [Lectotypus SMF 66493].



A. ZILCH: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 57:
Mollusca: Clausiliidae (4).

Erklärungen zu Tafel 28.

Phot. Senckenberg-Museum (E. HAUPT); Vergr. Gehäuse 3/1, Nacken 5/1.

Fig. 32. *Albinaria eburnea glabella* (L. PFEIFFER).

Kreta [Holotypus von *spratti* O. BOETTGER 1883 non L. PFEIFFER 1846, SMF 66575].

Fig. 33. *Albinaria sublamellosa obliterated* (O. BOETTGER).

Kreta: Agia Roumili (Sphakia) [Holotypus SMF 66503].

Fig. 34. *Albinaria sublamellosa heteroptyx* (O. BOETTGER).

Kreta: Agia Roumili bei Tarrha, Sphakia [Holotypus SMF 66521].

Fig. 35. *Albinaria xanthostoma* (O. BOETTGER).

W-Kreta: bei Gonia, südl. Cap Spada [Lectotypus SMF 66705].

Fig. 36. *Albinaria leonisorum* (O. BOETTGER).


Kreta: Russo Xylo beim Dorfe Mallaes [Lectotypus SMF 66708].

Fig. 37. *Albinaria rollei* (O. BOETTGER).

Cypern: Gebirge Pentadactylo [Holotypus SMF 68667].

Fig. 38. *Albinaria hedenborgi* (L. PFEIFFER).

Libanon: Tal Kozhaine, Maroniten-Kloster [Original NAEGELE's von *maronitica* WESTERLUND, SMF 66248].



A. ZILCH: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 57:
Mollusca: Clausiliidae (4).

Namenverzeichnis der erwähnten Taxa.

<i>achaica</i> O. BOETTGER	311	<i>clara</i> O. BOETTGER	340, 341
<i>acuticosta</i> WESTERLUND	344	<i>coa</i> O. BOETTGER	331
<i>adspersa</i> O. BOETTGER	342	<i>coerulea</i> ROSSMÄSSLER	322
<i>aetolica</i> WESTERLUND	317	<i>collaris</i> WESTERLUND	321
<i>agamemnon</i> O. BOETTGER	312	<i>compressa</i> L. PFEIFFER	321
<i>agesilaos(us)</i> MARTENS	312	<i>conemenosi</i> O. BOETTGER	310
<i>alajana</i> O. BOETTGER	333	<i>contaminata</i> ROSSMÄSSLER	315
<i>almyrosana</i> O. BOETTGER	335	<i>contraria</i> FUCHS & KÄUFEL	326
<i>altecostata</i> L. PFEIFFER	324	<i>convexior</i> O. BOETTGER	343
<i>amalthea</i> WESTERLUND	348	<i>corcyrensis</i> MOUSSON	314
<i>amorgia</i> O. BOETTGER	323	<i>corrugata</i> DRAPARNAUD	334
<i>amputata</i> O. BOETTGER	334	<i>costulata</i> O. BOETTGER	320
<i>anaphiensis</i> O. BOETTGER	325	<i>cretensis</i> L. PFEIFFER	322
<i>anatolica</i> ROTH	332, 333	<i>cretensis</i> ROSSMÄSSLER	342
<i>antiparia</i> WESTERLUND	322	<i>cristatella</i> KÜSTER	332
<i>aphrodite</i> O. BOETTGER	348	<i>cristulifera</i> O. BOETTGER	332
<i>apicalis</i> O. BOETTGER	333	<i>cytherae</i> O. BOETTGER	320
<i>arcadica</i> O. BOETTGER	318		
<i>argynnis</i> WESTERLUND	320	<i>deglupta</i> O. BOETTGER	346
<i>armathia</i> O. BOETTGER	339	<i>delosina</i> WESTERLUND	324
<i>artaensis</i> O. BOETTGER	316	<i>discolor</i> L. PFEIFFER	320
<i>arthuriana</i> O. BOETTGER	348	<i>dissipata</i> O. BOETTGER	316
<i>astropalia</i> O. BOETTGER	326	<i>distans</i> L. PFEIFFER	338
<i>atavirens</i> POLLONERA	329	<i>doersleri</i> A. J. WAGNER	335
<i>avia</i> CHARPENTIER	350	<i>dorica</i> O. BOETTGER	319
<i>avia</i> ROSSMÄSSLER	350	<i>dragonarana</i> LOOSJES	338
<i>avula</i> = <i>avia</i>	350	<i>drakakisi</i> MALTZAN	341
		<i>draparnaldi</i> BECK	334
<i>bigibbosa</i> CHARPENTIER	330		
<i>bipalatalis</i> MARTENS	348	<i>eburnea</i> L. PFEIFFER	346
<i>birugosa</i> O. BOETTGER	322	<i>epimenides</i> O. BOETTGER	334
<i>brenskei</i> O. BOETTGER	319	<i>epirotos</i> H. NORDSIECK	310
<i>brevicollis</i> L. PFEIFFER	325	<i>epirotica</i> MOUSSON	313
<i>broemmeri</i> O. BOETTGER	311	<i>eremita</i> CHARPENTIER	325
<i>byzantina</i> CHARPENTIER	342	<i>euboeica</i> O. BOETTGER	323
		<i>eudilica</i> O. BOETTGER	331
<i>calcarea</i> O. BOETTGER		<i>eumeces</i> O. BOETTGER	325
<i>compressa</i> —	321	<i>evanida</i> O. BOETTGER	330
<i>maculata</i> —	323	<i>extensa</i> L. PFEIFFER	337, 341
<i>camura</i> O. BOETTGER	339		
<i>candida</i> L. PFEIFFER	347	<i>famosa</i> O. BOETTGER	339
<i>carpathia</i> O. BOETTGER	339	<i>farcimen</i> WESTERLUND	344
<i>casia</i> O. BOETTGER	326	<i>flumina</i> L. PFEIFFER	350
<i>castellensis</i> K. L. PFEIFFER	326	<i>flammulata</i> L. PFEIFFER	320
<i>castrensis</i> MOUSSON	314	<i>flavescens</i> O. BOETTGER	312
<i>cathara</i> WESTERLUND	319	<i>forbesiana</i> L. PFEIFFER	330
<i>centralis</i> O. BOETTGER	341	<i>freytagi</i> O. BOETTGER	324
<i>centralis</i> WESTERLUND	344	<i>fuchskaeußeli</i> H. NORDSIECK	342
<i>cerigottana</i> O. BOETTGER	321	<i>fuscostrigata</i> O. BOETTGER	315
<i>chalcidensis</i> O. BOETTGER	326		
<i>chia</i> O. BOETTGER	331	<i>gerolimena</i> H. NORDSIECK	312
<i>coerulea</i> —	322	<i>glabella</i> L. PFEIFFER	346

<i>glabricollis</i> L. PFEIFFER	310	<i>macrodera</i> O. BOETTGER	311
<i>goldfussi</i> O. BOETTGER	319	<i>maculata</i> ROSSMÄSSLER	323
<i>grabusana</i> O. BOETTGER	343	<i>maculosa</i> DESHAYES	317
<i>gracilior</i> O. BOETTGER	321	<i>major</i> O. BOETTGER	
<i>grayana</i> L. PFEIFFER	321	<i>bigibbosa</i> —	330
<i>grisea</i> DESHAYES	317	<i>castrensis</i> —	314
		<i>contaminata</i> —	315
<i>hedenborgi</i> L. PFEIFFER	350	<i>corcyrensis</i> —	314
<i>heracleensis</i> O. BOETTGER	327	<i>praeclara</i> —	340
<i>heterochroa</i> WESTERLUND	317	<i>maltzani</i> O. BOETTGER	341
<i>heteroptyx</i> O. BOETTGER	347	<i>manselli</i> O. BOETTGER	338
<i>hians</i> O. BOETTGER	310	<i>maronitica</i> WESTERLUND	350
<i>hierapetrana</i> O. BOETTGER	336	<i>mavromoustakisi</i> BRANDT	349
<i>hippolyti</i> O. BOETTGER	348	<i>media</i> O. BOETTGER	314
<i>holostoma</i> O. BOETTGER	316	<i>megalostoma</i> O. BOETTGER	337
<i>holtzi</i> STURANY	349	<i>menelaos(us)</i> MARTENS	312
<i>homalorhapse</i> O. BOETTGER	347	<i>messenica</i> MARTENS	319
<i>homalorhapse</i> L. PFEIFFER	335	<i>milleri</i> L. PFEIFFER	324
<i>humillima</i> O. BOETTGER	343	<i>minor</i> O. BOETTGER	314
<i>hydriota</i> O. BOETTGER	318	<i>minor</i> CHARPENTIER	
		<i>bourguignati</i> —	321
<i>idaea</i> L. PFEIFFER	333	<i>corrugata</i> —	334
<i>immensa</i> O. BOETTGER	317	<i>minor</i> MARTENS	312
<i>inaequata</i> O. BOETTGER	320	<i>minor</i> L. PFEIFFER	
<i>inauris</i> O. BOETTGER	330	<i>caerulea</i> —	323
<i>incommoda</i> O. BOETTGER	315	<i>inflata</i> —	334
<i>inconstans</i> MOUSSON	314	<i>mitis</i> WESTERLUND	345
<i>incrustedata</i> O. BOETTGER	319	<i>modesta</i> CHARPENTIER	313
<i>inflata</i> OLIVIER	334	<i>modesta</i> ROSSMÄSSLER	313
<i>inflata</i> ROSSMÄSSLER	334	<i>moreletiana</i> O. BOETTGER	335
<i>insularis</i> O. BOETTGER	336	<i>multicosta</i> O. BOETTGER	340
<i>interjecta</i> KÄUFEL	316	<i>munda</i> ROSSMÄSSLER	331
<i>interpicta</i> O. BOETTGER	313	<i>muraria</i> A. SCHMIDT	316
<i>interpres</i> WESTERLUND	345	<i>myconia</i> WESTERLUND	323
		<i>naevosa</i> L. PFEIFFER	313
<i>janisadana</i> LOOSJES	338	<i>naevosa</i> — ROTH non L. PFEIFFER	313
<i>jonica</i> L. PFEIFFER	311	<i>nordsiecki</i> n. nom.	336
<i>karavica</i> FUCHS & KÄUFEL	327	<i>obliterata</i> O. BOETTGER	347
<i>klemmi</i> PAGET	333	<i>odysseus</i> O. BOETTGER	315
<i>kosensis</i> K. L. PFEIFFER	327	<i>oertzeni</i> O. BOETTGER	339
<i>koskinensis</i> POLLONERA	327	<i>schuchi</i> —	318
<i>kreglinger</i> L. PFEIFFER	324	<i>olivieri</i> ROTH	338
<i>krueperi</i> L. PFEIFFER	316	<i>olympica</i> H. NORDSIECK	318
		<i>omalica</i> WESTERLUND	343
<i>laconica</i> O. BOETTGER	319	<i>orientalis</i> O. BOETTGER	344
<i>lactea</i> ROSSMÄSSLER	315	<i>orientalis</i> WESTERLUND	336
<i>leonisorum</i> O. BOETTGER	349	<i>oscarii</i> O. BOETTGER	318
<i>lerosiensis</i> L. PFEIFFER	342	<i>othona</i> WESTERLUND	314
<i>leucadia</i> WESTERLUND	313		
<i>leucoderma</i> WESTERLUND	346	<i>parallelifera</i> O. BOETTGER	341
<i>liebetruti</i> CHARPENTIER	318	<i>paucicosta</i> O. BOETTGER	341

<i>perlactea</i> H. NORDSIECK	310	<i>sublaevigata</i> O. BOETTGER	327
<i>phalanga</i> O. BOETTGER	336	<i>sublamellosa</i> O. BOETTGER	347
<i>porphyrostoma</i> A. J. WAGNER	343	<i>submarginata</i> O. BOETTGER	331
<i>praeclara</i> L. PFEIFFER	340	<i>superba</i> O. BOETTGER	328
<i>privigna</i> O. BOETTGER	340	<i>suturalis</i> O. BOETTGER	337
<i>profuga</i> CHARPENTIER	321	<i>subvirginea</i> O. BOETTGER	344
<i>proteus</i> O. BOETTGER	332	<i>syphnia</i> O. BOETTGER	325
<i>puella</i> L. PFEIFFER	331	<i>syrensis</i> WESTERLUND	323
<i>pumilio</i> KÄUFEL	316		
<i>pura</i> O. BOETTGER	346	<i>tanourinnensis</i> GERMAIN	350
		<i>telensis</i> K. L. PFEIFFER	329
<i>rebeli</i> A. J. WAGNER	329	<i>tenerrima</i> O. BOETTGER	341
<i>rechingeri</i> PAGET	328	<i>tenuicostata</i> L. PFEIFFER	345
<i>retusa</i> OLIVIER	335	<i>terebra</i> L. PFEIFFER	335
<i>rhodia</i> POLLONERA	325	<i>teres</i> OLIVIER	336
<i>rollei</i> O. BOETTGER	349	<i>theobaldi</i> WESTERLUND	324
<i>rotundata</i> PARREYSS	324	<i>theodori</i> K. L. PFEIFFER	329
<i>rudis</i> L. PFEIFFER	340	<i>thiesseae</i> O. BOETTGER	322
		<i>thiesseana</i> O. BOETTGER	317
<i>samia</i> O. BOETTGER		<i>torticollis</i> OLIVIER	330
<i>chia</i> —	331	<i>transiens</i> O. BOETTGER	313
<i>coerulea</i> —	323	<i>trogodytes</i> A. SCHMIDT	345
<i>saxatilis</i> L. PFEIFFER	350	<i>tumens</i> BECK	334
<i>schuchii</i> ROSSMÄSSLER	318	<i>turrita</i> L. PFEIFFER	324
<i>scopulosa</i> CHARPENTIER	309	<i>ungeri</i> ZELEBOR	349
<i>sculpticollis</i> O. BOETTGER	328	<i>unia</i> O. BOETTGER	329
<i>semialba</i> O. BOETTGER	346	<i>unicolor</i> O. BOETTGER	332
<i>semicostulata</i> O. BOETTGER	312		
<i>senilis</i> ROSSMÄSSLER	312, 314	<i>venosa</i> O. BOETTGER	333
<i>sica</i> FUCHS & KÄUFEL	328	<i>vermiculata</i> O. BOETTGER	337
<i>simiensis</i> K. L. PFEIFFER	328	<i>vesti</i> O. BOETTGER	337
<i>solidula</i> L. PFEIFFER	343	<i>vexans</i> O. BOETTGER	345
<i>soluta</i> MOUSSON	315	<i>violascens</i> WESTERLUND	311
<i>sphakiota</i> MALTZAN	343	<i>virginea</i> L. PFEIFFER	345
<i>spratti</i> O. BOETTGER	347	<i>virgo</i> MOUSSON	349
<i>spratti</i> L. PFEIFFER	333	<i>voithii</i> ROSSMÄSSLER	311
<i>striata</i> L. PFEIFFER	347		
<i>strictecostata</i> O. BOETTGER	345	<i>werneri</i> FUCHS & KÄUFEL	342
<i>strigata</i> L. PFEIFFER	344	<i>wettsteini</i> FUCHS & KÄUFEL	329
<i>subcompressa</i> O. BOETTGER	321	<i>winneguthi</i> A. J. WAGNER	310
<i>subcostata</i> WESTERLUND	337		
<i>sublactea</i> O. BOETTGER	310	<i>xanthostoma</i> O. BOETTGER	348

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [107](#)

Autor(en)/Author(s): Zilch Adolf Michael

Artikel/Article: [Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 5 71\): Mollusca: Clausiliidae \(4\): Alopinae \(2\): Alopini \(1\). 309-363](#)