

Zur Kenntnis der quartären und rezenten Mollusken von Bessarabien und Galatz.

Von

Jar. Petrbok, Prag, National Museum.

A. Quartäre Faunen:

I. Reni:

In der altquartären Terrasse fand ich

1. *Emmericia* aff. *schulzeriana* (BRUSINA) (deren Bestimmung danke ich dem Herrn Dr. W. Wenz). Diese Art kommt hier nicht selten vor und hat schön ausgewachsene Exemplare (9—9,5 mm, 8 bis 9 mm).
2. *Bythinia tentaculata* (L.), typisch.

II. Galatz.

In einer holozänen Terrasse des Sees Lacu Bratisch wurde folgende Fauna gefunden:

1. *Helicella* sp. juv. cf. *striata* (MÜLLER)
2. *Cepaea vindobonensis* (C. PFEIFFER) in einem kleineren (17—21 mm) Stücke.
3. *Stagnicola palustris* (MÜLLER) var.
4. *Planorbis planorbis* (L.), bei einigen Exemplaren befindet sich der Kiel bis in die Mitte!
5. *Gyraulus* sp.
6. *Valvata piscinalis* (MÜLLER) hier selten.
7. *Valvata nalicina* MENKE, in großen Exempl., sehr häufig (5—6 mm).
8. *Hydrobia grandis* COBALCESCU. Sehr häufig; bis 11 zu 4,5 mm groß.
9. *Bithynia tentaculata* (L.), typisch.
10. *Lithoglyphus naticoides* (FÉR.) Zahlreiche typische Exemplare, etwas kleiner, manche etwas höher als der Typus.

11. *Melanopsis acicularis* (FÉRUSAC).

12. *Melanopsis esperi* (FÉRUSAC).

Bei diesen beiden Arten verschiedenste Formen.

13. *Theodoxus fluviatilis* (L.).

Auch lebend im Lacu Bratisch in derselben Form wie die im Lacu Siut bei Mamaia am Schwarzen Meere und im Varna-See.

14. *Pisidium amnicum* (MÜLLER).

15. *Dreissenia polymorpha* (PALLAS).

III. Galatz-Barbosi.

a) Pleistozän auf dem Donau-Anstoßufer.

Typische Lößfauna der südlichen Donauländer.

1. *Vallonia costata* (MÜLLER).

2. *Chondrula tridens eximia* (ROSSMAESSLER) mit der folgenden Art in überraschender Menge.

3. *Chondrula microtragus* (ROSSMAESSLER) in schönen großen Exemplaren.

4. *Pupa* sp.

b) Pleistozäne Donau-Terrasse:

Neu: *Bithynia tentaculata* (L.) (als 21. Art von dorten).

IV. Kahul-See.

Pleistozäner Löss am Ufer:

Neu bestimmt: *Chondrula tridens eximia* (ROSSM.)

B. rezente Faunen:

See Bratisch:

1. *Cepaea hortensis* (MÜLLER). Einfarbige gelbe und gelbrote, normale Exemplare.

2. *Chondrula tridens* (MÜLLER).

3. *Chondrula microtragus* (ROSSMAESSLER).

4. *Coretus corneus* (L.) var. Riesige Exemplare.
5. *Planorbis planorbis* MÜLLER. Kleine Form.
6. *Gyraulus* sp.
7. *Diplodiscus vortex* (L.).
8. *Valvata piscinalis* (MÜLLER).
9. *Bithynia tentaculata* (L.).
10. *Lithoglyphus naticoides* (FÉR.).
11. *Melanopsis acicularis* (FÉR.).
12. *Melanopsis esperi* (FÉR.).
13. *Theodoxus fluviatilis* (L.), netzartig gestreifte Ex.
14. *Dreissenia polymorpha* (PALLAS).
15. *Adacna relictæ* (MILACÉVIC).

See Kahul:

1. *Chondrula tridens* (MÜLLER).
2. *Chondrula tridens eximia* (ROSSMAESSLER).
3. *Lymnaea* sp.
4. *Coretus corneus* (L.). Riesige Exemplare.
5. *Planorbis planorbis* MÜLLER. Kleine Form.
6. *Valvata piscinalis* (MÜLLER).
7. *Bithynia tentaculata* (L.).
8. *Lithoglyphus naticoides* (FÉR.).
9. *Theodoxus fluviatilis* (L.) (wie im Bratisch).
10. *Dreissenia polymorpha* (PALLAS).
11. *Adacna relictæ* MILACÉVIC.

Druckfehlerberichtigung.

In meiner Arbeit „Zur Biologie der *Helicella obvia* Hartm.“ (Arch. Molluskenk., 62, 1930, S. 70) ist auf Zeile 11/12 von unten durch Fortlassen eines Wortes der Sinn umgedreht worden. Es muß dort heißen: Es erfolgen keine Reaktionen im Sinne von Kontraktionen.

G. Schmid.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [62](#)

Autor(en)/Author(s): Jaroslav

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der quartären und rezenten Mollusken von Bessarabien und Galafz. 198-200](#)