Kurze Bemerkungen.

Von F. Haas.

1. Ueber *Cyclotus discoideus* Haas.

Unter obigem Namen beschrieb ich (Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 10, S. 417, 1912) eine Art von der Insel Kabaëna, ohne bemerkt zu haben, daß Sowerby ihn bereits 1843 (Thes. Conch., 1, S. 111, Taf. 25, Fig. 87–88) für eine javanische Schnecke benutzt hatte; an der genannten Stelle wird nämlich ein *Cyclostoma discoideum* genannt, das nach heutiger Auffassung ein *Cyclotus* ist. Den infolgedessen vergebenen Namen *Cycl. discoideus* ändere ich deshalb für die Kabaëna-Schnecke in *Cyclotus (Cyclotus) discoidellus* n. n. um.

2. Ueber *Cylindrella teres* Menke.

Cylindrella teres MENKE, Zeitschr. f. Malak., 4, S. 1, 1847. — PHILIPPI, Abbild. Beschr. neuer od. wenig. bek. Conch., 3, S. 5, Taf. 3, Fig. 5—6, 1851.
Holospira teres PILSBRY, Man. Conch., 2nd. ser., 15, S. 104, 1903.

Die Art wurde von Menke auf ein von Liebmann im mexikanischen Staate Puebla gesammeltes Stück begründet; die erste Abbildung von ihr gab Philippi (a. a. O.). Spätere Untersucher trugen nichts zur Klärung der systematischen Stellung innerhalb der Urocoptiden bei, sodaß Pilsbry (a. a. O.) sie bei *Holospira*-Arten unbekannter Verwandtschaft einreihen mußte. Nun ist in das Senckenberg-Museum in Frankfurt a. M. mit der Sammlung A. Gysser der Typ der *Cylindrella teres* gekommen (Nr. 7023), den Gysser s. Z. beim Verkauf der Sammlung C. Th. Menke erworben hatte. Er wurde auf seinen feineren Bau untersucht und es stellte sich dabei heraus, daß die Menkesche Art von nun an als *Holospira (Holospira) teres* (Menke) geführt werden muß, da die Ausbildung ihrer inneren Lamellen ganz zu der bei der typischen Untergattung *Holospira* paßt.

3. Ueber einige Landschnecken aus Nord-Peru.

Das Senckenberg-Museum erhielt vor einiger Zeit eine kleine Ausbeute zum Geschenk, die Herr Dr. G. PETERSEN gesammelt hatte und die folgende Arten enthielt:

Porphyrobaphe (Porphyrobaphe) iostoma (SOW.). — Quebrada Angostura am Río Tumbes bei Pozo.

Thaumastus (Thaumastus) hartwegi (PFR.). — Cerros de Amotape, ö. v. Fernandez.

Bulimulus (Lissoacme) poecilus (ORB.). — Chimbote, Nordseite des Hafens.

Bulimulus (Lissoacme) pullatus (BROD.). — Chimbote, Nordseite des Hafens. Quebrada de los Peones bei Zorritos.

Bulimulus (Lissoacme) huascensis (RVE.). — Chimbote, Nordseite des Hafens. Gebändert, aber sonst ganz mit dem Arttyp übereinstimmend.

Radiodiscus (Radiodiscus) millecostatus PILSB. — Aus Genist vom Mittellauf des Río Tumbes. Obwohl diese Art bisher nur aus den südlichen Ver. St. v. N. Am. und N. Mexiko bekannt ist, vereinige ich meine zahlreichen peruanischen Stücke dennoch mit ihr. Einen nahen Verwandten von ihr hat H. B. BAKER (1925) aus Venezuela beschrieben und der ebenfalls hierher gehörige *Rad. mariae* PILSB. (1921) stammt von Bogotá, Kolumbien.

Miradiscops (Miradiscops) variolata H. B. BAKER. — Genist des Río Tumbes. Stimmt mit dieser (H. B. BAKER, 1925) aus Venezuela beschriebenen Art bis auf etwas erhabeneres Gewinde und die um eine halbe Windung höhere Windungszahl gut überein.

Caecilioides (Caecilioides) consobrina (ORB.) var. *minutissima* (GUPPY). — Genist des Río Tumbes.

Leptinaria (Leptinaria) aff. *lamellata* (P. & M.). — Ein ganz junges Stück aus dem Tumbes-Genist, das von solchen der *lamellata* aus Venezuela nicht zu unterscheiden ist.

Gastrocopta (Gastrocopta) wolfi (MILLER). — Genist des Río Tumbes.

Bathyomphalus aff. *declivis* (GLD.). — 1 Stück, Genist des Río Tumbes.

Spiralina keratoides (ORB.). — Genist des Río Tumbes.

Benützte Schriften.

BAKER, H. B. The Mollusca collected by the University of Michigan-Williamson Expedition in Venezuela. — Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Mich., Nr. 156, 1925.

PILSBRY, H. A. A Radiodiscus from Bogota, Columbia. — Nautilus, **35**, S. 49, 1921.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Molluskenkunde

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: 65

Autor(en)/Author(s): Haas Fritz

Artikel/Article: Kurze Bemerkungen 271-272