

Der Genotypus von *Plotia* BOLTEN & RÖDING 1798.

Von LOTHAR FORCART, Basel.

H. & A. ADAMS (1854, Bd. 1 S. 295) stellten *Plotia* als Subgenus in das Genus *Thiara* BOLTEN & RÖDING 1798.

BROT (1874 S. 7) wählte *Melania spinulosa* LAMARCK 1822 zum Genotypus von *Plotia*. PRESTON (1915 S. 35) bezeichnete *Melania spinulosa* LAMARCK = *M. scabra* MÜLLER und WENZ (1939 S. 713) *Thiaria (Plotia) scabra* (MÜLLER) als Genotypus.

Die Nachprüfung in BOLTEN & RÖDING (1798 S. 95–96) ergab, daß diese Typenwahlen unrichtig sind. Weder *Melania spinulosa* LAMARCK — die erst später publiziert wurde —, noch *Buccinum scabrum* MÜLLER 1774 befinden sich unter den ursprünglichen Arten von *Plotia*. *Plotia* umfaßte folgende 15 Arten:

Name in BOLTEN & RÖDING 1798:	Gegenwärtiger Name:
1 <i>P. Turrita</i>	nom. nud.
2 <i>P. Lurida</i>	nom. nud.
3 <i>P. Minuta</i>	synonym von <i>Melanoides (Melanoides) tuberculata</i> (MÜLLER) — Thiariidae.
4 <i>P. Fuscata</i>	<i>Melanoides (Stenomelania) fuscata</i> (BORN) — Thiariidae.
5 <i>P. Atra</i>	<i>Faunus ater</i> (L.) — Thiariidae.
6 <i>P. Fossilis</i>	nom. nud.
7 <i>P. Dentata</i>	nom. nud.
8 <i>P. Virginea</i>	<i>Liguus virgineus</i> (L.) — Bulimulidae.
9 <i>P. Puellaris</i>	synonym von <i>Liguus virgineus</i> (L.) — Bulimulidae.
10 <i>P. Lineata</i>	synonym von <i>Pyramidella (Pyramidella) dolabratus</i> (L.) — Pyramidellidae.
11 <i>P. Filata</i>	
12 <i>P. Punctata</i>	
13 <i>P. Vittata</i>	<i>Bullia (Bullia) vittata</i> (L.) — Nassaridae.
14 <i>P. Tranquebarica</i>	synonym von <i>Bullia (Bullia) vittata</i> (L.) — Nassaridae.
15 <i>P. Dubia</i>	nom. nud.

Aus obiger Aufstellung ist ersichtlich, daß keine der ursprünglichen Arten von *Plotia* der Gruppe von *Thiara scabra* (MÜLLER) angehören. Für dieses Subgenus stelle ich den neuen Namen *Pseudoplotia* n. subgen. auf:

Subgenus *Pseudoplotia* n. subgen.

Pseudoplotia n. subgen. Genotypus: *Thiara (Pseudoplotia) scabra* (MÜLLER) = *Buccinum scabrum* MÜLLER 1774.

Plotia BROT 1874 (non BOLTEN & RÖDING 1798). Genotypus design.: *Melania spinulosa* LAMARCK 1822.

Als Genotypus von *Plotia* BOLTEN & RÖDING wähle ich *Plotia minuta* BOLTEN 1798 = synonym von *Nerita tuberculata* MÜLLER 1774. Der Name *Plotia* BOLTEN & RÖDING 1798 ersetzt dann den jüngeren Namen *Melanoides* OLIVIER 1804. Wir erhalten folgende Synonymie:

Genus *Plotia* BOLTEN & RÖDING.

Plotia BOLTEN & RÖDING 1798. Genotypus (neugewählt): *Plotia minuta* BOLTEN & RÖDING 1798 = synonym von *Plotia (Plotia) tuberculata* (MÜLLER) = *Nerita tuberculata* MÜLLER 1774.

(MÜLLER) = *Nerita tuberculata* MÜLLER 1774.

Melanoides OLIVIER 1804. Genotypus (monotyp.): *Melanoides fasciata* OLIVIER 1804 = synonym von *Nerita tuberculata* MÜLLER 1774.

Literaturverzeichnis.

ADAMS, H. & A.: The Genera of Recent Mollusca. London 1853-1858.

BOLTEN, J. F. & RÖDING, P. F.: Museum Boltenianum. Hamburg 1798. (Nach der photographischen Reproduktion von C. D. SHERBORN & E. R. SYKES 1906).

BROT, A.: Die Melaniaceen (Melanidae) in Abbildungen nach der Natur. — MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab., 1 (24). Nürnberg 1874.

PRESTON, H. B.: Mollusca (Freshwater Gastropoda & Pelecypoda). — Fauna Brit. India. London 1915.

WENZ, W.: Gastropoda, Teil 3 Prosobranchia, Lfg. 4. — Handb. Paläozool., 6 (1). Berlin 1939.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [79](#)

Autor(en)/Author(s): Forcart Lothar

Artikel/Article: [Der Genotypus von Plotia Bolten & Röding 1798. 77-78](#)