

Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 22¹⁾:

Mollusca, Camaenidae (2)²⁾.

Von ADOLF ZILCH,

Forschungs-Institut Senckenberg, Frankfurt am Main.

Mit Tafel 16-17.

Papuina MARTENS 1860.

Papuina (Papuina) s. str.

— — **alfredi** (COX 1871).

(*barnaclei* E. A. SMITH 1877).

1916 *Papuina barnaclei*, — C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 293 T. 23 F. 14, 15.

Salomonen: Buka. E. WOLF l. [Orig. fig. SMF 27715a-b].

— — **blainvillei** (LE GUILLOU 1842).

1922 *Papuina blainvillei*, — C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 35 (4): 389 T. 22 F. 21.

Molukken (Aru-Inseln): Sungi Manumbai, Insel Wokam. H. MERTON 1908 [Orig. fig. SMF 4705].

— — **brazierae** (BRAZIER 1876).

1876 *Helix Brazierae* BRAZIER, Proc. linn. Soc. N. S. Wales, 1: 107.

1893 *Helix (Papuina) Brazierae*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 642 T. 108 F. 6-7.

Neuguinea: Yule Insel. BRAZIER d., Slg. KOBELT [Syntypen: SMF 8626, 8624 = Orig. fig.].

— — **chancei** (COX 1870).

1894 *Helix (Geotrochus) chancei*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 696 T. 199 F. 3-4, 5-6.

Salomonen: Ysabel Isl. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8625/2].

— — **chondrodes** (STRUBELL 1892).

1892 *Helix (Geotrochus) chondrodes* STRUBELL, N. Bl., 24: 45.

Molukken: Halmahera. B. STRUBELL 1891, Slg. O. BOETTGER [Syntypen SMF 8660/2].

¹⁾ 21: Arch. Moll., 87 (1/3): 53-76. Frankfurt am Main 1958.

²⁾ Mollusca, Pleurodontidae (1): Arch. Moll., 82 (4/6): 131-140. Frankfurt am Main 1953.

Papuina (*Papuina*)

— — **conscendens** (Cox 1866).

1866 *Helix conscendens* Cox, Proc. zool. Soc. London, 1866: 374.

Australien: Lismore, Oberer Richmond River. Cox d., Slg. MOELLENDORFF [Syntypen SMF 10058/2].

— — **dampieri smithi** C. BOETTGER 1916. Taf. 17 Fig. 16.

1916 *Papuina dampieri smithi* C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 293 T. 23 F. 17a-c.

Salomonen: Gover-Insel. E. WOLF 1909 [Lectotypus Orig. fig. SMF 5866; Paratypus SMF 82164].

— — **divaricata** (KOBELT 1894).

1894 *Helix (Papuina) divaricata* KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 702 T. 200 F. 7-8.

Neuguinea: Insel Djamna. B. STRUBELL 1893, Slg. O. BOETTGER [Syntypus SMF 8659].

— — **fergusoni densestriata** FULTON 1902.

1902 *Papuina densestriata* FULTON, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 316.

Neumecklenburg. FULTON v. [Syntypen SMF 8629/2].

— — **gestroi** (TAPPARONE-CANEFRI 1883).

1893 *Helix (Papuina) gestroi*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 650 T. 187 F. 3-4.

Neuguinea. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8627].

— — **lambei anirensis** I. RENSCH 1934. Taf. 17 Fig. 21.

1916 *Papuina lambei lambei*, — C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 294 [part., von Anir].

1934 *Papuina lambei anirensis* I. RENSCH, Arch. Naturgesch., NF 3 (3): 451.

Insel Anir, sö. Neumecklenburg. E. WOLF 1909 [Holotypus SMF 7580; Paratypen: SMF 7581/2].

— — **lambei dunckeri** LESCHKE 1912.

(*matthiae* C. BOETTGER 1916). Taf. 17 Fig. 17

1916 *Papuina lambei matthiae* C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 294 T. 23 F. 18a-c.

1934 *Papuina lambei dunckeri*, — I. RENSCH, Arch. Naturgesch., NF 3 (3): 451.

Kleine Insel bei St. Matthias. E. WOLF 1909 [Lectotypus von *matthiae* Orig. fig. SMF 5939; Paratypen: SMF 3865, 82250].

— — **lambei lihirensis** I. RENSCH 1934.

1934 *Papuina lambei lihirensis* I. RENSCH, Arch. Naturgesch., NF 3 (3): 450.

Neumecklenburg: Mission Pomat auf Lihir. P. O. MEYER l. 1933, Mus. Berlin m. 1933 [Paratypus SMF 7582].

— — **lambei mahurensis** I. RENSCH 1934. Taf. 17 Fig. 22.

1916 *Papuina lambei lambei*, — C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 294 [part., von Mahur].

1934 *Papuina lambei mahurensis* I. RENSCH, Arch. Naturgesch., NF 3 (3): 451.

Neumecklenburg: Mahur. E. WOLF 1909 [Typus SMF 7578; Paratypen: SMF 7579, 82246].

Papuina (*Papuina*)

— — ***lanceolata*** (L. PFEIFFER 1861).

1897 *Papuina lanceolata*, — KOBELT, Abh. senckenb. nat. Ges., 24: 77 T. 9 F. 8-9.

Molukken: Halmahera. KÜKENTHAL 1894, Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8647].

(*unicolor* MOELLENDORFF 1902).

1902 *Papuina lanceolata unicolor* MOELLENDORFF, N. Bl., 34: 191.

Beleg fehlt!

— — ***leucotropis*** (L. PFEIFFER 1861).

1922 *Papuina leucotropis*, — C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 35 (4): 392 T. 22 F. 24.

Molukken: Aru-Inseln. O. STAUDINGER 1893, Slg. O. BOETTGER [Orig. fig. SMF 4676].

— — ***secans linterae*** MOELLENDORFF 1897. Taf. 16 Fig. 1.

1897 *Papuina linterae* MOELLENDORFF, N. Bl., 29: 30.

1897 *Helix* (*Papuina*) *linterae*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 840 T. 227 F. 1-2.

Neuguinea. J. E. LINTER d., Slg. MOELLENDORFF [Holotypus Orig. fig. SMF 8655].

— — ***macfarlanei*** (Cox 1873).

1873 *Helix* (*Geotrochus*) *macfarlanei* Cox, Proc. zool. Soc. London, 1873: 567.

Salomonen. Cox d., Slg. MOELLENDORFF [Syntypus SMF 8634].

— — ***miser*** (Cox 1873).

1873 *Helix* (*Geotrochus*) *miser* Cox, Proc. zool. Soc. London, 1873: 146.

Salomonen. Cox d., Slg. MOELLENDORFF [Syntypen SMF 8633/2].

— — ***multizona*** (LESSON 1831).

1894 *Helix* (*Papuina*) *multizona*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 651 T. 187 F. 5-6, 7-8.

Neuguinea. H. DOHRN d., Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8628/2].

— — ***ohlendorffi*** KOBELT 1897. Taf. 16 Fig. 10.

1897 *Papuina ohlendorffi* KOBELT, Abh. senckenb. nat. Ges., 24: 78 T. 8 F. 6-7.

Molukken: Insel Batjan. KÜKENTHAL 1894, Slg. KOBELT [Holotypus Orig. fig. SMF 8644].

— — ***phaeostoma*** (MARTENS 1877).

(*densepicta* H. ROLLE 1902). Taf. 17 Fig. 13.

1902 *Papuina phaeostoma densepicta* ROLLE, N. Bl., 34: 212.

Insel Kung bei Neumecklenburg. H. ROLLE d. [Lectotypus SMF 8654; Paratypen SMF 8649/2].

(*fulgurtat* H. ROLLE 1902). Taf. 17 Fig. 14.

1902 *Papuina phaeostoma fulgurata* ROLLE, N. Bl., 34: 212.

Insel Kung bei Neumecklenburg. H. ROLLE d. [Lectotypus SMF 8652; Paratypen SMF 163332/4].

(*raremaculata* H. ROLLE 1902). Taf. 17 Fig. 15.

1902 *Papuina phaeostoma raremaculata* ROLLE, N. Bl., 34: 212.

Insel Kung bei Neumecklenburg. H. ROLLE d. [Lectotypus SMF 8653; Paratypen SMF 163330-1/4 + 8].

Papuina (*Papuina*)

— — (***phaeostoma***) ***humilis*** FULTON 1902.

1902 *Papuina humilis* FULTON, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 317.

Neumecklenburg: Nusa. FULTON v. [Syntypen SMF 27779/2].

— — (***phaeostoma***) ***spadicea*** FULTON 1902.

1902 *Papuina spadicea* FULTON, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 318.

Neumecklenburg. FULTON v. [Syntypen SMF 8661/2].

— — ***pileus*** (O. F. MÜLLER 1774).

1922 *Papuina pileus*, — C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 35 (4): 387 T. 22 F. 19, 20.

Molukken (Aru-Inseln): Sungai Manumbai, Insel Wokam. H. MERTON 1908 [Orig. F. 19 = SMF 4675; Orig. F. 20 = SMF 4702].

— — ***pseudosatsuma*** MOELLENDORFF 1902. Taf. 16 Fig. 2.

1902 *Papuina pseudosatsuma* MOELLENDORFF, N. Bl., 34: 192.

Molukken: Insel Obi. WATERSTRAAT l., H. ROLLE d., Slg. MOELLENDORFF [Holotypus SMF 8648].

— — ***rhynchostoma obiana*** MOELLENDORFF 1902. Taf. 16 Fig. 3.

1902 *Papuina rhynchostoma obiana* MOELLENDORFF, N. Bl., 34: 191.

Molukken: Insel Obi. WATERSTRAAT l., H. ROLLE d., Slg. MOELLENDORFF [Holotypus SMF 8646].

— — ***tomasinelliana*** (TAPPARONE-CANEFRI 1883).

1893 *Helix* (*Papuina*) *tomasinelliana*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 649 T. 187 F. 1-2.

Neuguinea. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8643].

— — ***vitrea*** (FÉRUSSAC 1832).

1897 *Papuina vitrea* var., — KOBELT, Abh. senckenb. nat. Ges., 24: 76 T. 9 F. 6-7.

Molukken: Halmahera. KÜKENTHAL 1894, Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8650].

— — ***zeno subglobosa*** FULTON 1902.

1902 *Papuina zeno* var. *subglobosa* FULTON, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 184.

Brit. Neuguinea: Riff bei Port Moreby. E. WEISKE l., FULTON v. [Syntypen SMF 27870, 162901/2].

***Papuina* (*Papustyla*) PILSBRY 1893.**

— — ***hindei*** (COX 1888).

1960 *Papuina* (*Papustyla*) *hindei*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 4): 620 Abb. 2173.

Bismarck Archipel: Insel Neupommern. Slg. C. BOETTGER [Orig. fig. SMF 82142].

***Papuina* (*Papuanella*) CLENCH & TURNER 1959.**

— — ***finisterrensis*** KOBELT 1914. Taf. 16 Fig. 9.

1914 *Papuina finisterrensis* KOBELT, N. Bl., 46: 7.

1917 *Papuina finisterrensis*, — KOBELT, N. Bl., 49: 7 T. 1 F. 6a-6b-6c.

Neuguinea: Ogeramua im Finisterre-Gebirge. Slg. KOBELT [Lectotypus Orig. fig. SMF 8630; Paratypen: SMF 8631, 82232 in Slg. C. BOETTGER].

Papuina (*Papuanella*)

— — **ogeramuensis** (KOBELT 1914). Taf. 16 Fig. 11.

1914 *Geotrochus ogeramuensis* KOBELT, N. Bl., 46: 5.

1917 *Geotrochus ogeramuensis*, — KOBELT, N. Bl., 49: 5 T. 1 F. 4a-4b-4c.

1959 *Papuanella ogeramuensis*, — CLENCH & TURNER, J. malac. Soc. Austr., 3: 5.

Neuguinea: Ogeramua. Slg. KOBELT [Holotypus Orig. fig. SMF 8645].

***Papuina (Rhynchotrochus)* MOELLENDORFF 1895.**

— — **caputserpentis** KOBELT 1914. Taf. 16 Fig. 12.

1914 *Papuina caput serpentis* KOBELT, N. Bl., 46: 6.

1917 *Papuina caput serpentis*, — KOBELT, N. Bl., 49: 6 T. 1 F. 5a-c.

Neuguinea: Bei Agololo im Hinterland des Hüongolfes (1400 m). FÖRSTER l., Slg. KOBELT [Holotypus Orig. fig. SMF 8632].

— — **gemina** FULTON 1902.

1902 *Papuina gemina* FULTON, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 183.

Brit. Neuguinea: Aborle (6000'), Aroa-Fluß. E. WEISKE l. d., Slg. EHRMANN [Syntypen SMF 163334/2].

— — **nodifera** (L. PFEIFFER 1861).

(*grata magna* FULTON 1910).

1910 *Papuina grata* var. *magna* FULTON, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 5: 371.

Niederl. Neuguinea: Muswar-Insel. FULTON v., Slg. EHRMANN [Syntypus SMF 163333].

— — **rhynchota** C. BOETTGER 1916. Taf. 17 Fig. 18.

1916 *Papuina rhynchota* C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 292 T. 23 F. 16a-c.

Bismarck Archipel. E. WOLF 1909 [Lectotypus Orig. fig. SMF 5937; Paratypen: SMF 5938, 82281].

— — **tayloriana tayloriana** (A. ADAMS & REEVE 1848).

1960 *Papuina (Rhynchotrochus) tayloriana*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2,4): 620, Abb. 2174.

Neuguinea: Milne Bay. PAAR 1901, Slg. JETSCHIN [Orig. fig. SMF 82202].

— — **tayloriana genulabris** MOELLENDORFF 1895. Taf. 16 Fig. 4.

1893 *Helix (Geotrochus?) tayloriana*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 642 T. 184 F. 8-9, 10-11.

1895 *Papuina Tayloriana* [var. *genulabris*] MOELLENDORFF, Proc. malac. Soc. London, 1 (5): 236.

Neuguinea. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 8658/2].

Neuguinea: Constantinhafen. KUBARY l., Slg. MOELLENDORFF [Lectotypus SMF 8656; Paratypen: SMF 8657/3, 82205/2].

— — **tayloriana planogyra** MOELLENDORFF 1895. Taf. 16 Fig. 5.

1895 *Papuina planogyra* MOELLENDORFF, Proc. malac. Soc. London, 1 (5): 235 T. 15 F. 5.

Neuguinea: Constantinhafen. KUBARY l., Slg. MOELLENDORFF [Lectotypus Orig. fig. SMF 8641; Paratypus SMF 8642].

Papuina (Rhynchotrochus)

— — **wiegmanni conjuncta** I. RENSCH 1934.

1934 *Papuina wiegmanni conjuncta* I. RENSCH, Arch. Naturgesch., NF 3 (3): 475.

Neupommern: Ulamona am Vulkan Vater. P. SCHNEIDER l., Mus. Berlin m. 1935 [Paratypen SMF 9593/3].

— — **wiegmanni disjuncta** I. RENSCH 1934.

1934 *Papuina wiegmanni disjuncta* I. RENSCH, Arch. Naturgesch., NF 3 (3): 475.

Neupommern: Jacquinot-Bucht. P. SCHNEIDER l., Mus. Berlin m. 1935 [Paratypen SMF 9594/3].

— — **wiegmanni kubaryi** MOELLENDORFF 1895. Taf. 16 Fig. 6.

1895 *Papuina Kubaryi* MOELLENDORFF, Proc. malac. Soc. London, 1 (5): 236 T. 15 F. 4.

1897 *Helix (Papuina) kubaryi*, — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): 842 T. 228 F. 1-3.

Neuguinea: Constantinhafen. KUBARY l., Slg. MOELLENDORFF [Lectotypus Orig. 1895 F. 4 = SMF 8635a; Paratypen: Orig. 1897 F. 1-3 = SMF 8635b, 8636/13, 9239/4, 82298/6, 8640/4, 8639/3].

(*kubaryi albina* MOELLENDORFF 1895). Taf. 16 Fig. 7.


1895 *Papuina Kubaryi* (Forma *albina*) MOELLENDORFF, Proc. malac. Soc. London, 1 (5): 236.

Neuguinea: Constantinhafen. KUBARY l., Slg. MOELLENDORFF [Lectotypus SMF 8637; Paratypen SMF 8638/12, 82189/7].

Erklärungen zu Tafel 16.

Phot. Senckenberg-Museum (E. Haupt), Vergr. 1/1.

- Fig. 1. *Papuina (Papuina) secans linterae* MOELLENDORFF.
Holotypus SMF 8655.
- Fig. 2. *Papuina (Papuina) pseudosatsuma* MOELLENDORFF.
Holotypus SMF 8648.
- Fig. 3. *Papuina (Papuina) rhynchostoma obiana* MOELLENDORFF.
Holotypus SMF 8646.
- Fig. 4. *Papuina (Rhynchotrochus) tayloriana genulabris* MOELLENDORFF.
Lectotypus SMF 8656.
- Fig. 5. *Papuina (Rhynchotrochus) tayloriana planogyra* MOELLENDORFF.
Lectotypus SMF 8641.
- Fig. 6-7. Fig. 6-7. *Papuina (Rhynchotrochus) wiegmanni kubaryi* MOELLENDORFF.
6) Lectotypus SMF 8635a; 7) Lectotypus der f. *albina* MOELLENDORFF, SMF 8637.
- Fig. 8. *Papuina (Crystallopsis) tenimberica* (MOELLENDORFF).
Lectotypus SMF 7011a.
- Fig. 9. *Papuina (Papuanella) finisterrensis* KOBELT.
Lectotypus SMF 8630.
- Fig. 10. *Papuina (Papuina) ohlendorffi* KOBELT.
Holotypus SMF 8644.
- Fig. 11. *Papuina (Papuanella) ogeramuensis* (KOBELT).
Holotypus SMF 8645.
- Fig. 12. *Papuina (Rhynchotrochus) caputserpentis* KOBELT.
Holotypus SMF 8632.




A. ZILCH: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 22:
Mollusca, Camaenidae (2).

Erklärungen zu Tafel 17.

Phot. Senckenberg-Museum (E. Haupt), Vergr. 1/1.

- Fig. 13-15. *Papuina (Papuina) phaeostoma* (MARTENS).
13) Lectotypus von *P. p. densepicta* ROLLE, SMF 8654;
14) Lectotypus von *P. p. fulgurata* ROLLE, SMF 8652;
15) Lectotypus von *P. p. ravemaculata* ROLLE, SMF 8653.
- Fig. 16. *Papuina (Papuina) dampieri smithi* C. BOETTGER.
Lectotypus SMF 5866.
- Fig. 17. *Papuina (Papuina) lambei dunckeri* LESCHKE.
Lectotypus von *P. l. matthiae* C. BOETTGER, SMF 5939.
- Fig. 18. *Papuina (Rhynchotrochus) rhynchota* C. BOETTGER.
Lectotypus SMF 5937.
- Fig. 19. *Papuina (Rhynchotrochus) wolffi* C. BOETTGER.
Holotypus SMF 5881.
- Fig. 20. *Papuina (Crystalloopsis) gowerensis* C. BOETTGER.
Typus SMF 5940.
- Fig. 21. *Papuina (Papuina) lambei anirensis* I. RENSCH.
Typus SMF 7580.
- Fig. 22. *Papuina (Papuina) lambei mahurensis* I. RENSCH.
Typus SMF 7578.



A. ZILCH: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 22:
Mollusca, Camaenidae (2).

Papuina (*Rhynchotrochus*)

— — **wolfi** C. BOETTGER 1916. Taf. 17 Fig. 19.

1916 *Papuina wolfi* C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 291 T. 23 F. 12a-c.
Keule-Insel bei Neuguinea. E. WOLF 1909 [Holotypus Orig. fig. SMF 5881].

***Papuina (Crystallopsis)* ANCEY 1887.**

— — **fictilia** (CLAPP 1923).

1923 *Crystallopsis fictilia* CLAPP, Bull. Mus. comp. Zool., 65: 397.

Salomonen: Anki, Malaita. W. N. MANN l., Mus. Cambridge m. 1932 [Paratypen SMF 5463/4].

— — **fulakorensis** (CLAPP 1923).

1923 *Crystallopsis fulakorensis* CLAPP, Bull. Mus. comp. Zool., 65: 398.

Salomonen: Fulakora, Isabel Island. W. N. MANN l., Mus. Cambridge m. 1932 [Paratypus SMF 5464].

— — **gowerensis** C. BOETTGER 1916. Taf. 17 Fig. 20.

1916 *Papuina gowerensis* C. BOETTGER, Abh. senckenb. nat. Ges., 36 (3): 294 T. 23 F. 19a-c.

Salomonen: Gower-Insel. E. WOLF 1909 [Typus Orig. fig. SMF 5940; Paratypen SMF 5941/2].

— — **hunteri** (COX 1871).

1960 *Papuina (Crystallopsis) hunteri*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 4): 620, Abb. 2175.

Salomonen. H. DOHRN 1882, Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 27901].

— — **tenimberica** (MOELLENDORFF 1892). Taf. 16 Fig. 8.

1892 *Cochlostyla (Corasia) takimberica* MOELLENDORFF, N. Bl., 24: 97 T. 1 F. 2.

Tenimber Inseln. MICHOLITZ l., Slg. MOELLENDORFF [Lectotypus SMF 7011a; Paratypen: SMF 7011b, 6376 = Orig. 1892 T. 1 F. 2 in Slg. KOBELT].

***Papuina (Cristovala)* CLENCH 1958.**

— — **tricolor** (L. PFEIFFER 1849).

1960 *Papuina (Cristovala) tricolor*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 4): 620, Abb. 2175a.

Salomonen: San Christoval. MEYERFELD 1879, Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 27903a].

***Papuina (Rhytidoconcha)* I. RENSCH 1933.**

— — **inquirenda** I. RENSCH 1929.

1929 *Papuina inquirenda* I. RENSCH, Zool. Anz., 85: 49.

1960 *Papuina (Rhytidoconcha) inquirenda*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 4): 621, Abb. 2176.

Squally-Isl., St. Matthias-Gruppe. EICHHORN l., Mus. Berlin m. [Paratypus Orig. fig. SMF 3724].

***Papuina (Megalacron)* I. RENSCH 1934.**

— — ***globula*** I. RENSCH 1930.

1930 *Papuina globula* I. RENSCH, Zool. Anz., 92: 226.

Neupommern: Kap Merkus, Pulie-Fluß. Mus. Berlin m. [Paratypus SMF 5770].

— — ***klaarwateri*** I. RENSCH 1931.

1931 *Papuina klaarwateri* I. RENSCH, Zool. Anz., 95: 187.

Admiralitäts-Inseln: Bundralis, Insel Manus. Mus. Berlin m. 1932 [Paratypus SMF 5772].

— — ***novaegeorgiensis creta*** I. RENSCH 1934.

1934 *Papuina novaegeorgiensis creta* I. RENSCH, Arch. Naturges., NF 3 (3): 480.

1960 *Papuina (Megalacron) novaegeorgiensis creta*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 4): 621, Abb. 2177.

Bismarck Archipel: French Island. Mus. Berlin m. [Paratypus Orig. fig. SMF 9592].

— — ***novaegeorgiensis lufensis*** THIELE 1928.

1928 *Papuina lufensis* THIELE, Zool. Jb. (Syst.), 55: 139.

Neuguinea: Hermit Island. DEMPWOLF l., Mus. Berlin m. 1929 [Paratypen SMF 3723/2].

***Papuina (Glomerata)* I. RENSCH 1934.**

— — ***migratoria*** (L. PFEIFFER 1855).

1960 *Papuina (Glomerata) migratoria*, — ZILCH in WENZ, Hdb. Pal., 6 (2, 4): 621, Abb. 2178.

Salomonen. OBERWIMMER d. 1904, Slg. JETSCHIN [Orig. fig. SMF 82262/2].

(*sellersi* COX 1871).

1894 *Helix sellersi* var., — KOBELT, M.CH., I. 12 (IV): T. 199 F. 7-8, 9-10.

Salomonen. Slg. KOBELT [Orig. fig. SMF 27806/2].

Bemerkung: Diese Abbildungen sind in der Tafelerklärung (: 851) und im Index (: 859) mit dem Hinweis auf Seite 697 erwähnt. Ich habe nicht feststellen können, wo KOBELT *sellersi* COX behandelt hat.

S c h r i f t e n .

BOETTGER, C. R.: Die Molluskenausbeute der Hanseatischen Südsee-Expedition 1909. — Abh. senckenb. naturf. Ges., 36 (3): 287-308, Taf. 21-23. Frankfurt a. M. 1916.

— — —: Die Landschneckenfauna der Aru- und der Kei-Inseln. — Abh. senckenb. naturf. Ges., 35 (4): 355-417, Taf. 21-23. Frankfurt a. M. 1922.

BRAZIER, J.: Descriptions of thirty-five new species of land shells from New Guinea, Australia, and islands in Torres Straits, collected during the CHEVERT Expedition. — Proc. linn. Soc. N. S. Wales, 1: 98-113. 1876.

CLAPP, W. F.: Some mollusca from the Solomon Islands. — Bull. Mus. comp. Zool., 65: 351-418. Cambridge (Mass.) 1923.

CLENCH, W. J. & TURNER, R. D.: Two new genera of land molluscs (Papuinae) from the Central Highlands of New Guinea. — J. malac. Soc. Austr., 3: 4-9. Melbourne 1959.

- COX, J. C.: Characters of six new Australian land-shells. — Proc. zool. Soc. London, 1866: 373-376. London 1866.
- — —: Descriptions of new land-shells from Australia and the Solomon Islands. — Proc. zool. Soc. London, 1873: 146-152, Taf. 16. London 1873.
- — —: Descriptions of new species of land and marine shells from Australia and the Solomon and Louisiade Islands. — Proc. zool. Soc. London, 1873: 564-569, Taf. 48. London 1873.
- FULTON, H.: Descriptions of new species of land-mollusca from New Guinea. — Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 182-184. London 1902.
- — —: Descriptions of new species of Helicoids from German New Guinea and New Mecklenburg (New Ireland). — Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 315-318. London 1902.
- — —: List with notes on some land-shells from the Island of Muswar, Dutch New Guinea, and descriptions of new species and varieties of *Planispira* (*Cristigibba*), *Papuina*, *Calycia*, and *Leptopoma*. — Ann. Mag. nat. Hist., (8) 5: 370-373. London 1910.
- KOBELT, W.: Die Familie der Heliceen. In MARTINI & CHEMNITZ, Systematisches Conchylien-Cabinet. — I. 12 (IV): 627-859, Taf. 162-288. Nürnberg 1893-1897 [: 627-650 Taf. 185-188 (1893); 651-730 Taf. 189-206 (1894); 731-826 Taf. 207-224 (1895); 827-859 Taf. 225-228 (1897)].
- — —: Land- und Süßwasserkonchylien [der Molukken]. — Abh. senckenb. naturf. Ges., 24 (1): 19-92, Taf. 4-11. Frankfurt a. M. 1897.
- — —: Diagnosen neuer Arten aus Neuguinea. — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 46: 3-8. Frankfurt a. M. 1914.
- — —: Beiträge zur Molluskenfauna von Neuguinea. Aus dem Hinterlande des Huongolfes. — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 49: 1-8, Taf. 1. Frankfurt a. M. 1917.
- MOELLENDORFF, O. VON: Die Landschneckenfauna der Tenimber-Inseln (Timorlaut). — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 24: 81-102, Taf. 1. Frankfurt a. M. 1892.
- — —: On a collection of land-shells made by Mr. I. KUBARY in German New Guinea. — Proc. malac. Soc. London, 1 (5): 234-240, Taf. 15. London 1895.
- — —: Drei neue Arten. — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 29: 28-31. Frankfurt a. M. 1897.
- — —: Binnenmollusken aus Niederländisch Indien. — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 34: 185-207. Frankfurt a. M. 1902.
- RENSCH, I.: Drei neue *Papuina*-Arten aus dem Bismarck-Archipel und Neu-Guinea. — Zool. Anz., 85 (3/4): 49-52. Leipzig 1929.
- — —: Neue Landmollusken aus dem Bismarck-Archipel. II. — Zool. Anz., 92 (9/10): 225-234. Leipzig 1930.
- — —: Beitrag zur Kenntnis der Schneckenfauna der Admiralitätsinseln. — Zool. Anz., 95 (5/8): 186-194. Leipzig 1931.
- — —: Systematische und tiergeographische Untersuchungen über die Landschneckenfauna des Bismarck-Archipels. I. — Arch. Naturg., NF 3 (3): 445-488. Leipzig 1934.
- ROLLE, H.: Neue Landschnecken. — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 34: 211-212. Frankfurt a. M. 1902.
- STRUBELL, B.: Landschnecken aus Halmahera. — Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., 24: 41-50. Frankfurt a. M. 1892.
- THIELE, J.: Mollusken vom Bismarck-Archipel, von Neu-Guinea und Nachbar-Inseln. — Zool. Jb. (Syst.), 55: 119-146, Taf. 5. Jena 1928.
- ZILCH, A.: Euthyneura. In W. WENZ, Gastropoda. — Hdb. Paläozool., 6 (2, 4): 601-835. Berlin (BORNTAEGER) 1960.

Namenverzeichnis

der erwähnten Gattungen, Arten und Unterarten.

<i>albina</i> MOELLENDORFF	198	<i>lihirensis</i> I. RENSCH	194
<i>alfredi</i> COX	193	<i>linterae</i> MOELLENDORFF	195
<i>anirensis</i> I. RENSCH	194	<i>lufensis</i> THIELE	200
<i>barnaclei</i> SMITH	193	<i>macfarlanei</i> COX	195
<i>blainvillei</i> LE GUILLOU	193	<i>magna</i> FULTON	197
<i>brazierae</i> BRAZIER	193	<i>mahurensis</i> I. RENSCH	194
<i>caputserpentis</i> KOBELT	197	<i>matthiae</i> C. BOETTGER	194
<i>chancei</i> COX	193	<i>Megalacron</i>	200
<i>chondrodes</i> STRUBELL	193	<i>migratoria</i> PFEIFFER	200
<i>conjuncta</i> I. RENSCH	198	<i>miser</i> COX	195
<i>condensens</i> COX	194	<i>multizona</i> LESSON	195
<i>creta</i> I. RENSCH	200	<i>nodifera</i> PFEIFFER	197
<i>Cristovala</i>	199	<i>obiana</i> MOELLENDORFF	196
<i>Crystallopsis</i>	199	<i>ogeramuensis</i> KOBELT	197
<i>densepicta</i> ROLLE	195	<i>ohlendorffi</i> KOBELT	195
<i>densestriata</i> FULTON	194	<i>Papuanella</i>	196
<i>disjuncta</i> I. RENSCH	197	<i>Papuina</i>	193
<i>divaricata</i> KOBELT	194	<i>Papustyla</i>	196
<i>dunckeri</i> LESCHKE	194	<i>phaeostoma</i> MARTENS	195
<i>fictilia</i> CLAPP	199	<i>pileus</i> MÜLLER	196
<i>finisterrensis</i> KOBELT	196	<i>planogyra</i> MOELLENDORFF	197
<i>fulakorensis</i> CLAPP	199	<i>pseudosatsuma</i> MOELLENDORFF	196
<i>fulgurata</i> ROLLE	195	<i>raremaculata</i> ROLLE	195
<i>gemina</i> FULTON	197	<i>rhynchota</i> C. BOETTGER	197
<i>genulabris</i> MOELLENDORFF	197	<i>Rhynchotrochus</i>	197
<i>gestroi</i> TAPPARONE-CANEFRI	194	<i>Rhytidoconcha</i>	199
<i>globula</i> I. RENSCH	200	<i>sellersi</i> COX	200
<i>Glomerata</i>	200	<i>smithi</i> C. BOETTGER	194
<i>gowerensis</i> C. BOETTGER	199	<i>spadicea</i> FULTON	196
<i>hindei</i> COX	196	<i>subglobosa</i> FULTON	196
<i>humilis</i> FULTON	196	<i>tayloriana</i> ADAMS & REEVE	197
<i>hunteri</i> COX	199	<i>tenimberica</i> MOELLENDORFF	199
<i>inquirenda</i> I. RENSCH	199	<i>tomasinelliana</i> TAPPARONE-CANEFRI	196
<i>klaarwateri</i> I. RENSCH	200	<i>tricolor</i> PFEIFFER	199
<i>kubaryi</i> MOELLENDORFF	198	<i>unicolor</i> MOELLENDORFF	195
<i>lambei</i> PFEIFFER	194	<i>vitrea</i> FÉRUSAC	196
<i>lanceolata</i> PFEIFFER	195	<i>wolfi</i> C. BOETTGER	199
<i>leucotropis</i> PFEIFFER	195		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [89](#)

Autor(en)/Author(s): Zilch Adolf Michael

Artikel/Article: [Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 221\):Mollusca, Camaenidae \(2\)2\). 193-202](#)