

Systematische Liste und Synonymik der bulgarischen Staphylinidae s. str.

(Coleoptera)

von

Ivan M. RAITSCHEV

Bis jetzt haben über die *Staphylinidae* in Bulgarien vor allem ausländische Entomologen gearbeitet. 1909 meldet F. RAMBOUSEK 338 Arten, davon waren 95 *Staphylinidae* s. str. (COIFFAIT, 1972). 1937 erscheint eine Meldung von SCHEERPELTZ über 36 Arten. Verschiedene Wissenschaftler publizierten Veröffentlichungen über einzelne Arten. Mit den vom Verfasser genannten (RAITSCHEV, 1979, 1982, 1984; 47 neue für Bulgarien) gibt es zur Zeit 243 Arten *Staphylinidae*.

Die Liste enthält 247 Arten, es sind 4 neue Arten dabei. Im Text sind sie mit einem Sternchen bezeichnet.

Die systematische Reihenfolge nach COIFFAIT (1972, 1974, 1978, 1982, 1984).

Fam. *Staphylinidae* s. str.

I. Subfam. *Xantholininae*

G. *Leptacinus* ERICHSON

1. *batychnus* GYLLENHAL, 1827

2. *lupercus* COIFFAIT, 1956.

G. *Phacophallus* COIFFAIT

3. *parumpunctatus* GYLLENHAL,
1827

G. *Gauropterus* THOMSON

4. *fulgidus* FABRICIUS, 1787

5. *sanguinolentus* REITTER, 1889

G. *Gyrophypnus* MANNERHEIM

6. *angustatus* Stephens, 1833

7. *fracticornis* MÜLLER, 1776

(*punctulatus* PAYKULL, 1789)

G. *Leptolinus* KRAATZ

8. *turcicus* COIFFAIT, 1956

G. *Nudobius* THOMSON

9. *lentus* GRAVENHORST, 1806

G. *Megalinus* MULSANT/REY

10. *glabratus* GRAVENHORST,
1802

(*relucens* GRAVENHORST,
1806)

G. *Phalacrolinus* COIFFAIT

11. *glaber* GRAVENHORST, 1802

G. *Xantholinus* BERTHOLD

s. G. *Heterolinus* COIFFAIT

12. *procerus* ERICHSON, 1839-40

s. G. *Helicophallus* COIFFAIT

13. *bulgaricus* COIFFAIT, 1972

14. *distans* MULSANT/REY, 1853

s. G. *Purrolinus* COIFFAIT

15. *tricolor* FABRICIUS, 1787

s. G. *Acanthophallus* COIFFAIT

16. *laevigatus* JACOBSON, 1874

17. *graecus* REITTER, 1908

18. *varnensis* COIFFAIT, 1972

s. G. *Xantholinus* s. str.

19. *sublinearis* COIFFAIT, 1969

20. *linearis* OLIVIER, 1794

21. *longiventris* HEER, 1838

22. *infimus* COIFFAIT, 1962

23. *schweigeri* COIFFAIT, 1970

G. *Othius* STEPHENS

24. *punctulatus* GOEZE, 1777.

- (*fulvipennis* FABRICIUS, 1792) s. G. *Philonthus* s. str.
25. *laeviusculus* STEPHENS, 1833 51. *danicus* COIFFAIT, 1963
26. *lapidicola* KIESENWETTER, 1848 52. *ventralis* GRAVENHORST, 1802
- G. *Baptolinus* KRAATZ 53. *nigriventris* THOMSON, 1867
27. *affinis* PAYCULL, 1789 54. *umbratilis* GRAVENHORST, 1802
55. *discoideus* GRAVENHORST, 1802
56. *mannerheimi* FAUVEL, 1868
- II. Subfam. *Staphylininae* 57. *addentus* SHARP, 1867
- Tr. *Philonthini* 58. *tenuicornis* MULSANT/REY, 1853
- G. *Erichsonius* FAUVEL 59. *nitidicollis* BOISDUVAL/LACCORDER, 1835
- (*Ectobius* FAUVEL) 60. *aculeatus* COIFFAIT, 1963
28. *cinerascens* GRAVENHORST, 1802 61. *corvinus* ERICHSON, 1837
- G. *Gabrius* CURTIS 62. *confinis* STRAND 1943
29. *suffragani* JOY, 1913 63. *picipes* FAUVEL, 1875
30. *femoralis* HOCHUUT, 1851 64. *cruentatus* GMELIN, 1790
31. *nigritulus* GRAVENHORST, 1802 65. *frigidus* KIESENWETTER, 1848
32. *astutus* ERICHSON, 1839-40 66. *succicola* THOMSON, 1860
33. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971 (*carbonarius* ERICHSON, 1837)
34. *vernalis* GRAVENHORST, 1806 (*chalceus* STEPHENS, 1832)
35. *obenbergeri* SMETANA, 1925 67. *ochropus* GRAVENHORST, 1802
36. *exiguus* NORDMAN, 1837 (*concinus* GRAVENHORST, 1802)
37. *expectatus* SMETANA, 1952 68. *varians* PAYCULL, 1789
38. *trossulus* NORDMAN, 1837 69. *cognatus* STEPHENS 1832
39. *latro* JOY, 1913 (*fuscipennis*, MANNHEIM, 1930)
40. *hoberlandti* SMETANA, 1952 70. *decorus* GRAVENHORST, 1802
41. *pennatus* SHARP, 1910 71. *rectangulus* SHARP, 1874
42. *splendidulus* GRAVENHORST, 1802 72. *rigidicornis* GRAVENHORST, 1802
43. *ravasini* GRIDELLI, 1920 (*fimetarius* GRAVENHORST, 1802)
- (*spurius* SMETANA, 1954) 73. *cianipennis* FABRICIUS, 1792
44. *subnigrituloides* SCHEERPELTZ, 1933 74. *carbonarius* GRAVENHORST, 1802
- (*subnigritulus* JOY, 1913) (*varius* GYLLENHAL, 1810)
- G. *Paragabrius* COIFFAIT 75. *intermedius* BOISDUVAL/LACCORDER, 1835
45. *micanthoides* BENIK/LOHSE, 1956 76. *politus* LINNÉ, 1758
46. *micans* GRAVENHORST, 1802 (*aeneus* ROSSI, 1790)
47. *siculus* GRIDELLI, 1823 77. *sanguinolentus* GRAVENHORST, 1803
48. *fulvipes*, FABRICIUS, 1792 78. *quisquiliarius* GYLLENHAL, 1810
- G. *Rabigus* MULSANT/REY
49. *tenius* FABRICIUS, 1792
50. *pullus* NORDMAN, 1837
- G. *Philonthis* CURTIS

79. *albipes* GRAVENHORST, 1802
 80. *debilis* GRAVENHORST, 1802
 81. *atratus* GRAVENHORST, 1802
 82. *corruscus* GRAVENHORST, 1802
 83. *pachycephalus* NORDMAN, 1837
 84. *cephalotes* GRAVENHORST, 1802
 85. *splendens* FABRICIUS, 1792
 86. *dimidiatipennis* ERICHSON, 1830
 87. *rufimanus* ERICHSON 1839-40
 88. *nitidus* FABRICIUS, 1787
 89. *punctus* GRAVENHORST, 1802
 90. *coerulescens* BOISDUVAL/LACCODER, 1835
 91. *ebenus* GRAVENHORST, 1802
 92. *immundus* GYLLENHAL, 1810
 93. *diversiceps* BERNHAUER, 1901
 94. *salinus* KIESENWETTER, 1844
 s.G. *Onichrophilonthus* NERES/WAGNER
 95. *marginatus* STROEN 1768
 G. *Spatulonthus* TOTTENHAM
 96. *parvicornis* GRAVENHORST, 1802
 (*agilis* GRAVENHORST 1806)
 97. *cochleatus* SCHEERPELTZ, 1937
 G. *Neobisnius* GANGLBAUER
 98. *orbis* KIESENWETTER, 1850
 99. *procerulus* GRAVENHORST, 1806
 100. *prolixus* ERICHSON, 1839-40
 G. *Remus* HOLME
 101. *sericeus* HOLME, 1837
 102. *filum* KIESENWETTER, 1849
 G. *Cafius* CURTIS
 103. *xantholoma* GRAVENHORST, 1806
 G. *Ortidus* MULSANT/REY
 104. *cribratus* ERICHSON, 1840
 Tr. *Staphylinini*
 G. *Dinothenarus* THOMSON
 (*Trichoderma* auct., nec. STEPHENS)
 105. *pubescens* De GEER, 1774
 106. *flavocephalus* GOEZE, 1777
 G. *Ontholestes* GANGLBAUER
 107. *murinus* LINNÉ, 1758
 108. *haroldi* EPPELSHEIM, 1884
 109. *tessellatus* FOURCROY, 1785
 G. *Abemus* MULSANT/REY
 110. *chloropterus* PANZER, 1796
 G. *Emus* LEACH
 111. *hirtus* LINNÉ, 1758
 G. *Platydracus* THOMSON
 112. *fulvipes* SCOPOLI' 1763
 113. *stercorarius* OLIVIER, 1794
 114. *chalcocephalus* FABRICIUS, 1801
 115. *latebricola*, GRAVENHORST, 1806
 G. *Staphylinus* LINNÉ
 116. *erythropterus* LINNÉ, 1758
 117. *dimidiaticornis* GEMMINGER, 1851
 118. *caesareus* CEDER, 1798
 G. *Ocypus* LEACH
 119. *chevolati* BAUDI, 1848
 120. *bicharicus* MÜLLER, 1925
 121. *ophthalmicus* SCOPOLI, 1763
 122. *similis* FABRICIUS, 1792
 123. *brunnipes* FABRICIUS, 1871
 124. *integer* ABEILLE, 1900
 125. *tenebricosus* GRAVENHORST, 1846
 126. *macrocephalus* GRAVENHORST, 1802
 G. *Pseudocypus* MULSANT/REY
 127. *fulvipennis* ERICHSON 1839-40
 128. *piscipennis* FABRICIUS, 1792
 129. *mus* BRULLÉ, 1832

130. *aenocephalus* De GEER, 1774
 G. *Tasgius* STEPHENS
 s.G. *Paratasgius* JARRIGE
 131. *ater* GRAVENHORST, 1802
 s.G. *Tasgius* s. str.
 132. *pedator* GRAVENHORST,
 1802
 G. *Alapsodus* TOTTENHAM
 s.G. *Allocypus* COIFFAIT
 133. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
 s.G. *Alapsodus* s. str.
 134. *compressus* MARCHAM, 1802
 G. *Metocypus* COIFFAIT
 135. *globulifer* GEOFFROY apr.
 FOURCROY, 1785
 G. *Creophilus* MANNERHEIM
 136. *maxillosus* LINNÉ, 1758
- Tr. *Quedini*
 G. *Quedius* STEPHENS
 s.G. *Microsaurus* STEPHENS
 137. *fulgidus* FABRICIUS, 1787
 138. *ochripennis* MENET, 1835
 139. * *aetholicus* KRAATZ, 1858 -
 Valtschitran, Umgebung Ple-
 vener, 14.V.1983, ein ♂,
 leg. RAITSCHEV
 140. *infuscatus* ERICHSON, 1840
 141. *burechi* COIFFAIT, 1971
 142. *scitus* GRAVENHORST,
 1806
 143. *maurus* SAHLBERG, 1834
 144. *cruentus* OLIVIER, 1794
 145. *mesomelinus* MARSHAM,
 1802
 146. *lateralis* GRAVENHORST,
 1802
 147. *xanthopus* ERICHSON,
 1839
 s.G. *Distichalius* CASEY
 148. *punctatellus* HEER, 1839
 149. *cinctus* PAYKUUL, 1790
 s.G. *Quedius* s. str.
 150. *curtipennis* BERNHAUER,
 1908
151. *meridio-carpaticus* SMETANA,
 1958
 152. *tristis* GRAVENHORST, 1802
 153. *fuliginosus* GRAVENHORST,
 1802
 s.G. *Quediops* COIFFAIT
 154. *scintillans* GRAVENHORST,
 1806
 155. *riparius* KELLNER, 1843
 s.G. *Quedionuchus* SHARP
 156. *plagiatus* MANNERHEIM, 1843
 s.G. *Sauridus* MARCHAM
 157. * *pseudonigriceps* RIETTER,
 1909 Gebirge Rilla, Bistritza,
 11.VII.1981, 5 ex., leg. S.ABEVA
 158. *nemoralis* BAUDI, 1848
 159. *obscuriceps* COIFFAIT, 1967
 160. *decui* COIFFAIT, 1963
 161. *cochaeus* EPELSHEIM, 1888
 162. *illyricus* WENDELER, 1928
 163. *cyanescens* MULSANT/REY,
 1875
 164. *dubius* HEER, 1834
 165. *cincticollis* KRAATZ, 1856
 166. *pyrinaeus* BRISOUT, 1863
 167. *balcanicus* BERNHAUER,
 1908
 168. *schipcanus* SCHEERPELTZ,
 1937
 169. *bulgaricus* SCHEERPELTZ,
 1937
 170. *ochropterus* ERICHSON,
 1839-40
 171. *troglophilus* COIFFAIT, 1969
 172. *ponteuxinus* COIFFAIT, 1970
 173. *obscuripennis* BERNHAUER,
 1900
 174. *limbatus* HEER, 1834
 175. *fumatus* STEPHENS, 1832
 176. *georgievi*, 1967
 177. *suturalis* KIESENWETTER,
 1845 (*umeralis* auct. nec
 STEPHENS)
 178. *obliteratus* ERICHSON,
 1839-40

179. *umbrinus* ERICHSON,
1839-40
180. *picipes* MANNERHEIM, 1830
s. G. *Raphirus* THOMSON
181. *collaris* ERICHSON,
1839-40
182. *boopoides* MUNSTER, 1922
183. *boops* GRAVENHORST, 1802
184. *fulvicollis* STEPHENS, 1932
185. *rodopianus* COIFFAIT, 1971
186. *insensus* SMETANA, 1959
187. *asturicus* BERNHAUER, 1918
188. *semiobscurus* MARCHAM,
1802
189. *scribae* GANGLBAUER,
1895
- G. *Velleiopsis* FAIRMAIRE
190. *marginiventris* FAIRMAIRE,
1882
- G. *Astrapaeus* GRAVENHORST
191. *ulmi* ROSSI, 1790
- G. *Heterothops* STEPHENS
192. *quadripunctula* GRAVENHORST
1806
193. *dissimilis* GRAVENHORST,
1802
- III. Subfam. *Paederinae*
- G. *Paederidus* MULSANT/REY
194. *ruficollis* FABRICIUS, 1781
(*gemellus* KRAATZ, 1856)
195. *rubrothoracicus* GOEZE, 1977
- G. *Paederus* FABRICIUS
196. *limnophilus* ERICHSON,
1839-40
197. *schönheri* CZWALINA, 1889
198. *fuscipes* CURTIS, 1823
199. *caligatus* ERICHSON,
1839-40
200. *litoralis* GRAVENHORST,
1802
201. *riparius* LINNÉ, 1758
(*gregarius* SCOPOLI, 1758)
202. *baudi* FAIRMAIRE, 1859
203. *brevipennis* BOISDUVAL/
LACCORDER, 1855
- G. *Achenium* LEACH
204. *depressum* GRAVENHORST,
1802
205. *scimbaloides* KOCH, 1937
206. *humille* NICOLAI, 1822
- G. *Scimbalium* ERICHSON
207. *anale* NORDMAN, 1836
(*planicolle*, ERICHSON, 1937)
- G. *Lobrathium* MULSANT/REY
208. *meridionale* KORGE, 1971
209. *bureschi* SCHEERPELTZ, 1937
210. *apicale* BAUDI, 1857
- G. *Tetartopeus* CZWALINA
211. *angustatus* BOISDUVAL/
LACCORDER, 1835
212. *terminatum* GRAVENHORST,
1802
- G. *Lathrobium* GRAVENHORST
213. *brunnipes* FABRICIUS, 1792
214. *laevipenne* HEER, 1938
215. *furcatum* czwalina, 1888
216. *taxi* BERNHAUER, 1902
217. *filiforme* GRAVENHORST,
1806
218. *elongatum* LINNÉ, 1767
219. *fulvipenne* GYLLENHEL, 1813
220. *longulum* GRAVENHORST,
1802
221. *leonardi* BREIT, 1912
- G. *Medon* STEPHENS
222. *brunneus* ERICHSON, 1837
223. *fuscus* MANNERHEIM, 1830
224. *coriaceus* COIFFAIT, 1969
225. *bulgaricus* COIFFAIT, 1970
226. *umbilicatus* COIFFAIT, 1970
- G. *Hypomedon* MULSANT/REY
- 227.* *fallax* LOKAY, 1919 - Bochet,
Umgebung Plevener, 22.VI.1983,
8 ex., leg. RAITSCHEV
228. *melanocephalus* FABRICIUS,
1792
- G. *Luzea* BLACKWELDER
229. *nigritula* ERICHSON,
1839-40

- G. *Dolicaon* CASTELNAU
(*Leptobium* CASEY)
230. *bigutulus* BOISDUVAL/
LACCORDER, 1835
G. *Pseudomedon* MULSANT/REY
231. *obsoletum* NORMAN, 1836
G. *Scopaeus* ERICHSON
232.* *gracilis* SPERK, 1835 -
Persina, Umgebung Beleneer,
(Dunai), 16.VII.1983, 12 ex.,
leg. RAITSCHEV
233. *laevigatus* GYLLENHAL, 1827
234. *minutus* ERICHSON, 1839-40
235. *minus* ERICHSON, 1839-40
236. *ectypus* COIFFAIT, 1971
237. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
- G. *Astenus* STEPHENS
238. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
239. *filiformis* LATREILLE, 1806
240. *gracilis* PAYKULL 1789
G. *Stilicus* BERTHOLD
241. *similis* ERICHSON, 1837
242. *subtilis* ERICHSON, 1839-40
243. *orbiculatus* PAYKULLE, 1789
244. *rufipes* GERMAR, 1836
245. *erichsoni* FAUVEL, 1867
G. *Cryptobium* MANNERHEIM
246. *fracticorne* PAYKULLE, 1789
- IV. Subfam. *Euasthetinae*
G. *Euasthetus* GRAVENHORST
247. *ruficapilis* BOISDUVAL/
LACCORDER, 1835

Literatur

- COIFFAIT, H., 1972: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., II, Toulouse, t. I, 651 pp.
- COIFFAIT, H., 1974: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., III, Toulouse, t. II, 593 pp.
- COIFFAIT, H., 1978: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., VI, Toulouse, t. III, 364 pp.
- COIFFAIT, H., 1982: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., VII, Toulouse, t. IV, 440 pp.
- COIFFAIT, H., 1984: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., VIII, Toulouse, t. V, 424 pp.
- RAITSCHEV, I., 1979: Des nouveaux Staphylinides rares de la Bulgarie. (*Coleoptera, Staphylinidae*). Acta Zool. bulg., 13: 81-84.
- RAITSCHEV, I., 1982: Envers la recherche des Staphylinides du tribus *Philonthini* COIFF. (*Col., Staphylinidae*) de la Bulgarie Moyene du Nord. Bull. des musees de la Bulgarie Nord-Ouest, t. 7; 252-259.
- RAITSCHEV, I., 1984: Nouveaux staphylinides de la Bulgarie. (*Col., Staphylinidae*). Acta zool. bulgarica, 24, sous presse.

- RAMBOUSEK F., 1909: Sur les staphylinides de Bulgarie. Vestnik Kral. Cesk. spol. nauk v Prahe, 2(4): 1-23.
- SCHEERPELTZ, O., 1937: Wissen. Ergeb. einer von H. Hofrat F. SCHUBERT, seinem Sohne H. cand. phil. F. SDHUBERT und H. Prof. Ing. K. MANDL im Sommer 1935-36 nach Bulgarien unternommenen Studienreise. *Col., Staphylinidae*. Rev. de la Inst. d'Hist. Natur. Sofia, 10: 283-292.

Anschrift des Verfassers:

Ivan M. RAITSCHEV
5800, Pleven, BG
boul. St. Zaimov 3
Muzeum Histor. Departam., sect. Nature
Bulgarie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [2_1986](#)

Autor(en)/Author(s): Raitschev Ivan M.

Artikel/Article: [Systematische Liste und Synonymik der bulgarischen Staphylinidae s. str. \(Coleóptera\) 329-335](#)