

Atalanta (April 1985) 16: 114-157, Würzburg, ISSN 0171-0079

Zweiter Beitrag zur Heterocerenfauna (Lepidoptera)
Griechenlands

von

HERMANN HACKER und GEORG DERRA

Eingegangen am 15. II. 1984

Die Lepidopterenfauna, insbesondere die Noctuidenfauna Griechenlands ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nur sehr mangelhaft erforscht. Demzufolge ist auch die Zahl der bisher bekannten Arten mit 390 nur sehr gering. GANEV (1982) gibt für Bulgarien 581 Noctuiden-Arten an. In Anbetracht der geographischen Lage und der Tatsache, daß nur wenige Arten, die in Bulgarien oder Jugoslawisch-Mazedonien vorkommen, in Griechenland fehlen dürften, sind 630 bis 650 potentiell vorhandener Arten sicherlich nicht zu hoch gegriffen.

In dieser Arbeit werden die Ausbeuten und Beobachtungen folgender Entomologen aus Griechenland ausgewertet und aufgelistet:

H. BECK D-6500 Mainz, G. BEHOUNEK D-8024 Deisenhofen, H. BOBITS A-1210 Wien, W. BROSKUS D-6507 Ingelheim/Rh., G. DERRA D-8600 Bamberg, TH. GRÜNEWALD D-8300 Landshut, H. HACKER D-8623 Staffelstein, K. HEUBERGER D-8400 Regensburg, L. KOBES D-3400 Göttingen, R. SCHÜTZ D-8300 Landshut, L. WEIGERT D-8399 Griesbach.

Allen, die Listen bereitstellten sowie Einblick in die jeweiligen Sammlungen gewährten, sei herzlich gedankt. Gedankt sei auch Herrn TH. WITT, D-8000 München und Herrn W. WOLF, D-8589 Bindlach für die Bestimmung der "Bombyciden" bzw. Geometriden der Ausbeute der Verfasser vom Oktober 1982, sowie den Herren W. DIERL und F. KASY, die die Arbeit in den Beständen der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM) und der Lepidopterensammlung des Naturhistorischen Museums in Wien (NHMW) möglich machten und unterstützten.


Zusammenfassung der Ergebnisse:

Eine Art, *Megalodes eximia* (FREYER, 1845) wird erstmalig für Europa in Griechenland nachgewiesen.

Insgesamt 56 Noctuidenarten werden erstmalig für Griechenland angeführt. Die Zahl der nachgewiesenen Noctuidenarten erhöht sich dadurch auf 447.

Im einzelnen sind dies:

1. *Euxoa glabella* WAGNER, 1930
2. *Ochropleura signifera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3. *Ochropleura candelisequa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
4. *Ochropleura plecta* (LINNÉ, 1761)
5. *Nocuta orbona* (HUFNAGEL, 1766)



- ▲ DERRA/HACKER
- ▲ BOBITS
- GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT
- BROSZKUS
- BEHOUNEK
- sonstige

Darstellung der
Fundplätze

6. *Noctua tirrenica* BIEBINGER, SPEIDEL & HANIGK, 1983
7. *Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
8. *Xestia castanea* (ESPER, 1796)
9. *Mesogona acetosellae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
10. *Heliophobus reticulata* (GOEZE, 1781)
11. *Hadena compta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
12. *Hadena laudeti* (BOISDUVAL, 1840)
13. *Hadena drenowskii* (REBEL, 1930)
14. *Egira conspicillaris* (LINNÉ, 1758)
15. *Mythimna prominens* (WALKER, 1856)
16. *Cucullia lychnitis* (RAMBUR, 1833)
17. *Episema korsakovi* (CHRISTOPH, 1885)
18. *Lithophane semibrunnea* (HAWORTH, 1809)
19. *Dichonia convergens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
20. *Antitype chi* (LINNÉ, 1758)
21. *Ammoconia caecimacula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
22. *Conistra vaccinii* (LINNÉ, 1761)
23. *Agrochola lota* (CLERCK, 1759)
24. *Agrochola nitida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
25. *Agrochola helvola* (LINNÉ, 1758)
26. *Agrochola thurneri* BOURSIN, 1953
27. *Agrochola wolfschlägeri* BOURSIN, 1953
28. *Xanthia gilvago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
29. *Acronicta megacephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
30. *Acronicta auricoma* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
31. *Pyrois cinnamomea* (GOEZE, 1781)
32. *Rusina ferruginea* (ESPER, [1785])
33. *Trachea atriplicis* (LINNÉ, 1758)
34. *Euplexia lucipara* (LINNÉ, 1758)
35. *Phlogophora scita* (HÜBNER, 1790)
36. *Enargia ypsilon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
37. *Cosmia trapezina* (LINNÉ, 1758)
38. *Apamea anceps* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
39. *Apamea sordens* (HUFNAGEL, 1766)
40. *Celaena leucostigma* (HÜBNER, [1809])
41. *Archana dissoluta* (TREITSCHKE, 1825)
42. *Amphipoea oculea* (LINNÉ, 1761)
43. *Rhizedra lutosa* (HÜBNER, [1803])
44. *Hoplodrina blanda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
45. *Caradrina susianja* MENTZER, 1981
46. *Haemerosia renalis* (HÜBNER, [1813])
47. *Melicleptria cognata* (FREYER, 1839)
48. *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)

49. *Pseudozarba bipartita* (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)
50. *Earias chlorana* (LINNÉ, 1761)
51. *Earias vernana* (HÜBNER, [1799])
52. *Abrostola agnorista* DUFAY, 1956
53. *Colobochyla salicalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
54. *Thria robusta* WALKER, [1858]
55. *Paracolax derivalis* (HÜBNER, 1796)
56. *Hypena rostralis* (LINNÉ, 1758)

Axia nesiota REISSER, 1962, wird erstmalig für das europäische Festland nachgewiesen. Bisher war sie nur von Kreta bekannt. De FREINA und WITT (1983) trennen sie artlich von der nordafrikanischen *Axia voulogeri* STGR.

Summary

This report contains new records of Heterocera, especially Noctuidae, of Greece. It includes one species [*Megalodes eximia* (FREYER, 1845)] new to the European Fauna, 56 species (specified on page 1-3) found for the first time to the fauna of Greece. By this the number of Greek Noctuidae is increasing from 390 to 447.

Axia nesiota REISSER, 1962 (bona spec.) only known from Crete, is found for the first time on the European continent.

Standfussiana defessa (LEDERER, 1858) and *Parascotia detersa* (STAUDINGER, 1891) both known from Crete, are checked by genitalia, furthermore the male genitalia of four of the Mediterranean *Parascotia*-species are figured.

Trotz der Fülle neuer Fundorte für einzelne Arten und des Nachweises von 57 neuen Arten ist die Noctuidenfauna Griechenlands noch längst nicht erforscht. Insbesondere die Hochgebirge und die Schilfgebiete in versumpften Deltas bergen mit Sicherheit noch eine große Zahl interessanter Arten. Weiterhin müßten die Monate März bis Mai sowie September bis Dezember und die Wintermonate gründlicher erforscht werden. Der Übergangscharakter der griechischen Fauna zur kleinasiatischen Fauna dürfte weiterhin durch viele kleinasiatische Arten, die auf den griechischen Inseln nahe der türkischen Küste vorkommen, dokumentiert werden. Von dort liegen mit geringen Ausnahmen nur Tagaufsammlungen vor. Auch Kreta dürfte noch manch interessante Art bergen, obwohl die Insel von REISSER und MALICKY bereits relativ gründlich durchforscht wurde.

Aus diesen Gründen wird die Erstellung einer Noctuiden-Fauna noch Jahre beanspruchen.

In der folgenden Aufstellung werden alle neuen Funde von insgesamt 310 Noctuiden-, 23 "Bombyciden"- und 67 Geometridenarten aufgelistet.

1. *Euxoa temera* (HÜBNER, [1803])

Peloponnes, Tripolis, 5.X.1982; Mykene, 4.X.1982; Tayetos-Gebirge, 1300 m,

Langada-Paß, 7.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, Vorisia, Varvara, Maronia, Pefkos, vom 12.-17.X.1982 überall einzeln, Mittelgriechenland, Delphi, 500 m, 19.X.1982 (alle 13 Fundorte leg. DERRA/HACKER). Die Art ist in Griechenland allgemein verbreitet.

2. *Euxoa glabella* WAGNER, 1930

Griech. Mazedonien, Konitza, 11.VII.1981 (leg. KIRSCH, coll. et det. HACKER). Erstfund für Griechenland.

3. *Euxoa cos* (HÜBNER, [1824])

Gythion, 11.X.1982; Kreta, Pefkos, 17.X.1982 (leg. DERRA), Tayetos-Geb., 1400 m, 7.X.1982 (leg. WEIGERT).

4. *Agrotis cinerea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Griech. Mazedonien, Menikion-Gebirge, Umgebung Kehrakambos, 14.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

5. *Agrotis spinifera* (HÜBNER, [1808])

Kreta, Iraklion (GRÜNEWALD); N-Griechenland, Karia, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Griech. Mazedonien, Disron-Gebirge, Umgebung Terpilos, 300 m, 22.V.1982 und Kilkis, 21.V.1982 (beide leg. BEHOUNEK); Mittel-Griechenland, Delphi, 19.X.1982; Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Kreta, Chora Sohakion, 12.X.1982; Vorisia, Ida-Geb., 13.X.1982; Ost-Kreta, Maronia, 200 m, 16.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER); N-Griechenland, Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSKUS).

6. *Agrotis segetum* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 5.X.1982, Tayetös-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 1400 m, 14.X.1982; Vaion, 20 m, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 500 m, 17.X.1982; Mittel-Griechenland, Delphi, 500 m, 19.X.1982 (alle 12 Fundorte leg. DERRA/HACKER); Griech. Mazedonien, Menikion-Geb., 650 m, Nea Zihni, 23.V.1982 und Thrakien, Rhodopen, Kirki, 200 m, 24.V.1982 (beide leg. BEHOUNEK).

7. *Agrotis exclamationis* (LINNÉ, 1758)

Lithochoron (Olymp), 31.V.1962 (leg. HEUBERGER); N-Griechenland, Karia, 1.VII.–18.VII.1980 (leg. BOBITS); Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis 21.V.1982 und Menikion-Geb.; Nea Zihni, 650 m, 23.V.1982 (beide leg. BEHOUNEK).

8. *Agrotis trux* (HÜBNER, [1824])

Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 5.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 500 m, 17.X.1982; Mittel-Griechenland, Delphi

19.X.1982; N-Griechenland, Metamorphosis, 200 m, 21.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER).

Auf Kreta herrscht die buntre f. *amasina* STAUDINGER, 1901 vor, der aber nicht der Rang einer Unterart zukommen kann, da unter den Tieren auch immer wieder völlig normal gefärbte und gezeichnete beobachtet werden können.

9. *Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766)

Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 5.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Mittel-Griechenland, Delphi, 19.X.1982; N-Griechenland, Metamorphosis, 21.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER); Griech. Mazedonien, Menikion-Geb., Agriani, 650 m, 15.VI.1982 (leg. BEHOUNEK); N-Griechenland, Karia, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Lithochoron (Olymp) 31.V.1962 (leg. HEUBERGER).

Die fünf letztgenannten Arten sind mit Sicherheit in Griechenland und auf den Inseln überall verbreitet.

10. *Agrotis puta* (HÜBNER, [1824])

Griech. Mazedonien, Kavala (leg. GRÜNEWALD), Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 5.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Mittelgriechenland, Delphi, 19.X.1982 (alle 13 Fundorte leg. DERRA/HACKER); Lithochoron (Olymp), 23.IV.1973; Delphi, 500-800 m und Parnass, Arachova, 900-1200 m, 24.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS).

11. *Agrotis crassa* (HÜBNER, [1803])

Marathon, iX.1980 (coll. BEHOUNEK); Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 5.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER).

Karia, Olymp, 700 m, 15.VII.-11.VIII.1974 (leg. ARENSBERGER, coll. ZSM). Die griechischen Tiere gehören zur f. *golickei* ERSCHOV, 1872. Die Art unterliegt aber gerade in Süd-Europa einer großen Variationsbreite, so daß der Form nicht der Status einer Unterart zukommt.

12. *Actinotia hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mazedonien, Disron-Geb., 300 m, Pontokerassea, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Delphi, 1982 (leg. GRÜNEWALD); Larissa, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS); Lianokladia, 24.VI.1964 (leg. HEUBERGER).

Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Chora Sphakion, 12.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER); Lithochoron (Olymp), 23.IV.1973; Delphi, 500-800 m und Parnass, Arachova, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS).

13. *Ochropleura forcipula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

N-Griechenland, Vevi, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Parnass, 500 m, 12.VI.1981, (leg. WEIGERT); ebenfalls Parnass, 1982 (GRÜNEWALD).

Die ssp. *helladica* (REBEL, 1905) (REBEL I.c.) für die griechischen Tiere ist möglicherweise berechtigt. Eine Revision für die sehr polytypisch erscheinende Art wäre aber dringend nötig.

14. *Ochropleura gracilis* (WAGNER, 1929)

Parnass, 1600 m, 12.VIII.1982 in Anzahl (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ), Parnass, 13.VII.1980 (leg. DUFAY, coll. KOBES).

DUFAY beschrieb 1983 für die Tiere vom Parnass und Chelmos-Gebirge die ssp. *etoliae*. *Ochropleura gracilis* kommt in Europa bisher nur in diesen beiden Gebirgszügen vor, wird aber am Peloponnes, in Mittel-Griechenland und vermutlich auch am Olymp in ähnlichen Höhen noch zu finden sein.

15. *Ochropleura signifera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Parnasse, 1100 m, Mitte VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

Erster Nachweis für Griechenland.

16. *Ochropleura candelisequa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

N-Griechenland, Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

Ebenfalls Erstnachweis für Griechenland.

17. *Ochropleura leucogaster* (FREYER, 1831)

Lithochoron (Olymp), Mitte X. 1966 (leg. ARENSBERGER, coll. ZSM), ebenfalls Lithochoron, 14.VI.1962 und 19.VI.1963 (leg. HEUBERGER), Peloponnes, Messini, 8.X.1982 und Kalamata, 9.X.1982 (leg. DERRA/HACKER), Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982 und Vaion, 15.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); N-Griechenland, Meteora-Klöster, 5.X.1973 (leg. BROSZKUS); Chelmos-Geb., Mega Spileion, 16.VI.1968 (coll. BEHOUNEK), Olymp, 700 m (leg. GRÜNEWALD).

18. *Ochropleura plecta* (LINNÉ, 1761)

Mazedonien, Menikion-Geb., Kehrakambos, 500 m, 14.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

Die holarktisch verbreitete und in Mitteleuropa überall häufige Art wird nach Süden zu immer seltener und im Mittelmeerraum weitgehend von der vorigen abgelöst, ohne daß sich beide Arten ausschließen würden. Da aus der Literatur für Griechenland bisher keine Funde bekannt wurden, muß der angegebene Fund als Erstnachweis gelten. Möglicherweise wurde der Art bisher auch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aus allen Nachbarländern einschließlich der europäischen und asiatischen Türkei ist sie bekannt, wenn auch erst wenige Nachweise vorliegen.

19. *Standfussiana defessa* (LEDERER, 1858)

Ein Männchen der ssp. *sturanyi* (REBEL, 1906) aus Kreta (leg. REISSER, coll.

ZSM) wurde genitaliter überprüft (Gen. Präp. HACKER N 1416). Die Artzugehörigkeit zu *Standfussiana defessa* LED. steht außer Zweifel. Damit hat die Art eine ähnliche Verbreitung wie *Xestia palaestinensis* (KALCHBERG, 1897), *Mythimna herrichii* (HERRICH-SCHÄFFER, 1850), *Calophasia barthae* WAGNER, 1929, *Agrochola mansueta* (HERRICH-SCHÄFFER, 1850), *Caradrina pseudopertinax* (BOURSIN, 1939), *Acantholipes regularis* (HÜBNER, [1813]), *Parascotia detersa* (STAUDINGER, 1891) und *Rivula tanitalis* REBEL, 1912, insgesamt neun kleinasiatische Noctuidenarten, die für Europa nur von Kreta bekannt sind. Zwei Arten, nämlich *Allophyes cretica* PINKER & REISSER, 1978 und *Cucullia minogenica* REBEL, 1916 sind endemisch auf Kreta, während Griechenland mit *Stilbina olympica* DIERL & POVOLNY, 1970 und *Cryphia amygdalina* BOURSIN, 1963 ebenfalls zwei endemische Noctuidenarten beherbergt.

20. *Rhyacia lucipeta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Olymp, 1800 m, i.VII.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); N-Griechenland, Metamorphosis, 200 m, 21.X.1982 (leg. HACKER).

21. *Chersotis rectangula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

N-Griechenland, Karia, 29.VI.-18.VII.1980 (leg. BOBITS).

22. *Chersotis multangula* (HÜBNER, [1803])

In der ssp. *dissoluta* (STAUDINGER, 1901) aus Karia (N-Griechenland) vom 5.-31.VII.1981 (BOBITS).

23. *Chersotis margaritacea* (de VILLERS, 1789)

Parnass, 1600 m, Mitte VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

24. *Chersotis elegans* (EVERSMANN, 1837)

Ebenfalls Parnass, 1600 m, Mitte VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ). (Gen. det. HACKER, Präp. N. 1202).

25. *Chersotis cuprea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Olymp, 1800 m, 5.VII.-31.VII.1981 (BOBITS).

26. *Chersotis laeta* (REBEL, 1904)

Chersotis laeta (REBEL, 1904) ist eine gute Art und durch eine Reihe von Merkmalen sicher von *Chersotis fimbriola* (ESPER, 1798) zu trennen. Das Problem der Arttrennung und die Aufgliederung der Unterarten beider wird innerhalb einer "Revision der Gattung *Chersotis* BOISDUVAL, 1840" (HACKER und VARGA, in Bearbeitung) geklärt. Auf dem griechischen Festland kommt *Chersotis laeta* RBL. in der ssp. *achaiana* THURNER, 1967, auf Kreta in der ssp. *cretica* HACKER & VARGA (in litt.) vor.

Olymp, 700 m, 11.VI.1981 (leg. SCHÜTZ).

27. *Noctua pronuba* (LINNÉ, 1758)

Lithochoron (Olymp), 31.V.1962 (HEUBERGER); S-Peloponnes, Sidirokastron bei Gythion, 600 m, 10.X.1982 und Gythion, 11.X.1982 (DERRA/HACKER).

28. *Noctua orbona* (HUFNAGEL, 1766)
Lithochoron, 31.V.1962 (leg. HEUBERGER).
Erstnachweis für Griechenland.
29. *Noctua comes* (HÜBNER, [1813])
Delphi (GRÜNEWALD), Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982 (DERRA/HACKER).
30. *Noctua tirrenica* BIEBINGER, SPEIDEL & HANIGK, 1983
Peloponnes, Tripolis, 6.X.1983 (leg. HACKER), (Gen. Präp. HACKER N 1523); Peloponnes, Zachlorou, 15.-30.VI.1952 (leg. THURNER, coll. ZSM); Peloponnes, Kalavryta, 5.-12.VI.1958 (leg. THURNER, coll. ZSM), (Gen. Präp. HACKER N 1622 und 1623). Alle bisher aus Griechenland genitaliter untersuchten Tiere gehören zu der neuen Art. *Noctua fimbriata* SCHREBER ist aber aus Jugosl. Mazedonien und Bulgarien bekannt (gen. det. HACKER), so daß sie auch in Griech. Mazedonien vorkommen dürfte.
31. *Noctua janthina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lithochoron, 25.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Gythion, 11.X.1982 (DERRA/HACKER).
32. *Noctua interjecta* (HÜBNER, [1803])
N-Griechenland, Karia, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS); Peloponnes, Mega Spileon und Olymp, 700 m (beide GRÜNEWALD/SCHÜTZ).
33. *Noctua haywardi* (TAMS, 1926)
Olymp, 100 m, Aug. 1982 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ; N-Griechenland, Karia, 29.VI.-18.VII.1980, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Parnass (Mitt. KOBES, leg. DUFAY).
34. *Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lithochoron, 27.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Karia, 5.VII.-31.VII.1981 (leg. BOBITS); Parnass, 1600 m, Mitte VIII. 1982 und Peloponnes, Mega Spileon (beide GRÜNEWALD/SCHÜTZ).
35. *Peridroma saucia* (HÜBNER, [1808])
Lithochoron, 2.VI.1962 und 20.VI.1963 (leg. HEUBERGER); Karia 29.VI.-18.VII.1980 (leg. BOBITS); Parnass, 1600 m, 13.VIII.1982, (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Peloponnes, Archadokambos, 700 m, 5.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER); Lithochoron, 23.IV.1973 und Delphi, 500-800 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSKUS).
36. *Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
N-Griechenland, Karia, 5.VII.-42.VII.1981 (leg. BOBITS).
Neu für Griechenland.

37. *Xestia c-nigrum* (LINNÉ, 1758)

Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS).

38. *Xestia ashworthii* (DOUBLEDAY, 1855)

In der ssp. *candalarum* (STAUDINGER, 1871) aus Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS). Aus Griechenland bisher nur von TOULECHKOFF (1951), ebenfalls aus dem Olymp-Gebiet, gemeldet.

39. *Xestia castanea* (ESPER, 1796)

In der ssp. *neglecta* (HÜBNER, [1803]): Tayetos-Gebirge, 1300 m, 7.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

Neu für Griechenland.

40. *Xestia xanthographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775])

Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Sidirokastron bei Gythion, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982 (leg. DERRA/HACKER) (det. HACKER).

41. *Xestia cohaesa* (HERRICH-SCHÄFFER, 1845)

Die Art war vom 4.-24.X.1982 an allen Plätzen vertreten. Die Aufzählung der Fundplätze ist gleichzeitig eine Aufzählung der Leuchtplätze:

Peloponnes: Mykene, 150 m, 4.X.; Achadokambos, 700 m, 5.X.; Tripolis, 700 m, 6.X.; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.; Kalamata, 150 m, 9.X.; Sidirokastron bei Gythion, 600 m, 10.X.; Gythion, 50 m, 11.X.

Kreta: Chora Sphakion, 600 m, 12.X.; Vorisia, 600 m, 13.X.; Varvara, 1400 und 1000 m, 14.X.; Vaion, 20 m, 15.X.; Maronia, 200 m, 16.X.; Pefkos, 500 m, 17.X.

Mittel-Griechenland: Delphi, 500 m, 19.X.

Nord-Griechenland: Metamorphosis, 20 km NE Polykastron, 200 m, 21.X.

Meist häufig, insbesondere am Peloponnes und auf Kreta (alle leg. DERRA/HACKER) (det. HACKER).

42. *Mesogona acetosellae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Metamorphosis (N-Griechenland), 21.X.1982 (leg. HACKER).

Neu für Griechenland.

Die f. *pallida* (DANNEHL, 1929), zu der auch die Tiere am Balkan gehören, kommt einzeln bereits im Südalpenraum vor. Die von CALLE (1981) beschriebene ssp. *segoviensis* aus Spanien bezeichnet ebenfalls diese helle Form.

43. *Discestra marmorosa* (BORKHAUSEN, 1792)

Olymp, 1800 m, 1.VII.-18.VII.1980 (leg. BOBITS).

44. *Discestra mendax* (STAUDINGER, 1879)

Lithochoron, 1.VI.1962, 4.VI.1962 (leg. HEUBERGER); Mazedonien, Menikion-Geb., Agriani, 650 m, 15.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

45. *Discestra trifolii* (HUFNAGEL, 1766)

Karia, 29.VI.-18.VII.1980 (BOBITS); Parnass, Delphi, 500-800 m, 23.IV.-4.V. 1973 (leg. BROSKUS); Gythion, 11.X.1982; Sidirokastron bei Gythion, 10.X. 1982 (beide DERRA/HACKER).

46. *Discestra stigmosa* (CHRISTOPH, 1887)

Marathon, 20.IX.1980 (coll. BEHOUNEK).

47. *Hada nana* (HUFNAGEL, 1766)

Karia, 5.-31.VII.1980 (BOBITS).

48. *Pachetra sagittigera* (HUFNAGEL, 1766)

Olymp, 1800 m, 8.-13.VII.1982 (leg. BOBITS).

49. *Heliothobus reticulata* (GOEZE, 1781)

Olymp, 1800 m, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS).
Neu für Griechenland.

50. *Mamestra w-latinum* (HUFNAGEL, 1766)

Mazedonien, Menikion-Geb., Nea Zihni, 650 m, 23.V.1982 und Kehrakambos, 500 m, 14.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

51. *Mamestra oleracea* (LINNÉ, 1758)

Mazedonien, Disron-Geb., Terpilos, 22.V.1982 und Menikion-Geb., Nea Zihni, 650 m, 23.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS).

52. *Mamestra bicolorata* (HUFNAGEL, 1766)

Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis, 200 m, 21.V.1982 und Menikion-Geb., Kehrakambos, 500 m, 14.VI.1982 (leg. BEHOUNEK) (Gen. det. HACKER); Karia, 29.VI.-18.VII.1980 (leg. BOBITS).

Die nahe verwandte *Mamestra corsica* (RAMBUR, 1832) konnte bisher in Griechenland noch nicht nachgewiesen werden.

53. *Mamestra dysodea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Karia, 29.VI.-18.VII.1980 (BOBITS); Parnass, 500 m, 12.VI.1981 (leg. WEIGERT); N-Griechenland, Florina, 850 m, 11.VI.1981 (leg. WEIGERT).

54. *Hadena perplexa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Parnass, 1100 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis, 200 m, 21.V.1982 und Pontokerasse, 300 m, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Delphi, 500-800 m, 25.IV.-4.V.1973 und Parnasse, 900-1200 m im gleichen Zeitraum; N-Griechenland, Meteora-Klöster, 5.V.1973 (alle leg. BROSKUS).

55. *Hadena silenes* (HÜBNER, [1822])

Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis, 200 m, 21.V.1982, Pontokerasse, 300 m, 22.V.1982 und Menikion-Geb., Nea Zihni, 650 m, 23.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

Die Tiere zeigen bereits Übergänge zur f. (oder ssp.?) *variegata* (WAGNER, 1929). Diese ist keinesfalls eine gute Art sondern stellt nur die kleinasiatische Form der weitverbreiteten *silenes* HBN. dar. Im Genital zeigt sie oft Annäherungen zur spanischen *sancta* (STAUDINGER, 1859), die ebenfalls als Form (oder ssp.?) zu *silenes* HBN. zu stellen ist (HACKER, 1983).

56. *Hadena luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Parnass, 500-800 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Karia, 29.VI.-18.VII. 1980 (leg. BOBITS); Parnasse, 1100 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

57. *Hadena confusa* (HUFNAGEL, 1766)

Olymp, 700 m, 11.VI.1981 (leg. WEIGERT).

58. *Hadena comptula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Karia 5.VII.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

Erstfund für Griechenland.

59. *Hadena armeriae* (GUÉNÉE, 1852)

Delphi, 500-800 m und Arachova, Parnass, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); ebenfalls Parnass, 1100 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

60. *Hadena albimacula* (BORKHAUSEN, 1792)

Olymp, 1800 m, 8.-30.VII.1982 (BOBITS); Delphi, 500-800 m und Parnass, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS).

61. *Hadena laudeti* (BOISDUVAL, 1840)

Karia, 29.VI.-18.VII.1980 (leg. BOBITS); Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Terpilos, 100 m, 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

Neu für Griechenland.

62. *Hadena magnoliae* (BOISDUVAL, 1829)

N-Griechenland, Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Olymp, 1800 m, 1.-18.VII.1980 (BOBITS); Lithochoron, 25.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Olymp, 700 m, 11.VI.1981 (leg. WEIGERT); Parnass, 1100 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

63. *Hadena filigrama* (ESPER, 1788)

Lithochoron, 4.VI.1962 (leg. HEUBERGER); Griech. Mazedonien, Menikion-Geb., Nea Zihni, 650 m, 23.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

64. *Hadena drenowskii* (REBEL, 1930)

Olymp, 1800 m, 8.VII.-30.VII.1982 (leg. BOBITS).

Bemerkenswerter Neufund dieser pontomediterranen Art für Griechenland. Sie ist aus Bulgarien beschrieben und wurde auch in Jugoslaw. Mazedonien, Kleinasien und im Iran gefunden.

65. *Hadena caesia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Olymp, 1800 m, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS) in der ssp. *xanthophoba* (SCHA-

WERDA, 1922).

66. *Hadena urumovi* (DRENOWSKI, 1931)

Parnass, 1600 m, 13.VIII.1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

67. *Egira conspicillaris* (LINNÉ, 1758)

Delphi, 500-800 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS).

Neu für Griechenland.

68. *Mythimna ferrago* (FABRICIUS, 1787)

Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Sidirokastron bei Gythion, 10.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); Karia, 5.VII.-31.VII.1981 (BOBITS).

69. *Mythimna albipuncta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS); Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982; Pontokerassea, 22.V.1982; Thrakien, Rhodopen, Kirki, 200 m, 24.V.1982 und Menikion-Geb., Kehrakambos, 500 m, 14.VI.1982 (alle BEHOUNEK).

70. *Mythimna vitellina* (HÜBNER, [1808])

Von BEHOUNEK und BOBITS an den gleichen Plätzen wie die vorige; Lithochoron (HEUBERGER e.o.); Peloponnes, Mykene, 4.X.; Achadokambos, 5.X.; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.; Gythion, 11.X.; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.; Vorisia, 13.X.; Vaion, 15.X.; Maronia, 16.X.; Pefkos, 17.X.; N-Griechenland, Metamorphosis, 21.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER).

71. *Mythimna unipuncta* (HAWORTH, 1809)

Eine Aufzählung der Fundplätze dieser allgemein verbreiteten Art erübrigts sich. Sie wurde von allen Belegführenden von April bis Oktober gefunden.

72. *Mythimna riparia* (RAMBUR, 1829)

Gythion, 11.X.1982 (HACKER).

73. *Mythimna congrua* (HÜBNER, [1817])

Peloponnes, Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982 (DERRA/HACKER); Thrakien, Rhodopen, Kirki, 200 m, 13.VI.1982 und Disron-Geb., Terpilos, 100 m, 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

74. *Mythimna l-album* (LINNÉ, 1767)

Karia, 8.-30.VII.1982 (BOBITS); Peloponnes, Achadokambos, 5.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron bei Gythion, 10.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER).

75. *Mythimna sicula* (TREITSCHKE, 1835)

Kalamata, 9.X.1982; auf Kreta vom 12.-17.X. in Chora Sphakion, Vorisia, Varvara, Vaion, Maronia, Pefkos, jeweils einzeln (leg. DERRA/HACKER); Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis, Pontokerassea und Thrakien, Rhodopen, Kirki vom 21.-24.V.1982 sowie Rhodopen; Kirki, 13.VI.1982 (alle BEHOUNEK); Karia, 8.-30.VII.1982 (BOBITS); Olympia (GRÜNEWALD).

76. *Mythimna prominens* (WALKER, 1856)

Kalamata, 9.X.1982 und Gythion, 11.X.1982, insgesamt 1 ♂, 2 ♀♀ (leg. HACKER, Gen. Präp. HACKER N 1132).

Neu für Griechenland (s. auch HACKER, 1983).

77. *Mythimna putrescens* (HÜBNER, [1824])

Peloponnes, Achadokambos, 5.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER).

78. *Mythimna zeae* (DUPONCHEL, 1827)

Schilfgebiete bei Lamia, Mittel-Griechenland, 20.X.1982, 2 ♂♂ (leg. HACKER).

79. *Mythimna loreyi* (DUPONCHEL, 1827)

Für die Art gilt das gleiche wie bei Nr. 40, *X. cohaesa* H.-S.

80. *Cucullia wredowi* (COSTA, [1836])

Delphi, 500-800 m und Parnass, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Delphi, 16.III.1975 (leg. BECK), (Gen. det. HACKER, Präp. N 1101, 1103).

81. *Cucullia umbratica* (LINNÉ, 1758)

Griech. Mazedonien, Menikion-Geb., Kehrakambos, 650 m, 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

82. *Cucullia celsiae* HERRICH-SCHÄFFER, 1851

Delphi, 500-800 , und Parnass, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS).

83. *Cucullia thapsiphaga* (TREITSCHKE, 1826)

Parnass, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Olymp, 800 m, VII. 1981, Raupenfunde (BOBITS).

84. *Cucullia blattariae* (ESPER, 1796)

Parnass, 1100 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Parnass, Arachova, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Karia, VII. 1981, Raupenfunde (BOBITS); Lithochorон, VI. 1962 und VI. 1963, Raupenfunde (HEUBERGER).

85. *Cucullia lychnitis* (RAMBUR, 1833)

Lithochorон, 29.V.1969 (leg. LUKASCH, coll. ZSM), (det. HACKER).

Neu für Griechenland.

86. *Cucullia scrophulariae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Leptokaria, N-Griechenland, VII. 1981, Raupenfunde (BOBITS).

87. *Cucullia verbasci* (LINNÉ, 1758)

Parnass, Arachova, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1982 (leg. BROSZKUS); Leptokaria, VII. 1981, Raupenfunde (BOBITS).

88. *Calophasia lunula* (HUFNAGEL, 1766)

Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

89. *Calophasia platyptera* (ESPER, 1788)

Delphi, 25.IV.-4.V.1973 (BROSZKUS); Larissa, 1.-16.VII.1980 (BOBITS).

90. *Copiphana olivina* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)

Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Griech. Mazedonien, Disron-Geb., Kilkis, 22.V.1982 und Pontokerassea, 22.V.1982; Menikion-Geb., Kehrakambos, 14.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

91. *Copiphana lunaki* (BOURSIN, 1940)

Delphi (GRÜNWALD/SCHÜTZ), Peloponnes, Mega Spileon, 6.VI.1981 (leg. MÜHLE, coll. HACKER); Attika, Parnis Oros, 400 m, 23.V.1978 (leg. MÜHLE, coll. HACKER); Parnass, Delphi, 500-800 m, 25.IV.-4.V.1973 (BROSZKUS).

92. *Amephana dalmatica* (REBEL, 1919)

Jachloron, 20.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT); N-Griechenland, Florina, ~850 m, 11.VI.1981 (leg. WEIGERT); Delphi, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982 und Pontokerassea, 22.V.1982; Rhodopen, Kirki, 24.V.1982 und 13.VI.1982 (alle leg. BEHOUNEK).

93. *Omphalophana anatolica* (LEDERER, 1857)

Lithochorон, 2.VI.1962 (leg. HEUBERGER); Delphi, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

94. *Episema tersa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Peloponnes, Tripolis, 6.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (leg. DERRA/HACKER). Die Tiere vom Festland sind durchschnittlich größer als die von Kreta. Auf Kreta war die Art auf Felsheidebiotopen teilweise ausgesprochen häufig.

95. *Episema korsakovi* (CHRISTOPH, 1850)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Delphi, 19.X.1982 (leg. DERRA/HACKER/WEIGERT). Am ersten Biotop, einem Felsheidebiotop, war die Art nicht selten. Die Falter variieren erheblich in Färbung und Zeichnung. Neu für Griechenland.

96. *Episema scoriacea* (ESPER, 1789)

In einigen Tieren an den gleichen Plätzen wie die vorige.

97. *Leucoclaena muscosa* (STAUDINGER, 1891)

Achadokambos, 5.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982 (leg. DERRA/HACKER). Für Europa bisher nur von Kreta bekannt (REISSER, 1974).

98. *Ulochlaena hirta* (HÜBNER, [1813])

Metamorphosis, N-Griechenland, 21.X.1982, 1 ♂ (leg. HACKER).

99. *Lophoterges hoerhammeri* (WAGNER, 1931)

Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT), (Gen. Präp. HACKER N 1192); ebenfalls Delphi (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

100. *Aporophila australis* (BOISDUVAL, 1829)

Vom 4.-21.X.1982 an allen Plätzen vertreten (vergl. bei Nr. 41), teilweise in vielen Formen ausgesprochen häufig. Auf Kreta überwiegen sehr dunkle Tiere.

101. *Aporophila nigra* (HAWORTH, 1809)

Kreta, Varvara, 14.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Mittel-Griechenland, Lamia, 20.X.1982; Nord-Griechenland, Metamorphosis, 21.X.1982 (alle DERRA/HACKER).

102. *Scotochrosta pulla* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Sidirokastron bei Gythion, 10.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

Für Griechenland bisher nur von Kreta bekannt.

103. *Lithophane semibrunnea* (HAWORTH, 1809)

Ein ♂ in der helleren ssp. *wiltshirei* BOURSIN, 1962 aus Metamorphosis/Nord-Griechenland (Gen. Präp. HACKER N 1527). Neu für Griechenland. Die Art ist im östlichen Mittelmeerraum von Bulgarien, Kleinasien und dem Irak bekannt.

104. *Evisa schawerdae* REISSER, 1930

Sidirokastron bei Gythion, 10.X.1982, einzeln (leg. DERRA/HACKER). Für Süd-Ost-Europa bisher in einigen Tieren aus Jugosl. Mazedonien und aus Olympia (leg. LUKASCH) bekannt.

105. *Dryobota labecula* (ESPER, 1788)

Metamorphosis, 21.X.1982, häufig (DERRA/HACKER).

106. *Meganephria bimaculosa* (LINNÉ, 1767)

Metamorphosis, 21.X.1982, 1 ♀ (leg. HACKER).

107. *Allophyes oxyacantheae* (LINNÉ, 1758)

Peloponnes, Tripolis, 6.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA/HACKER). Die Tiere wurden genitaliter überprüft.

108. *Dichonia convergens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Sidirokastron bei Gythion, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Delphi, 19.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (alle DERRA/HACKER).

Erstnachweis für Griechenland.

109. *Dichonia aeruginea* (HÜBNER, [1808])

Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982

(leg. DERRA/HACKER).

110. *Lamprosticta culta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Disron-Geb., Pontokerasse, 300 m, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

111. *Dryobotodes carbonis* (WAGNER, 1931)

Vom 4.-21.X.1982 an allen Plätzen meist häufig vertreten (vergl. bei Nr. 41). (DERRA/HACKER).

112. *Dryobotodes tenebrosa* (ESPER, 1789)

Wie vorige Art.

113. *Dryobotodes eremita* (FABRICIUS, 1775)

Tayetos-Geb., 1400 m, 7.X.1982 (leg. WEIGERT).

Neu für Griechenland.

114. *Blepharita leuconota* (EVERSMANN, 1850)

Kalamata, 9.X.1982 (leg. HACKER).

115. *Blepharita solieri* (BOISDUVAL, 1840)

Mykene, 4.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Delphi, 19.X.1982; Lamia, 20.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

116. *Polymixis canescens* (DUPONCHEL, 1826)

Vom 4.-21.X.1982 eine der häufigsten Arten. Fundplätze vergl. bei Nr. 41.

117. *Polymixis polymita* (LINNÉ, 1761)

Zweiter Nachweis für Griechenland, nachdem die Art von LUKASCH am 30.IX. 1971 auch bei den Thermopylen gefunden wurde.

118. *Polymixis rufocincta* (GEYER, [1828])

Achadokambos, 5.X.1982; Kreta, Vervara, 1400 m, häufig am 14.X.1982 und einzeln am 17.X.1982 in Pefkos; Delphi, 19.X.1982, einzeln (leg. DERRA/HACKER).

119. *Polymixis bischoffi* (HERRICH-SCHÄFFER, 1845)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Mykene, 4.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X. 1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982, meist einzeln, in ausgesprochenen Felsheideformationen wie bei Achadokambos oder Chora Sphakion und Varvara auf Kreta auch häufig (leg. DERRA/HACKER).

120. *Antitype chi* (LINNÉ, 1758)

Mykene, 4.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982 (leg. DERRA/HACKER). Erstnachweis für Griechenland.

121. *Ammoconia caecimacula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA/HACKER). Neu für Griechenland.

122. *Ammoconia senex* (GEYER, [1828])

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982; Delphi, 19.X.1982; jeweils einzeln; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982, Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; überall sehr häufig in sehr verdunkelten Tieren (leg. DERRA/HACKER).

Die Population von Kreta wird auf Grund der auffallenden Genitalunterschiede von RONKAY und VARGA (in litt.) als gute Art abgetrennt.

123. *Conistra vaccinii* (LINNÉ, 1761)

Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. HACKER, WEIGERT). Erstnachweis für Griechenland. In den tiefer gelegenen und wärmeren Gegenden vermutlich später fliegend.

124. *Agrochola iota* (CLERCK, 1759)

Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. HACKER). Wie viele der sehr spät fliegenden Arten erstmals für Griechenland nachgewiesen.

125. *Agrochola gratiosa* (STAUDINGER, 1881)

Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982 (leg. HACKER, Gen. Präp. N 1512).

Zweiter Nachweis für Griechenland, nachdem die Art am 2.X.1976 von LUKASCH bei den Thermopylen überhaupt erstmalig für Europa nachgewiesen worden war.

126. *Agrochola mansueta* (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)

Kreta: Varvara, 1400 m, 14.X.1982 (leck. HACKER). Eine für Europa bisher nur von Kreta bekannte Art (REISSER, 1974).

127. *Agrochola nitida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Tripolis, 6.X.1982, 1 ♀ (leg. et det. HACKER).

Erstfund für Griechenland.

128. *Agrochola helvola* (LINNÉ, 1758)

Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

Ebenfalls neu für Griechenland.

129. *Agrochola thurneri* BOURSIN, 1953

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; jeweils einige Tiere (leg. DERRA, HACKER, WEIGERT), (Gen. Präp. HACKER N 1158, 1216). Neu für Griechenland. Bisher nur aus Jugoslaw. Mazedonien bekannt.

130. *Agrochola wolfschlägeri* BOURSIN, 1953

Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA). Wie die vorige aus Jugoslaw. Maze-

donien beschrieben und neu für die griechische Fauna.

131. *Agrochola lychnitis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Metamorphosis, 21.X.1982, häufig (DERRA/HACKER).

132. *Spudaea ruticilla* (ESPER, 1791)
Parnass, Arachova, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (BROSZKUS).
Neu für Griechenland.

133. *Xanthia gilvago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. HACKER). Ebenfalls neu für Griechenland.

134. *Xanthia cypreago* (HAMPSON, 1906)
Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Delphi, 19.X.1982; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); meist nur einzeln, auf Kreta zum Teil häufiger.

135. *Colocasia coryli* (LINNÉ, 1758)
Griech. Mazedonien, Menikion-Geb., Nea Zihni, 23.V.1982 (BEHOUNEK).

136. *Acronicta aceris* (LINNÉ, 1758)
Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS); Disron-Geb., Pontokerassea, 22.V.1982 und Rhodopen; Kirki, 24.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

137. *Acronicta megacephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982 und Pontokerassea, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK). Erstnachweis für Griechenland.

138. *Acronicta tridens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Disron-Geb., Terpilos, 22.V.1983 (leg. BEHOUNEK), (Gen. Präp. HACKER N 1109-1111).

139. *Acronicta psi* (LINNÉ, 1758)
Disron-Geb., Terpilos, 22.V.1983 (leg. BEHOUNEK). (Gen. Präp. HACKER N 1108, 1112, 1126). Vom gleichen Fundplatz liegen also je zur Hälfte Tiere von *tridens* und *psi* vor. Vom äußeren Aussehen her sind sie nicht sicher zu bestimmen. Zur sicheren Trennung beider Arten müssen alle Tiere genitaliter untersucht werden.

140. *Acronicta auricoma* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS).
Erstnachweis für Griechenland.

141. *Acronicta euphorbiae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lithochoron, 23.IV.1973 (leg. BROSZKUS); Menikion-Geb., Nea Zihni, 23.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

142. *Acronicta orientis* (MANN, 1862)

Disron-Geb., Terpiros, 22.V.1983 (leg. BEHOUNEK).

143. *Acronicta rumicis* (LINNÉ, 1758)

Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982; Terpiros, 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK); Lithochoron, 31.V.1962 (HEUBERGER); Messini, 8.X.1982 (leg. HACKER).

144. *Cryphia amygdalina* BOURSIN, 1963

Parnis Oros bei Athen, 1000 m, 16.VIII.1982 (leg. GRÜNEWALD), (Gen. Präp. HACKER N 1243). Eine der beiden in Griechenland endemischen Noctuidenarten.

145. *Cryphia ochsi* BOURSIN, 1941

Parnis Oros bei Athen, 1000 m, 16.VIII.1982 und Peloponnes, Mega Spileon, 15.VIII.1982 (leg. GRÜNEWALD), (Gen. Präp. HACKER N 1238, 1279).

146. *Cryphia algae* (FABRICIUS, 1775)

Karia, 7.-28.VII.1981 (leg. BOBITS); Jachloron, 22.VI.1964 (HEUBERGER).

147. *Cryphia ereptricula* (TREITSCHKE, 1825)

Olymp, 700 m (leg. SCHÜTZ), in der ssp. *hellenica* BOURSIN, 1962.

148. *Cryphia rectilinea* (WARREN, 1909)

Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD, SCHÜTZ, WEIGERT), (Gen. Präp. HACKER N 1241, 1245); Mega Spileon und Parnis Oros (leg. GRÜNEWALD).

149. *Cryphia raptricula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Olymp, 19.VI.1981 (coll. HACKER), Olymp, 700 m, 11.VI.1981 (leg. SCHÜTZ), (Gen. Präp. HACKER, N 1053, 1239); Lithochoron, 26.VI.1964 (HEUBERGER); Karia, 7.-28.VII.1981 (leg. BOBITS); Parnis Oros bei Athen (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

150. *Cryphia petrea* (GUÉNÉE, 1852)

Delphi, 14.VI.1981, in der ssp. *contristans* (LEDERER, 1857), (leg. SCHÜTZ), (Gen. Präp. HACKER N 1244).

151. *Cryphia muralis* (FORSTER, 1771)

Karia, 16.VII.1982 (leg. BOBITS); Florina, N-Griechenland (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

152. *Pyrois effusa* (BOISDUVAL, 1829)

Tripolis, 6.X.1982 (leg. WEIGERT); Kreta, Varvara, 14.X.1982 und Maronia, 16.X.1982 (leg. HACKER).

153. *Pyrois cinnamomea* (GOEZE, 1781)

Karia, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS).

Neu für Griechenland.

154. *Amphipyra pyramidaea* (LINNÉ, 1758)

Karia, 8.-30.VII.1982 (BOBITS); Tripolis, 6.X.1982 (leg. HACKER).

155. *Amphipyra livida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

156. *Amphipyra tragopoginis* (CLERCK, 1759)
Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); Olymp (GRÜNEWALD).

157. *Amphipyra tetra* (FABRICIUS, 1787)
Delphi, 14.-16.VIII.1981 (leg. WEIGERT).

158. *Amphipyra micans* LEDERER, 1857
Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS); Tripolis, 6.X.1982, 1 ♀ (leg. HACKER).
Mega Spileon, VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD).

159. *Amphipyra stix* (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)
Larissa, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

160. *Mormo maura* (LINNÉ, 1758)
Lithochoron, 31.V.1962, 20.VI.1963 (leg. HEUBERGER); Karia, 5.-31.VII.1981
(leg. BOBITS); Tripolis, 6.X.1982 (HACKER).

161. *Dypterygia scabriuscula* (LINNÉ, 1758)
Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS).

162. *Rusina ferruginea* (ESPER, [1785])
Karia, 1.-18.VII.1980 (leg. BOBITS); Menikion-Geb., Kehrakambos, 14.VI.1982
(leg. BEHOUNEK). Erstnachweis für Griechenland.

163. *Anthracia eriopoda* (HERRICH-SCHÄFFER, 1845)
Kalamata, 9.X.1982 (leg. HACKER); Mega Spileon, VIII. 1982 (GRÜNEWALD).

164. *Polyphaenis sericata* (ESPER, 1787)
Parnis Oros bei Athen, 1000 m, Mitte VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ);
Karia, 29.VI.-18.VII.1980 (leg. BOBITS).

165. *Thalpophila matura* (HUFNAGEL, 1766)
Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982;
Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982;
Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982;
Pefkos, 17.X.1982; Delphi, Mittel-Griechenland, 19.X.1982; Metamorphosis, N-
Griechenland, 21.X.1982 (alle leg. DERRA/HACKER).

166. *Trachea atriplicis* (LINNÉ, 1758)
Nord-Griechenland, Prespa-See, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS).
Erstfund für Griechenland.

167. *Euplexia lucipara* (LINNÉ, 1758)
Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS). Ebenfalls erstmals für Griechenland.

168. *Phlogophora meticulosa* (LINNÉ, 1758)

Thrakien, Rhodopen, Kirki, 200 m, 24.V.1982 (BEHOUNEK), Achadokambos, 5.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

169. *Phlogophora scita* (HÜBNER, 1790)

N-Griechenland, Trespa-See, 19.VII.1982 (leg. BOBITS).

Bemerkenswerter Neufund für Griechenland.

170. *Callopistria juventina* (STOLL in CRAMER, 1782)

Lithochoron, 2., 3. und 4.VI.1962 (leg. HEUBERGER); Karia, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Peloponnes, Olympia, VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

171. *Callopistria latreillei* (DUPONCHEL, 1827)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Lamia, 20.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA/HACKER, WEIGERT); Parnass, Arachova, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1982 (leg. BROSKUS); Menikion-Geb., Kehrakambos, 14.VI.1982 (BEHOUNEK); Karia, 8.-30.VII.1982 (BOBITS).

172. *Enargia ypsilon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Disron-Geb., Terpiros. 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK). Neu für Griechenland.

173. *Dicycla oo* (LINNÉ, 1758)

Rhodopen, Kirki, 13.VI.1982 (leg. BEHOUNEK); Karia, 1.-18.VII.1982 (leg. BOBITS); Lianokladio, 24.VI.1964 (leg. HEUBERGER).

174. *Cosmia confinis* (HERRISCH-SCHÄFFER, [1849]) (= *rhodopsis* BOURSIN, 1962)

Lamia, 16.VI.1963; Lithochoron, 20.VI.1963 (leg. HEUBERGER).

175. *Cosmia trapezina* (LINNÉ, 1758)

Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS). Erstnachweis für Griechenland.

176. *Apamea furva* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Olymp, 1800 m, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

177. *Apamea platinea* (TREITSCHKE, 1825)

Olymp, 1800 m, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Parnass, 1600 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); ssp. *pantheri* (REBEL, 1905).

178. *Apamea anceps* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982; Rhodopen, Kirki, 24.V.1982 (leg. BEHOUNEK). Erstnachweis für Griechenland.

179. *Apamea sordens* (HUFNAGEL, 1766)

Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS). Ebenfalls erstmalig für Griechenland nachgewiesen.

180. *Oligia latruncula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Rhodopen, Kirki, 13.VI.1982 (leg. BEHOUNEK), (Gen. Präp. HACKER N 1095).

181. *Oligia strigilis* (LINNÉ, 1758)

Menikion-Geb., Kehrakambos, 14.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

182. *Mesapamea secalis* (LINNÉ, 1758)

Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS).

183. *Photedes morrisii* (DALE, 1837)

Lamia, 16.VI.1963 (leg. HEUBERGER). Diese für das Faunengebiet sehr bemerkenswerte Art ist bereits bei STAUDINGER (1871) und THURNER (1967) für Griechenland angegeben.

184. *Luperina dumerilii* (DUPONCHEL, 1827)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.XX.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaiion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982; meist einzeln, auf grasreichen Biotopen häufig (leg. DERRA/HACKER).

185. *Amphipoea oculata* (LINNÉ, 1761)

Olymp, Karia, e.p. 1981 (leg. BOBITS), (Gen. Präp. HACKER N 1672).

Neu für Griechenland.

186. *Celaena leucostigma* (HÜBNER, [1808])

Parnass, 1600 m, Mitte VIII. 1982 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

Bemerkenswerter Neufund für die griechische Fauna.

187. *Oria musculosa* (HÜBNER, [1808])

Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT). Kyllini, 5.-19.VI.1979 (leg. STÖCKERT, coll. HACKER).

188. *Archana dissoluta* (TREITSCHKE, 1825)

Jachloron, 22.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Kyllini, 5.-19.VI.1979 (leg. STÖCKERT, coll. HACKER). Neu für Griechenland.

189. *Rhizedra lutosa* (HÜBNER, [1803])

Anthilli bei Lamia, 20.X.1982 (leg. DERRA/HACKER). Neu für Griechenland.

190. *Sesamia nonagrioides* (LEFEBVRE, 1827)

Thessalien, Stomion am Ossa-Geb., 3.X.1982 (leg. WEIGERT), Gythion, 11.X.1982; Anthilli bei Lamia, 20.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. DERRA/HACKER), (Gen. Präp. HACKER N 1119); Olymp, 800 m, 7.-26.VII.1981 (leg. BOBITS).

191. *Charanyca trigrammica* (HUFNAGEL, 1766)

Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982; Pontokerassea, 22.V.1982; Menikion-Geb., Nea Zihni, 23.V.1982; Rhodopen, Kirki, 24.V.1982 (alle leg. BEHOUNEK); Karia, 7.-26.VII.1981 (leg. BOBITS).

192. *Sesamia cretica* (LEDERER, 1857)

Lithochoron, 2. und 3.VI.1962; Lianokladio, 24.VI.1964 (leg. HEUBERGER).

193. *Hoplodrina blanda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982; Pontokerassea, 22.V.1982; Rhodopen, Kirki, 24.V.1982, 13.VI.1982; Disron-Geb., Terpilos, 16.VI.1982 (alle BEHOUNEK); Olymp, 1000 m (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

Neu für Griechenland.

194. *Hoplodrina ambigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mykene, 4.X.1982 (leg. WEIGERT); Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta: Vorisia, 13.X. und Vaion, 15.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

195. *Atypha pulmonaris* (ESPER, 1790)

Rhodopen, Kirki, 13.VI.1982; Disron-Geb., Terpilos, 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK); Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS).

196. *Spodoptera exigua* (HÜBNER, [1808])

Delphi, Mega Spileon (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Delphi, 25.IV.-4.V.1973 und Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Karia, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Messini, 8.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X. 1982; Vaion, 15.X.1982 (leg. DERRA/HACKER/WEIGERT).

197. *Spodoptera littoralis* (BOISDUVAL, 1833)

Messini, 8.X.1982; Kreta, Maronia, 16.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

198. *Caradrina aspersa* (RAMBUR, 1834)

Delphi, Mega Spileon, Mitte VIII 1982 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

199. *Caradrina kadenii* (FREYER, 1836)

Kreta, Pefkos, 17.X.1982 (leg. HACKER).

200. *Caradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)

Olymp, 1000 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

201. *Caradrina susianja* MENTZER, 1981

Parnass, 1100 m, 13.VI.1981 (leg. SCHÜTZ, (Gen. Präp. HACKER N 1236). Die erst kürzlich aus Jugoslawien beschriebene Art wurde von GANEV (1982) auch für Bulgarien festgestellt und ist neu für die griechische Fauna.

202. *Caradrina flavirena* (GUÉNÉE, 1852)

Delphi, 25.IV.-4.V.1973; Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Pelo-

ponnes, Tolon, Mitte IX. 1966 (leg. WEISS, coll. KOBES); Achadokambos, 5.X. 1982; Mykene, 4.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (alle DERRA/HACKER).

203. *Caradrina clavipalpis* (SCOPOLI, 1763)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron 10.X.1982; Kreta: Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982 (DERRA/HACKER); Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

204. *Cardrina gilva* (DONZEL, 1837)

Parnass, 1600 m, 12.VIII.1982 (leg. GRÜNEWALD); Karia, 5.-31.VII.1981 (BOBITS).

205. *Athetis hospes* (FREYER, [1831])

Delphi, Olympia (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Karia, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS); Disron-Geb., Terpilos. 16.VI.1982 (BEHOUNEK); Messini, 8.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Vaion, 15.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

206. *Praestilbia armeniaca* STAUDINGER, 1892

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982 (leg. DERRA/HACKER/WEIGERT).

207. *Hadjina viscosa* STAUDINGER, 1892

Kreta, Vaion, 15.X.1982, häufig (leg. DERRA/HACKER).

208. *Stilbina olympica* DIERL & POVOLNY, 1970

Achadokambos, 5.X.1982 (1 ♂ leg. WEIGERT); Tripolis, 6.X.1982, häufig (leg. DERRA/HACKER/WEIGERT). Die Art war bisher nur vom Typenfundplatz Olympia bekannt. Erstmals konnte auch das flugunfähige Weibchen gefunden und die Zucht durchgeführt werden (BECK & HACKER, 1984).

209. *Megalodes eximia* (FREYER, 1845)

Lamia, 16.V.1963 (leg. HEUBERGER). Die Art wurde erstmals für Europa in Griechenland nachgewiesen.

210. *Aegle agatha* STAUDINGER, 1861

Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT).

211. *Aegla verspertalis* (HÜBNER, [1818])

Delphi, Olympia (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

212. *Haemerosia renalis* (HÜBNER, [1813])

Delphi (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

Neu für Griechenland.

213. *Heliothis viriplaca* (HUFNAGEL, 1766)

Parnass (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

214. *Heliothis maritima* de GRASLIN, 1855

Karia, 7.-26.VII.1981 (BOBITS).

215. *Heliothis nubigera* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

Karia, 7.-26.VII.1981 (BOBITS).

216. *Heliothis peltigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und

Heliothis armigera (HÜBNER, [1808])

Auf eine Aufzählung der sehr zahlreichen Fundplätze dieser, auch als Wanderfalter bekannten Arten, wird aus Platzgründen verzichtet.

218. *Meliceptria cognata* (FREYER, 1839)

Vevi, N-Griechenland, 23.VII.1982 (leg. BOBITS). Neu für die griechische Fauna.

219. *Protoschinia scutosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Karia, 18.VII.1982 (leg. BOBITS).

220. *Periphanes delphinii* (LINNÉ, 1758)

Parnass, 1100 m, 13.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Karia, 18.VII.1982 (leg. BOBITS).

221. *Periphanes treitschkei* (FRIVALDSKY, 1845)

Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT); Lithochoron, 3.VI.1962 (leg. HEUBERGER).

222. *Rhodoclepria incarnata* (FREYER, [1838])

Disron-Geb., Pontokerasse, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

223. *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)

Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982 (leg. BEHOUNEK). Neu für Griechenland.

224. *Apaustis theophila* (STAUDINGER, 1866)

N-Griechenland, Florina, 850 m, 11.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT). Die Falter saßen in größerer Anzahl früh am Morgen in den ersten Sonnenstrahlen an Blüten. Seit der Urbeschreibung von STAUDINGER und seinem Faunenbeitrag (1871) die ersten Nachweise für diese aus Griechenland beschriebene Art im Lande. Sie kommt ansonsten noch in Bulgarien (GANEV, 1982) und in Kleinasien vor und wird in Jugoslaw. Mazedonien nicht fehlen.

225. *Metachrostis velox* (HÜBNER, [1813])

Méga Spileon, Mitte VIII. 1982 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

226. *Metachrostis velocior* (STAUDINGER, 1892)

Delphi (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

227. *Rhypagla lacernaria* (HÜBNER, [1813])

Delphi, (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

228. *Odice suava* (HÜBNER, [1813])

Karia, 7.-26.VII.1981 (leg. BOBITS); Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT).

229. *Eublemma ostrina* (HÜBNER, [1808])

Kreta: Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); Parnass, 12.VI.1981; Delphi, 14.-16.VI.1981; Parnis Oros bei Athen (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Delphi, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSKUS); Tripolis, 6.X.1982 (leg. WEIGERT).

230. *Eublemma parva* (HÜBNER, [1808])

Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS); Delphi, 500 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); Lamia, 16.VI.1963 (HEUBERGER). Beide *Eublemma*-Arten sind in mehreren Generationen am Balkan allgemein verbreitet.

231. *Eublemma rosea* (HÜBNER, 1790)

Olymp, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS).

232. *Eublemma respersa* (HÜBNER, 1790)

Karia, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS).

233. *Eublemma purpurina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Parnass, 1100 m, 13.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ; Rhodopen, Kirki, 25.V.1982; Menikion-Geb., Agriani, 15.VI.1982; Disron-Geb., 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK)).

234. *Eublemma polygramma* (DUPONCHEL, 1836)

Delphi, 14.-16.VI.1981; Olymp, 700 m, 11.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Florina, 11.VI.1981 (WEIGERT); Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS).

235. *Calymma communimacula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Delphi (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

236. *Phyllophilota oblitterata* (RAMBUR, 1833)

Leptokaria, VII. 1981, Raupenfunde (BOBITS).

237. *Lithacodia pygarga* (HUFNAGEL, 1766)

Leptokaria, 20.VII.1981 (BOBITS); Menikion-Geb., Agriani, 15.VI.1982; Disron-Geb., Terpilos, 16.VI.1982 (BEHOUNEK).

238. *Ozarba moldavica* (HERRICH-SCHÄFFER, 1845)

Lithochoron, 4.VI.1962 (leg. HEUBERGER); Delphi (GRÜNEWALD/SCHÜTZ);

Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS).

239. *Ozarba lascivalis* (LEDERER, 1855)

Karia, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS); Olympia (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

240. *Pseudozarba bipartita* (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)

Larissa, 29.VI.-18.VI.1980 (leg. BOBITS); Tripolis, 6.X.1982 (leg. HACKER).

Neu für Griechenland.

241. *Emmelia trabealis* (SCOPOLI, 1763)

Olympia, Mitte VIII. 1982 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Lithochoron, 4.VI.1962 (HEUBERGER).

242. *Acontia lucida* (HUFNAGEL, 1766)

Lamia, 16.VI.1963; Lithochoron, 2.VI.1862 (HEUBERGER); Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Vaion, 15.X.1982 (DERRA/HACKER); Disron-Geb., Pontokerassea, 22.V.1982; Terpilos, 16.VI.1982; Rhodopen, Kirki, 24.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Delphi, 25.IV.-4.V.1973 und Meteora-Klöster, 5.V.1973 (BROSZKUS).

243. *Zebeeba falsalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1892)

Parnass, 500 m, Olympia und Mega Spileon, VIII. 1982 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

244. *Nycteola asiatica* (KRULIKOWSKY, 1904)

Olymp, 700 m, 11.VI.1981; Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Disron-Geb., Terpilos. 16.VI.1982 (BEHOUNEK); Mykene, 4.X.1982 (leg. WEIGERT); Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982 (leg. HACKER).

245. *Eutelia adulatrix* (HÜBNER, [1813])

Lithochoron, 4.VI.1962, zahlreich (HEUBERGER); Mykene, 4.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982 (DERRA/HACKER); Rhodopen, Kirki, 25.V.1982 (BEHOUNEK); Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/WEIGERT); Karia, VII. 1982 (BOBITS).

246. *Eutelia adoratrix* (STAUDINGER, 1891)

Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS); Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT); Olymp, 19.VII.1981 (leg. KIRSCH, coll. HACKER).

247. *Earias chlorana* (LINNÉ, 1761)

Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Rhodopen, Kirki, 25.V.1982 und 13.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

248. *Earias vernana* (HÜBNER, 1799)

Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS). Beide *Earias*-Arten sind neu für Griechenland.

249. *Bena prasinana* (LINNÉ, 1758)

Rhodopen, Kirki, 24.V.1982 (BEHOUNEK); Gythion und Sidirokastron bei Gythion, 10. und 11.X.1982 (leg. HACKER).

250. *Abrostola trigemina* (WERNEBURG, 1864)

Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT); Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS).

251. *Abrostola triplasia* (LINNÉ, 1758)

Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS).

252. *Abrostola agnorista* DUFAY, 1956

Karia, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS), (Gen. Präp. HACKER N 1673).

Neu für Griechenland.

253. *Euchalcia chlorocharis* (DUFAY, 1961)

Parnass, Arachova, 28.IV.-12.V.1980 (leg. KOSCHWITZ, coll. HEUBERGER); Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT); 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS).

254. *Diachrysia chrysitis* (LINNÉ, 1758)

Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982 (BEHOUNEK); Lithochorон, 31.V.1962 (HEUBERGER).

255. *Macdunnoughia confusa* (STEPHENS, 1850)

Disron-Geb., Terpilos, 16.VI.1982 (BEHOUNEK).

256. *Plusia festucae* (LINNÉ, 1758)

Halophile Schilfgebiete an der Küste bei Lamia, 20.X.1982 (leg. HACKER).

257. *Trichoplusia circumspecta* (FREYER, 1831)

Jachloron, 21.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Achadokambos, 5.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Pefkos, 17.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

258. *Trichoplusia daubei* (BOISDUVAL, 1840)

Kreta, Vaion, 15.X.1982; Anthilli bei Lamia, 20.X.1982 (leg. HACKER).

259. *Trichoplusia orichalcea* (FABRICIUS, 1775)

Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982 (leg. HACKER).

260. *Ctenoplusia accentifera* (LEFEBVRE, 1827)

Jachloron, 21.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Achadokambos, 5.X.1982; Gythion, 11.X.1982 (leg. HACKER); Delphi, Parnass, 900-1200 m, 25.IV.-4.V.1973 (leg. BROSZKUS); Larissa, 1.VII.-16.VII.1980 (leg. BOBITS).

Auf die Aufzählung der überaus zahlreichen Funde von

261. *Trichoplusia ni* (HÜBNER, [1803] und

262. *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789), wird aus Platzgründen verzichtet.
Beide Arten sind zudem als Wanderfalter bekannt.

263. *Catocala sponsa* (LINNÉ, 1767)

Karia, 14.VII.1981 (leg. BOBITS).

264. *Catocala dilecta* (HÜBNER, [1808])

Kreta, Varvara, 1400 m, 14.X.1982 (HACKER); Karia, 14.VII.1981 (BOBITS).

265. *Catocala nupta* (LINNÉ, 1767)

Karia, 1.-16.VII.1980 (leg. BOBITS).

266. *Catocala elocata* (ESPER, 1788)

Maga Spileon, Mitte VIII. 1982 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Karia, 14.VII.1981 (leg. BOBITS).

267. *Catocala promissa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Karia, 14.VII.1981 (leg. BOBITS).

268. *Catocala conjuncta* (ESPER, 1788)

Kreta, Pefkos, 17.X.1982 und Vorisia, 13.X.1982 (leg. HACKER); Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS); Delphi, Parnass, 1600 m, Mega Spileon (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

269. *Catocala conversa* (ESPER, 1788)

Lithochoron, 4., 19., 23.VI.1963, zahlreich (HEUBERGER); Parnass, 500 m, 12.VI.1981; Delphi, 14.-16.VI.1981; Olymp, 700 m, 11.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Karia, 14.VII.1981 (BOBITS).

270. *Catocala nymphagoga* (ESPER, 1788)

Parnass, 500 m, 12.VI.1981; Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Karia, 14.VII.1981 (BOBITS); Lamia, 16.VI.1963; Lithochoron, 21.VI.1963, 26.VI.1964, zahlreich (HEUBERGER).

271. *Catocala hymenaea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Lamia, 16.VI.1963; Lithochoron, 19. und 21.VI.1963 zahlreich (HEUBERGER).

272. *Ephesia nymphaea* (ESPER, 1788)

Parnass, 500 m, 12.VI.1981; Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ/WEIGERT); Karia, 14.VII.1981 (BOBITS); Lamia, 16.VI.1963; Lithochoron, 19.-21.VI.1963, 20.VI.1964, häufig (HEUBERGER).

273. *Ephesia disjuncta* (GEYER, 1828)

Karia, 14.VII.1981 (leg. BOBITS); Delphi, 14.-16.VI.1981 (WEIGERT); Olympia und Lambia (Peloponnes) (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

274. *Ephesia eutychea* TREITSCHKE, 1835

Vom 2.VI. bis Anfang IX. von allen Belegführenden als sehr häufig bis massenhaft gemeldet. Olymp, 700 m, Parnass, Delphi, Karia, Kirki, Kehrakambos, Terpilos u.a.

275. *Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Menikion-Geb., Nea Zihni, 23.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Lithochoron, 23.IV. 1973 (BROSZKUS).

276. *Ophiusa tirhaca* (CRAMER, [1777])

Lithochoron, 18.VI. und 20.VI.1963 (leg. HEUBERGER), Delphi, 19.X.1982; Kreta Vorisia, 13.X. und Vaion, 15.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

277. *Clytie syriaca* (BUGNION, 1837)

Olympia (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

278. *Dysgonia algira* (LINNÉ, 1767)

Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/WEIGERT); Lithochoron, 2.VI.1962, 25.VI.1964 (leg. HEUBERGER); Disron-Geb., Kilkis, 21.V.1982; Pontokerassea, 22.V.1982; Rhodopen, Kirki, 13.VI.1982 (leg. BEHOUNEK); Meteora-Klöster, 5.V.1973 (BROSZKUS); Karia, 14.VII.1981 (BOBITS).

279. *Grammodes bifasciata* (PETAGNA, 1787)

Karia, 10.VII.1982 (leg. BOBITS); Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Messini, 8.X.1982 (leg. DERRA); Lithochoron, 25.VI.1964 (HEUBERGER).

280. *Grammodes stolida* (FABRICIUS, 1775)

Lithochoron, 3.VI.1962 (HEUBERGER); Parnass, 500 m, 12.VI.1981 (WEIGERT); Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Korinth, 30.III.1973 (leg. de FREINA, coll. HACKER); Disron-Geb., Pontokerassea, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK); Meteora-Klöster, 5.V.1973 (BROSZKUS); Karia, 10.VII.1982 (BOBITS).

281. *Euclidia glyphica* (LINNÉ, 1758)

Florina, 11.VI.1981 (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

282. *Callistege mi* (CLERCK, 1759)

Disron-Geb., Pontokerassea, 22.V.1982 (leg. BEHOUNEK).

283. *Aleucanitis cailino* (LEFEBVRE, 1827)

Olymp, 1800 m, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS); Parnass, 1100 m, 13.VI.1981 (GRÜNEWALD/WEIGERT).

284. *Catephia alchymista* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Lithochoron, 3.VI.1962, 26.VI. 1964 (leg. HEUBERGER).

285. *Aedia leucomelas* (LINNÉ, 1758)

Mykene, 4.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Messini, 8.X.1982; Gythion, 11.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); Delphi, 14.-16.VI.1981 (GRÜNEWALD/WEIGERT); Olympia (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

286. *Aedia funesta* (ESPER, 1786)

Lamia, 16.VI.1963; Lithochoron, 2.VI.-4.VI.1962 (leg. HEUBERGER).

287. *Tyta luctuosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kilkis, 21.V.1982 (BEHOUNEK); Lithochoron, 4.VI.1962 (HEUBERGER); Messini, 8.X.1982; Vaion, 15.X.1982 (DERRA/HACKER); Karia, 1.-16.VII.1980 (BOBITS); Delphi, 25.IV.-4.V.1973; Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS).

288. *Lygephila craccae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982 (leg. DERRA/HACKER); Olymp, 1800 m, 5.-31.VII.1981 (BOBITS); Parnis Oros (GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

289. *Lygephila limosa* (TREITSCHKE, 1826)

Delphi, Mega Spileon (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Meteora-Klöster, 5.V.1973 (leg. BROSZKUS); Mykene, 4.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

290. *Autophila limbata* (STAUDINGER, 1871)

In der ssp. *parnassicola* DRAUDT, 1936: Delphi, 15.VI.1981 (leg. GRÜNEWALD, det. HACKER).

291. *Autophila anaphanes* BOURSIN, 1940

Tayetos-Geb., 1300 m, 7.X.1982 (leg. HACKER); Attika, Laurion, 19.VII.1974 (coll. HACKER).

292. *Autophila dilucida* (HÜBNER, [1808])

Korfu, Kerkyra (GRÜNEWALD).

293. *Apopestes spectrum* (ESPER, 1787)

Karia, 29.VI.-18.VII.1980, 5.-31.VII.1981, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS).

294. *Calyptra thalictri* (BORKHAUSEN, 1790)

Olymp, 1800 m, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS); Olymp, 1000 m (leg. GRÜNEWALD).

295. *Colobochyla salicalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Disron-Geb., Terpilos, 16.VI.1982 (leg. BEHOUNEK).

Neu für Griechenland.

296. *Parascotia fuliginaria* (LINNÉ, 1761)

Olymp, 1800 m, 8.-20.VII.1982 (leg. BOBITS).

297. *Parascotia detersa* (STAUDINGER, 1891)

Das von REISSER am 28.VII.1960 auf Kreta gefangene Männchen dieser Art (Ida-Gebirge, Silva Rouva, 1100 m, coll. ZSM) wurde genitaliter überprüft. Die Art, die von HARTIG/HEINICKE nicht in die Liste der europäischen Noctuiden-

arten aufgenommen wurde, ist damit bestätigt. Zur Kenntnis der mediterran verbreiteten Arten der Gattung *Parascotia* HÜBNER, [1825] werden die männlichen Genitale von *P. detersa* (STAUDINGER, 1891), *P. fuliginaria* (LINNÉ, 1761), *P. nisseni* TURATI, 1907 und *P. robiginosa* (STAUDINGER, 1891) abgebildet. *Parascotia lorai* AGENJO, 1967, ist nach Ansicht von CALLE, Murcia-Spanien eine gute Art.

298. *Zethes insularis* RAMBUR, 1833

Lithochoron, 2.VI.1962 (leg. HEUBERGER); Karia, 5.-31.VII.1981 (leg. BOBITS); Delphi, 14.-16.VI.1981 (leg. WEIGERT); Delphi, 25.IV.-4.V.1973 (BROSZKUS).

299. *Phytometra viridaria* (CLERCK, 1759)

Karia, 7.-28.VII.1982 (leg. BOBITS).

300. *Raparna conicephala* (STAUDINGER, 1870)

Leptokaria, 8.-30.VII.1982 (leg. BOBITS); Kreta, Vaion, 15.X.1982 (leg. DERRA/HACKER).

301. *Thria robusta* WALKER, [1858]

Von dieser Art wurden in Europa bisher vier Tiere gefangen. Neben zwei Nachweisen aus Spanien und Portugal zwei Tiere aus Griechenland. Beide stammen aus Monemvasia, Lakonia: 1979 (FIBIGER & SKULA in litt.) und 16.XII.1982 (briefliche Mitteilung FIBIGER). Vermutlich wird die in den altweltlichen Tropen und Subtropen weit verbreitete Art in den Wintermonaten auch noch in Süd-Italien zu finden sein und ist wegen ihrer ungünstigen Flugzeit bisher übersehen worden.

302. *Orectis proboscidata* (HERRISCH-SCHÄFFER, [1851])

Mega Spileon (leg. GRÜNEWALD/SCHÜTZ).

303. *Orectis* sp.

Gythion, 11.X.1982 (leg. HACKER).

304. *Nodaria nodosalis* (HERRICH-SCHÄFFER, [1854])

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982 (leg. HACKER).

305. *Pechipogo plumigeralis* (HÜBNER, 1825)

Karia, 10.-18.VII.1960 (leg. BOBITS).

306. *Herminia zelleralis* (WOCKE, 1850)

Karia, 10.-25.VII.1981 (leg. BOBITS); Florina, 11.VI.1981 (GRÜNEWALD).

307. *Paracolax derivalis* (HÜBNER, 1796)


Tripolis, 6.X.1982 (leg. HACKER). Neu für Griechenland.

308. *Hypena rostralis* (LINNÉ, 1758)

Metamorphosis, 21.X.1982 (leg. HACKER). Ebenfalls neu für Griechenland.

309. *Hypena lividalis* (HÜBNER, 1796)

Delphi (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Kalamata, 9.X.1982 (leg. HACKER).



- Abb. 1: *Parascotia detersa* STGR., männl. Genital, Syria septr., Amanus, Jeschil-dera, VI. 1933, leg. PFEIFFER, coll. ZSM, Gen. Präp. DERRA N 30/83.
- Abb. 2: *Parascotia deterse* STGR., männl. Genital, Kreta, Ida, Silva Rouva, 1100 m, 28.VII.1960, leg. REISSER, coll. ZSM, Gen. Präp. DERRA N 31/83.
- Abb. 3: *Parascotia robiginosa* STGR., männl. Genital, Asia Minor, Kizilcahamam, 21./22.VII.1970, leg. FRIEDEL, coll. ZSM, Gen. Präp. DERRA N 29/83.
- Abb. 4: *Parascotia fuliginaria* L., männl. Genital, Fennia, Helsingin pit., Tammisto, 21.VII.1961, leg. AALTO, coll. HACKER, Gen. Präp. DERRA N 33/83.
- Abb. 5: *Parascotia nisseni* TURATI, männl. Genital, Corsica, 10.X.1975, leg. JEANNIN, coll. HACKER, Gen. Präp. DERRA N 32/83.
- Abb. 6: *Parascotia detersa* STGR., männl. Falter, Kreta, Ida, Silva Rouva, 1100 m, 28.VII.1960, leg. REISSER, coll. ZSM.

310. *Rhynchodontodes antiqualis* (HÜBNER, [1809])

Parnass, 500 m (GRÜNEWALD/SCHÜTZ); Karia, 1.-18.VII.1980 (BOBITS); Disron-Geb., Pontokerasse, 22.V.1982; Rhodopen, Kirki, 24.V.1982 und 13.VI. 1982 (leg. BEHOUNEK).

"Bombycidae" und Geometridae der Ausbeuten der Verfasser vom Herbst 1982

311. *Axia nesiota* REISSEER, 1962

Achadokambos, 700 m, 5.X.1982, nicht selten; Mittel-Griechenland, Delphi, 19. X.1982 2 ♂♂; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982, einzeln.

De FREINA und WITT (1983) betrachten die Populationen von Kreta und Griechenland, die sich kaum unterscheiden, als eigene Art und nicht als Unterart zu *Axia voulogeri* STAUDINGER. Die Funde von Peloponnes und Parnass sind die Erstnachweise für das europäische Festland. *A. nesiota* RSSR. ist nach *Axia margarita* HÜBNER die zweite auf dem Festland nachgewiesene Axiiden-Art. Die dritte europäische Art, *Axia napoleona* SCHAWERDA, gilt als endemisch für Korsika.

312. *Phragmatobia fuliginosa meridionalis* TUTT, 1904

Mykene, 4.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Messini, 8.X.1982; Gythion, 11.X. 1982; Kreta, Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982.

313. *Callimorpha quadripunctaria magna* SPULER, 1910

Gythion, 11.X.1982.

314. *Eilema caniola* (HÜBNER, 1827)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Varvara, 14.X.1982; Schilfgebiete bei Lamia, 20.X. 1982.

315. *Pelosia hellenica* DERRA & HACKER, 1983

Schilfgebiet bei Lamia, 20.X.1982.

316. *Dysauxes famula burgeffi* DRAUDT, 1931

Mykene, 4.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982.

316a. *Dysauxes famula hyalina* (FREYER, 1845)

Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 14.X.1982; Maronia, 15.X.1982; Pefkos, 17. X.1982.

317. *Ocneria rubea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Gythion, 11.X.1982, 1 ♀.

318. *Drepana binaria* (HUFNAGEL, 1769)

Messini, 4.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Delphi, 19.X.1982

319. *Cymatophorina diluta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Tripolis, 6.X.1982, 1 ♂.

320. *Roeselia togatulalis* (HÜBNER, 1837)

Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982.

321. *Roeselia albula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Gythion, 11.X.1982.

322. *Celama chlamytulalis* (HÜBNER, 1827)

Kreta, Maronia, 16.X.1982.

323. *Thaumetopoea solitaria* (FREYER, 1838)

Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982.

324. *Thaumetopea processionea pseudosolitaria* DANIEL, 1951

Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982.

325. *Drymonia querna* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Gythion, 11.X.1982, 1 ♂

326. *Lasiocampa trifolii cocles* (GEYER, 1830-31)

Kreta, Vaion, 15.X.1982.

327. *Lasiocampa grandis* (ROGENHOFER, 1891)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Messini, 8.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982. An allen Plätzen nicht eben selten, teilweise häufig.

328. *Perisomena caecigena* (KUPIDO, 1825)

Metamorphosis, 21.X.1982 häufig, die ♂♂ in rötlichen und gelblichen Formen.

329. *Lemonia taraxaci strigata* REBEL, 1918

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982. Insbesondere am zweitgenannten Biotop häufig. Die Männchen fliegen zwischen 22 und 24 Uhr, die Weibchen zwischen 0 und 1 Uhr Ortszeit. WITT hält nach Sichtung der Tiere *strigata* RBL. für eine gut ausgeprägte und abgegrenzte Unterart.

330. *Heptalus adriaticus* OSTHELDER, 1931

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982. Bis auf den Fundplatz auf Kreta, wo nur ein ♂ am Licht erschien, war die Art nicht gerade selten.

331. *Zeuzera pyrina* (LINNÉ, 1767)

Gythion, 11.X.1982.

332. *Phragmataecia castaneae* (HÜBNER, 1790)

Schilfgebiet bei Lamia, 20.X.1982, 1 ♂.

333. *Diloba caeruleocephala* (LINNÉ, 1758)

Tripolis, 6.X.1982; Metamorphosis, 21.X.1982.

334. *Pseudoterpnia pruinata* HUFNAGEL, 1767)

Peloponnes, Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Pefkos, 17. X.1982.

335. *Microloxia herbaria* (HÜBNER, [1813])

Mykene, 4.X.1982, 1 ♂.

336. *Eucrostes indigenata* (de VILLERS, 1789)

Mykene, 4.X.1982, 1 ♀.

337. *Xenochlorodes beryllaria* (MANN, 1853)

Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15. X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Maronia, 16.X.1982.

338. *Cyclophora pupillaria* (HÜBNER, [1799])

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; N-Griechenland, Metamorphosis, 21.X.1982.

339. *Scopula ornata* (SCOPOLI, 1763)

Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Gythion, 10.X.1982.

340. *Sopula submutata* (TREITSCHKE, 1828)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12. X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Parnass, Delphi, 19.X.1982.

341. *Scopula marginepunctata* (GOEZE, 1781)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Mittel-Griechenland, Delphi, 19.X.1982; N-Griechenland, Metamorphosis, 21.X.1982.

342. *Scopula imitaria* (HÜBNER, [1799])

Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kreta, Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Mittel-Griechenland, Delphi, 19.X.1982.

343. *Scopula minorata* (BOISDUVAL, 1833)

Mykene, 4.X.1982; Peloponnes, Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Anthilli bei Lamia, 20.X.1982.

344. *Problepsis ocellata* (FRIVALDSKY, 1845)

Insgesamt vier Tiere dieser schönen Art aus Mykene, 4.X.1982 und Achadokambos, 5.X.1982.

345. *Idaea filicata* (HÜBNER, [1799])

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

346. *Idaea sublongaria* (STAUDINGER, 1899)

Kreta, Vaion, 15.X.1982, insgesamt sechs Tiere.

347. *Idaea albitorquata* (PÜNGELER, 1908)

Achadokambos, 5.X.1982; Kreta, Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982.

348. *Idaea camparia* (HERRICH-SCHÄFFER, [1854])

Achadokambos, 5.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

349. *Idaea subsericeata* (HAWORTH, 1809)

Mykene, 4.X.1982; Kreta, Pefkos, 17.X.1982.

350. *Idaea ruficostata* (ZELLER, 1847)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982.

351. *Idaea degeneraria* (HÜBNER, [1799])

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

352. *Rhodometra sacraria* (LINNÉ, 1767)

Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Anthilli bei Lamia, 20.X.1982.

353. *Xanthorhoe oxybiata* (MILLIÈRE, 1872)

Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

354. *Orthonama obstipata* (FABRICIUS, 1794)

Kreta, Vaion, 15.X.1982.

355. *Camptogramma grisescens* (STAUDINGER, 1892)

Kreta, Chora Sphakion, 1 ♀, 12.X.1982.

356. *Camptogramma bilineata* (LINNÉ, 1758)

Kreta, Chora Sphakion und Vorisia, 12. und 13.X.1982.

357. *Nebula ablutaria* (BOISDUVAL, 1840)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

358. *Nebula adlata* (STAUDINGER, 1894)

Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982.

359. *Thera variata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982.

360. *Thera firmata* (HÜBNER, [1822])

Tayetos-Geb., 7.X.1982.

361. *Euphyia frustata* (TREITSCHKE, 1828)

Tripolis, 6.X.1982.

362. *Perizoma flavosparsata* (WAGNER, 1926)

Tayetos-Geb., 7.X.1982; Gythion, 11.X.1982.

363. *Eupithecia centaureata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mykene, 4.X.1982; Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Maronia, 16 X.1982.

364. *Eupithecia unedonata* (MABILLE, 1868)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Maronia, 16.X.1982.

365. *Eupithecia ericeata* (RAMBUR, 1833)

Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

366. *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809)

Achadokambos, 5.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982.

367. *Aplocera plagiata* (LINNÉ, 1758)

Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kreta, Varvara, 14.X.1982; N-Griechenland, Metamorphosis, 21.X.1982.

368. *Aplocera cretica* (REISSER, [1974])

Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17.X.1982.

369. *Aplocera efformata* (GUÉNÉE, 1857)

Kreta, Maronia, 16.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

370. *Aplocera dervenaria* v. MENTZER, 1981

Mykene, 4.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; insgesamt fünf Tiere dieser erst vor kurzem abgetrennten und beschriebenen Art.

371. *Rhoptria asperaria* (HÜBNER, [1817])

Mykene, 4.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vaion, 15.X.1982.

372. *Semiothisa aestimaria* (HÜBNER, [1809])

Messini, 8.X.1982, 1 ♀.

373. *Pachynemria hippocastanaria* (HÜBNER, [1799])

Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982.

374. *Sthanelia tibiaria* (RAMBUR, 1829)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982.

375. *Ennomos quercaria* (HÜBNER, [1813])

Mykene, 4.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982.

376. *Eumera regina* STAUDINGER, 1892

Mykene, 3.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; insgesamt acht Tiere.

377. *Crocallis tusciaria* (BORKHAUSEN, 1793)

Metamorphosis, 21.X.1982, 2 ♀♀.

378. *Crocallis elinguaria* (LINNÉ, 1758)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

379. *Colotois pennaria* (LINNÉ, 1761)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Anthilli bei Lamia, 20.X.1982; Metamorphosis, 22.X.1982.

380. *Nychiodes dalmatina* WAGNER, 1909

Sidirokastron, 10.X.1982, 1 ♂.

381. *Menophra abruptaria* (THUNBERG, 1792)

Kalamata, 9.X.1982, 1 ♂.

382. *Menophra trypanaria* (WILTSHERE, 1948)

Mykene, 4.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982.

383. *Peribatodes rhomboidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

384. *Peribatodes correptaria* (ZELLER, 1847)

Mykene, 4.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vaion, 15.X.1982.

385. *Peribatodes umbraria* (HÜBNER, [1809])

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14.X.1982; Pefkos, 17.X.1982.

386. *Peribatodes secundaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Tayetos-Geb., 7.X.1982.

387. *Selidosema plumaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982.

388. *Itame berytaria* (STAUDINGER, 1892)

Tripolis, 6.X.1982; Tayetos-Geb., 7.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982 und Varvara, 14.X.1982.

389. *Eumannia oppositaria* (MANN, 1864)

Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982, häufig.

390. *Campaea honoraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kalamata, 9.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Vorisia, 13.X.1982.

391. *Campaea margaritata* (LINNÉ, 1767)

Tripolis, 6.X.1982.

392. *Gnophos sartatus* (TREITSCHKE, 1827)

An allen Fundplätzen, mit Ausnahme der Schilfbiotope bei Messini und Lamia und des nordgriechischen Metamorphosis, meist häufig bis sehr häufig.

393. *Gnophos obscuratus* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Achadokambos, 5.X.1982.

394. *Gnophos supinarius* MANN, 1854

Achadokambos, 5.X.1982.

395. *Gnophos variegatus* DUPONCHEL, 1830

Tayetos-Geb., 7.X.1982.

396. *Gnophos mucidarius* (HÜBNER, [1799])

Achadokambos, 5.X.1982; Messini, 8.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13.X.1982; Varvara, 14. X.1982; Vaion, 15.X.1982; Pefkos, 17.X.1982.

397. *Aspitates ochrearia* (ROSSI, 1794)

Mykene, 4.X.1982; Achadokambos, 5.X.1982; Kalamata, 9.X.1982; Sidirokastron, 10.X.1982; Gythion, 11.X.1982; Kreta, Chora Sphakion, 12.X.1982; Vorisia, 13. X.1982; Varvara, 14.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Delphi, 19.X.1982.

398. *Dyscia sicanaria* (OBERTHÜR, 1923)

Achadokambos, 5.X.1982; Tripolis, 6.X.1982; Kalamata, 9.X.1982.

399. *Dyscia crassipunctaria* REBEL, 1916

Kreta, Vorisia, 13.X.1982; Vaion, 15.X.1982; Maronia, 16.X.1982; Pefkos, 17. X.1982.

400. *Alcis jubata* (THUNBERG, 1788)

Tripolis, 6.X.1982.

Literatur

Um das Literaturverzeichnis in seinem Umfang zu begrenzen, werden von den faunistischen Arbeiten zur griechischen Lepidopterenfauna nur die wichtigsten Veröffentlichungen angeführt, vor allem diejenigen, die die Noctuidenfauna betreffen.

BECK, H. & H. HACKER (1983): *Stilbina olympica* DIERL & POVOLNY, 1970, Beschreibung des bisher unbekannten Weibchens und der Präimaginalstadien - Mitt. Münch. Ent. Ges. 73: 1-14.

BIEBINGER, A., SPEIDEL, W. & H. HANIGK (1983): Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sardinien: *Noctua tirrenica* n. sp. (Lep.: Noctuidae). Ent. Z. 93: 81-86.

BOURSIN, CH. (1940a): *Rhyacia palaestinensis* KALCHB., *Rhyacia pulvrea* HPS., *Rh. v. elutior* ALPH. et leurs rapports avec *Rh. xanthographa* SCHIFF. (Contr. XXV). - Rev. Fr. d'Ent. 1940, II: 86-92.

BOURSIN, CH. (1940b): Description d'un Copiphana nouveau d'Macédoine. Bull. Soc. Linn. Lyon, 1940: 70-75.

BOURSIN, CH. (1952): Synonymie Notizen nebst verschiedenen Bemerkungen. - Z. f. Lep. 1952: 49-68, Krefeld.

- BOURSIN, CH. (1953): Zwei neue *Agrochola* HB.-Arten (*Orthosia* auct.) aus der Umgebung von Ochrid in Mazedonien. - Z. Wien. Ent. Ges. **38**: 62-66.
- BOURSIN, CH. (1962a): Eine neue *Cosmia* HB (*Calymnia* auct.) aus dem Balkan und Kleinasien. Z. Wien. Ent. Ges. **47**: 65-69.
- BOURSIN, CH. (1962b): *Lithophane semibrunnea* HAW. Eine vorderasiatisch-mediterrane Art mit Beschreibung einer neuen Subspecies. - Z. Wien. Ent. Ges. **47**: 92-94.
- BOURSIN, CH. (1963): Eine neue *Cryphia* HB aus Griechenland. - Z. Wien. Ent. Ges. **48**: 155-157.
- CALLE, J.A. (1981): Contribucion a los Noctuidae espanoles, XXIV: Una nueva especie, cuatro nuevas subspecies y una nueva cita para Espana. Bol. Asoc. esp. Entom. 4 (1980): 79-84.
- DE FREINA, J.J. & TH. WITT (1983): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera: Geometroidea, Axiidae). - Z. Arb. Gem. Öst. Ent., **35**: 17-20.
- DERRA, G. & H. HACKER (1983): *Pelosia hellenica* n. sp., eine neue Arctiid aus Griechenland (Lepidoptera, Lithosiinae). - Entomofauna **4**: 253-260.
- DIERL, W. & D. POVOLNY (1970): *Stilbina olympica* sp. n., eine neue Noctuidenart (Lepidoptera) aus Griechenland. Acta ent. bohemoslow. **67**: 188-191.
- DUFAY, CL. (1968): Revision des Plusiinae Paléarctiques, I. Monographie du Genre *Euchalcia* HÜBNER. Veröff. Zool. Staatssammlung München **12**: 21-151.
- DUFAY, CL. (1975): *Dryobotodes carbonis* WAGNER, bona species, espece nouvelle en Europe et en France. - Bull. Soc. Linn. Lyon **44**: 24-27.
- DUFAY, CL. (1981): *Chersotis grammiptera* (RAMBUR, [1839]), bona sp. en France et en Espagne - Alexanor **12**: 103-117.
- DUFAY, CL. (1982): Découverte en Grece de *Lophoterges hoerhammeri* (F. WAGNER) bona sp., espece nouvelle pour l'Europe (Noctuidae, Cuculliinae). - Nota lepid. **5**: 77-80.
- DUFAY, CL. (1983): *Ochropleura gracilis* (F. WAGNER), bona sp., espece nouvelle pour l'Europe, description de sa sous-espece hellenique (Noctuidae, Noctuinae). - Nota lepid. **6**: 41-48.
- GANEV, J. (1982): Systematic and synonymic list of Bulgarian Noctuidae. — Phegea **10**: 145-160.
- HACKER, H. (1983): Faunistische und taxonomische Beiträge zur Noctuidenfauna des Mittelmeergebietes (Lepidoptera). - Neue Ent. Nachr. **6**: 54-57.
- HACKER, H. & J. LUKASCH (1948): Geometriden und Noctuiden (Lepidoptera) aus der Sammlung J. LUKASCH Ein Beitrag zur Fauna von Griechenland. - Spixiana **7**: 51-61.
- MARTEN, W. (1937): Zur Kenntnis der Axiidae (Lep.). Ent. Rundsch. **54**: 306-308, 408-412, 493-497, 511-515, 533-536, 543-547, 576-579; **55**: 15-17, 21-23, 45-48, 61-66.

- MENTZER, E. von (1981a): The group *Aplocera lythoxylata* (HÜBNER), with
A. dervenaria n. sp. and *palumbata* n. sp. (Lepidoptera, Geometridae).
Ent. scand. 12: 49-56.
- MENTZER, E. von (1981b): *Paradrina susianja* n. sp. (Lepidoptera, Noctuidae).
Ent. scand. 12: 403-404.
- MENTZER, E. von (1981c): Neue und bemerkenswerte Funde von Lepidopteren
in Jugoslawien. - Acta ent. Jugosl., 17: 137-141.
- PINKER, R. (1968): Die Lepidopterenfauna Mazedoniens. III. Geometridae.
Prirodonaucen Muzej Skopje 4: 1-72.
- REBEL, H. (1902): Lepidopteren aus Morea, gesammelt von MARTIN HOLTZ
im Jahre 1901. - Berl. Ent. Z. 47: 83-110.
- REBEL, H. (1903): Lepidopteren aus Morea, Nachtrag. Berl. Ent. Z. 48: 243-
249.
- REBEL, H. (1905): Lepidopteren aus Morea, II. Nachtrag. Berl. Ent. Z. 50:
291-31.
- REBEL, H. (1916): Die Lepidopterenfauna Kretas. Ann. K. K. Naturhist. Hof-
mus. 30: 66-172.
- REISSER, H. (1958): Neue Heteroceren aus Kreta. - Z. Wien. Ent. Ges. 43: 105-
128.
- REISSER, H. (1962): Weitere neue Heteroceren aus Kreta. Z. Wien. Ent. Ges.
47: 193-216.
- REISSER, H. (1974): Zur Lepidopterenfauna Kretas: neue Zugänge zum Arten-
bestand. Ann. Mus. Goulandris 2: 137-140.
- STAUDINGER, O. (1871): Beitrag zur Lepidopterenfauna Griechenlands. Horae
Soc. Ent. Ross. 7: 3-304.
- THURNER, J. (1964): Die Lepidopterenfauna Jugoslawisch-Mazedoniens. I.
Rhopalocera, Grypocera, Noctuidae. Sonderheft Nr. 1 des Prirodonaucen
Muzej, Skopje.
- THURNER, J. (1967): Lepidopteren aus Morea. Ein weiterer Beitrag zur Fauna
des Peloponnes (Griechenland). Z. Wien. Ent. Ges. 52: 5-23, 50-58.
- TOULECHKOFF, K. (1951): Études faunistiques d'Olympe de la Grece (Insekta,
Lepidoptera). - Inst. Zool. Acad. Bulg. Sci. 1: 305-328.

Anschrift der Verfasser:

GEORG DERRA
Concordiastraße 2
D-8600 Bamberg

HERMANN HACKER
Kilianstraße 10
D-8623 Staffelstein

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Hacker Hermann, Derra Georg

Artikel/Article: [Zweiter Beitrag zur Heterocerenfauna \(Lepidoptera\)
Griechenlands 114-157](#)