

Kleine Ergänzungen zur Tagfalterfauna der Türkei

(Lepidoptera, Rhopalocera)

von

ROLF REINHARDT

eingegangen am 14.VIII.2001

Das fundamentale dreibändige Werk „Die Tagfalter der Türkei...“ (HESSELBARTH et al., 1995) verdient es, durch neue Funde und Fundorte fortgeschrieben zu werden. So ergänzte bereits АВАДЖИЕВ (1999) einen Fundort für *Danaus chrysippus* (LINNAEUS, 1758). Diese Wanderart besitzt in der Türkei nur wenige Fundpunkte, ist aber im gesamten Mittelmeerraum in Ausbreitung begriffen.

Es ist klar, daß ein so großes und reich strukturiertes Gebiet, wie es die Türkei darstellt, nicht flächendeckend bearbeitet worden sein kann.

Nachfolgend sollen einige Funde und Fundorte hinzugefügt werden. Laut Karte IV (in Band 3) sind die UTM-Raster QB 18 und UF 18 nicht mit Angaben belegt. Für das Raster ME 32 können weitere Arten hinzugefügt werden.

Folgende ergänzende Angaben, die anlässlich einer Urlaubsreise im Oktober 1998 notiert wurden, können hinzugefügt werden.

Troja (Ausgrabungsstätte), Provinz Çanakkale, Marmara-Region, UTM: ME 32; 06.X.1998:

Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)

Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)

Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758)

Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767)

Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)

Papilio machaon LINNAEUS, 1758

Colias crocea (FOURCROY, 1785).

Aphrodisias (Ausgrabungsstätte), Provinz Denizli, Ägäis-Region, UTM: QB 18; 08.X.1998:

Danaus chrysippus (LINNAEUS, 1758)

Argynnis pandora ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Papilio machaon LINNAEUS, 1758.

Belek (Badeort östlich Antalya, Hotelanlage direkt am Strand), Provinz Antalya, Antalya-Region, UTM: UF 18; 10.-14.X.1978:

Colias crocea (FOURCROY, 1785)

Pelopidas thrax (HÜBNER, 1821)

Gegenes pumilio (HOFFMANNSEGG, 1804)

Lampides boeticus (LINNAEUS, 1767)

Danaus chrysippus (LINNAEUS, 1758)

Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)

Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758).

Der Vollständigkeit halber sollen die in Belek häufig zu beobachtenden Taubenschwänzchen-Schwärmer *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS, 1758) vermerkt werden, die tags um die Blüten der *Mirabilis*-Sträucher flogen. Am 10.X. wurden 8 Falter, am 11.X. 1 Falter und am 12.X. 25 Exemplare gezählt.

Literatur

- ABABJIEV, S. P. (1999): New locality record for *Danaus (Anosia) chrysippus* (LINNAEUS, 1758) in Turkey. – *Atalanta* **30**: 55.
- HESSELBARTH, G., VAN OORSCHOT, H. & S. WAGENER (1995): Die Tagfalter der Türkei unter Berücksichtigung der angrenzenden Länder. – Selbstverlag S. Wagener, Bocholt, Bd. 1–3: 1354 + 847 S.

Anschrift des Verfassers

ROLF REINHARDT
Burgstädter Str. 80a
D-09648 Mittweida

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Reinhardt Rolf

Artikel/Article: [Kleine Ergänzungen zur Tagfalterfauna der Türkei \(Lepidoptera, Rhopalocera\) 399-400](#)