©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at
Atalanta (Dezember 2001) **32**(3/4):401, Farbtafel XVIIIb, Würzburg, ISSN 0171-0079

Die Raupe von *Charaxes jasius* (LINNAEUS, 1767) auf Aprikose

(Lepidoptera, Nymphalidae)

von

FRITZ DANNER

eingegangen am 27.X.2001

Am 4.IX.2001 konnte eine L4-Raupe des Erdbeerbaumfalters nahe der Stadt Rethymnon, Insel Kreta auf einem Pfirsichbaum (*Prunus persica*) gefunden werden. Die Raupe saß auf einem jungen Trieb auf dem äußersten Blatt, ca. 3 m hoch am Baum. Zu Hause wurde die Raupe mit Aprikose (*Prunus armeniaca*) bis zur Verpuppung weiter gefüttert. Aus der Puppe schlüpfte am 14.X.2001 ein ♂.

Die Hauptfutterpflanze von *Charaxes jasius* L. ist der Erdbeerbaum *Arbutus unedo*. TOLMAN & LEWINGTON (1998: 137) geben darüberhinaus noch *Osyris quadripartita* (Südspanien und Balearen), *Nicotiana glauca* (Samos) sowie *Citrus* × *nobilis* und *Citrus sinensis* (Nordafrika) an. Hinter *Rhamnus* wird ein Fragezeichen gesetzt.

Literatur

TOLMAN, T. & R. LEWINGTON (1998): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. – Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos-Verlag, Stuttgart.

Erklärung der Farbtafel XVIIIb (S. 475):

Abb. 1: Raupe von *Charaxes jasius* (LINNAEUS, 1767), Kreta, Rethymnon, September 2001.



Anschrift des Verfassers

FRITZ DANNER
Rustorf, Hofmark 6
D-94436 Simbach

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at

Farbtafel XVIIIa

HENSLE, J.: Eine ökologische Variation von *Pieris napi* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Pieridae). - Atalanta **32** (3/4): 389-394.



Abb. 1: *Pieris napi napi* (L.), ♀, gen. vern. Baden-Württemberg, Mittlerer Schwarzwald, ob. Prinzbachtal, 400 m. F1, e.o.: 14.III.1999. Ex Zucht 98/1. J. HENSLE leg. et cult.
Abb. 2: *Pieris napi napi* (L.), ♀, gen aut. Baden-Württemberg, Mittlerer Schwarzwald, ob. Prinzbachtal, 400 m. F1, e.o.: 16.VIII.2000. Ex Zucht 2000/15. J. HENSLE leg. et cult.

Farbtafel XVIIIb

DANNER, F.: Die Raupe von *Charaxes jasius* (LINNAEUS, 1767) auf Aprikose (Lepidoptera, Nymphalidae). - Atalanta **32** (3/4): 401.



Abb. 1: Raupe von *Charaxes jasius* (LINNAEUS, 1767), Kreta, Rethymnon, September 2001.

Farbtafel XVIIIc

EITSCHBERGER, U.: Eine neue *Isoparce*-Art aus Mexico (Lepidoptera, Sphingidae). - Atalanta **32** (3/4): 411-418.



Abb. 1: *Isoparce broui* spec. nov., Holotypus ♀, GenPräp. 3089, Mexico, Tamps., El Cielito, near Encino, 28.-30.VIII.1985, EMEM.
Abb. 2: *Isoparce cuprressi* (BOISDUVAL, [1875]) ♂, USA, Lousiana, St. Tammany Parish, 4.2 miles NE Abita Springs, 23.III.1999, coll. V. A. BROU, EMEM.
Abb. 3: *Isoparce cuprressi* (BOISDUVAL, [1875]) ♀, USA, Lousiana, St. Tammany Parish, 4.2 miles NE Abita Springs, 5.IV.1999, coll. V. A. BROU, EMEM.

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at

Farbtafel XVIIIa / XVIIIb /XVIIIc











ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Atalanta

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 32

Autor(en)/Author(s): Danner Fritz

Artikel/Article: Die Raupe von Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) auf Aprikose (Lepidoptera, Nymphalidae) 401