

Geometridae 2007

von

HEINZ FISCHER

***Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767)** – Gruppe III, Binnenwanderer

Allgemeines: Dieser kosmopolitisch verbreitete Binnenwanderer ist recht variabel und kann gebietsweise mit zwei ähnlichen Arten der Gattung *Casilda* (AGENJO, 1952) verwechselt werden. Die Melder werden deshalb gebeten, nur sicher diagnostizierte Exemplare zu melden, da die Auswerter der Daten diese nicht kontrollieren können. *Casilda antophilaria* (HÜBNER, 1813) ist osteuropäisch und westasiatisch verbreitet, *Casilda consecraria* (STAUDINGER, 1871) kommt in Südwesteuropa und Nordafrika, vor allem an den Küsten, sowie auf Zypern vor. Die zuverlässigsten äußeren Unterscheidungsmerkmale sind der Diskalfleck der Vorderflügel, der bei *R. sacraria* (L.) dunkel ist (weiß bei den beiden anderen Arten), und der Verlauf der Postmedianen, die bei *R. sacraria* (L.) stets in den äußersten Apexspitzen enden (diese enden weiter innen am vorderen Vorderflügelrand bei den beiden *Casilda* - Arten).




Abb.1: *Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767), Abb.2: *Casilda consecraria* (STAUDINGER, 1871) (siehe auch Farbtafel 5: A, B).

Eine detailliertere Diagnose, auch genitaliter, sowie eine große Auswahl verschiedener Variationen dieser drei Arten findet man bei HAUSMANN (2004).

Meldungen 2007: Insgesamt wurden 64 Exemplare von sechs Beobachtern gemeldet, mit einer Ausnahme alle aus den südeuropäischen Mittelmeerländern.

Deutschland: Ein Falter am 4.VIII., Baden Württemberg, 79241 Ihringen, Gündlingerstr.8 (841).

Griechenland: Ein Falter am 14.VIII., Insel Samos, 83100 Lemonakia Beach, 2 km nw Kokkari, 50m -150m, N 37°47'02", E 26°52'28" (102). 50 Falter am 20.10.07, Insel Kos, Hafenort Mastihari, Strand, Dünen (THOMAS KISSLING).

Portugal: Ein Falter am 2.IX., Ulgueira, Quinta, N 38°47'13", W 9°28'27" (PHILIPP WEIGELL).

Italien: 1 ♂ am 8.X., Insel Pantelleria, Montagna Grande, San Vito (54).

Spanien: 10 Falter am 1.XI., 21130 Mazagon, Düne, Park (MAGDALENE HUBBUCH).

Orthonama obstipata (FABRICIUS, 1794) – Gruppe III, Binnenwanderer

Meldungen 2007: Insgesamt wurden 23 Exemplare von 5 Beobachtern gemeldet.

Deutschland: Ein Falter am 28.V., 75443 Ötisheim, Sparcenter Schlattstr. 23 (KARL HOFSSÄSS). Ein Falter am 16.VII., Baden Württemberg, 73240 Wendlingen (385). Ein Falter am 19.VII., 75438 Knittlingen, Stegersee (KARL HOFSSÄSS). Ein Falter am 14.VIII., Bayern, 86551 Aichach-Sulzbach (HEINRICH VOGEL). Ein Falter am 3.XI., 42781 Haan, NSG Spörkelnbruch, Feuchtwiese/ Schafweiden (ARMIN DAHL).

Portugal: 14 ♂♂, 4 ♀♀ am 1.IX., Azoreninsel Pico, Silveira Umgebung (54).

Cyclophora pupillaria (Hübner, 1799) – Gruppe III, Binnenwanderer

Es liegen leider keine Meldungen für 2007 vor.

Die Melder beachten bitte, daß die Art auf Madeira als *Cyclophora pupillaria lilacinipes* (SCHAUS & COCKERELL, 1923) und auf den Azoren als *Cyclophora pupillaria granti* (PROUT, 1935) vorkommt. Beide Unterarten stellen keine Wanderpopulationen dar.

Literatur

HAUSMANN, A. (2004): Sterrhinae. —In A. HAUSMANN (ed.): The Geometrid Moths of Europe 2: 1-600, Apollo Books, Stenstrup.

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Math. HEINZ FISCHER
Rainerweg 25
83700 Rottach
Germany

E-mail: heinzschmetterling@yahoo.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Heinz

Artikel/Article: [Geometridae 2007 157-158](#)