

## Geometridae 2010

von  
HEINZ FISCHER

### ***Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767) - Gruppe III, Binnenwanderer**

Es wurde 1 ♂ und mehrere Raupen aus Syrien gemeldet: Mehrere Raupen an *Polygonum equisetiforme* am 10.X., Jabal al Arab (Südsyrien) westlich von Qanawat, 1080m (STEFAN LEWANDOWSKI); 1 ♂ (Totfund) am 14.X., Dayr Siman (Nordsyrien), 533 m (STEFAN LEWANDOWSKI).

### ***Idaea rusticata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) - Gruppe III, Binnenwanderer**

Insgesamt wurden sechs Falter und vier Eier von zwei Beobachtern aus Baden-Württemberg und der Schweiz in den Monaten Juni, Juli und August gemeldet.

**Deutschland:** Zwei Falter am 6.VII., Baden-Württemberg, Bammental, Guttenbergstr. 7 (Haus Bastian), 140 m, mit der Bemerkung: „beide abgeflogen“; ein Falter am 16.VIII., Baden-Württemberg, Bammental, Guttenbergstr. 7 (Haus Bastian), 140 m, mit der Bemerkung: „nicht mehr frisch“; 1 ♀ am 20.VIII., Baden-Württemberg, Bammental, Guttenbergstr. 7 (Haus Bastian), 140 m, mit der Bemerkung: „am 22.VIII. vier Eier im Glas gefunden“ (alle Meldungen JUTTA BASTIAN).

**Schweiz:** Zwei Falter am 28.VI., 6655 Intragna, Ticino (Tessin), Ortsmuseum mit der Bemerkung: „Erstnachweis 2010“, 46°10'N, 8°42'E (VERENA SCHEIWILLER).

### ***Orthonama obstipata* (FABRICIUS, 1794) - Gruppe III, Binnenwanderer**

Insgesamt wurden drei Exemplare von drei Beobachtern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeldet.

**Deutschland:** 1 ♀ am 15.X., Nordrhein-Westfalen, 47259 Duisburg-Huckingen, an der Eingangsbeleuchtung des Klärwerks, 51°22'26,51"N, 6°44'38,62"E (WILLI WIEWEL).

**Österreich:** 1 ♂ am 17.IX., Oberösterreich, Windischgarsten, Villa Sonnwend am Licht, 47°44'3"N, 14°19'34"E (ANNETTE VON SCHOLLEY-PFAB).

**Schweiz:** 1 ♀ am 23.X., Aargau, 4463 Buus, Schießstand, 47°31'N, 7°52'E (Dr. HEINER ZIEGLER).

Anschrift des Verfassers:


Dipl.-Math. HEINZ FISCHER  
Rainerweg 25  
83700 Rottach  
Germany

E-mail: heinzschmetterling@Yahoo.de

## Buchbesprechung

Omnes Artes, Mailand 2011

ECKWEILER, W. & G. C. BOZANO: Guide to the butterflies of the palaeartic region. Satyrinae part IV, Tribe Satyrini, Subtribe Maniolina - *Maniola*, *Pyronia*, *Aphantopus*, *Hyponephele*. Herausgeber: G. C. BOZANO. DIN A4-Format, 102 Seiten, mit ca. 899 Farbabbildungen von Faltern, zahlreichen Genitalabbildungen (Strichzeichnungen in SW) und farbigen Verbreitungskarten der einzelnen Taxa, mit farbigem Schutzumschlag aus festem Karton. Preis: € 34,-- ISBN 978-88-87989-12-0, ISSN 1723-459X



Khorasan/Iran). Nach den Neubeschreibungen werden die einzelnen Taxa der Satyrinae abgehandelt, wobei auch einige Typentiere farbig abgebildet werden, was den wissenschaftlichen Wert der Arbeit zusätzlich erhöht (Seiten 10-92). Ein umfangreiches Literaturverzeichnis (Seiten 93-98) und ein systematischer Index (Seiten 99-102) runden den Band ab, der wie alle seine Vorgänger jedermann nur wärmstens empfohlen werden kann.

Es ist der 13. Band der Serie „Guide to the butterflies of the palaeartic region“, der mir zu Besprechung vorliegt. Wie alle seine Vorgänger, die allesamt in dieser Zeitschrift vorgestellt wurden, besticht auch dieser Band durch die hervorragende drucktechnische Gestaltung und die großzügige Ausstattung mit Abbildungen, sei es von Faltern, Genitalien oder Verbreitungskarten. Was mich an dieser Serie auch begeistert, ist die effiziente und leichte Handhabung des Buches, die eine Bestimmung der Falter zu einem Kinderspiel macht, - dabei aber auch rasch über das Wesentliche der gesuchten Art oder Unterart informiert.

Ich maße mir hier nicht an zu urteilen, ob das zuvorige Splitten mancher Arten durch andere Autoren in der Vergangenheit, oder das Lumpen, also das erneute Zusammenfassen mehrerer, aufgeteilter Arten unter das Dach einer Art, wie hier durch ECKWEILER & BOZANO vorgenommen, gerechtfertigt ist oder nicht, denn dazu fehlt mir das tiefere Verständnis für diese sehr schöne und reizvolle, aber schwierige Gruppe von Tagfaltern. Das Urteil hierüber, mit eventuellen Korrekturen, sei dem wirklichen Spezialisten vorbehalten, nicht aber den notorischen Kritikern, die selbst nichts oder nur sehr wenig geleistet haben.

Nach dem Vorwort (Seite 1) und der kurzen Einführung in die Serie „Guide to the butterflies of the palaeartic region“ und den darin Verwendeten Abkürzungen (Seiten 2-4), werden von vier *Hyponephele*-Arten fünf neue Unterarten durch ECKWEILER & BOZANO beschrieben (*H. cheena baltistana* aus NW-Pakistan, *H. davendra taftana* aus Beludschistan/SO-Iran, *H. davendra tadjika* aus Tadschikistan/Rußland, *H. chitralica omotoi* aus Afghanistan, *H. cadusia tekkensis* aus

ULF EITSCHBERGER